

*Inf 10. 13

R38377

DIE KRANKHEITEN

DER

MUNDHÖHLE, DES RACHENS UND DER NASE.

Mit Einschluss

der

Rhinoskopie und der local-therapeutischen Technik

für

praktische Aerzte und Studirende

von

DR. PHILIPP SCHECH,

Professor an der Universität München.

ROYAL COLLEGE OF PHYSICIANS, EDINR. LIBRARY.

Mit 41 Abbildungen.

Fünfte vollständig neu bearbeitete Auflage.

LEIPZIG UND WIEN

FRANZ DEUTICKE

1896.

Alle Rechte vorbehalten.

Verlags-Nr. 461.

Druck von Köhler & Hamburger, Wien, VI. Mollardgasse 41.

Vorwort zur ersten Auflage.

Die Fortschritte auf dem Gebiete der Mundrachen-, besonders der noch nicht in ihrer Bedeutung genügend gewürdigten Nasenkrankheiten sind in den letzten Jahren so wesentliche geworden, dass der in der Praxis stehende oder in dieselbe eintretende Arzt nicht umhin kann, von ihnen Notiz zu nehmen. Wenn auch an guten, den betreffenden Stoff behandelnden Schriften und Werken kein Mangel ist, so leidet doch bei aller Vortrefflichkeit ein Theil an zu grosser Knappheit oder an allzu grosser Ausführlichkeit. Der Aufforderung der Verlagsbuchhandlung, ein weniger voluminöses, aber doch die Materie vollständig erschöpfendes Lehrbuch zu schreiben, kam ich um so lieber nach, als ich in einer zwölfjährigen Lehrthätigkeit nicht nur die Bedürfnisse des Praktikers kennen gelernt habe, sondern auch selbst auf dem Gebiete der Hals- und Nasenkrankheiten literarisch und praktisch thätig war. Die Eintheilung des Stoffes mag Manchem ungewohnt sein; doch glaube ich, dass sie ebensogut ist wie irgend eine andere. Dass das Hauptgewicht überall auf den objectiven Befund gelegt wurde, erschien mir im Hinblicke auf die grosse Zahl symptomatisch gleicher Erkrankungen absolut nothwendig; ist man doch gerade bei den Krankheiten des Mundes, Rachens, Kehlkopfes und der Nase genöthigt, die Diagnose fast nur auf die objectiven Zeichen zu basiren. Die ausführlichere Behandlung mancher Capitel erklärt sich aus der Häufigkeit resp. Wichtigkeit der betreffenden Affection; Derjenige, welcher die Therapie zu specialistisch gefärbt findet, möge bedenken, dass es keine andere, einfachere und ebenso wirksame gibt. Die Verdienste Anderer wird der Leser nach Gebühr berücksichtigt finden, aber auch die eigene selbstständige Erfahrung und Kritik des Verfassers nicht vermissen.

München, im October 1884.

Dr. Philipp Schech.

Vorwort zur zweiten Auflage.

Früher, als der Verfasser erwarten durfte, ist eine neue Auflage des vorliegenden Werkchens nothwendig geworden. Die günstige Aufnahme, welche das Buch im In- und Auslande gefunden — eine Uebersetzung in's Englische erschien 1886 (The diseases of the mouth, throat, and nose, translated by R. H. Blaikie, Edinburgh: Young J. Pentland) —, ist dem Verfasser der beste Beweis, dass dasselbe seinen

Zweck nicht verfehlt hat. Die Verbesserungen der zweiten Auflage bestehen theils in Einfügung zahlreicher kleinerer Ergänzungen und Zusätze, theils in Veränderung der Eintheilung und Einschaltung neuer Capitel, wie sie durch die Fortschritte der Wissenschaft und der Vollständigkeit wegen geboten erscheinen. Dem vielfach ausgesprochenen Wunsche nach Vermehrung der Abbildungen und einem Literaturverzeichniss wurde gleichfalls Rechnung getragen. Und so möge auch die zweite Auflage, welcher trotz beträchtlicher Vermehrung des Inhaltes der ursprüngliche Charakter eines kurzen Lehrbuches gewahrt blieb, sich derselben günstigen Aufnahme erfreuen wie die erste.

München, im October 1887.

Dr. Philipp Schech.

Vorwort zur dritten Auflage.

Auch in der vorliegenden dritten Auflage hat sich der Verfasser bemüht, wo es nöthig geworden, zu verbessern und zu ergänzen. Neu sind hinzugekommen die Capitel über „Allgemeine Symptomatologie", damit dem Anfänger durch einige allgemeine Fingerzeige die Erkenntniss der speciellen Affectionen noch mehr erleichtert werde. Die meisten Veränderungen erfuhren mit Rücksicht auf die rege wissenschaftliche Thätigkeit auf diesem Gebiete die Krankheiten der Nase, namentlich jene der Nebenhöhlen. Die Zahl der Abbildungen ist sehr bedeutend (um 20) vermehrt worden. Von den Nasenspiegelbildern, die vom Verfasser genau nach der Natur gezeichnet wurden, hofft derselbe, dass sie ihren Zweck, das bessere Verständniss der Nasenkrankheiten, nicht verfehlen werden.

München, im October 1889.

Dr. Philipp Schech.

Vorwort zur vierten Auflage.

Die Veränderungen der vierten Auflage betreffen sowohl die Vermehrung des Inhaltes als auch die Eintheilung. Neu sind die Capitel „Pharyngitis ulcerosa", „Rhinitis ulcerosa"; der Hypertrophie der Gaumen- und Rachenmandel wurden der besseren Uebersicht wegen eigene Capitel eingeräumt. Die Zahl der Abbildungen wurde wiederum vermehrt, die neueste Literatur in ausgiebigster Weise berücksichtigt.

München, im März 1892.

Dr. Philipp Schech.

Vorwort zur fünften Auflage.

In Folge der ungemein rührigen Thätigkeit, welche in den letzten Jahren auf literarischem Gebiete herrschte, musste die fünfte Auflage grösstentheils umgearbeitet werden. Wenig wurden davon betroffen die Krankheiten der Mundhöhle, mehr die Krankheiten des Rachens, namentlich das Capitel „Diphtherie", am meisten die Krankheiten der Nase und unter diesen wieder die Krankheiten der Nebenhöhlen, welche in völlig veränderter Form erscheinen.

München, im October 1895.

Dr. Philipp Schech.

Inhaltsverzeichniss.

I. Abtheilung.

Die Krankheiten der Mundhöhle und der Speicheldrüsen.

Seite

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen 1
Untersuchungsmethode 5
Allgemeine Symptomatologie 6
Allgemeine Therapie 8
Missbildungen, angeborene und erworbene Formfehler und sonstige Anomalien 8
Stomatitis catarrhalis und gonorrhoica 11
Leukoplakia oris 15
Stomatitis phlegmonosa und parenchymatosa 19
Stomatitis exsudativa (Eczem, Herpes, Pemphigus, Urticaria, Variola, Aphthen) 27
Stomatitis ulcerosa 33
Stomatitis diphtheritica 44
Stomatitis gangraenosa 45
Syphilis 49
Tuberculose, Lupus, Lepra, Rotz 53
Mykosen und Parasiten 58
Blutungen 63
Neubildungen und Geschwülste 65
Nervenkrankheiten 69

Die Krankheiten der Speicheldrüsen.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen 77
Vermehrung der Speichelsecretion, Speichelfluss 78
Verminderung der Speichelsecretion, Aptyalismus, Xerostomie 81
Parotitis epidemica 82
Parotitis suppurativa 86
Sialodochitis 87
Erkrankungen der Submaxillaris und Sublingualis 88
Angina Ludovici 89
Gechwülste, Neubildungen und Concretionen 92

II. Abtheilung.

Die Krankheiten des Rachens.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen 97
Untersuchungsmethode 102
Allgemeine Symptomatologie 109
Allgemeine Therapie 111
Missbildungen, angeborene und erworbene Formfehler und sonstige Anomalien 119
Pharyngitis catarrhalis acuta 126
Pharyngitis chronica 134
Hypertrophie der Rachenmandel 151
Hypertrophie der Gaumenmandeln 161

Seite
Pharyngitis phlegmonosa 165
Retropharyngealabscess 171
Pharyngitis exsudativa (Miliaria, Herpes, Erysipel, Pemphigus, Erythema exsudativum, Variola, Pharyngitis fibrinosa, Aphthen, Oedem) 175
Pharyngitis ulcerosa 179
Pharyngitis diphtheritica 181
Pharyngitis gangraenosa 204
Syphilis 205
Tuberculose 210
Scrophulose. Lupus, Lepra, Rotz 212
Mykosen 215
Blutungen 218
Fremdkörper und Concretionen 220
Neubildungen und Geschwülste 224
Nervenkrankheiten 230

III. Abtheilung.

Die Krankheiten der Nase.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen 243
Untersuchungsmethode 250
Allgemeine Symptomatologie 255
Allgemeine Therapie mit Allgemeiner Operationslehre, Wundbehandlung und üble Zufälle 261
Missbildungen, Anomalien und Formfehler 269
Rhinitis catarrhalis acuta und purulenta 278
Rhinitis chronica (hypertrophica, atrophica, Ozaena) 283
Rhinitis phlegmonosa, Septumabscess, primäre Perichondritis 298
Rhinitis exsudativa (Herpes, Eczem des Naseneinganges, Oedem, Rhinitis fibrinosa) 300
Rhinitis ulcerosa 303
Rhinitis diphtheritica 307
Rhinitis gangraenosa 308
Syphilis 309
Tuberculose 316
Scrophulose, Lupus, Rotz, Rhinosclerom 319
Mykosen und Parasiten 324
Blutungen 326
Fremdkörper und Concretionen (Nasensteine) 330
Neubildungen und Geschwülste 332
Nervenkrankheiten 344
Reflexneurosen 349

Die Krankheiten der Nebenhöhlen.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen 363
Missbildungen, Formfehler und sonstige Anomalien 367
Allgemeine Pathologie 368
Allgemeine Aetiologie und Symptomatologie 370
Allgemeine Diagnose 373
Die Krankheiten der Kieferhöhle 378
Die Krankheiten der Stirnhöhle 387
Die Krankheiten der Siebbeinhöhlen 395
Die Krankheiten der Keilbeinhöhle 398

Figurenverzeichniss.

			Seite
Figur	1.	Frontalansicht des Nasenrachenraumes nach Luschka	98
„	2.	Verschiedene Gaumenhaken	105
„	3.	Das rhinoskopische Bild	106
„	4.	Vergrössertes Bild des Nasenrachenraumes von vorne nach Zaufal	107
„	5.	Universalhandgriff von Schech für galvanokaustische Operationen	116
„	6.	Zweielementige Zinkkohlentauchbatterie nach von Bruns	117
„	7.	Verwachsung des perforirten weichen Gaumens mit der Hinterwand	122
„	8.	Membranartige Verwachsung der Zunge mit der hinteren Rachenwand	123
„	9.	Membran- und bandartige Verwachsung der Zunge mit der hinteren Rachenwand	123
„	10.	Adenoide Wucherungen schweren Grades	153
„	11.	Ringmesser von Gottstein	158
„	12.	Ringmesser von Lange	158
„	13.	Curette von Hartmann	158
„	14.	Choanenzange von Schech	159
„	15.	Ansicht der rechten Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes	245
„	16.	Verschiedene Nasenspiegel	251
„	17.	Nasenspiegelbild, perspectivisch verkürzt	252
„	18.	Nasenspiegelbild, perspectivisch verlängert	252
„	19.	Terrassenförmig abfallendes Septum	271
„	20.	Deviation des Septum im oberen Theile, Spina im unteren	271
„	21.	Infractionsdeviation	271
„	22.	Hochgradig missbildetes deviirtes Septum etc.	272
„	23.	Hochgradige Verkrümmung des Septum mit Spinenbildung	272
„	24.	Spina am unteren Theile des Septum	273
„	25.	Spina septi rechts, Infractionsdeviation links	273
„	26.	Von der unteren zur mittleren Muschel sich erhebende Spina	273
„	27.	Hypertrophische Rhinitis	284
„	28.	Einfache und papilläre Hypertrophie der hinteren Muschelenden	285
„	29.	Syphilitische Geschwüre an Muscheln und Scheidewand	310
„	30.	Ovale Perforation des Septum	311
„	31.	Grosser unregelmässiger Defect des Septum	311
„	32.	Schleimpolypen in beiden Nasen	334
„	33.	Papillom der unteren Muschel	335
„	34.	Vom Vomer ausgehender Nasenrachenpolyp	336
„	35.	Vom Keilbein ausgehender Nasenrachenpolyp	336
„	36.	Schlingenschnürer (Ecraseur) für die Nase	340
„	37.	Canüle zum Ausspritzen der Kiefer- und Stirnhöhle vom Hiatus aus	376
„	38.	Canüle zum Ausspülen der Kieferhöhle von der Alveole oder Fossa canina aus	382
„	39.	Instrument von Hartmann zur Eröffnung der Kieferhöhle von der Alveole aus	383
„	40.	Troicart von Mikulicz zur Eröffnung der Kieferhöhle von der Nase aus	385
„	41.	Troicart und Canüle von Krause zur Eröffnung der Kieferhöhle von der Nase aus	385

I. Abtheilung.

Die Krankheiten der Mundhöhle und der Speicheldrüsen.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen.

Als Mundhöhle bezeichnet man denjenigen Raum, welcher vorne von den Lippen, seitlich von der Schleimhaut der Wangen, oben vom harten Gaumen, hinten vom Gaumensegel und unten von der Zunge und den vom Unterkiefer zum Zungenbein gehenden Muskeln begrenzt wird. Durch das Vorgeschobenwerden der Alveolen des Ober- und Unterkiefers zerfällt die Mundhöhle in zwei Theile, einen kleinen vorderen, das Vestibulum oris, und einen grösseren hinteren, das eigentliche Cavum oris. Beide Theile communiciren miteinander durch eine Lücke, welche zwischen dem letzten Backzahne und dem vorderen Rande des Kronenfortsatzes des Unterkiefers liegt. Die vordere Oeffnung der Mundhöhle, die Rima oris, wird gebildet durch die Lippen, zwei äusserst bewegliche Gebilde, deren Bedeckung in die Schleimhaut des Digestionstractus übergeht und von denen jede mittelst einer schmalen Schleimhautfalte — dem Frenulum labii super. et infer. — an das Zahnfleisch angeheftet ist. Die Schleimhaut der Lippen setzt sich einerseits auf die Innenfläche der Wangen, andererseits auf die Alveolarfortsätze des Ober- und Unterkiefers fort, um durch die Lücken zwischen den Zähnen auf den harten Gaumen und mittelst des Zungenbändchens auf die Zunge und die Ausführungsgänge der Sublingual- und Submaxillardrüsen sich zu erstrecken. Wenn auch die vordere Fläche des weichen Gaumens anatomisch noch zur Mundhöhle gehört, so kann derselbe doch erst bei den Rachengebilden besprochen werden.

Der wichtigste Bestandtheil der Mundhöhle ist die Zunge.

Ihre obere convexe Fläche ist bis zum Isthmus faucium hin mit Tast- und Geschmacksorganen besetzt und erhält dadurch ein unebenes, rauhes, zottiges Aussehen. Man unterscheidet kleine, fadenförmige Erhabenheiten, die Papillae filiformes, welche in unzähliger Menge die Oberfläche der Zunge einnehmen und derselben das rauhe, pelzartige Aussehen geben, ferner die grösseren Papillae fungiformes, welche als rundliche Knöpfchen oder kurze, zapfenartige Höcker zwischen die ersteren eingestreut sind, und endlich die grössten, die Papillae circumvallatae, welche, in V-förmiger Stellung gegen den Isthmus faucium gerichtet, über die übrige Schleimhaut beträchtlich hervorragen

und deshalb von ängstlichen Leuten öfters für pathologische Producte, besonders für Krebswucherungen gehalten werden.

Der hinterste Theil der Zunge, von den wallartigen Papillen bis zum Kehldeckel hinab, besitzt sehr entwickelte Balgdrüsen, welche geschlossene Follikel enthalten. Ihre Zahl schwankt nach Ostmann zwischen 34—102; sie bilden einen Theil des „lymphatischen Pharynxringes" und werden auch als „Zungentonsille" oder „vierte Mandel" bezeichnet. An den Seitenrändern der Zunge, unmittelbar vor der Insertion der vorderen Gaumenbögen, findet sich theils eine flache, unebene oder gekerbte Erhabenheit, theils eine deutlich abgegrenzte, linsengrosse Erhöhung, die Papilla foliata, ein Geschmacksorgan, das, namentlich wenn dasselbe excessiv vergrössert oder gar der Sitz von Schmerzen ist, für ein pathologisches Gebilde gehalten werden kann.

Hinsichtlich der Oberfläche der Zunge begegnet man den grössten Verschiedenheiten.

Während meistens die Oberfläche glatt und gleichmässig ist, erscheint sie bei manchen Personen der Länge und der Quere nach zerklüftet und tief eingeschnitten, welchen Zustand man auch als Glossitis dissecans bezeichnet.

Sehr häufig finden sich, sowohl unter normalen als pathologischen Verhältnissen, an den Rändern der Zunge und auf der Wangenschleimhaut die Abdrücke der Zähne. Treten die Papillen durch Schwellung und Röthung stärker hervor, dann spricht man von Himbeer-, Katzen- oder Erdbeerzunge, wie sie hauptsächlich bei Scharlach beobachtet wird. Narben an der Zunge deuten auf frühere Verletzungen, vielleicht in Folge von Epilepsie, überstandener Syphilis oder Leukoplakie

Die Oberfläche der Zunge ist mit einer weissen, weissgelben oder grünlichen Masse bedeckt, welche gegen die Zungenspitze zu allmälig spärlicher wird oder ganz fehlt, in der Mitte der Zunge aber, besonders gegen den Isthmus faucium hin, an Mächtigkeit zunimmt, dem sogenannten Zungenbelag, dessen Vorhandensein nach Unna an die haarbüschelragenden Papillae filiformes geknüpft ist. Bei manchen ganz gesunden Individuen, namentlich Rauchern und Trinkern, erreicht der Zungenbelag eine Dicke, die man sonst nur bei pathologischen Zuständen zu sehen bekommt. Der pathologische Zungenbelag entsteht in den meisten Fällen durch eine Schwellung der gesammten Haarbüschelbegleitung der Pap. filif.

Die Weisse des Zungenbelags ist theilweise durch Quellung der oberen Hornschichten, theilweise durch Pilzwucherungen in derselben bedingt.

Trockenes, glänzendes, wie lackirtes Aussehen der Zunge beobachtet man bei Fiebernden, Typhösen, Pneumonikern, Urämischen. Diabetikern oder Solchen, welche nicht durch die Nase athmen können, ebenso bräunlichen fuliginösen Belag; schwarzer oder dunkelbraunrother Belag rührt theils von Medicamenten und Ingesten, so namentlich von Eisenpräparaten, Succ. liquir, Rothwein und Heidelbeeren, theils von eingetrocknetem Blute aus kleinen Schleimhautrissen her.

Die Form des Zungenbelags variirt ausserordentlich. Er erscheint theils in Längsstreifen an den Rändern oder in der Mitte der Zunge, theils in Form rundlicher oder länglicher Flecken, theils in Gestalt gewundener Linien und Kreise, deren Centrum roth erscheint, theils in zusammenhängenden Flächen. Der Belag besteht wie jener an dem Zahnfleisch und zwischen den Zähnen zum kleinen Theile aus jüngeren und älteren, theilweise fettigdegenerirten Epithelien, Speiseresten, Fettkugeln, Schleimkörperchen, zum grössten Theile hingegen aus Mikroorganismen, Leptothrix, Kokken, Bacterien, Bacillen und Spirillen. Wenn auch diese Organismen für gewöhnlich unschädlich sind, so können dieselben doch zeitweise und unter gewissen nicht näher bekannten Umständen, wenn sie in eine Wunde gerathen, gefährliche Erscheinungen zur Folge haben, wie auch durch zahlreiche Versuche constatirt ist, dass durch Inoculation normalen Mundspeichels Thiere getödtet werden können. Biondi fand in dem normalen Mundspeichel des Menschen fünferlei pathogene Mikroorganismen.

Die Schleimhaut der Mundhöhle ist nicht an allen Orten gleich stramm an ihre Unterlage festgeheftet. Am festesten ist sie über dem harten Gaumen, lockerer an den Uebergangsstellen zum Zahnfleisch und den Lippen. Ihr Epithel ist Pflasterepithel, das namentlich an der Zunge in beständiger Desquamation begriffen ist. Sie ist besonders reich an Schleimdrüsen, deren Ausführungsgänge als stecknadelstichgrosse Punkte leicht erkennbar sind, während die zu Gruppen vereinigten Acini namentlich an den Lippen durch die Schleimhaut durchschimmern. Blässe der Schleimhaut deutet stets auf Anämie, mag sie eine primäre oder secundäre sein, Cyanose sieht man bei Herzfehlern und Larynx- und Trachealstenose, Emphysem, braune oder schwarze Pigmentirung in Form kleinerer oder grösserer Flecken an den Lippen, Wangen und hartem Gaumen bei Argyrie, Morb. Addisonii, weisse Flecken bei Leukoplakie, Hydrargyrose, Soor, Aphthen, Syphilis etc., gelbe bei Xanthelasma.

An Lymphgefässen ist besonders die Zunge reich. Die Capillaren der Schleimhaut und ihrer Papillen bilden reiche, injicirbare Netze, welche zu grösseren Stämmchen zusammenfliessen und mit denen des Pharynx und der Zungenmuskeln sich verbinden. An Lymphdrüsen sind besonders zu nennen die Glandul. auricul. anter., faciales profundae, hauptsächlich aber die Submaxillares und die oberflächlichen und tiefen Cervical- und Jugulardrüsen.

Die arteriellen Gefässe der Mundhöhle stammen aus sehr verschiedenen Zweigen. So schickt z. B. die Art. maxillaris externa die Art. submentalis für die Haut und Muskeln unter dem Kinne, die Rami glandulares und musculares für Parotis, Submaxillaris, M. digastricus, stylohyoideus, masseter und pterygoid. int., ferner die Coronaria der Ober- und Unterlippe; die Art. auricul. post. aus der Carotis externa versorgt die Parotis, den M. digastricus, stylohyoideus, styloglossus etc.; die Art. temporalis gleichfalls die Parotis und mittelst der Art. transversa faciei die Wange und Gesichtsmuskeln; an die Zähne gehen Aeste der Art. maxillar. interna, so die Art. alveol. inf. an die Zähne des Unterkiefers, endlich gehen auch noch Aeste der Art. maxill. int. an die Kaumuskeln.

Die grössten Gefässe führt die Zunge. Die Arteria lingualis aus der Carotis externa entspringt in gleicher Höhe mit dem grossen Horne des Zungenbeines und dringt zwischen Hyoglossus und Constrictor phar. med. in die Zunge ein. Ihre Verzweigungen in der Zungensubstanz selbst heissen Art. hyoidea, Art dorsal. linguae, Art. sublingualis und Art. profunda linguae oder ranina; die letztere ist der stärkste Ast und tritt neben dem Frenulum linguae in die Zunge, weshalb sie bei Operationen am Boden der Mundhöhle, wie z. B. dem Lösen des Frenulum, leicht verletzt werden kann.

Die Venen Venae buccales, labii super. und inf. massetericae, parotideae, submentalis münden in die Vena facial. anter., die Vena transversa faciei, alveolaris super. et infer., parotidea münden in die Vena facialis posterior, die unter der Zungenspitze entstehenden Venae linguales in die V. jugular. interna.

Die Nerven der Mundhöhle dienen theils dem Tastsinn, theils dem Geschmack, theils der Bewegung der Muskeln.

Die Gefühlsnerven stammen aus dem Trigeminus, die Geschmacksnerven aus dem Glossopharyngeus. Dem Nerv. lingualis des Trigeminus, besonders der in ihm vorhandenen Chorda tympani, welche von Facialis stammt, schreibt man eine specifische Geschmacksempfindung zu, zumal er sich in jenen Regionen der Zungenschleimhaut verbreitet, in die der Glossopharyngeus nicht hineingelangt.

Die Motilität der Zunge wird durch den N. hypoglossus vermittelt; seine Zweige begeben sich zum M. hyoglossus, M. geniohyoideus, genioglossus, longitudinalis und transversus linguae. Die Musc. mylohyoid., sowie der vordere Bauch des M. biventer erhalten ihre Innervation vom dritten Aste des Trigeminus. Die Kaumuskeln werden von der motorischen Portion des Trigeminus innervirt, der Orbicul. oris sowie die mimischen Muskeln vom N. facialis.

Die Musculatur der Mundhöhle setzt sich zusammen aus den Muskeln der Lippen, der Wangen und der Zunge.

Unter den Muskeln der Lippen ist der wichtigste der Orbicul. oris. Er schliesst den Mund, spitzt die Lippen zum Pfeifen, Küssen und Ausblasen des Lichtes und verlängert sie zu einem kurzen Rüssel beim Saugen.

Zu den mimischen Muskeln gehören der Levator lab. super., der Levator und Depressor anguli oris, der Zygomat. major und minor, der Risorius Santorini, Levator menti etc.

Von den Muskeln der Wange ist der Buccinator zu erwähnen. Wirkt er allein, so erweitert er die Mundhöhle in die Quere; wird diese Erweiterung durch die gleichzeitige Thätigkeit des Orbicul. oris aufgehoben, dann drückt er die Wange an die Zähne oder er comprimirt die mit Luft gefüllte Mundhöhle, welche, wenn die Lippen sich ein wenig öffnen, mit Gewalt entweicht, wie beim Spielen von Blasinstrumenten; er heisst deshalb auch Trompetermuskel.

Zu den Kaumuskeln rechnet man den Musc. temporalis, den Masseter und Pterygoid internus und externus. Sie haben alle die Function, den Unterkiefer an den Oberkiefer heranzuziehen; der

Pterygoid. int. hebt nicht nur den Unterkiefer, sondern schiebt ihn auch nach vorne, wenn er einseitig wirkt, nach der entgegengesetzten Seite und wird daher vom Pterygoid. int. unterstützt.

Der Boden der Mundhöhle resp. Zunge wird gebildet aus dem M. digastricus (Biventer), mylohyoideus, geniohyoideus, stylohyoideus, genioglossus, hyoglossus, styloglossus.

Die Zunge selbst besteht ausser den sich rechtwinkelig mit einander verwebenden Fasern des Genioglossus, Hyoglossus und Styloglossus noch aus drei besonderen Muskelschichten, welche in der Zunge entspringen und auch in ihr endigen.

Die obere Längenschichte, gleich unter der Schleimhaut gelegen, schiebt ihre Bündel zwischen die des Genioglossus hinein. Die untere überragt an Stärke die obere. Sie dehnt sich zwischen dem Musc. genioglossus und hyoglossus an der unteren Fläche der Zunge bis zur Spitze hin.

Die quere Muskelschichte, Musc. lingualis transversus, entspringt von den Seitenflächen des Septum linguae. Ihre Fasern laufen nach aus- und aufwärts, die inneren gehen zum Rücken der Zunge, die äusseren zum Zungenrande und schieben sich zwischen den Längsfasern des Genioglossus und Hyoglossus hindurch.

Die M. genioglossi ziehen die Zunge nach vorne und bewirken deren Herausstrecken, die M. hyoglossi ziehen nach hinten. Gemeinschaftlich wirkend, platten diese beiden Muskeln die Zunge ab. Die einzelnen Muskelfasern können sich unabhängig von einander contrahiren, wodurch die Zunge nach auf- und abwärts, rechts und links beweglich und wölbungsfähig wird und sich auch rinnenförmig vertiefen kann.

Manche Menschen besitzen eine ausserordentliche Beweglichkeit ihrer Zunge (Volubilitas linguae); sie können dieselbe in den Nasenrachenraum einführen oder in dem unteren Abschnitte des Rachens verschwinden lassen oder mit der Nasenspitze in Berührung bringen.

In der Mundhöhle befinden sich die Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, deren anatomische Beschreibung bei den Krankheiten der Speicheldrüsen nachzusehen ist.

Untersuchungsmethode.

Zur Untersuchung der Mundhöhle bedient man sich vorzugsweise der Inspection.

Man lässt entweder das diffuse oder reflectirte Tageslicht in die Mundhöhle fallen oder bei trübem Wetter oder bei Nacht das reflectirte künstliche Licht. Niemals unterlasse man, mit den hakenförmig in die Mundwinkel eingesetzten Zeigefingern die Wangen abzuziehen oder die Lippen umzustülpen und Zähne und Zahnfleisch genau zu besichtigen.

Schlechte, cariöse Zähne finden sich sehr oft im Gefolge von Bluterkrankungen, so namentlich bei Anämie, Tuberculose, Syphilis, Diabetes mellitus, ferner bei Verdauungsstörungen, Rhachitis, rasch aufeinander folgendem Genuss heisser und kalter Ingesta, dem Gebrauch von Mineralsäuren und gewisser Eisenpräparate und Mundwässer. Das Zahnfleisch zeigt häufig einen rothen, entzündeten, aufgelockerten Rand, so namentlich bei Scorbut; häufig ist ein schiefergrauer Saum bei Bleivergiftung.

Grosse Schwierigkeiten bietet oft die Untersuchung des Bodens der Mundhöhle. Während Sänger oder Gesangskundige durchweg ihrer Zunge jede gewünschte Stellung geben können, benehmen sich Ungeübte, besonders Fettleibige, Bonvivants oder Aengstliche, meist recht ungeschickt. Würge- und Brechbewegungen beim Versuche, die Zunge herauszustrecken, rollendes Herumwerfen derselben, sowie Einrisse in das Zungenbändchen gehören bei diesen zu den gewöhnlichen Vorkommnissen. Wie sehr die laryngoskopische Untersuchung durch das sogenannte Steigen der Zunge erschwert wird, ist ja genügend bekannt.

Der hinterste Theil der Zunge wird am besten mit dem Kehlkopfspiegel untersucht, doch leistet auch die Palpation mit dem Finger gute Dienste. Dieselbe ist unentbehrlich zur Constatirung des Umfanges und der Consistenz etwaiger Tumoren oder Fremdkörper, sowie der Beschaffenheit des Grundes und der Ränder der Geschwüre.

Wichtige Aufschlüsse gibt auch in manchen Fällen der Geruchssinn, sowie die chemische Analyse der Mundsecrete. Von grösster Bedeutung ist endlich auch die mikroskopische Untersuchung der Geschwürssecrete, Belege, Gewebsbestandtheile und Neubildungen.

Allgemeine Symptomatologie.

Die weitaus häufigsten Klagen der Mundkranken beziehen sich auf das Vorhandensein abnormer Sensationen. Am häufigsten sind Schmerzen bei der Nahrungsaufnahme, beim Erfassen und Zerkleinern der Speisen, beim Trinken, Sprechen oder Rauchen; auch spontan auftretende lancinirende oder neuralgische Schmerzen kommen vor. Die erstere häufigere Art findet sich stets bei Entzündungs- und Ulcerationsprocessen oder Epithelverlusten, die letztere Art bei neurasthenischen Personen, sowie oft schon frühzeitig bei Carcinom der Zunge. Am empfindlichsten erweist sich die Zunge, besonders die Zungenspitze, an welcher äusserst geringfügige und leicht zu übersehende Veränderungen, wie Röthung und Schwellung der Papillen, Epithelverluste, die heftigsten Schmerzen zur Folge haben. Von anderweitigen Sensationen sind zu erwähnen: das Gefühl des Wundseins, Brennens, ferner das Gefühl von Eingeschlafensein, Pelzigsein, von Steifigkeit, Schwerbeweglichkeit der Zunge und Lippen, letzteres meist in Folge von motorischer oder sensibler Lähmung.

Schluckbeschwerden sind bedingt durch phlegmonöse Entzündung und Abscedirung der Zunge, Geschwüre am Zungengrund, Infiltrate des Mundbodens, grosse Geschwülste der Speicheldrüsen oder der Zungenwurzel.

Eine häufige Klage bilden Anomalien der Secretion. Die Production des Mundspeichels und der Schleimdrüsen erscheint verringert, die Kranken klagen über Trockenheit und müssen sich öfters anfeuchten; gewöhnlich findet sich dieser Zustand bei Fieber, im Anfangsstadium der Stomatitis, namentlich bei Stomatitis sicca, bei Schrumpfniere, Diabetes, Magenkatarrhen, Polyurie, acuten Wasserverlusten und bei der Mundathmung. Ist die Secretion hingegen vermehrt, besteht Speichelfluss, so müssen die Kranken beständig das rasch sich ansammelnde Secret durch Ausspucken entfernen. In der Regel gesellen sich zu diesen Erscheinungen Störungen des Geschmacks.

Aeusserst häufig findet sich übler Geruch aus dem Munde. Die gewöhnliche Ursache des Fötor ist mangelhafte Reinigung und Pflege der Mundhöhle, namentlich der Zähne und des Zahnfleisches, Caries der Zähne, Nichtentfernen von Speiseresten aus hohlen Zähnen oder deren Zwischenräumen; seltener kommt übler Geruch vor bei Concrementbildungen der Zungen- und Gaumenmandel.

Gewisse Mundentzündungen, namentlich die mit Geschwürsbildung einhergehenden, wie: Stomatitis mercurialis, scorbutica, Stomacace, Diphtherie, tuberculöse oder syphilitische Geschwüre, zerfallende Neubildungen sowie Gangrän haben einen äusserst widrigen, ja aashaften Geruch zur Folge.

Sehr häufig sind Anomalien der Sprache, namentlich der Articulation vorhanden. Die Sprache erscheint verlangsamt, undeutlich, lallend, die Production gewisser Consonanten ist erschwert oder unmöglich, die Kranken stossen mit der Zunge an; diese Störungen haben ihren Grund entweder in Lähmungszuständen oder in entzündlichen Infiltraten, Neubildungen, Cystenbildung oder Geschwürsprocessen der Zunge, Lippen oder des Mundbodens.

Am seltensten sind Respirationsstörungen. Sie kommen vor bei phlegmonösen Entzündungen und Abscessen der Zunge, ausgebreiteten den Racheneingang verengernden Infiltraten des Mundbodens oder grossen Neubildungen, Miterkrankungen des Kehlkopfeingangs.

Allgemeinstörungen, Fieber, Appetitlosigkeit, mangelhafte Ernährung etc. kommen meist nur bei phlegmonösen und diphtheritischen Processen, verjauchenden Neubildungen, Noma, bei Kindern jedoch schon bei geringfügigen Mundaffectionen, Soor, Aphthen, Herpes etc. zur Beobachtung. Auch allgemeine pyämische und septische Erscheinungen können von Erkrankungen der Mundhöhle ihren Ausgang nehmen.

Allgemeine Therapie.

Die Mundhöhle ist der localen Behandlung sehr leicht zugänglich. Die Application von Heilmitteln in Form von Mundwässern ist so alt wie die Medicin. Man benützt dazu wässerige oder schleimige Flüssigkeiten, Pflanzeninfuse oder Decocte, in welchen die Arzneistoffe aufgelöst oder suspendirt werden. Am häufigsten werden jetzt gebraucht die Desinficientia, so namentlich das Creolin, Kali chloricum, Kali hypermang., Odol, Lysol, die Salicyl-, Bor-, Carbolsäure, das Salol, ein Kaffeelöffel voll einer 6% alkoholischen Lösung in einem Glas Wasser, ferner die Adstringentia, Alaun, Natr. biborac., Tannin, Arg. nitr., Tinct. Ratanh., Tinct. gallar., endlich auch die Aromatica, Tinct. Benzoes, Tinct. Myrrhae, Eau de Pierre, de Botot etc. Diese Stoffe werden auch in Form von Einspritzungen, Inhalationen und Pinselungen angewendet.

Pulverförmige Substanzen, Seifen, Pasten sind fast nur zur Reinigung der Zähne in Gebrauch.

Von den narkotischen Mitteln sind die beliebtesten Tinct. opii, Morphium; als locales Anästheticum, besonders bei schmerzhaften Fissuren und Geschwüren, empfiehlt sich hauptsächlich das Cocaïn oder Menthol.

Von den Aetzmitteln sind die gebräuchlichsten: Argent. nitr., Zinc. chlor., Sublimat, Milchsäure, Chromsäure, Trichloressigsäure, ferner der Thermocautère und die Galvanokaustik. Auch die Elektricität findet zur Reizung der Muskeln und Nerven ausgedehnte Verwendung. Relativ selten dagegen werden jetzt verordnet die Kaumittel, Pastillen, Leeksäfte.

Bei manchen Affectionen ist endlich auch eine externe Behandlung nöthig; sie besteht in Blutentziehungen mittelst Blutegeln und der Application kalter und warmer Umschläge und medicamentösen Einreibungen und Bepinselungen mit Jod, Jodoform, Ung. cin., Chloroform, Ol. Hyoscyami. Auch die Massage wurde, allerdings mit sehr zweifelhaftem Erfolge, bei Lymphdrüsengeschwülsten, Cysten etc. empfohlen.

Missbildungen, angeborene und erworbene Formfehler und sonstige Anomalien.

Unter den Formfehlern der Mundhöhle kommen vor Allem jene Spaltbildungen in Betracht, welche dadurch zu Stande kommen, dass die einzelnen Theile, aus welchen sich das Gesicht zusammensetzt, sich getrennt von einander entwickeln, oder dass dieselben da, wo diese Trennung für eine gewisse Entwicklungsstufe normal ist, sich später nicht miteinander vereinigen.

Die bekannteste und häufigste Missbildung ist die Spaltung der Lippen, die Hasenscharte. Sie betrifft meist die Oberlippe seitlich

von der Mittellinie und ragt häufig bis an den Nasenflügel oder in das Nasenloch hinein. Sie ist häufiger einseitig als doppelseitig, oder auf beiden Seiten gleich stark oder auf einer Seite schwächer entwickelt. Von den Dehiscenzen der eigentlichen Mundhöhle ist zu erwähnen die Kieferspalte zwischen Schneide- und Augenzahn. Dieselbe kann sich auf den harten Gaumen fortsetzen und erzeugt so die Gaumenspalte oder bei Doppelseitigkeit den Wolfsrachen, bei welchem in der Regel auch Lippen und weicher Gaumen mitgespalten erscheinen. Die Folgen dieser Missbildung beziehen sich hauptsächlich auf die Ernährung Da das Saugen erschwert ist, bleiben die Kinder oft atrophisch, auch dann, wenn die Nahrung mit dem Löffel gegeben wird, da ein Theil durch die Nase herausgeschleudert wird. Selten sind Wangenspalten, angeborene Defecte, die bis zum Ohre oder zu den Augenlidern reichen können.

Auch theilweisen oder gänzlichen Verschluss der Mundhöhle durch Verwachsung der Lippenränder hat man beobachtet, ebenso abnorme Kleinheit der Mundöffnung, „Mikrostomie“, so dass manchmal kaum eine Sonde durchpassiren kann, ferner abnorme Kürze der Lippen, „Brachylie“, abnorme Kürze des Lippenbändchens, Lippenfisteln, Verwachsungen und Verbindungen der Lippen mit den Alveolarrändern der Kiefer oder dem Gaumen. Relativ selten ist die Doppellippe; man versteht darunter einen allmälig an dem Roth der Oberlippe sich entwickelnden Wulst, der durch eine Furche von der eigentlichen Lippe getrennt und durch das Frenul. labii öfters in zwei Hälften getheilt wird.

Verhältnissmässig häufig ist die Hypertrophie der Lippen. Sie ist theils angeboren, theils erworben und beruht auf Wucherung des interstitiellen Bindegewebes und Vergrösserung der Drüsen in Folge von Eczem, chronischer Rhinitis resp. Lymphangoitis und venöser Stase. Bekannt ist die dicke Oberlippe der serophulösen und tuberculösen Kinder und die der Erwachsenen in Folge von häufigen Entzündungen dieser Theile. Die geschwellte Lippe ist schmerzlos, fühlt sich hart und derb an und ist zuweilen mit Einrissen versehen. Hypertrophische knorpelharte Lippen sah Verf. einmal in einem Falle von Sclerema adultorum.

Als angeborene Anomalien kommen auch Verdoppelung der Zunge und des Gaumens, accessorische Zungenbildung, ferner das Fehlen und die Spaltung der Zunge, die abnorme Kleinheit oder die abnorme Grösse, Makroglossie, zur Beobachtung; ferner Verwachsungen der Zunge mit dem Zahnfleische und dem Boden der Mundhöhle, angeboren oder erworben nach Ulcerationen, ferner zu grosse Kürze oder zu grosse Länge des Zungenbändchens. Mit der abnormen Kürze des Frenulum, der „angewachsenen Zunge“, wurde von jeher viel Unfug getrieben und alles Mögliche auf das angebliche Vorhandensein dieser Anomalie geschoben; von einer abnormen Kürze des Zungenbändchens kann jedoch nur dann die Rede sein, wenn der Finger nicht unter die Spitze der Zunge gelegt und diese letztere nicht über die Schneidezähne hervorgestreekt werden

kann. Da, wo das Zungenbändchen sich zu weit nach vorne inserirt, sind die Bewegungen der Zungenspitze beschränkt und das Saugen und Sprechen erschwert. Zu grosse Länge des Frenulum bedingt das sogenannte Verschlucken der Zunge, welche sich beim Saugen gegen den harten Gaumen aufbäumt und durch Niederdrücken des Kehldeckels Dyspnoe verursachen kann; dasselbe geschieht häufig in der Chloroformnarkose, wenn die gelähmten Muskeln in Folge ihrer Schwere die Zunge nach rückwärts ziehen. Das Lallen, Stammeln, Stottern, sowie die anderen Sprachfehler, Sigmatismus, Rotacismus, Lambdacismus, haben seltener ihren Grund in organischen Veränderungen der Sprachwerkzeuge als vielmehr in einer unrichtigen Verwendung und Stellung oder mangelhaften Uebung.

Erwähnt sei noch, dass Schäffer einmal einen Nävus des Gesichts sich auf die Schleimhaut des Mundes, Rachens und Kehlkopfes fortsetzen sah. Auch beobachtete Verf. einmal bei einem Kinde eine angeborene kolossale Venectasie der Lippen- und Wangenschleimhaut und bei einer Erwachsenen ein Aneurysma dissecans der linken Unterkiefergegend und linken Zungenhälfte.

Von den erworbenen Defecten des harten Gaumens nehmen in Bezug auf Häufigkeit die durch Zerfall syphilitischer Producte entstandenen die erste Stelle ein; seltener verdanken sie penetrirenden Schusswunden oder der Phosphornekrose oder der Scrophulose, dem Lupus und Carcinom ihre Entstehung.

Erworbene Lippenspalten sind die Folgen von Verletzungen, Hieben, Schnitten; Verwachsungen der Lippen mit dem Kiefer, Mangel der Lippen (Achylie), sowie Ektropien sind bedingt durch geschwürige Zerstörung und Narbenretraction. Einrisse und Fissuren des Lippenroths sind namentlich zur kälteren Jahreszeit sehr häufig und schmerzhaft.

Eine Folge tiefgehender Ulcerationen und Substanzverluste der Mundhöhle, wie sie bei Stomacace, Scorbut und Noma vorkommen, ist die narbige Kieferklemme. Durch ausgebreitete Narben, welche vom Oberkiefer von der Innenseite der Wangen zum Unterkiefer herabziehen, wird das Oeffnen des Mundes unmöglich gemacht.

Es gibt ferner auch eine arthrogene und myogene Kieferklemme; die erstere ist bedingt durch entzündliche Infiltration oder Ankylose des Kiefergelenks in Folge von Verletzungen oder Fracturen; die letztere durch syphilitische Gummata resp. schwielige Entartung (Myositis) oder abnorme Erregungszustände der Kaumuskeln.

Da die Behandlung des grössten Theils der besprochenen Zustände in das Gebiet der plastischen Chirurgie fällt, so soll hier nur der Lösung des Zungenbändchens gedacht werden. Man bringt das Bändchen zwischen Zeige- und Mittelfinger der linken Hand oder in den Einschnitt einer Myrthenblattsonde und schneidet mit einer Scheere das Bändchen ein, hüte sich aber vor einer Verletzung der Zungensubstanz, da sonst die Blutung aus der A. ranina eine sehr beträchtliche sein kann.

Gegen die Hypertrophie der Lippen muss, wenn dieselbe auf scrophulöser Basis beruht, ausser passender Diät mehrere Monate lang Leberthran oder Jodeisen verabreicht und ein kochsalz- oder jodhaltiges Bad, so namentlich Nauheim, Kreuznach, Tölz, Heilbrunn, sowie längerer Landaufenthalt verordnet werden. Chronische Nasenkatarrhe und Naseneiterungen sind nach den später zu schildernden Grundsätzen zu behandeln.

Stomatitis catarrhalis und gonorrhoica.

Die Entzündung der Mundhöhle charakterisirt sich in ihrer einfachsten Form als erythematöse Röthung und Schwellung der Schleimhaut, deren Secretion in der Regel sehr gesteigert ist.

Aetiologisch unterscheidet man eine primäre oder idiopathische und eine secundäre oder symptomatische, sowie eine acute und chronische Stomatitis.

Als Ursachen der acuten primären Form müssen mechanische, chemische und thermische Reize angeführt werden, als da sind: scharfe Zahnkanten, Zahncaries, Zahnstein, Durchbruch der Zähne, dauernd erschwertes Saugen in Folge von Milchmangel der Brüste oder schlechter Warzen und Saugpfropfen, allzu energisches Abschaben der Zunge, zu heisse und zu kalte, zu stark gewürzte und saure Speisen, scharfkantige Ingesta, Nüsse, Mandeln, saures Obst, Alcoholica, Tabak, Mineralsäuren und kaustische Alkalien. Die ausserordentliche Häufigkeit von Mundkrankheiten bei Säuglingen erklärt sich theils aus dem Gebrauche der Lutschbeutel, unreiner Gummistöpsel oder Veilchenwurzeln, kurz aus mangelhafter Pflege der Mundhöhle, theils nach Epstein aus dem Reize der Luft, dem mechanischen Acte des Saugens, der zarten Beschaffenheit der Epithelien und der oft allzu energischen Reinigung der Mundhöhle. Ob Erkältungen in ähnlicher Weise wie auf der Schleimhaut des Rachens und der Nase Entzündung erzeugen können, erscheint sehr zweifelhaft.

Die secundäre Stomatitis findet sich als Begleiterin anderweitiger Mundaffectionen, besonders der Geschwüre, sowie der meisten fieberhaften und Infectionskrankheiten, so namentlich des Scharlachs, der Influenza, Masern, Blattern, des Erysipels und Typhus, ferner auch der meisten Affectionen des Magendarmcanals; endlich nach Einverleibung gewisser Medicamente, wie des Jods, Broms, Bleis, Arseniks, Quecksilbers und Wismuths. Barié beschreibt auch eine Stomatitis uraemica.

Unter den subjectiven Erscheinungen nimmt bei der acuten Form der Schmerz die hervorragendste Stelle ein; die Empfindlichkeit, die sich schon bei dem Erfassen der Ingesta bemerkbar macht, steigert sich beim Kauen zu intensiven Schmerzen, so besonders an der Zungenspitze; Kinder greifen beständig in den Mund, strecken die Zunge heraus, verweigern die Saugflasche oder Brustwarze und lassen

dieselbe sofort unter Wimmern und Schreien wieder los. Anfangs klagen die meisten Kranken über Hitzegefühl und Trockenheit im Munde, später über vermehrte, theils flüssige, theils klebrige Secretion. Appetit ist theils normal, theils verringert, letzteres namentlich bei den mit Fieber oder Magendarmaffectionen verbundenen Fällen, der Durst vermehrt. Der Geschmack ist in erheblicher Weise verändert, alle Speisen, besonders die aromatischen, schmecken gar nicht oder schlecht. Der von den Kranken geklagte faulige, fade, pappige Geschmack muss theils auf die Zersetzung der Secrete, theils auf Alteration der Geschmacksnerven zurückgeführt werden.

Wenn auch Erwachsene durch die Affection wenig in ihrer Ernährung leiden, so ist es doch begreiflich, dass Säuglinge und jüngere Kinder durch eine länger anhaltende Stomatitis sehr herunterkommen, eventuell sogar zu Grunde gehen können.

Die objectiven Erscheinungen bestehen in einer mehr oder weniger ausgesprochenen Röthe und Schwellung der Schleimhaut; die Zungenränder sowie die Wangen zeigen die Eindrücke der Zähne, die Schleimhaut ist mit einem weisslichen, zähen. fad- oder übelriechenden Schleim überzogen, der sehr zellen- und kernreich ist und besonders auf der Zunge und dem Zahnfleische eine beträchtliche Dicke erreicht. Die Papillen der Zunge sind kolbig geschwellt, treten deutlich hervor, werden durch tiefe Furchen von einander geschieden, das sie bedeckende Epithel ist gequollen, von weissgrauer oder gelblicher Farbe; in selteneren Fällen wird das Epithel abgestossen und es treten die lebhaft rothen, zuweilen blutigen Spitzen der Papillen zu Tage (Papillitis). Bei hysterischen Frauen schwellen zuweilen die Papill. circumvallatae an, um sich nach einigen Tagen von selbst wieder zurückzubilden.

Hieher gehört auch die von Wertheimber beschriebene erythematöse Zungenrandentzündung der Säuglinge.

Sie beginnt an der Zungenspitze, die sich lebhaft röthet und deren Papillen stark hervortreten; einzelne matt glänzende Stellen erscheinen vom Epithel entblösst. Die Entzündung setzt sich dann auf die zu beiden Seiten der Zungenspitze gelegenen Randtheile fort, welche, deutlich geschwollen, das Niveau ihrer Umgebung überragen und sich durch ihre Röthe scharf von derselben abgrenzen. Eine Weiterausbreitung findet nicht statt, auch kommt es nicht zu Bläschenbildung, zu exsudativer oder mykotischer Auflagerung. Die Rückbildung beginnt von der Zungenspitze aus, indem die gerötheten Theile allmälig verschwinden. Die Dauer der Affection beträgt 8—10 Tage; dieselbe betrifft meist künstlich ernährte, etwas schwächliche, aber sonst gesunde Kinder; die Ursache beruht auf mechanischer Reizung beim Saugen. Das Leiden kann durch Schmerzen beim Saugen zu mangelhafter Ernährung resp. Gewichtsabnahme führen.

Localisirt sich der Process auf dem Zahnfleisch (Gingivitis), dann sind die Beschwerden im Ganzen geringer; dasselbe erscheint tief oder blauroth, die Fortsätze zwischen den Zähnen vergrössert und mit schmierigem Secret bedeckt oder zwischen Zähnen und Zahnfleisch

quillt spontan oder auf Druck Eiter hervor. Sehr schmerzhaft ist die Schwellung des Zahnfleisches an der Rückfläche der oberen Schneidezähne und den benachbarten Theilen des harten Gaumens; die normalerweise hier befindlichen zahlreichen Falten der Schleimhaut nehmen beträchtlich an Volumen zu und sind trotz der geringen an ihnen wahrnehmbaren Röthe spontan oder bei Berührung sehr empfindlich. Die Schleimhaut des harten Gaumens ist netzförmig injicirt, die Schleimdrüsen erscheinen vergrössert und treten als hirsekorngrosse weisse oder rothgraue Knötchen oder als helle Bläschen deutlich hervor und secerniren auf Druck ein schleimig-eitriges Secret.

Geschwüre kommen bei einfacher Stomatitis nicht oder nur ausnahmsweise bei Kindern vor, höchstens kommt es zur Lockerung und Desquamation des Epithels.

Eine eigenthümliche Form ist die Stomatitis sicca, ein Analogon der Pharyngitis sicca. Verf sah die theils acut, theils chronisch verlaufende Affection bisher nur bei älteren Personen. Die Schleimhaut der Zunge, der Lippen, des weichen Gaumens erscheint geröthet, die Zungenoberfläche glatt, mit äusserst spärlichen Papillen besetzt, glänzend wie lackirt, manchmal rissig und mit einem bald zähen und klebrigen, bald zu Borken eingetrockneten Secrete bedeckt. Die Affection ist nicht identisch mit Xerostomie.

Die Hauptklage besteht in unerträglicher, zu häufiger Anfeuchtung mit Wasser nöthigender Trockenheit im Munde und Rachen; zuweilen sind auch Empfindlichkeit gegen zu warme oder zu kalte sowie scharfe Speisen und Getränke vorhanden, ferner Beschwerden beim Sprechen und Schlucken.

Die chronische Stomatitis verdankt hauptsächlich dem Missbrauche des Alkohols und des Tabaks, sowie mangelhafter Mundpflege und schlechten Zähnen ihre Entstehung. Ganz constant ist sie bei Säufern, zumal wenn sich bei ihnen schon hochgradige Verdauungsstörungen eingestellt haben. Die Schleimhaut erscheint schmutzig roth gefärbt, mit einem dicken, schleimig-eitrigen Belag bedeckt. Die Beschwerden sind oft sehr gering, namentlich kann Schmerz ganz fehlen. Bei Schwangeren, hauptsächlich schwächlichen Mehrgeschwängerten, kommt zuweilen eine vom vierten Monate der Gravidität bis zum ersten oder zweiten Monate nach der Geburt dauernde sehr schmerzhafte Entzündung des Zahnfleisches vor, die selbst zum Ausfallen der Zähne Anlass geben kann.

Auch das Vorkommen einer acuten purulenten Stomatitis (Stomatitis gonorrhoica) ist durch neuere Beobachtungen sichergestellt. Bei Kindern fanden Dohrn, Leyden und Rosinski

den Gonococcus sowohl in dem Epithel als auch in excidirten Gewebsstücken der Mundhöhle neben Ophthalmoblennorrhoe; Cutler sah bei einer Puella publica in Folge von Immissio penis hochgradige entzündliche Schwellung und Röthung der Schleimhaut mit oberflächlichen Geschwüren auf Lippen, Wangen und Zahnfleisch.

Der Verlauf der acuten idiopathischen Stomatitis ist gut, da meist schon nach einigen Tagen ein Rückgang der Erscheinungen bemerkbar wird; auch die symptomatische Form gibt eine günstige Prognose, doch ist der Verlauf, dem Charakter der Grundkrankheit entsprechend, oft ein sehr schleppender; die chronische Stomatitis kann Monate und Jahre dauern, zumal wenn die Schädlichkeiten, welche sie veranlassten, fortdauern. Die Stomatitis gonorrhoica führt zu Erosionen mit pseudomembranösen Belägen, heilt aber ebenfalls unter entsprechender Behandlung.

Die Behandlung sei vor allen Dingen eine causale; schädliche Ingesta müssen verboten, das Rauchen unterlassen, Zahnstein entfernt, cariöse Zähne extrahirt, schlechte Brüste und Saugflaschen, Gummistöpsel etc. durch bessere neue ersetzt werden.

Die Diät beschränke sich in manchen Fällen auf flüssige oder ganz weiche Substanzen, Milch, Eier, Bouillon, die bei der ausserordentlichen Empfindlichkeit der Mundhöhle stets lau oder kühl zu geniessen sind. Säuerliche oder stark zuckerhaltige Fruchtsäfte zum Getränke beizusetzen, verbiete man; am besten eignet sich reines, frisches Brunnenwasser oder Eis; die so sehr beliebten künstlichen kohlensäurehaltigen Mineralwässer verursachen sehr oft ein prickelndes und brennendes Gefühl.

Die Indicatio morbi erheischt die locale Behandlung der erkrankten Schleimhaut. Am einfachsten und schonendsten sind bei katarrhalischer diffuser Erkrankung die medicamentösen Mundwässer. In der Wahl der Stoffe sei man ebenso vorsichtig, wie in der Concentration.

Am meisten empfiehlt sich das Kali chloricum in 1—2% Lösung, ferner das Natr. biborac. (2—3%). Borsäure in 1—4% Lösung ohne Zusatz von Honig oder Syrup. Auch die Adstringentia, namentlich das Tannin (5 : 500 mit 20 Glycerin), Zinc. sulfur, Alaun in schwacher Concentration sind vortheilhaft. Bei circumscripter Erkrankung, wie z. B. bei Gingivitis mit Lockerung des Zahnfleisches, mache man Einpinselungen mit Tannoglycerin (1 : 10) oder mit Tinct. Catechu, Tinct. gallar., Tinct. Ratanh.; die letzteren können auch mit Tinct. Myrrh. vermischt und mit Wasser verdünnt (1 Kaffeelöffel auf 200 Gramm) als Mundwässer gebraucht werden. Kindern, welche noch nicht spülen können, muss nach jeder Nahrungsaufnahme die Mundhöhle vorsichtig mit kaltem Wasser gereinigt und mit den erwähnten Medicamenten, besonders mit Natr. biborac. 1 : 10 oder mit 2—4% Borsäurelösung mittelst eines reinen Leinenlappens ausgewischt oder mit einem feinen Haarpinsel ausgepinselt werden.

Bei chronischer Stomatitis empfiehlt sich der fortgesetzte Gebrauch schwacher Alkalien oder alkalischer Quellen als Mundwasser oder innerlich, ferner Pinselungen mit Arg. nitr., Tannin, Tinct. Ratanh., das Kauen von Rhabarberstücken, gegen die Gingivitis der Schwangeren Bepinselungen mit einer Cocaïn-Tanninlösung oder von gleichen Theilen Spirit. Cochlear. und Chloralhydrat.

Bei Stomatitis sicca empfehlen sich ausser Alkalien ganz besonders Lösungen von Glycerin oder Jodkalijodglycerin zum Pinseln, ferner innerlich Pilocarpin pro dosi 0·01 oder Inf. Jaborandi; bei Stomatitis gonorrhoica ausser den obenerwähnten Mundwässern Bestreichen der Geschwüre mit Lapis, Cupr. sulfur. oder Wismuth mit Glycerin, Sublimat 1 : 7000.

Leukoplakia oris.

Die Leukoplakia oris, auch Leukoma, Psoriasis, Ichthyosis, Keratosis oder Tylosis oris, sowie chronische superficielle Glossitis, Raucherplaques oder Plaquesnarben genannt, stellt eine chronisch verlaufende Mundaffection vor, die sich durch das Auftreten theils circumscripter, theils diffuser weisser Flecken kennzeichnet. An diesen Stellen sind das Pflasterepithel stets mehr oder weniger gewuchert und verdickt, die Submucosa mit lymphoiden Zellen durchsetzt, die Gefässe vermehrt, erweitert und von kleinzelliger Wucherung umgeben. Nach längerem Bestande tritt in den oberen Epithelschichten Verhornung ein, oft mit starker Wucherung der Papillen. In den unteren Epithellagen zeigt sich nach Schuchardt deutliche Riffelung der Zellen und eine Art Kappenbildung der Zellkerne; auch findet sich unmittelbar unter den verhornten Epithelien eine eigenthümliche Substanz, das Eleïdin, das mit der Verhornung in engem Zusammenhange steht.

Die Leukoplakie befällt am häufigsten die Schleimhaut der Mundwinkel entweder allein oder mit jener der Wangen, sowie die obere, untere oder seitliche Fläche der Zunge; seltener ergreift sie den harten oder weichen Gaumen, fast niemals das Zahnfleisch. Dass sich die Affection aus rothen Flecken entwickelt, welche allmälig eine weisse Farbe annehmen, hat Verf. selbst beobachtet. In den leichtesten Fällen resp. im Anfangsstadium bemerkt man an den Mundwinkeln, der Zunge oder der Wangen eine schwache grauweisse Verfärbung des Epithels von geringem Umfange. Später vergrössern sich die Flecke und werden reinweiss, als ob man mit Lapis touchirt hätte, und heben sich theils scharf von der gesunden Umgebung ab, theils gehen sie allmälig in die letztere über. Häufig finden sich jetzt in den Flecken Falten oder eine felder- und mosaikartige Eintheilung; die Flecken haben oft ganz groteske Formen oder bilden mehr regelmässige zusammenhängende Flächen oder wie an den Lippen einen förmlichen Ring. Die Oberfläche der Zunge erscheint meist arm an

Papillen und glatt; sehr oft finden sich schmerzhafte Einrisse, Schrunden und Epithelverluste. In den hochgradigsten Fällen resp. im spätesten Stadium nehmen die Flecken noch mehr an Dicke zu, werden mattweiss oder gelbweiss und bilden theils wie an der Zunge eine zusammenhängende steife, pappdeckelharte wie emaillirte Fläche oder strahlige, sternförmige, Narbenzügen ähnliche Figuren oder bei stärkerer Entwickelung der Papillen warzige, stachelige, panzerartige Prominenzen, die meist noch ihre felderartige Eintheilung bewahren. Aeusserst häufig finden sich jetzt Rhagaden und eiternde Fissuren, namentlich an den Lippen und der Zunge, also an Theilen, welche in Folge ihrer Musculatur Bewegungen ausgesetzt sind. Eine Umwandlung der Flecken in Geschwüre kommt nicht vor, dagegen finden sich zuweilen papillomatöse, hahnenkammartige Wucherungen an den Rändern oder Einrisse in den Flecken. Aehnliche Verfärbungen des Epithels hat man auch auf der Vulva beobachtet; auch sollen in einzelnen Fällen auf der Haut Eruptionen von Psoriasis und Lichen planus sich vorgefunden haben.

Die subjectiven Erscheinungen sind bei den einzelnen Kranken sehr verschieden. Während bei der Mehrzahl derselben in den ersten Stadien der Krankheit fast alle Beschwerden fehlen, so dass die Affection oft nur zufällig entdeckt wird, klagt ein Theil schon ziemlich früh über lästiges Brennen im Munde, grosse Empfindlichkeit beim Sprechen, Essen, Trinken und Rauchen, namentlich bei dem Genusse scharfer, gesalzener Speisen und Alcoholica; oft treten die Beschwerden nur zeitweise, besonders bei acuten Nachschüben oder Epithelialverlusten auf, um für Wochen und Monate zu verschwinden. In den späteren Stadien, wenn bereits beträchtliche Verdickung und Verhornung des Epithels eingetreten ist, können zwar gleichfalls die Beschwerden sehr geringfügig sein, doch klagen die Kranken meist über Steifigkeit und Schwerbeweglichkeit der Zunge und der Lippen beim Kauen und Sprechen. Sehr schmerzhaft ist aber die Affection dann, wenn sich das Epithel in grösserer Ausdehnung abstösst oder Rhagaden und ulcerirende Fissuren, voluminöse Excrescenzen oder Carcinom sich gebildet haben; öfters kommt es dabei zu Blutungen. Alteration des Geschmackes und Salivation werden nur bei sehr diffuser Erkrankung beobachtet.

Die Aetiologie ist zum Theil noch recht dunkel. Sicher ist, dass bei vorhandener Disposition resp. abnormer Zartheit und Widerstandslosigkeit der Schleimhaut jede andauernde Reizung der Mundhöhle, mag sie durch zu starkes Tabakrauchen oder Tabakkauen, durch zu heisse reizende Kost und Alcoholica, durch Mercurialcuren, Einathmen von Russ und Rauch oder durch scharfe Zahnkanten unterhalten werden, die Krankheit hervorrufen kann. Auch Anämie, Gicht, Diabetes sowie Verdauungsstörungen werden als Ursache angegeben. Die erste Rolle spielt unzweifelhaft das Rauchen vieler und starker Cigarren oder Cigaretten und von Tabak aus kurzen Pfeifen: dabei kommen nicht nur in Betracht der Nicotingehalt, sondern hauptsächlich auch die Verbrennungsproducte des Tabaks, Kohlensäure,

Ammoniak, Carbolsäure, empyreumatische Oele, welche besonders reizend wirken. An zweiter Stelle steht als ursächliches oder vielmehr begünstigendes Moment die Syphilis (Erb). Nach Verf. Erfahrung muss zu derselben aber noch eine weitere Schädlichkeit dazukommen und diese ist weniger der längere oder wiederholte Gebrauch von Quecksilber, sondern vielmehr wiederum das Rauchen. Dass Syphilis allein zu Leukoplakie führt, ist um so unwahrscheinlicher, als Leukoplakie bei Frauen, die sicher nicht weniger häufig an Syphilis leiden, so gut wie gar nicht beobachtet wird. Dagegen soll in denjenigen Ländern, wo auch die Frauen mehr dem Rauchen huldigen, auch Leukoplakie häufiger vorkommen. Darin hat Erb aber Recht, wenn er sagt, dass ohne die genannten zwei Ursachen Leukoplakie äusserst selten gefunden wird, dass bei vorhandener Syphilis schon ein viel geringeres Maass des Rauchens genügt, um Leukoplakie zu erzeugen, dass die Plaquesnarben kein absolut sicheres Zeichen vorausgegangener Syphilis sind und dass nur dann der Verdacht auf Syphilis berechtigt ist, wenn die Patienten nicht oder nur sehr wenig geraucht haben. Verf. rechnet die Epithelialtrübungen nach Quecksilbergebrauch ebenfalls zu Leukoplakie; wenn dieselben sich wieder zurückbilden und selten jenen hohen Grad der Verhornung erreichen wie die anderen Formen, so liegt das darin, dass die sie veranlassende Schädlichkeit, das Quecksilber, gerne gemieden wird, wenn es nicht mehr nöthig ist, während das Rauchen, Trinken und Essen das ganze Leben lang mit ungeschwächter Leidenschaft fortgesetzt werden. (Vergleiche auch die Capitel Stomatitis mercurialis und Pharynxhydrargyrose.)

Die Diagnose ist bei genauer Beobachtung der objectiven Erscheinungen leicht. Am häufigsten kommen Verwechslungen mit syphilitischen Papeln vor. Für Leukoplakie charakteristisch ist die Persistenz der Flecken; sie verharren monatelang an einem und demselben Ort, während die syphilitischen Papeln sowie die gutartigen Plaques eine viel kürzere Lebensdauer besitzen, rasch grösser werden oder heilen. Während die leukoplakischen Flecken sich niemals in Geschwüre umwandeln, sondern nur Einrisse zeigen, wandeln sich die syphilitischen Plaques nach kurzer Zeit in oberflächliche Ulcerationen um; während sich die leukoplakischen Producte mit der Zeit immer härter und resistenter, zum Schlusse warzenartig und knorpelig anfühlen, erscheint die Oberfläche der syphilitischen Plaques gelockert, wenig cohärent und weich; syphilitische Plaques heilen unter allgemeiner und localer Behandlung ziemlich rasch und ohne Narben, während die Leukoplakie von Mercur und Jod selten beeinflusst wird und tiefe central eingezogene Narben hinterlässt.

Ausser mit Syphilis ist ferner noch eine Verwechslung mit Eruptionen von Lichen ruber planus möglich. Bei demselben finden sich zuweilen ebenfalls kleinere und grössere, isolirte oder zusammenhängende weisse Flecken auf den Lippen, den Wangen, der Zunge, dem Zahnfleisch und dem weichen Gaumen, welche den leukoplakischen vollkommen ähnlich sehen. Nach Touton schützt nur die Gruppirung der Flecken und netzförmigen Streifen, sowie ihre Entstehung

aus deutlichen Knötchen und die gleichzeitige oder bald nachfolgende Mitbetheiligung der äusseren Haut vor Verwechslung; auch erweist sich der innerliche Gebrauch von Arsen sowie die locale Behandlung mit Sublimat bei Lichen sehr, bei Leukoplakie gar nicht wirksam.

Der Verlauf der Leukoplakie ist ein sehr chronischer; sie kann sich auf einige Monate beschränken, aber auch 10, 20, 30 Jahre, ja bis zum Lebensende dauern; öfters tritt Stillstand ein, doch treten Recidiven und acute Nachschübe mit Desquamation der Epithelien nach Excessen im Rauchen besonders häufig auf.

Die Prognose ist mit Ausnahme der durch Mercurialien erzeugten Form in doppelter Hinsicht zweifelhaft; wenn auch die Leukoplakie meist ohne besondere Beschwerden verläuft und zuweilen spontan oder durch Kunsthilfe heilt, so gehören doch dauernde Heilungen zu den Ausnahmen. Die Prognose wird aber auch deshalb dubiös, weil die Affection zu Carcinombildung an Lippen, Wange und Zunge Anlass geben kann. Nach Nedopil sind es nicht immer die hochgradigsten Fälle, bei denen eine solche Umwandlung stattfindet; nach Schuchardt gibt jeder chronische Reizzustand, mag er die äussere Haut oder eine Schleimhaut treffen, durch gesteigerte Vascularisation und Durchtritt von gelösten und ungelösten Blutbestandtheilen zu Krebsbildung Anlass. Das Carcinom entwickelt sich entweder diffus unter oder neben den verhornten Schleimhautpartien als flaches Infiltrat oder als Knoten, oder die Ränder und der Grund der Einrisse induriren sich, zerfallen und bilden Krebsgeschwüre; Lymphdrüsenschwellung tritt gewöhnlich schon sehr frühe auf. Der Verlauf solcher Plattenepithelcarcinome ist ebenso ungünstig wie jener der anderen, doch kann durch frühzeitige chirurgische Eingriffe Radicalheilung erzielt werden, obwohl Recidiven auch hier häufig sind. Dass die Umwandlung in Carcinom besonders häufig oder gar die Regel ist, kann jedoch nicht behauptet werden.

Bei der Behandlung hat man zuerst die Ursache zu berücksichtigen; darnach muss das unsinnige Rauchen unterlassen, der Gebrauch des Quecksilbers ausgesetzt, sowie jede Reizung der Mundhöhle durch scharfe Speisen und Getränke vermieden werden. Die meisten Kranken machen selbst die Beobachtung, dass durch Aussetzen des Rauchens ihr Uebel sich bessert, durch Wiederaufnahme desselben sich verschlimmert. Dyspeptische Beschwerden, Gicht, Anämie etc., müssen mit den entsprechenden Mitteln behoben werden. Eine antisyphilitische Behandlung ist nicht nur völlig unnütz, sondern sogar schädlich, was freilich von Erb bestritten wird. Wenn wir auch kein Mittel besitzen, um die Bildung neuer Plaques zu verhindern oder die vorhandenen sicher und dauernd zu entfernen, so erweist sich doch die locale Behandlung zuweilen als vortheilhaft. Sie bezweckt vor Allem die Lockerung und Entfernung der verdickten Epithelschichten, was namentlich in den milderen Fällen durch alkalische Mundwässer, Natr. bicarb. 10·0 : 300·0, 1—3% Boraxlösung oder die alkalisch-muriatischen Quellen von Karlsbad, Ems, Vichy etc. erreicht wird. Aetzungen mit Lapis in Substanz, Aetzkali, Chromsäure oder

Mineralsäuren verschlimmern fast stets das Uebel; Joseph empfiehlt, wie schon früher Schiff, Abreibung der Flecken mit einem in concentrirte (20—80%) Milchsäurelösung getauchten Wattebausche, Beregszászy Bepinselungen mit Salicylsäure 1·0, Spir. vini rectif. 5·0, Glycerini 10·0. Einige rühmen Bepinselungen mit Perubalsam 1—3mal täglich (Rosenberg) und Mundwässer von Sublimat oder 1% Chromsäure, wieder Andere Jodoform äusserlich und innerlich. Winternitz empfiehlt Mundwässer aus Heidelbeerdecoct, Cozzolino Bepinselungen mit Rp. Jodi puri 0·2, Kali jod. 20·0, Acid. thym. 0·1, Glycerin 30·0, Leistikow die Application einer Paste aus Terra silic. 1·5, Resorcin 3·0, Adeps 0·5, mehrmals täglich. Bei schmerzhafter Schrundenbildung ist die Application einer 10—20% Cocaïnlösung angezeigt; zur rascheren Ueberhäutung der Schrunden und ulcerirten Einrisse empfiehlt Sehwimmer Bepinselungen mit 5% Papayotinlösung. Entfernung der Flecken mit scharfem Löffel, Excision, Thermocauter oder Galvanokaustik ist nur bei circumscripter Erkrankung oder bei Anwesenheit carcinomatöser oder sonstiger verdächtiger Producte angezeigt; krebsig indurirte Geschwüre oder Knoten müssen baldmöglichst bis tief in das gesunde Gewebe hinein excidirt werden.

Stomatitis phlegmonosa und parenchymatosa.

Seltener als die katarrhalische ist die phlegmonöse Entzündung der Mundhöhle.

Unter den Ursachen sind Verletzungen, besonders durch Fremdkörper, wohl die häufigsten; ferner Verätzungen und Verschorfungen in Folge des Genusses kaustischer Alkalien und Säuren. Auch traumatische und andere Geschwüre, besonders diphtheritische, syphilitische und tuberculöse, können zu circumscripter oder diffuser Phlegmone Anlass geben. Manchmal pflanzt sich das Gesichtserysipel auf die Mundschleimhaut fort und erzeugt ausser Phlegmone noch Blasenbildung; wahrscheinlich sind in allen Fällen pyogene Mikroorganismen die specielle Ursache.

Die diffuse phlegmonöse Stomatitis tritt theils als selbstständige Erkrankung auf, theils als secundäre bei schweren fieberhaften Processen, so besonders bei Typhus, Scharlach, aber auch in Begleitung von Kiefcrperiostitis. Sie hat besonders häufig ihren Sitz im submucösen Bindegewebe der Lippen und Wangen. Als erstes Symptom lässt sich neben hohem Fieber Schmerz beim Sprechen und Essen, vermehrte Salivation und eine brettartige Härte der befallenen Theile constatiren. Im weiteren Verlaufe können sich die Erscheinungen zurückbilden, oder es entstehen an zahlreichen Stellen kleinere und grössere Abscesse oder ausgebreitete Eiterinfiltrate, welche sich gegen die Mundhöhle zu öffnen und nach Zerstörung der Muskeln und Thrombosirung der Gefässe zu Gangrän und Sepsis führen können.

Relativ häufig wird die Zunge von phlegmonösen und parenchymatösen Entzündungen befallen. (Glossitis phlegmonosa seu suppurativa.)

In aeuter Weise sehwillt die Zunge an durch Verletzungen, so besonders dureh Einspiessen von Fremdkörpern oder durch Fliegen-, Wespen-, Bienenstiche, dureh Verbrennungen oder Infection mit septisehen Stoffen, Milzbrand, Typhus, Erysipel, Scharlach, Poeken, Maul- und Klauenseuche, angeblich aueh durch Erkältungen und sonstige nicht näher bekannte Ursaehen. Da die Lymphgefässe der Zunge mit jenen des Raehens in Verbindung stehen, so geben zuweilen auch aeute, namentlich suppurative, diphtheritische oder nekrotisirende Anginen zu Phlegmone oder Abseessbildung der Zunge Anlass. Verf. hat selbst selbst zwei derartige Fälle naeh phlegmonöser Tonsillitis beobachtet. Zuweilen wird nur eine Hälfte der Zunge befallen (Hemiglossitis), weshalb die meisten Beobaehter diese Affection auch auf nervösem Wege entstehen lassen. (Siehe: Hemiglossitis herpetiea im Capitel Stomatitis exsudativa.)

Die Schwellung ist bedingt theils durch Oedem, theils dureh entzündliche Zellinfiltration des Parenchyms, welche resorbirt wird oder zur Eiterung gelangt. Zuweilen beschränkt sieh die Phlegmone auf die Follikel der Zungenbasis, die in ähnlieher Weise erkranken wie jene der Tonsillen (Tonsillitis praeepiglottiea aeuta follicularis, Seifert). Die Mündungen der Balgdrüsen erseheinen mit eitrigem Seeret erfüllt, die Drüsen selbst entzündlich gesehwellt. Die Affection kommt theils selbstständig, theils in Verbindung mit Angina tonsillaris vor.

Die Erseheinungen der diffusen acuten phlegmonösen Glossitis bestehen in kolossaler rapid zunehmender Vergrösserung einer oder beider Hälften der Zunge, die meist schon nach wenigen Stunden in der Mundhöhle keinen Platz mehr findet und zwischen den Lippen herausgestreckt oder gegen die hintere Raehenwand und den Kehlkopfeingang angedrüekt wird, so dass hoehgradigste Athemnoth eintreten kann. Fieber, beträchtliehe bis zur Unmöglichkeit jeglicher Nahrungsaufnahme sich steigernde Schmerzen, Sehluckbesehwerden, profuse Salivation, Foetor ex ore, Schlaflosigkeit, Prostration, Unverständlichkeit der Spraehe sind die weiteren Begleiter dieser qualvollen Affeetion. In den weniger aeut verlaufenden Fällen kann das Fieber fehlen; ist der Zungengrund ergriffen, so ist der hintere untere Theil der Zunge beträehtlich vergrössert, die Spraehe klosig, das Sehlueken meist sehr ersehwert, ebenso das Hervorstrecken der Zunge; nicht selten ist in Folge Mitbetheiligung des Kehldeekels durch Oedem Athemnoth vorhanden; mit dem palpirenden Finger lässt sich sowohl von der Mundhöhle aus die vermehrte Resistenz und Sehwellung der Zungensubstanz, als von aussen die brettartige Härte des Mundbodens, sowie die Sehwellung der Submaxillaris und Sublingualis naehweisen. Bei mehr eireumseriptem Auftreten bilden sieh harte Infiltrate, die naeh längerem oder kürzerem Bestande verschwinden, oder zu bleibender Hypertrophie führen, oder sich in Abseesse umwandeln. Die Erschei-

nungen der Tonsillitis praeepiglottica bestehen in stechenden Schmerzen beim Schlucken, Fremdkörpergefühl, vermehrtem Bedürfniss zum Räuspern und Schlingen, und wenn die vergrösserten Follikel mit der Epiglottis in Berührung treten, in Hustenreiz. Chronische Abscesse, die am häufigsten am Grunde oder an der Spitze der Zunge sowie an den Rändern vorkommen, können schmerzlos verlaufen und für Neubildungen gehalten werden.

Die Behandlung der acuten phlegmonösen Stomatitis und Glossitis muss eine energisch antiphlogistische sein. Eisumschläge, Auflegen von Eisstücken auf die infiltrirten Stellen und Zunge, Ausspülen mit desinficirtem Eiswasser, Bepinselungen mit verdünnter Jodtinctur, Spray mit Alaunlösung (Stuver), besonders aber mehrere der Länge der Infiltrate resp. des Zungenrückens nach vorzunehmende $^1/_2$—1 Cm. tiefe Scarificationen mit Blutenlassen der Schnittwunden, parenchymatöse Carbolinjectionen (König), Ansetzen von Blutegeln in die Regio submaxillaris werden meist Abschwellung zur Folge haben. Bei Hemiglossitis sind Scarificationen meist unnöthig. Gelingt es nicht, die Athemnoth zu beheben, dann ist die Tracheotomie angezeigt. Wenn auch die innerliche Application von Medicamenten bei hohem Fieber oder pyämischen Erscheinungen meist recht schwierig ist, so dürfen doch die Antipyretica, eventuell per Clysma, nicht unversucht bleiben, ebenso wie Ableitungen auf den Darmcanal. Zeigen sich Erscheinungen von Abscedirung, dann sind warme Mundwässer zu verordnen und ist bei eintretender Fluctuation die Eröffnung mit dem Messer oder der Aspirationsnadel vorzunehmen; nachher empfehlen sich desinficirende Mundwässer. In der Tiefe der Zungenwurzel verborgene Abscesse können theils von der Mundhöhle aus durch einen in der Mitte der Zunge vor der Epiglottis zu machenden Einstich mit dem Lanzenmesser eröffnet werden, theils ist ihnen nur von aussen durch Eröffnung der Regio suprahyoidea und Durchtrennung des M. subcutaneus colli und der Mylohyoidei beizukommen; am ungefährlichsten ist das Vorschieben einer Kornzange durch die infiltrirten Gewebe. In den langsamer verlaufenden Fällen ist die exspectative Methode die beste; man suche durch häufiges Einathmen heisser Dämpfe oder Spülungen das Infiltrat zu zertheilen, eventuell zu erweichen; nicht selten entleert sich dann der gebildete Eiter von selbst. Dass bei einer so schmerzhaften und die Nahrungsaufnahme so erschwerenden Affection nur flüssige, breiige Nahrung gereicht werden darf, ist selbstverständlich. Nicht selten bleibt die Zunge gross und verhärtet und reibt sich dann an den Zähnen; Butlin empfiehlt zum Schutz der Zunge das Tragen einer die unteren Zähne bedeckenden Guttapercharinne.

Entzündung des die Zunge umgebenden Zellgewebes, Periglossitis sublingualis, ist sehr selten und wurde einmal von Henoch beobachtet.

Die Schleimhaut des Mundbodens erschien hochgradig ödematös, teigig, das Sprechen und Schlucken war sehr schmerzhaft, Fieber und profuse Salivation vorhanden.

Die Therapie besteht anfangs in Eisumschlägen, Auflegen von Eisstücken unter die Zunge, später in der Application warmer Mundwässer und Bepinselungen mit verdünnter Jodtinctur.

Als chronische parenchymatöse Entzündung ist die Makroglossie, Prolapsus linguae, aufzufassen. Sie ist theils angeboren, zuweilen, wie Bruck beobachtete, combinirt mit Idiotie und allgemeiner wahrer Muskelhypertrophie, theils erworben, und besteht in einer Hyperthrophie sämmtlicher die Zunge zusammensetzender Gewebe, so namentlich des Muskel-, Fett- und Bindegewebes; in anderen Fällen tritt mehr die Erweiterung der Lymphgefässe in Form cystenartiger Hohlräume hervor. Die Makroglossie ist meist doppelseitig, kann aber auch halbseitig vorkommen. Für die acquirirte Makroglossie müssen häufige Entzündungen, Hemiglossitis, Stomatitis mercurialis, sowie Verletzungen der Zunge, Bisse, wie sie bei Epileptikern sehr gewöhnlich sind, verantwortlich gemacht werden.

Hypertrophie der Zunge, der Lippen und des weichen Gaumens hat man auch als Begleiterscheinung des Cretinismus, des Myxödems, der Acromegalie und der Cachexia strumipriva beobachtet. Das hervorstechendste Symptom bildet die oft ungeheure Vergrösserung der Zunge. Sie wird zwischen den Zähnen vorgestreckt und ist meist durch Vertrocknung an der Oberfläche mit Einrissen und Schrunden bedeckt. Die Alveolen der Zähne werden durch den beständigen Druck des hypertrophischen Organs nach aussen in eine mehr horizontale Lage gedrängt, das Zahnfleisch lockert sich, die Zähne fallen aus. Immer besteht reichliche Salivation, Schmerzen beim Essen und Sprechen und undeutliche, lallende Sprache, bei Myxödem und Cachexia strumipriva ausserdem noch Nachlass der geistigen Fähigkeiten, cretinartiges Exterieur und Pachydermie.

Bei circumscripter chronischer parenchymatöser Glossitis, die dem Reize scharfer Zahnkanten, Cigarrenspitzen etc. ihre Entstehung verdankt, bilden sich kleinere oder grössere knotige Verdickungen, die weniger Schmerz als ein Gefühl von Schwere und Belästigung beim Sprechen verursachen und die durch fortwährende Reibung an den Zahnrändern oder andere Schädlichkeiten ulceriren und sich in Carcinom umwandeln können.

Die Behandlung der Makroglossie besteht in keilförmiger Excision in horizontaler und verticaler Richtung oder in galvanokaustischer Amputation oder in der multiplen Punction mittelst Fistelbrenner (Ignipunctur), wodurch zahlreiche sich contrahirende Narben und damit Verkleinerung des Organs erzeugt werden. Zur Verhütung allzu starker Reaction applicirt man nachher Eis. Compressivverbände

haben meist keine Wirkung, da die Fixirung derselben zu grosse Schwierigkeiten bietet. Dagegen empfiehlt Fehleisen die Ligatur der Art. lingualis. Bei circumscripter Knotenbildung führt bisweilen methodische Bepinselung mit Jod oder Lapis zum Ziele.

Nicht selten ist die Zunge in besonders hochgradiger Weise nach verschiedenen Richtungen hin tief eingeschnitten (Lingua dissecata). Entstehen in diesen Furchen Schrunden und Einrisse, dann wird diese Affection sehr schmerzhaft, namentlich bei der Nahrungsaufnahme, beim Rauchen und Sprechen. Ueber die Ursachen dieser Furchenbildung ist nichts Sicheres bekannt; die schmerzhaften Stellen können durch Ueberstreichen mit Boraxglycerin oder Lapis oder Papayotin in der Regel bald zur Heilung gebracht werden; palliativ empfiehlt sich das Cocaïn.

Auf der Grenze zwischen Entzündung und Neubildung steht die Glossitis syphilitica indurativa.

In der Schleimhaut, dem interstitiellen Bindegewebe und den Muskeln findet eine reichliche Proliferation von Zellen und Wucherung von Bindegewebe statt, wodurch die Zunge anschwillt und theils in toto, theils an einzelnen Stellen grösser wird. Das Organ fühlt sich hart an, bei der circumscripten Form knotig, ist aber schmerzlos. Nach längerem Bestande schrumpft das Bindegewebe, wodurch die Zunge an der Oberfläche höckerig, gefurcht und eingezogen erscheint und atrophirt. Bei circumscriptem Auftreten der Bindegewebsneubildung entstehen durch die Einziehung nur einige wenige seichte Furchen an der Oberfläche der Zunge; localisirte sich der Process in der Tiefe, so werden die Einziehungen sehr tief und unter Umständen die ganze Dicke der Zunge betreffen. Nach diffuser Erkrankung entstehen zahlreiche Furchen, welche eine Lappung der Zunge zur Folge haben.

Die Behandlung besteht in der Verabreichung von Jod oder Quecksilber.

Zu den chronischen parenchymatösen Entzündungen der Mundhöhle muss auch die von Volkmann und Unna beschriebene Myxadenitis labialis oder Cheilitis glandularis apostematosa (Baelzsche Krankheit) gerechnet werden. Sie manifestirt sich durch beträchtliche Schwellung der Unterlippe, deren Schleimdrüsen vergrössert erscheinen und nacheinander vereitern.

Die Schwellung der Lippe entwickelt sich allmälig ohne besondere Schmerzen; dieselbe wird hart und oft so voluminös, dass ihre Beweglichkeit erschwert, ja ganz aufgehoben wird. Gleichzeitig erscheinen die Schleimdrüsen in hirsekorngrosse, höckerige Geschwülstchen umgewandelt, ihr Ausführungsgang stark dilatirt; auf Druck entleert sich schleimig-eitriges Secret. Meistens bilden sich furunculöse Entzün-

dungen, die bald in die Mundhöhle, bald nach aussen durchbrechen und oft monatelang noch Secret secerniren, schliesslich aber durch Vernarbung heilen. Das periglanduläre Gewebe ist indolent geschwellt und infiltrirt, die Unterkieferdrüsen nicht geschwellt, das Allgemeinbefinden nicht gestört. Ein directer Zusammenhang mit Syphilis ist nicht nachweisbar; nach Unna vergesellschaftet sich die Erkrankung mit anderen mehr oberflächlichen katarrhalischen Entzündungsprocessen.

Die Behandlung besteht nach Volkmann in der innerlichen Verabreichung von Jodkali, reinigenden Mundwässern, besonders von Kali chloricum, leichten Cauterisationen der Lippen, frühzeitiger Spaltung von Abscessen; Unna empfiehlt tägliche Pinselungen mit Jodtinctur nach Entfernung der die Ulcerationen bedeckenden Schuppen und Krusten.

Nicht selten befinden sich die Papillen der Zunge in einem chronischen mit Hyperplasie verbundenen Entzündungszustande.

Die Papillae filiformes erscheinen verdickt, kolbig geschwellt oder durch Epithelwucherung in kleine, flache, harte, mit dem palpirenden Finger fühlbare Excrescenzen umgewandelt. In anderen Fällen findet die Hyperplasie in der Längsrichtung statt, die Papillae filif. erscheinen ungewöhnlich gross und gleichen Haaren, welche sich in die Höhe richten und glatt auf die Oberfläche der Zunge niederlegen lassen. Die Farbe dieser „haarförmigen Bildungen", wie sie W. Roth nennt, ist bald hell resp. weiss, bald dunkel und schwarz. In letzterem Falle bezeichnet man die Erkrankung auch als „schwarze Zunge", Lingua nigra, oder Nigrities linguae oder, wie Brosin vorschlägt, als schwarze Haarzunge.

Das Wesen der schwarzen Zunge besteht in einer excessiven Epithelwucherung und Vergrösserung der Papillae filif., welche vollständig verhornen und eine gelbe bis schwarzbraune Farbe annehmen. Man hielt früher die Affection für eine Mykose, da einzelne Beobachter, wie Dessois und Sell, einen eigenthümlichen Pilz (Glossophyton) zwischen den hypertrophischen Zungenpapillen in Form von eiförmigen stark lichtbrechenden Körperchen gefunden hatten. Brosin, der dieselben ebenfalls sah, hält sie für unentwickelte Soorpilze. W. Roth, der seine Fälle nicht mit der schwarzen Zunge identificirt, trotzdem in einem derselben die Papillen pigmentirt waren, lässt die haarförmigen Bildungen durch die gewöhnlichen Pilze der Mundhöhle entstehen (Keratomykose), welche massenhaft zwischen den Epithelien eingelagert seien. Verf. kann sich jedoch dieser Ansicht weder in Bezug auf die haarförmigen Bildungen noch die schwarze Zunge anschliessen, da die Anwesenheit von grossen Mengen Mikrokokken in und zwischen den Epithelien der normalen Papillen Regel ist, und die enorm vergrösserten und verhornten Papillen theils ganz frei, theils sehr spärlich von Mikrokokken besetzt gefunden werden. Auch Brosin kommt zu dem Schlusse, dass die schwarze Haarzunge mit einem pflanzlichen Parasiten, der neuerdings wieder von Sendsiak, Ciaglinski und Hewelke urgirt wird, nichts zu thun habe. Er

macht für die ungewöhnliche Länge der Papillae filif. das gesteigerte Wachsthum und die gesteigerte Verhornung ihrer Epithelien verantwortlich; die schwarze Farbe entsteht in den Zellen selbst, durch Vermehrung der in den normalen Hornzellen vorhandenen Hornfarbe; je älter, trockener und fester die Hornschicht, um so dunkler ist die Farbe der Zellen. Die schwarze Zunge gehört deshalb weniger zu den abnormen Pigmentirungen als zu den Hyperkeratosen.

Subjective Beschwerden macht die Affection theils keine, theils geringe, weshalb sie oft zufällig entdeckt wird. Die Kranken klagen manchmal über Stumpf- und Pelzigsein der Zunge mit Verminderung des Tastgefühls und des Geschmacks, sowie über Trockenheit und üblen Geruch aus dem Munde und Würgen und Kitzeln im Halse. Wenn Brosin sagt, die schwarze Zunge werde von ihren Besitzern schon sehr bald gefühlt, da die langen Haare ein Gefühl von Trockenheit oder Pelzigsein oder der Anwesenheit eines Fremdkörpers erzeugten, so trifft dies nicht in allen Fällen zu.

Objectiv findet sich auf dem Rücken der zuweilen ungewöhnlich dick belegten Zunge, unmittelbar vor den wallartigen Papillen beginnend und sich einseitig oder doppelseitig gegen die Zungenspitze fortsetzend, eine braunschwarze Verfärbung, in deren Bereich die Zungenoberfläche mit kleineren und grösseren Haaren vergleichbaren Fäden besetzt erscheint; streicht man von vorne nach hinten, so richten sich dieselben wie die Haare eines Seidenhutes in die Höhe, so dass die Oberfläche der gefärbten Stellen rauh erscheint oder, wie Raynaud sich ausdrückt, einem von Wind und Regen niedergeworfenen Kornfelde gleicht.

Aetiologisch beschuldigte man das Kauen und Rauchen von Tabak sowie andere die Mundhöhle treffende Reize; wiederholt wurde die Affection bei sehr alten Leuten gefunden, doch kommt sie auch bei Kindern und Frauen vor, weshalb das Tabakrauchen wohl kaum als alleinige Ursache gelten kann. Gundobin beschuldigt Verdauungsbeschwerden, speciell sauere Reaction der Mundflüssigkeit, Lannois macht trophische Störungen centraler oder allgemeiner Natur verantwortlich, Horand und Weill wollen die Affection öfter bei Diabetikern gesehen haben. In einem von Lédiard mitgetheilten Falle war Zungenkrebs vorhanden.

Die Diagnose stützt sich auf die oben erwähnten Veränderungen, welche mit Leichtigkeit gestatten, die Affection zu unterscheiden von gewöhnlichen durch Ingesta oder Medicamente bedingten Verfärbungen, oder von Pigmentirungen, wie sie zuweilen bei Morb. Adissonii oder Xanthelasma oder Argyrie vorkommen.

Eine Behandlung ist nur nöthig, wenn die Patienten Beschwerden empfinden. Roth machte von Bepinselungen mit 10% alkoholischer Salicylsäure und 10% Sublimatlösung Gebrauch. Verf. bedient sich der Curette.

Brosin empfiehlt Reinigung der Mundhöhle, gewaltsames Entfernen der Epithelanhänge und Aetzen der Papillarkörper. Unna will die verfärbten Zungenpartien mit 5% Salicyl- oder 10% Resorcin-

äther, mit 5% Collodium versetzt, öfters bepinseln; sodann soll ein Wattebausch mit Wasserstoffsuperoxyd getränkt und mit der Zunge oft gegen den Gaumen angedrückt werden, da das Wasserstoffsuperoxyd die schwarze Hornfarbe reoxydirt und die Hornsubstanz erweicht. Endlich empfiehlt Unna noch eine Behandlung mit Hebra'schem Seifengeist mit nachträglicher Einreibung einer schwachen Salicylsalbe.

Die Papillae fungiformes erleiden gleichfalls häufig Veränderungen.

Bald sind sie acut geschwellt, hochroth, scharlachroth, bald in chronisch hyperplastischem Zustande. Sie erscheinen stark verbreitert, in warzige oder stachelige Gebilde umgewandelt, die ihren Trägern ein Gefühl von Kratzen, Unebenheit am Gaumen erzeugen. Abtragen mit der Scheere und energisches Aetzen mit Chromsäure oder dem Galvanokauter helfen am sichersten.

Relativ häufig finden sich die Balgdrüsen an der Zungenwurzel in einem entzündlich hypertrophischen Zustande.

Acut schwellen dieselben an bei Stomatitis mercurialis, bei diffuser Phlegmone; zuweilen abscediren sie in ähnlicher Weise wie die Follikel der Tonsille.

Ist die Schwellung eine chronische, dann spricht man von Hypertrophie der Zungentonsille. Aetiologisch kommen häufige acute oder langanhaltende Entzündungen und Reizzustände der Mundrachenhöhle, so namentlich solche im Bereiche des schon öfters erwähnten lymphatischen Mundrachenringes, nach Swain zuweilen auch Erkältungen, sowie Scrophulose, Tuberculose und Syphilis in Betracht. Die Affection kommt besonders oft zur Pubertätszeit oder auch im Klimakterium vor.

Die Störungen, welche die Affection bei dem häufiger ergriffenen oder wenigstens mehr belästigten weiblichen Geschlechte oder bei Nervösen hervorruft, bestehen hauptsächlich in dem spontan oder beim Schlucken und Sprechen auftretenden Gefühle der Anwesenheit eines Fremdkörpers im Halse, in Brennen, Drücken, Verschleimung, sowie Ermüdung der Stimme bei anhaltendem lauten Sprechen oder Singen, in vermehrtem Bedürfnisse zum Schlucken; häufig ist auch quälender Hustenreiz, der zu Anfällen von Dyspnoe oder Bewusstlosigkeit Anlass geben kann. Verursacht werden die angegebenen Erscheinungen grossentheils, aber nicht ausschliesslich, durch den Contact und Druck, welchen die oft enorm geschwellten und zu Tumoren vergrösserten Zungenbalgdrüsen auf den Kehldeckel ausüben; doch kann es auch vorkommen, dass eine abnorm nach vorne gestellte oder eine besonders lange Spitze tragende Epiglottis sich in den nicht hypertrophischen Drüsen verfängt oder reibt und dieselben Erscheinungen hervorruft, und umgekehrt, dass trotz beträchtlicher Hyperplasie alle Symptome fehlen. Zuweilen werden die Beschwerden gelindert durch Hervorstrecken der Zunge, d. h. wenn der Zungenrücken von dem Kehldeckel entfernt wird. Swain glaubt, dass der

Globus hystericus meist auf das Vorhandensein geschwellter Zungenbalgdrüsen zurückzuführen sei; nach des Verf. Erfahrung ist dies jedoch nur selten der Fall und lassen sich für den Globus in der Regel keinerlei materielle Veränderungen auffinden.

Die Diagnose stützt sich theils auf die Digitaluntersuchung, theils auf den laryngoskopischen Befund, welcher eine mehr oder weniger umfangreiche Berührung oder Ueberlagerung des Kehldeckels und der Fossae glossoepigl. durch die vergrösserten Follikel erkennen lässt. Gesichert wird die Diagnose ferner durch die Untersuchung mit der Sonde, wenn bei Berührung der geschwellten Drüsen Schmerz oder Husten auftritt, der nach Cocaïnisirung der betreffenden Stelle wieder verschwindet.

Die Prognose ist günstig, der Verlauf meist ein langwieriger.

Die Therapie hat die Aufgabe, die vergrösserten Drüsen zu verkleinern oder ganz zu beseitigen. Die Verkleinerung geschieht durch methodische Bepinselungen mit Arg. nitr. oder Mandl'scher Lösung (Jodi puri 0·1—0·3, Kali jod. 1·0—2·0, Glycerin 20·0) oder durch galvanokaustische Aetzung oder durch Chromsäure oder Trichloressigsäure; bei sehr beträchtlicher Vergrösserung und tumorartigem Aussehen der Drüsen müssen dieselben entfernt werden, und zwar durch Abtragen mit der Scheere oder der kalten oder heissen Schlinge; die Nachbehandlung besteht in Schlucken von Eis und desinficirenden Gurgelungen, Aufblasen von Jodolpulver.

Auch Atrophie der Zungenpapillen, namentlich der Papillae filif., kommt vor. Gar nicht selten finden sich auf dem Zungenrücken grössere oder kleinere längliche oder runde Stellen von hellrother Farbe und glatter Oberfläche, die bedingt sind durch den Verlust der Hornfortsätze der Papillae filif. und den auf diesen normaliter haftenden Zungenbelag. Solche Individuen klagen über Trockenheit und besondere Empfindlichkeit der Mundhöhle; wodurch diese Veränderung erzeugt wird, ist völlig unbekannt.

Atrophie der Zungenbalgdrüsen soll nach Virchow und Lewin pathognomonisch für Syphilis sein.

Stomatitis exsudativa.

(Eczem, Herpes, Pemphigus, Urticaria, Variola, Aphthen.)

In der Mundhöhle kommen ebenso wie im Rachen und in der Nase zahlreiche Veränderungen vor, welche sich unter den bisher beschriebenen und noch zu beschreibenden Formen nicht gut einreihen lassen, die aber doch ihrer Häufigkeit wegen besprochen werden müssen. Es erschien dem Verf. noch am ehesten zulässig, den Herpes, Eczem, Pemphigus, die Variola, die Aphthen und einige andere Processe

unter obigem Titel abzuhandeln, zumal auch vom pathologisch-anatomischen Standpunkte aus keine wesentliche Einsprache erhoben werden dürfte.

Bläschen und Blasen mit serösem Inhalte kommen hauptsächlich bei Herpes, Eczem und Pemphigus, solche mit eitrigem Inhalte, Pusteln, vorzüglich bei Variola zur Beobachtung.

Herpeseruptionen sitzen mit besonderer Vorliebe auf den Lippen (Herpes labialis), dem harten Gaumen, seltener auf den Wangen und der Zunge.

Aetiologisch spielen rheumatisch-febrile Zustände die Hauptrolle, wofür das Auftreten derselben im Gefolge acuter Nasenkatarrhe, Influenza, Muskel- und Gelenkrheumatismen beweisend ist; bekannt ist auch sein häufiges Vorkommen bei gastrischen Störungen, sowie bei Influenza und Pneumonie und sein fast völliges Fehlen bei Typhus. Reize, welche die Lippen und die Mundhöhle treffen, besonders scharfe, gesalzene und gepfefferte Speisen, stark gebeizte Cigarren, können unzweifelhaft den Ausbruch desselben provociren.

Mit besonderer Vorliebe sitzen die Herpesbläschen an der Uebergangsstelle der Haut in das Lippenroth. Bald auf der Oberlippe, bald auf der Unterlippe, bald auf beiden zugleich, schiessen in kürzester Zeit mehrere meist in Gruppen beisammenstehende, stecknadelkopf- bis erbsengrosse Bläschen auf, deren anfangs heller und durchsichtiger Inhalt sich nach einigen Tagen trübt und den Eruptionen ein grauweisses oder graubläuliches Colorit verleiht; manchmal wird der Inhalt derselben eitrig. Die Bläschen vertrocknen nun in den nächsten Tagen entweder von selbst oder ihr Inhalt entleert sich durch zufällige Verletzungen, besonders bei der Reinigung der Nase. Um die Bläschen herum befindet sich meist ein rother Ring und entzündliche Infiltration des Gewebes.

Entwickelt sich der Herpes auf der Schleimhaut selbst, dann kommt man selten früh genug dazu, die charakteristischen Bläschen zu sehen, da die emporgehobene Epithelialdecke in kürzester Zeit macerirt und abgestossen wird; man erblickt meist kleine rundliche, oberflächliche, vereinzelt oder in Gruppen stehende Excoriationen mit weissem oder gelblichem Grund und gerötheter und gewellter Umgebung, an deren Rändern zuweilen noch die Reste der abgehobenen Epithelialdecke in Form eines oder mehrerer Ringe wahrzunehmen sind.

Während Herpes der Lippen meist nur ein Gefühl von Hitze und Spannung oder Stechen bei Berührung zur Folge hat, verursacht der Herpes der Schleimhaut sehr beträchtliche, besonders bei der Nahrungsaufnahme sich noch steigernde Schmerzen. Besonders intensiv wird zuweilen die Zunge, und zwar halbseitig, bei Männern öfters als bei Frauen, befallen (Hemiglossitis herpetica). Nach Güterbock befinden sich die Bläscheneruptionen stets im Gebiete des N. trigeminus, seltener der Chorda, niemals ist der Hypoglossus oder Glossopharyngeus betheiligt. Die Zunge ist mit kleineren und grösseren Gruppen von Bläschen besetzt, welche bald eintrocknen, aber auch tiefgehende parenchymatöse Entzündung und Abscedirung zur Folge

haben können. Meist finden sich auch am Zahnfleisch, harten und weichen Gaumen, sowie auf der Haut des Gesichtes und der Nase zosterartige Bläschen. Es ist unzweifelhaft, dass die Affection einer Erkrankung des Trigeminus ihre Entstehung verdankt; ob dieselbe aber centraler oder peripherer Natur sei, ist noch nicht entschieden.

Die Affection dauert in der Regel einige Tage, doch können bei Nachschüben 1—2 Wochen bis zum Verschwinden aller Erscheinungen verstreichen. Flatau beobachtete einen Fall von chronisch recidivirenden Herpes der Mundschleimhaut, der über 17 Jahre dauerte und mit Herpeseruptionen auf der Haut und den Genitalien combinirt war.

Das Eczem der Lippen tritt nach Kaposi acut und chronisch auf, und zwar theils selbstständig, theils in Verbindung mit Eczem des Gesichts und Naseneinganges. Es befällt meist den Lippensaum, der rissig wird und mit hämorrhagischen Krusten besetzt ist. Es besteht starkes Jucken und sind Exacerbationen häufig und hartnäckig. Eine andere Form des Eczems äussert sich durch das Auftreten kleiner rother Flecken am Lippenrand und dessen Umgebung; auf der gerötheten Haut bilden sich weisse Schuppen, die sich fortwährend abstossen und erneuern.

Grössere Blasen entstehen manchmal nach Verbrühungen sowie im Gefolge des Erysipel, das sich entweder von der äusseren Haut oder vom Rachen aus auf die Mundhöhle fortsetzt, ferner bei Pemphigus und durch andere noch nicht genügend bekannte Ursachen. Hieher gehört auch ein von Sidlo beschriebener höchst merkwürdiger Fall von acuter Blasen- und Emphysembildung in der Mundhöhle und am weichen Gaumen, der aller Wahrscheinlichkeit nach einer Infection mit septischen oder putriden Stoffen seine Entstehung verdankte. Der Pemphigus der Mundhöhle tritt sowohl idiopathisch für sich allein, als auch in Verbindung mit Pemphigus der Haut auf. Im Stadium der Blasenbildung sieht man die Affection selten, desto häufiger aber im Stadium der Desquamation; die Eruptionen sind von grauweisser Farbe, das Epithel aufgelockert und macerirt, der Diphtherie sehr ähnlich, die Blasen können mit serösem, serös-eitrigem oder blutig-eitrigem Inhalt gefüllt sein; nach Abstossung ihrer Decke bleibt eine excoriirte Schleimhaut zurück.

Nach Kaposi kommt es im Verlauf der Urticaria, namentlich der selteneren Riesenurticaria, auf der Schleimhaut des Mundes, Rachens und des Kehldeckels zu plötzlich entstehenden flüchtigen ödematösen Schwellungen, durch welche die Uvula enorm vergrössert wird und die Epiglottis bis zur Suffocation anschwellen kann.

Entwickelt sich Variola auf der Mundschleimhaut, dann entstehen aus den zuerst auftretenden flachen Knötchen mit trübem Inhalt gefüllte, mit einer Delle versehene Bläschen und später eitergefüllte Pusteln, welche platzen und sich in Geschwüre umwandeln. Die begleitende Stomatitis ist meist sehr heftig, auch schwellen bei beträchtlicher Anzahl der Pusteln die Lymph- und Speicheldrüsen an und haben excessive Salivation zur Folge. Auch die Varicellen occupiren sehr oft die Mundschleimhaut, um dort Bläschen zu er-

zeugen, die sich in rundliche, den herpetischen ähnliche Geschwüre umwandeln.

Dass ein von Michelson als Glossitis papulosa acuta beschriebener Fall hieher gehört, ist dem Verf. um so wahrscheinlicher, als die Affection unter fieberhaften Allgemeinerscheinungen begann und mit sich rasch vergrössernden, mit Dellen versehenen Efflorescenzen verlief; dass Variola übrigens ohne gleichzeitiges Exanthem auf der äusseren Haut sich nur in der Mundrachenhöhle localisiren kann, hat Verf. an sich selbst erlebt.

Eine andere hieher gehörige und namentlich bei Kindern im Alter von 9 Monaten bis 3 Jahren häufige Affection sind die Aphthen (Stomatitis aphthosa).

Während man früher mit dem Worte Aphthen höchst verschiedene Dinge bezeichnete, beschränkt man jetzt den Begriff auf kleine, flache, weisse oder weissgelbe Flecken, welche einen gutartigen Verlauf nehmen und für sich allein niemals mit übelriechender Secretion einhergehen.

Während einzelne Beobachter die Aphthen aus Bläschen, andere aus vereiternden Schleimfollikeln oder aus Zelleninfiltraten des submucösen Bindegewebes entstehen lassen und Bohn dieselben auf croupöse Exsudate zwischen Submucosa und Epithelschicht zurückführt, hält E. Fränkel die Aphthen für pseudodiphtherische Producte. Er fand an den Aphthen alle diejenigen Elemente, welche als Bildner fibrinöser Pseudomembranen speciell von Croup und Diphtherie bekannt sind. An der Bildung der Pseudomembranen nehmen Theil die Zeichen der Coagulationsnekrose aufweisenden Epithelien, ferner zahlreiche Leukocyten und Fibrin. Die Aphthen entstehen auf Kosten des ertödteten Epithels; sie haften auf dem intacten eigentlichen Schleimhautgewebe und liegen nicht subepithelial. In den aphthösen Herden finden sich Mikrokokken, namentlich Staphylococcus pyogenes aureus, citreus und flavus, die E. Fränkel für die wahrscheinliche Ursache der Aphthen hält, während er den übrigen Ursachen, gastrischen Beschwerden, Dentition, Pneumonie, acuten Exanthemen etc., nur die Rolle prädisponirender Momente zuertheilt. Besonders gerne scheint der Infectionsstoff in dem Belege schlechter Zähne zu sitzen.

Den Aphthen täuschend ähnliche Producte sah Verf. mehrmals bei Herzkranken aus Capillarembolien resp. Schleimhautecchymosen hervorgehen.

An verschiedenen Stellen der Mundhöhle, auf Lippen, Wangen, hartem und weichem Gaumen, besonders auch auf der Zunge, bilden sich nach vorheriger stärkerer Vascularisation und Röthung, jedoch meist sehr schnell und mit deutlichen Nachschüben, zuweilen unter sehr beträchtlichem Fieber und Allgemeinstörungen, stecknadelkopf- bis linsengrosse, zuweilen in grösseren Plaques und gewundenen Figuren auftretende, aus einer weissen, speckigen, über das Niveau deutlich hervorragenden Masse bestehende Flecke. Der weisse Belag haftet fest auf der Unterlage, lässt sich nur mit Gewalt und unter

Blutung entfernen und ist von einem mehr oder weniger scharfen, schmalen, rothen Saum umgeben; später wird er durch reichliche Secretion erweicht und in Folge mechanischer Einwirkung abgehoben, doch bleibt meist eine dicke, filzige, von Epithelfetzen umgebene Masse zurück. Bohn nennt dies offene Aphthen und protestirt gegen die Bezeichnung als Geschwüre, da man unter letzteren nur die eitrige Einschmelzung von Geweben verstehe und es bei vielen kleineren und mittleren Aphthen niemals zum Abgange des Epithels komme. Confluiren mehrere benachbarte Aphthen, dann entstehen ausgebreitete landkartenartige Verfärbungen, die zu verschiedenen Irrthümern Anlass geben können. Die begleitende Stomatitis ist oft so hochgradig, dass Foetor ex ore auftritt.

Mag man nun die aus capillären Blutungen hervorgegangenen Veränderungen als hämorrhagische Erosionen und damit als eine eigene Species bezeichnen, Thatsache ist, dass sie sich von den Aphthen in ihrer Erscheinung und ihrem Verlaufe in nichts unterscheiden. Die Heilung findet stets in der Weise statt, dass die aphthöse Masse mehr und mehr eingeschnürt und abgestossen wird und dass die vom Belage befreiten Stellen sich schnell überhäuten. Narbenbildung findet nicht statt, da der ganze Process sich am Epithel abspielt.

Dass die Aphthen von Person zu Person ansteckend sind, ist jetzt sicher erwiesen, kommen doch Epidemien in Findelhäusern, Kinderspitälern und Kasernen nicht selten vor. Nach Monti kommen sie nicht blos bei schwächlichen, sondern auch bei kräftigen Kindern während der ersten Dentition vor, auffallend häufig aber bei rachitischen; zur Bildung von Aphthen gehört nach Monti ausser dem Infectionsstoffe die mangelhafte Reinigung der congestionirten oder durch das lange Verweilen organischer Substanzen entzündeten Mundschleimhaut. Bei Frauen finden sie sich namentlich zur Zeit der Menses, Gravidität und des Puerperiums. Manche Frauen leiden bei jeder Menstruation an diesem lästigen Uebel, auch sind der Genuss der Milch von Kühen, welche an Maul- und Klauenseuche litten, sowie gastrische Störungen, mangelhafte Reinigung der Mundhöhle, speciell schlechter Zähne, auf die Entstehung derselben von Einfluss.

Die subjectiven Beschwerden der Aphthen bestehen ausser in dem initialen Fieber in Schmerzen und grosser Empfindlichkeit der Mundhöhle bei Nahrungsaufnahme, beim Kauen, Sprechen und Rauchen; Säuglinge und Kinder verweigern schreiend die Nahrung und können in ihrer Ernährung Schaden leiden.

Die Prognose ist günstig, der Verlauf jedoch nicht immer ganz harmlos. So beobachtete J. Seitz hochgradigstes Fieber mit Erbrechen, Kopfschmerz, Schwellung der Hals- und Kieferdrüsen und der Milz und acute parenchymatöse Nephritis mit hydropischen Erscheinungen. Recidiven sind nicht selten und mit neuem Fieberausbruch combinirt, so dass sich die Krankheit mehrere Wochen hinziehen kann.

Die Differentialdiagnose der verschiedenen Bläschen und Blasen und ähnlicher Vorgänge unterliegt in der Regel keinen grossen

Sehwierigkeiten. Am ehesten kann Herpes mit Aphthen und umgekehrt verweehselt werden, was aber weder in diagnostischer noch in therapeutischer Hinsieht ein Unglüek ist. Von den syphilitischen, tubereulösen und traumatischen Uleerationen unterscheiden sich Herpes und Aphthen durch ihren meist acuten Verlauf. Varicellen, Variola, Rotz, Maul- und Klauenseuche befallen in der Regel aueh noch andere Körpertheile und manifestiren sich dadurch nur als Localisation eines Allgemeinleidens.

Die Therapie hat bei allen Formen der exsudativen Stomatitis besonders auf passende Ernährung Rücksicht zu nehmen; indifferente Stoffe, wie laue oder kühle Mileh, ungesalzene Fleischbrühe und Suppe, leichter ehinesischer Thee, verdienen bei der oft ausserordentliehen Empfindlichkeit der Mundhöhle den Vorzug; dass Alcoholiea und Tabak auf das Strengste verboten werden müssen, ist natürlich. Die loeale Behandlung beschränkt sich, da fast alle Mundwässer den Schmerz eher steigern, auf Reinigung mit lauwarmem Wasser, Camillenthee oder einem anderen sehleimigen Vehikel, eventuell mit Zusatz einiger Tropfen Opiumtinetur, oder auf Ausspülung mit 1—3% Borsäurelösung; Bepinselungen mit Boraxlösung 5:25 oder Tannoglyeerin 1:30 oder ½% Natr. Salicyllösung, bei grosser Sehmerzhaftigkeit mit 2—10% Coeaïnlösung oder, wie bei Pemphigus, Aufstreuen von Morphiumpulver können gleiehfalls empfohlen werden. Bei Herpes ist innerlieh Calomel (3mal täglieh 0·05) oder Antipyrin, bei mehr neuralgisehem Schmerz Phenacetin oder Salipyrin zu versuehen, bei ehroniseh-reeidivirendem Herpes Arsen. Die Behandlung des Eezem ist verschieden nach dem Stadium. In acuten Fällen ist jede Berührung mit Wasser, sowie das Kratzen zu vermeiden, daneben Bor-, Blei-, Zink- oder Hebrasalbe. Zur Verhütung von Reeidiven innerlieh Arsenik. Bei den seborrhoischen Formen ist die Application einer Sehwefel-, Resorcin- oder Naphtholsalbe angezeigt oder nach Vidal eine Salbe aus Butyr. Cacao 4·0, Ol. amygd. dulc. 10·0, Aeid. tartar. 0·25—0·3. Bei Urtiearia sind Abführmittel zu verordnen und subcutan 0·0005 Atropin. Bei den mit Magendarmaffeetionen einhergehenden Aphthen empfehlen sich Bitterstoffe, unter Umständen milde Laxantia, loeale Bepinselungen mit Lapislösung oder mit Aether. Gegenüber den die Menses begleitenden Aphthen ist in der Regel jede Therapie maehtlos, doeh müssen etwaige Anomalien der Sexualorgane beseitigt und hochgradige nervöse Aufregung mit Nervinis bekämpft, chlorotisehe Zustände mit Eisen, China, Landaufenthalt, Brunnencuren behandelt werden.

Stomatitis ulcerosa.

Finden sich ausser Röthung und Schwellung der Schleimhaut noch Abhebung des Epithels, oberflächliche oder tiefergehende Substanzverluste, dann spricht man von Stomatitis ulcerosa.

Wenn auch nicht jeder Substanzverlust ein Geschwür zu nennen ist, so entwickelt sich das letztere doch constant aus dem ersteren; wenn deshalb mehrere mit Abhebung der epithelialen Decke einhergehende Affectionen in dem vorhergehenden Capitel besprochen wurden, während dieselben von Anderen zu den Geschwürsprocessen gerechnet werden, so war für uns in erster Linie der pathologisch-anatomische Gesichtspunkt resp der Grundprocess massgebend. Deshalb werden auch der Syphilis und Tuberculose der Mundhöhle eigene Capitel gewidmet werden.

Zu der Stomatitis ulcerosa rechnet man vorerst die sogenannten specifischen Mundentzündungen, die zwar nicht immer mit Ulcerationen combinirt sind, aber doch sehr häufig mit solchen verlaufen.

Unter diesen nimmt die Stomatitis mercurialis in praktischer Hinsicht die erste Stelle ein.

Wird dem Organismus Quecksilber längere Zeit oder auf einmal in grösseren Dosen einverleibt, gleichgiltig, ob dasselbe durch den Magen oder durch die Haut, den Conjunctivalsack, das subcutane Zellgewebe oder durch die Lunge in Form von Quecksilberdämpfen, letztere besonders bei Chemikern, Hutmachern, Spiegelbelegern oder Barometermachern, in den Körper gelangt, so kündet sich die Hydrargyrose zuerst durch eine unangenehme metallische Geschmacksempfindung und Trockenheit im Munde an. Die Zähne scheinen stumpf und verlängert zu sein, das Erfassen und Zerkleinern der Speisen ist schmerzhaft und hat leicht Blutungen aus dem Zahnfleische zur Folge. Bald stellt sich Speichelfluss ein, die Schmerzen steigern sich, die Zunge schwillt theilweise oder im Ganzen an, in letzterem Falle derart, dass sie hinter den Zähnen keinen Platz hat und zur Mundöffnung herausgestreckt wird.

Bei der objectiven Untersuchung erscheint die Mundschleimhaut im Ganzen oder theilweise, namentlich an den letzten Backzähnen und der Wangenschleimhaut geröthet und geschwellt; in besonders hohem Grade ist das Zahnfleisch der unteren Schneidezähne gewulstet und mit Ecchymosen besetzt.

Statt die Zähne enge zu umschliessen, liegt das Zahnfleisch denselben nicht direct auf, sondern steht mehr oder weniger weit ab, wodurch die Zähne sich lockern. Die Zunge und die Schleimhaut der Wangen, des Zahnfleisches sind mit einem schmierigen, schmutzigen, grünlichen Ueberzuge bedeckt, der einen intensiven Fötor verbreitet. Wird in diesem Stadium die weitere Einwirkung des Quecksilbers nicht verhindert und die Affection nicht zur Heilung gebracht, dann überzieht sich die Schleimhaut mit einem weisslichgrauen, diphtherie-

ähnlichen Belage, nach dessen Abstossung unregelmässige, tiefgehende, leicht blutende Geschwüre zum Vorschein kommen. Die Salivation erreicht den höchsten Grad, die Nahrungsaufnahme wird immer schmerzhafter, zuletzt ganz unmöglich. die Zähne fallen aus, die Ulcerationen greifen mehr und mehr in die Tiefe bis auf das Periost des Kiefers und können so Periostitis, Caries und Nekrose oder auch Gangrän der Lippen und Wangen zur Folge haben. Glücklicherweise gehören bei der heutigen Syphilistherapie derartige Fälle zu den Seltenheiten.

Bei längerer Einwirkung des Quecksilbers kommt es, nachdem eine Stomatitis mercurialis vorausgegangen, zu Epitheltrübungen und Epithelverdickungen der Mundrachen-Schleimhaut, welche von den durch die Frühsyphilis gesetzten Veränderungen oft schwer zu unterscheiden sind und die bereits in dem Capitel „Leukoplakie“ erwähnt wurden.

Die von Schuhmacher und Sommerbrodt beobachteten einzeln oder herdweise auf oder zwischen den Balgdrüsen der Zunge, den Zungenkehldeckelfalten und der hinteren Rachenwand sitzenden weissen, später graugelb sich verfärbenden Auflagerungen (Pharynxhydrargyrose), die der Stomatitis mercurialis zeitlich vorausgehen, nach Aussetzen des Quecksilbers ohne Narben heilen und nur mit dem Kehlkopfspiegel diagnosticirt werden können, verdanken einer oberflächlichen Nekrose der Schleimhaut durch Arrosion des hinabfliessenden mercurhaltigen Speichels ihre Entstehung. Zu Geschwüren führende Stomatitis soll nach Bresgen auch bei Arbeiterinnen von künstlichen Blumen vorkommen, namentlich bei solchen, welche die Stengel fabriciren; der grüne, aus Pikrinsäure und Berlinerblau bestehende Farbstoff wird durch das Befeuchten der Finger mit Speichel auf die Mundschleimhaut gebracht und erzeugt dort die erwähnten Veränderungen.

Die Diagnose der mercuriellen Stomatitis stützt sich auf den Nachweis der Aufnahme des Metalles und seiner Salze. So leicht dieser in der Regel auch gelingt, so schwer ist derselbe doch manchmal zu erbringen und braucht deshalb nur an eine Beobachtung Bamberger's erinnert zu werden, welchem es in einem scheinbar unerklärlichen Falle gelang, als Ursache die zur Vertilgung der Wanzen in die Bettstelle eingestrichene graue Salbe zu ermitteln. Dem Verf. ist ferner ein Fall bekannt von einem Arzte, der einige Stunden nach dem Amalgamiren der Zinkelemente einer Batterie und ein anderes Mal nach der Einreibung einer minimalen Menge von Ung. einer. an Stomatitis erkrankte.

Dass der Eine für die kleinsten Dosen von Mercur empfänglich ist, während der Andere die stärksten Schmiercuren ohne irgendwelche Intoxication durchmacht, ist individuell und schwer zu erklären. Sicher ist aber, dass durch die Anwesenheit epithelentblösster Stellen in der Mundhöhle, namentlich durch die Reibung cariöser Zähne oder durch Wulstung der Wangenschleimhaut, Läsion des den unteren Weisheitszahn bedeckenden Zahnfleisches der Ausbruch der Mercurial-

stomatitis begünstigt wird, wie von Bockhart auch experimentell nachgewiesen wurde.

Die Prognose ist, so lange es noch nicht zu umfangreicheren Ulcerationen gekommen ist, eine günstige; sie wird aber ungünstig resp. zweifelhaft, wenn ausgebreitete oder gar schon gangränöse Geschwüre und Zerstörungen vorhanden sind. Die chronische leukoplakische Form gibt eine günstige Prognose, da dieselbe nach Aussetzen des Quecksilbers von selbst zurückgeht.

Die Behandlung muss in erster Linie darauf gerichtet sein, den Kranken auf den eventuellen Eintritt der Affection aufmerksam zu machen und dann sofort ausserhalb des Bereiches der schädlichen Potenz zu setzen und quecksilberhaltige Medicamente und alle Gegenstände, die damit imprägnirt sein können, zu beseitigen. Dazu gehört auch das Verlassen der Wohnung oder des Zimmers, in welchem die Inunctionen bisher vorgenommen worden waren, und die gründliche Reinigung der Haut durch ein warmes Vollbad.

Die örtliche Behandlung ist, so lange es sich nicht um Geschwüre handelt, identisch mit der bei Stomatitis catarrh. angegebenen; ist es zur Ulceration gekommen, dann verdienen die Desinficientia den Vorzug, so besonders Mundwässer mit Kali chloric., Acid. boric., Aq. chlori, Thymol oder Extr. ling. Campech. (20: aq. font. aq. Salv. āā. 400·0) oder einer Kampheremulsion 3:300. Sehr wirksam sind Bepinselungen der Geschwüre mit Acid. tannicum oder verdünnter Chrom-, Salz- oder Bromwasserstoffsäure oder mit Tinctur. Ratanh. 50·0 Acid. carbol. 0·5 oder 2% Wasserstoffsuperoxyd. Bei grosser Schmerzhaftigkeit empfehlen sich Cocaïnbepinselungen unmittelbar vor der Nahrungsaufnahme. Manche Autoren geben dem innerlichen Gebrauche der Kali chloric. pro die 2—5 Gramm als Prophylacticum und als Heilmittel vor allen anderen den Vorzug. Die Wirkung des Schwefels ist nicht erwiesen, dagegen sollen sich kleine Dosen von metallischem Jod in alkoholisch-glyceriniger Lösung, sowie die Salpetersäure und das Atropin zuweilen als wirksam erwiesen haben. Gegen die weissen Epithelverdickungen am Zungengrund und den hyoepiglottischen Falten erwiesen sich (Schuhmacher) Bepinselungen mit verdünnter Jodtinctur, sowie Kali chloricum innerlich sehr vortheilhaft.

Als eine der vielen Localisationen des Scorbuts und der damit nahe verwandten Hämophilie, Morb. Werlhofii, jener chronischen allgemeinen Ernährungsstörung, die sich hauptsächlich durch Hämorrhagien in die verschiedensten Organe und fortschreitenden Verfall der Kräfte manifestirt, ist die Stomatitis scorbutica zu betrachten.

Die Krankheit beginnt, nachdem meistens rheumatische Schmerzen im Rücken, den Extremitäten und den Gelenken, sowie allgemeine Abgeschlagenheit, Druck und Beklemmung auf der Brust, Herzklopfen, sowie spontane Hämorrhagien der Haut der unteren Extremitäten vorausgegangen waren, mit Empfindlichkeit der Mundhöhle, besonders mit Schmerzen beim Kauen und vermehrter Speichelsecretion. Das Zahnfleisch, das an seiner Peripherie mit einem blaurothen Saume ein-

gefasst erscheint, nimmt an Volumen zu, seine Fortsätze zwischen den Zähnen schwellen zu dicken, kolbenartigen Zapfen an, wuchern über das Niveau der Zähne hinüber und sind mit grösseren oder kleineren Blutextravasaten besetzt. Allmälig bilden sich Geschwüre, an deren unregelmässigen Rändern fungöse Excreseenzen aufschiessen und deren Grund schmutzigbraun oder mit frischem Blut bedeckt erscheint. Die zerfallene Schleimhaut, die manchmal in Fetzen herunterhängt, beschlägt sich mit einem diphtheritischen Exsudate und blutet bei der leisesten Berührung. Die Secretion ist eine äusserst profuse, der mit blutigem Schleim vermischte Speichel äusserst übelriechend, ja aashaft. Die Zähne fallen theilweise aus, theilweise haften sie nur noch sehr lose; auf den Wangen, der Zunge und den Lippen, zuweilen auch im Rachen, bilden sieh weitere Blutextravasate, die gleichfalls zerfallen und sich in Geschwüre umwandeln. Die Blutungen sind oft so profus, dass die Kranken in relativ kurzer Zeit anämisch und hydropisch zu Grunde gehen. Babes fand im Zahnfleisch einen faden- und stäbchenartigen Pilz, den er für die Veränderungen am Zahnfleisch und die Blutungen verantwortlich macht.

Die Diagnose der Stomat. scorb. ist mit Rücksieht auf die übrigen Störungen nicht schwer, auch ist bei keiner anderen Form der Stomatitis die Schwellung der Schleimhaut so intensiv; die gleich nachher zu bespreehende Stomacace ist eine rein locale Affection und charakterisirt sich hauptsächlich durch den gelben Saum des Zahnfleisches, der bei Scorbut fehlt.

Die Prognose des Mundscorbuts ist an und für sich nicht ungünstig; sie ist aber zum Mindesten zweifelhaft, wenn das Leiden schon einen höheren Grad erreicht hat oder Complicationen in anderen lebenswichtigen Organen vorhanden sind; doch können auch plötzliche profuse Blutungen die vorher günstige Prognose bedenklich trüben.

Bei der Behandlung des Mundseorbuts müssen die Ernährungsverhältnisse geregelt und die sanitätswidrigen Verhältnisse der Kasernen, Gefängnisse oder Schiffe beseitigt werden. Da mangelhafte Ernährung in qualitativer und quantitativer Hinsicht, so besonders der Ausfall des Fettes, ferner Ersehwerung der Magenverdauung in Folge grober oder einförmiger Kost als Ursachen des Scorbuts anzusehen sind, so muss auf möglichste Abwechslung und Mischung der Kost Rücksicht genommen werden. Als scorbutverhindernde Nahrungsmittel gelten noch jetzt frisches Obst, frische, grüne Gemüse, Citronensäure, Sauerkraut und Brunnenkresse, Bier und Alkohol. Bei ausgebrochenem Scorbut ist nach Neumann und Vogel der Genuss der Bierhefe 150—200·0 pro die ganz besonders wirksam. A. Rose in New-York empfiehlt als das wirksamste Mittel die Gallussäure innerlich theils in Form von Pulvern (3mal täglieh 0·5), theils als Mixtur (Acid. gall. 4·0, Spir. vini 8·0, Aq. dest. 180, alle 10 Minuten 1 Esslöffel), theils in Verbindung mit Tinct. Cinnam, T. Chinae, T. Gentian. Zur Beseitigung der hämorrhagisehen Diathese empfehlen sich Chinadecocte mit Acid. sulfur. dilut., Gentiana, Calam. aromat., Tinct. Chinae 40·0 mit Tinct. Zingib. 20·0, Chinin, Ergotin und Eisen,

namentlich Liq. ferri sesquichl. 1:50 Glycerin. Von Einigen wird auch Creosot und Aqua picis empfohlen. Die locale Behandlung muss auf fleissigste Reinigung des Mundes mit den früher erwähnten Mitteln bedacht sein. Bei Neigung zu Blutungen zeigen sich Bepinselungen der Geschwüre mit verdünntem Liq. ferri sesquichl. oder Bestreuen mit Alaun sehr wirksam, bei grosser Schmerzhaftigkeit ist Cocaïn angezeigt. Nach A. Rose sollen die meisten Mundgeschwüre durch Bepinselungen mit Chloral (5:30 Glycerin) sehr schnell heilen.

Grosse Aehnlichkeit mit den beiden eben besprochenen Formen hat die idiopathische Stomacace, die Mundfäule.

Ihre Aetiologie ist noch nicht ganz aufgeklärt, doch kann als sicher angenommen werden, dass schlechte, feuchte Wohnungen, Ueberfüllung der Wohnräume, ungenügende oder ungeeignete Kost, abnorm heisse Sommer, Malaria, Rhachitis, Scrophulose und Tuberculose bei der Genese der Krankheit eine wichtige Rolle spielen. Wenn die Stomacace auch hauptsächlich eine Krankheit des Kindesalters ist, so werden doch auch Erwachsene nicht verschont, wie die zahlreichen Epidemien bei dem Militär in Belgien, Frankreich, Portugal etc. beweisen. Da ihre Existenz von dem Vorhandensein des Zahnfleisches resp. der Zähne abhängt, so kommt die Affection bei zahnlosen Kindern oder Greisen nicht vor; dagegen stattet sie ungesunden, überfüllten Findelhäusern, Pflegeanstalten, Spitälern und Kasernen mit besonderer Vorliebe ihre Besuche ab. Sie tritt theils sporadisch, theils epidemisch auf, weshalb sie auch für contagiös gilt, zumal seit Bergeron an sich selbst einen positiven Impfversuch anstellte. Die Nichtcontagionisten dagegen stützen sich auf andere negative Impfversuche, sowie auf die Thatsache, dass die Officiere und Unterofficiere der befallenen Kasernen wenig oder gar nicht von der Krankheit ergriffen werden, und glauben, die Schädlichkeit sei weniger an den Menschen als an den Boden und die Localität gebunden. Bohn hält es für zweifellos, dass die Stomacace weder eine Krankheit specifischen Ursprunges ist, noch auf Infection beruht. Sie erklärt sich vielmehr aus einer durch allgemeine Ursachen hervorgerufenen oder begünstigten localen chronischen Entzündung und Widerstandslosigkeit des Zahnfleisches. Andere beschuldigen mangelhafte Reinigung des Zahnfleisches oder den Genuss von Milch, die von maul- und klauenseuchenkranken Kühen stammt. Neuerdings glaubt Frühwald, dass ein Pilz, der Bacillus foetidus pyogenes, bei der Entstehung der Stomacace eine Rolle spielt.

Die idiopathische Stomacace beginnt meist acut, selten in chronischer Weise unter den Erscheinungen der katarrhalischen Stomatitis des Zahnfleischrandes des Unterkiefers. Nach kurzer Zeit, in 2—3 Tagen, bei der chronischen Form nach Wochen, selbst Monaten, erweicht das geschwellte von den Zähnen abstehende Zahnfleisch und verwandelt sich in eine gelbliche, schmierige, stinkende Masse, nach deren Abstossung ein Geschwür zum Vorschein kommt, das sich längs

des Zahnfleischrandes ausbreitet, bei der geringsten Berührung blutet und zur Folge hat, dass die Zähne im weiteren Verlauf ausfallen. Auch auf den dem Zahnfleisch gegenüberliegenden Theilen der Wangen und der Zunge bilden sich aus blaurothen gewulsteten Stellen tiefe Geschwüre, deren Grund mit einem graugelben sanguinolenten Eiter bedeckt ist. Meist lässt sich auch Schwellung der Lymphdrüsen am Unterkiefer constatiren. In dem schmierigen Belege der Ulcerationen finden sich neben Blut- und Eiterkörperchen, amorphen Massen eine Unzahl von Pilzen, besonders Leptothrix buccalis, Spirochaeten und Monas Lens. Den höchsten Grad erreichen die Beschwerden, wenn das Kieferperiost befallen wird oder Gangrän auftritt. Das Allgemeinbefinden ist in der Regel wenig gestört, Fieber fehlt oder ist gering, der Appetit oft nur verringert, der Schmerz meist sehr hochgradig, der Geruch aus dem Munde pestartig. Es kommen jedoch auch sporadische und rudimentäre Formen der Stomacace vor. Das Zahnfleisch röthet sich, die Papillen zwischen den Zähnen schwellen an, werden blauroth, allmälig hebt sich das Zahnfleisch von den Zähnen ab, es tritt eitriger Beleg und oberflächlicher Zerfall ein; ähnliche Vorgänge spielen sich auch auf der übrigen Mundschleimhaut ab, um nach 8—10 Tagen zu heilen.

Die Prognose der Stomacace ist im Allgemeinen günstig, besonders wenn die Kranken frühzeitig genug in Behandlung kommen. Die Geschwüre heilen meist ohne Narben, doch bleiben solche mit Functionsbehinderung zurück bei sehr tiefen oder gangränösen Substanzverlusten. In seltenen Fällen kommt es zu Kiefernekrose.

Die Diagnose stützt sich auf die Symptome, die Aetiologie und das öftere endemische Auftreten der Krankheit, doch ist es beim Beginne machmal recht schwer, die idiopathische Stomacace vom Mercurialismus oder Scorbut zu unterscheiden. Bei letzterem ist in der Regel das Zahnfleisch viel intensiver geschwellt, von blaurother livider Farbe, über die Zähne emporwuchernd; auch fehlt der gelbe Saum.

In der Therapie der Stomacace spielt das Kali chloricum die erste Rolle. Der äusseren Anwendung als Mundwasser steht nur oft die übergrosse Empfindlichkeit der Mundhöhle, sowie das kindliche Alter der Patienten entgegen; innerlich gibt man einem vierjährigen Kinde davon in Wasser oder Chinadecoct pro die 2·0, einem Erwachsenen 5·0. Nach Vogel verschwindet der Fötor schon nach 12 Stunden, das Zahnfleisch blutet nicht mehr, kurz überall macht sich Besserung bemerkbar. Nach Bohn heilen manche Fälle nur durch Extraction der Zähne im Bereiche des erkrankten Zahnfleisches.

Bei den meist anämischen und heruntergekommenen Patienten muss der Ernährung, sowie der Verbringung in frische Luft eine ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden; hat man die Kranken über das schlimmste Stadium mit flüssiger Nahrung hinweggebracht, dann empfehlen sich breiige und allmälig erst feste Substanzen, starke Weine, Bier, Eisen, China. Stets aber muss, so lange noch Spuren von Ulcerationen vorhanden sind, die Mund-

höhle nach jeder Nahrungsaufnahme gereinigt und mit desinficirenden aromatischen Wässern ausgespült, bei Kindern ausgewischt werden. Dazu eignen sich besonders Tinct. Myrrhae, Tinct. Benzoes, Tinct. Ratanh., Tinct. Cochleariae, Tinct. Catechu; Ol. Terebinth. mit Chloroform und Tinct. opii āā als Bepinselung, ferner das Jodoform, Salol oder Jodol.

Nach Betrachtung der specifischen Mundentzündungen wenden wir uns zu den einzelnen mehr circumscripten Geschwürsformen, von denen jene, welche mechanischen, chemischen oder thermischen Reizen ihre Entstehung verdanken, die sogenannten traumatischen Geschwüre, wegen ihres alltäglichen Vorkommens zuerst berücksichtigt werden sollen.

Am bekanntesten sind die Ulcerationen an den Rändern und der Spitze der Zunge, den Lippen und Wangen in Folge von Biss, scharfen Zahnrändern und spitzigen Wurzelresten. Die durch schlechte Zähne hervorgerufenen und unterhaltenen Zungengeschwüre sind nicht selten indurirt und einem Krebsgeschwür ähnlich. An sie schliessen sich die Geschwüre des Zahnfleisches, entstanden durch den Reiz des Zahnsteines. Hieher gehören ferner auch die Geschwüre, die auf eingedrungene Fremdkörper oder den unvorsichtigen Genuss starker Säuren und Alkalien oder siedenden Wassers zurückzuführen sind; ferner das sogenannte Keuchhusten- und Dentitionsgeschwür der Kinder.

Das erstere verdankt den Frictionen der während der Hustenanfälle hervorgestreekten Zunge an den Kanten der Zähne seine Entstehung und sitzt gewöhnlich an dem Zungenbändchen oder neben demselben, seltener an der Spitze oder der oberen Fläche der Zunge. Das Dentitionsgeschwür ist verursacht durch das Hervorbrechen der unteren Schneidezähne, es erscheint meistens im Verlaufe des ersten Lebensjahres und sitzt constant an der unteren Fläche der Zungenspitze oder an der Insertion des Frenulum linguae; seine Ränder sind meist etwas infiltrirt, der Grund speckig, bei Berührung sehr schmerzhaft, zuweilen wird das Frenulum ganz zerstört. Während es bei wohlgenährten Kindern meist schon nach einigen Tagen heilt, ist es bei schlechtgenährten oder an Verdauungsstörung leidenden sehr hartnäckig.

Schliesslich sei noch erwähnt, dass bei der laryngoskopischen Untersuchung gar nicht selten durch ungestümes Hervorziehen und Aufpressen der Zunge auf die Zähne Einrisse und Ulcerationen am Frenulum linguae erzeugt werden. Ob die bei Trigeminuslähmung entstehenden Geschwüre am Zahnfleisch, den Lippen und Wangen traumatischer oder trophoneurotischer Natur sind, ist noch nicht endgiltig entschieden.

Die Beschwerden, welche derartige Geschwüre verursachen, beschränken sich in der Regel auf Schmerzhaftigkeit und Empfindlichkeit beim Essen und Sprechen. Dass Kinder in der Ernährung sehr leiden, bedarf keiner weiteren Erklärung. In selteneren Fällen

gesellen sich dazu mehr oder weniger ausgesprochene Salivation und Blutungen, die jedoch fast niemals bedenklicher Natur sind; endlich darf man nicht vergessen, dass solche Geschwüre krebsig werden können.

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache; so müssen z. B. scharfe Zähne abgefeilt oder extrahirt, Fremdkörper und Zahnstein entfernt werden. Local empfehlen sich die bei Stomatitis catarrhalis angeführten Mittel, eventuell Touchirung mit Lapis. Da das Dentitions- und Keuchhustengeschwür oft nur nach Verbesserung der Nutrition und Constitution heilt, so müssen diese wie allenfalls bestehende Verdauungsstörungen sorgfältigst behandet werden.

Eine andere Art von Geschwüren, welche früher mit Aphthen identificirt wurden, sind die Follicularverschwärungen am harten Gaumen der Neugeborenen, auch Bednar'sche Aphthen genannt.

Nach Bohn finden sich auf der gelblichen injicirten Schleimhaut des Gaumengewölbes in und neben der Raphe, sowie den neben den oberen Alveolarfortsätzen gelegenen Theilen des harten Gaumens hirsekorn- bis stecknadelkopfgrosse Knötchen von weisser, milchiger Farbe und rundlicher Gestalt, die bald wenig, bald stark über die Schleimhaut hervorragen und als verstopfte Schleimhautfollikel oder Epidermioidcysten von Epstein als Epithelperlen bezeichnet werden. Nach Epstein entstehen dieselben aus einer ungleichmässigen und stellenweise unterbrochenen Vereinigung der Gaumenplatten, zwischen welchen kleine Hohlräume übrig bleiben, die durch fortgesetzte Zellenproliferation der Wände sich zu geschichteten Epithelkugeln entwickeln. Ein Theil dieser Knötchen bleibt wochen-, selbst monatelang unverändert, ein anderer Theil zerfällt eitrig und bildet plattenförmige Ulcerationen, welche durch die Raphe in zwei Hälften getheilt und von gewulsteter bläulicher Schleimhaut wallartig umschlossen werden. Die seitlich sitzenden Geschwüre an den hinteren Winkeln des harten Gaumens — die Plaques pterygoidiennes — entstehen nach Baumm durch Läsion der über die Hamuli pterygoid. straff gespannten Schleimhaut beim Reinigen der Mundhöhle; sie sind von Linsengrösse, scheibenförmig oder oval; manche von ihnen sind scharf abgegrenzt, wie mit einem Locheisen herausgeschlagen. Diese Geschwüre confluiren, können bei kachektischen Kindern die ganze Schleimhaut durchsetzen und sogar den Knochen blosslegen. Henoch leugnet ihre Entstehung aus den obenerwähnten Epithelperlen. Eugen Fränkel erklärt sie für mykotische Epithelnekrosen, bedingt durch Invasion von Bacterien in das Deckepithel des Gaumens über den Proc. pterygoid. Hand in Hand geht damit eine Lockerung und allmälige Abstossung des nekrotischen Epithelüberzugs bis zum Zustandekommen einer echten Ulceration; in diesem Stadium kann durch Einwanderung anderer Mikroorganismen Allgemeininfection zu Stande kommen.

Die durch diese Ulcerationen erzeugten Beschwerden entgehen, da sie nur bei Säuglingen vorkommen, in der Regel der

Beobachtung; ab und zu werden die Angehörigen oder der Arzt durch Schreien und erschwertes Saugen auf sie aufmerksam gemacht. Nach Bohn etablirt sich Soor, Diphtherie und Gangrän gern auf diesen Geschwürchen.

Die Diagnose stützt sich auf den stereotypen Sitz, das Aussehen und die Flüchtigkeit der Erkrankung. Verwechslungen mit syphilitischen Geschwüren sind bei einiger Aufmerksamkeit zu vermeiden.

Eine Behandlung ist bei der spontanen Rückbildung des Leidens meist nicht nöthig, im Uebrigen kann man dasselbe durch Pinselungen mit Zinc. sulf. 1:10 oder Arg. nitr. 1:15 rasch heilen.

Relativ noch wenig bekannt und deshalb mit anderen Processen verwechselt sind die idiopathischen Schleimhautgeschwüre der Zunge.

Man versteht darunter oberflächliche Substanzverluste oder Excoriationen, die auf kein dyskrasisches Leiden, namentlich nicht auf Syphilis, zurückgeführt werden können. Aeusserst zahlreich sind die Namen, welche man für die in Rede stehende Affection vorgeschlagen hat. Während die Einen nach dem Vorgange von Caspary dieselben als flüchtige, gutartige Plaques bezeichnen, nennen die Anderen mit Unna dieselben kreisfleckige Exfoliation der Zunge oder wandernden Ring, ringförmige Exfoliation oder Landkartenzunge, Andere wiederum oberflächliche Excoriationen oder Epithelabschilferungen. Dieselben als idiopathische Schleimhautplaques zu bezeichnen, erscheint mit Rücksicht auf ein gleichfalls so benanntes schon beschriebenes anderes Leiden, die Leukoplakie, nicht empfehlenswerth.

Die gutartigen oberflächlichen, in Form rundlicher Flecken oder länglich gewundener Streifen oder sich durchschneidender Ringe auftretenden Excoriationen sitzen auf dem Rücken und den Rändern der Zunge, und zwar häufiger auf dem vorderen Theile nahe der Spitze. Sie haben einen rothen, körnigen Grund und einen weissen, gold- oder schwefelgelben oder lehmfarbigen, schmalen, etwas erhabenen und scharf abgeschnittenen Rand; die Ränder der Zunge sind zuweilen facettirt, die Papillae filiformes verloren gegangen, die Papillae fungiformes geschwellt und geröthet oder ihres Epithels beraubt; der gelbe Rand besteht aus Epithelien und Pilzmasse, sowie Papillenkuppen.

Die subjectiven Beschwerden können völlig fehlen, so dass das Leiden zufällig entdeckt wird; nicht selten jedoch besteht Empfindlichkeit und geringe Schmerzhaftigkeit beim Genusse zu hoch oder zu niedrig temperirter oder gewürzter oder scharfer Speisen, sowie beim Rauchen. Jucken und Salivation, sowie heftiger in Paroxysmen auftretender Schmerz kommt fast nur bei sehr ausgebreiteten Epithelverlusten oder bei gleichzeitiger Mitbetheiligung des Nervensystems vor; man bezeichnet die mit materiellen Veränderungen an der Zunge einhergehenden Schmerzen auch als Glossodynia exfoliativa (Kaposi) im Gegensatz zu jener Form, bei welcher sich keine objectiven Veränderungen auffinden lassen (Glossodynia nervosa). Durch beständige Reizung der epithelberaubten Stellen durch die Zähne oder durch

Rauchen kann es, wie Verf. gesehen, zu Schwellung der benachbarten Lymphdrüsen kommen; bei Kindern gibt die Affection nicht selten zu Ernährungsstörungen Anlass. Zuweilen geht dem Eintritt der Menses eine Exacerbation des Uebels voraus, mit dem Erscheinen desselben lässt es wieder nach. Nach Schwimmer scheinen die gutartigen Exfoliationen manchmal dem Ausbruche der Leukoplakie vorauszugehen. Im Bereiche der ergriffenen Theile ist weder der Geschmack noch der Tastsinn in irgend einer Weise verändert.

Während Unna die idiopathischen Zungenerosionen für eine höchst chronisch verlaufende, mit acuten Nachschüben einhergehende, fast schmerzlose Epithelerkrankung hält und glaubt, dass dieselbe durch nervöse Reize unterhalten werde, halten Andere die Affection für eine subacute Entzündung der Schleimhaut resp. der Papillen. Die deutschen Forscher stellen mit Bestimmtheit jeden Zusammenhang mit Syphilis in Abrede, welcher Ansicht sich auch Verf. anschliesst, Parrot hingegen bringt die Affection mit Syphilis in Verbindung. Eine unstreitige Disposition zur Landkartenzunge gibt die Anämie, ferner Dyspepsie, Magenkatarrh und ganz besonders die Dentition, weshalb $^1/_2$—3jährige Kinder oft ergriffen werden. Auch die Heredität scheint eine Rolle zu spielen.

Nach Gautier können alle Veranlassungen, welche den Organismus herunterbringen, Gelegenheit zu der Entwicklung des Uebels geben, so besonders Excesse, hochgradige Ermüdung, gastrische Beschwerden und Helminthiasis. Die Syphilis wirkt nach Gautier nicht direct auf die Entstehung der Krankheit hin, sondern nur im Allgemeinen durch Schwächung des Organismus.

Die Diagnose stützt sich hauptsächlich auf die Flüchtigkeit, Oberflächlichkeit, sowie den chronischen und höchst wechselnden Verlauf der Erkrankung. Die aphthösen und herpetischen Geschwüre zeigen tiefere Substanzverluste und im Allgemeinen auch eine viel grössere Schmerzhaftigkeit und befallen noch andere Theile der Mundschleimhaut, so besonders Lippen, Gaumen, und verlaufen acut. Am häufigsten finden Verwechslungen mit syphilitischen Plaques statt. Während die syphilitischen Plaques ein milchweisses, bläuliches Aussehen haben, stets mit einer Infiltration der Basis einhergehen und niemals so schnell ihr Aussehen und ihren Standort wechseln, ferner auch an anderen Stellen der Mundhöhle, so besonders an den Lippen, Wangen, am Zahnfleisch und im Rachen vorkommen, charakterisiren sich die gutartigen Exfoliationen durch gelbliche Farbe der Ränder und Röthe des Grundes, durch den Mangel eines Infiltrates, durch ausserordentliche Flüchtigkeit hinsichtlich der Form, Grösse und des Standortes und durch Beschränktsein auf die Zunge.

Die Prognose der idiopathischen Zungenplaques ist insoferne günstig, als die Affection keine Neigung hat, einen bösartigen Charakter anzunehmen, ungünstig aber wegen der Hartnäckigkeit und des chronischen Verlaufes.

Hinsichtlich der Therapie gehen die Ansichten sehr auseinander. Während die Einen die vollständige Nutzlosigkeit jeglicher

localen Behandlung betonen, will Unna recht befriedigende Erfolge haben durch Mundwässer aus Flor. sulf. 10·0, Mixt. gummos. oder Emuls. amygd. 200·0 oder aus Natr. subsulf. Glycerin āā 10·0, Aq. dest. 200·0. Am wirksamsten zeigte sich ihm aber folgende Mischung:

Rp. Aq. subsulfur. Aq. menth. pip. āā 100·0, Flor. sulf., Syr. simpl. āā 20·0, Gummi Tragac. 2·0. D. S. Mundwasser, gut umzuschütteln. Nach vorheriger Reinigung der Mundhöhle mit lauem oder kühlem Wasser wird ein Schluck dieser Mischung 5 Minuten lang im Munde behalten und nach allen Richtungen getrieben. In der Regel genügt eine dreimalige tägliche Spülung. Bei kleinen Kindern wird man sich mit Betupfen der Zunge mit Borax, Tannin begnügen müssen. Seifert empfiehlt als bestes Mittel Aetzungen mit Chromsäurelösung. Ausser der localen muss auch noch eine Allgemeinbehandlung platzgreifen bei Anomalien der Blutmischung, Affectionen des Magens und des Nervensystems oder der weiblichen Genitalien. Bei sehr heftigem Schmerz empfiehlt sich das Cocaïn, auch konnte Kaposi in einzelnen Fällen durch Bepinselungen mit Lapislösung Erfolge erzielen.

Die grösste Aehnlichkeit mit den idiopathischen Zungenplaques besitzt eine Affection, die neuerdings von Michelson beschrieben und, zur Erinnerung an den ersten Beschreiber Moeller, Glossitis superficialis Moellers bezeichnet wurde.

Man versteht darunter chronische Excoriationen der Zunge in Form von unregelmässigen, meist scharf umschriebenen hochrothen Flecken, auf welchen das Epithel abgestossen oder verdünnt, die Papillen hyperämisch und geschwellt und über das Niveau der übrigen Schleimhaut erhaben erscheinen. Secret fehlt, niemals entwickelt sich eine tiefere Verschwärung; die Affection zeigt wenig Neigung, sich in die Fläche auszubreiten, dagegen dauert die einmal erlangte Form hartnäckig fort. Mit Vorliebe sitzen die Flecken auf den Rändern und der Spitze der Zunge, zuweilen auch auf der unteren Zungenfläche und der Innenseite der Lippen. Zum Unterschied von der Lingua geographica erzeugen diese Excoriationen sehr heftigen Schmerz bei der Nahrungsaufnahme, so dass die Esslust verringert und der Geschmack völlig übertäubt wird; auch die articulatorischen Bewegungen der Zunge sind bisweilen schmerzhaft. Bei Landkartenzunge ändern die Flecken rasch ihren Sitz und ihre Grösse, bei Moeller's Stomatitis bleiben sie; während die erstere meist bei Kindern auftritt, kommt die letztere ausschliesslich bei Erwachsenen vor; bei Landkartenzunge sind die Flecken gewunden, geschlängelt, in concentrischen Kreisen gestellt, die Ränder mit weissen oder lehmgelben Tüpfeln besetzt, bei Moeller's Glossitis sind die Flecken gleichmässig roth; in ihrer Mitte kann eine ohne Hinterlassung von Folgen schnell wieder verschwindende Eruption discreter weisslicher opaker Knötchen von Stecknadelkopfgrösse stattfinden.

Die Affection kommt hauptsächlich bei schwächlichen Personen vor und scheint mit Parasiten des Darmes, namentlich mit Bandwurm, in gewissem Connex zu stehen. Anatomisch besteht die Veränderung in einem im subepithelialen Bindegewebe sich abspielenden,

mit Verdünnung und stellenweisem Verluste des Epithels einhergehenden Entzündungsprocesse.

Die Therapie besteht in der Anwendung desinficirender Mundwässer oder Heidelbeerdecoct (Preuss), in Bepinselungen mit Lapislösung, Tannin oder Alumin. acetico. tart., Chromsäure; gegen die Schmerzen: Cocaïncinpinselungen unmittelbar vor dem Essen. Schwächezustände, Anämie, Dyspepsie, Parasiten des Darmes etc. müssen beseitigt werden.

Stomatitis diphtheritica.

Die Diphtherie der Mundhöhle ist in der Regel eine secundäre Krankheit, d. h. vom Rachen fortgeleitet, und befällt so am häufigsten den harten Gaumen, die hinteren und seitlichen Theile der Zunge, die Schleimhaut des Mundbodens, der Wangen und des Zahnfleisches in der Umgebung der hinteren Backzähne. Im Verlaufe des Scharlachs kommt es an den Mundwinkeln, den Lippen und der Zunge zu grauweissen Plaques, die von den Meisten für diphtheritische gehalten, von Henoch jedoch für Producte einer nekrotisirenden Entzündung erklärt werden.

Primär etablirt sich die Diphtherie noch am ehesten auf schon länger bestehenden Schleimhautrissen und Geschwüren oder auf Wunden in Folge chirurgischer Eingriffe; sehr selten wird die völlig intacte Schleimhaut primär ergriffen. Verf. beobachtete nur zwei derartige Fälle, den einen bei einem Oekonomiearbeiter, der unter gangränös-septischen Erscheinungen zu Grunde ging, den anderen bei einem Herrn durch Infection mit einem Zahnschlüssel, welcher kurz zuvor bei einem Diphteriekranken in Anwendung gekommen und mangelhaft gereinigt worden war.

Die Beschwerden bestehen ausser in gastrischen und Allgemeinerscheinungen sowie Fieber, das aber ebenso wie bei Rachendiphtherie sehr unbedeutend sein oder auch ganz fehlen kann, in Schmerzen beim Oeffnen des Mundes, beim Kauen und Sprechen, in übler Exhalation, Blutungen, die zuweilen eine lebensgefährliche Heftigkeit und Dauer annehmen. Die Pseudomembranen können in der Mundhöhle dieselbe Mächtigkeit wie im Rachen erreichen, aber auch dünne, schmierige Belege vorstellen, nach deren Abstossung die Schleimhaut des Epithels beraubt, ecchymosirt und ulcerirt erscheint.

Der Verlauf ist ähnlich wie im Rachen; die Krankheit kann sich localisiren, aber ebensogut auch auf Rachen, Nase und Kehlkopf fortpflanzen und zu Allgemeininfection Anlass geben.

Die Prognose richtet sich nach der Intensität und dem Charakter der Erkrankung, dem Allgemeinbefinden des Kranken und allenfallsigen Complicationen mit Scharlach, Typhus, Cholera etc.

Die Therapie ist dieselbe wie bei der später zu besprechenden Rachendiphtherie.

Stomatitis gangraenosa.

Wenn die Gangrän der Mundhöhle gleichfalls unter den entzündlichen Processen eine Stelle findet, so hat dies insoferne Berechtigung, als derselben immer entzündliche Erscheinungen vorausgehen und die Gangrän nur einen der mannigfachen Ausgänge der Entzündung vorstellt.

Unter den veranlassenden resp. disponirenden Ursachen spielen Anomalien der Blutmischung, schlechte Ernährung, Scrophulose, Masern, Scorbut, sowie schwere Infectionskrankheiten, besonders Typhus, Diphtherie, Malaria, Keuchhusten, Scharlach, ferner parenchymatöse Exsudationen und Eiterinfiltrate die Hauptrolle.

Je hochgradiger die durch die Entzündung gesetzten Circulationsstörungen durch Embolie und Thrombose sind, je massenhafter die Exsudation von Blut- und Eiterzellen oder Faserstoff stattgefunden hat, desto grösser ist die Gefahr des gangränösen Zerfalles. In der Mundhöhle geht dieselbe theils von der Schleimhaut aus, theils von den tieferliegenden Theilen und tritt bald circumscript, bald diffus auf.

Wenn sich auch unter besonders ungünstigen Umständen zu jeder der im vorvorigen Capitel geschilderten Geschwürsformen Gangrän gesellen kann, so gehört ein solcher Ausgang doch immerhin zu den Seltenheiten. Noch am ehesten ist dies der Fall bei der diffusen phlegmonösen, der diphtheritischen, mercuriellen und scorbutischen Stomatitis, sowie der idiopathischen Stomacace.

Mit besonderer Vorliebe entwickelt sich die Gangrän meist selbstständig ohne vorausgegangene Mundaffection an der Wange. Man hat diese Form des Brandes als Noma oder Wasserkrebs bezeichnet und als selbstständige Krankheit beschrieben. Hiefür ist aber, wie Bamberger und andere Autoren mit Recht geltend machen, durchaus kein Grund vorhanden, zumal sich die Noma nur durch ihren Sitz, keineswegs aber durch ihr Wesen von den anderen Arten der Gangrän unterscheidet. Die feuchte Form des Brandes ist in der Mundhöhle die häufigere, doch kommt auch die trockene zur Beobachtung.

In dem Gewebe, welches die nekrotischen Stellen begrenzt, zeigen sich nach H. Ranke eigenthümliche, zuweilen an Karyokinese erinnernde Degenerationsvorgänge an den Kernen. Diese Kernveränderungen scheinen der Nekrose überhaupt eigenthümlich zu sein, denn sie wurden auch bei Diphtherie gefunden. In dem den nomatösen Brand umgebenden, infiltrirten und bereits der Nekrose verfallenen Gewebe finden sich massenhaft Kokken. An der Peripherie der nekrotischen, mit Kokken erfüllten Zone ist das Bindegewebe in lebhafter Kernvermehrung begriffen und erinnert das Bild sehr an die von R. Koch beschriebene, durch einen Kettencoccus hervorgerufene progressive Gewebsnekrose der Feldmäuse. Bis jetzt ist jedoch die specifische Natur der bei Noma beobachteten Kokken noch nicht erwiesen.

Als ätiologische Momente der Noma kommen insbesondere acute Exantheme, namentlich Masern, Scharlach und andere schwere Infectionskrankheiten, mangelhafte Ernährung, Wohnen in dumpfen, feuchten, überfüllten Räumen in Betracht. Doch darf man wie Vogel hervorhebt, diesen letztgenannten Schädlichkeiten schon deshalb keine allzu grosse Bedeutung beimessen, weil die Krankheit unter dem massenhaften Proletariat der grossen Städte weit häufiger sein müsste. Sicher ist, dass Noma in niedrig gelegenen Orten, in Küstenstrichen und Malariagegenden, so besonders in Holland, häufiger vorkommt als in höher gelegenen, dass die Jahreszeit ziemlich indifferent ist, dass von Geburt aus schwächliche oder durch acute Infectionskrankheiten, so besonders Typhus und Masern, Dysenterie oder chronische Darmkatarrhe geschwächte Kinder, besonders weiblichen Geschlechtes, vom 3. bis 7. Lebensjahre am häufigsten befallen werden, dass aber auch gesunde Erwachsene von der Krankheit ergriffen werden können. Nicht zu leugnen ist endlich, dass durch unvorsichtige Behandlung schwächlicher Kinder oder decrepider älterer Personen mit Quecksilberpräparaten während des Verlaufes acuter Infectionskrankheiten oder anderer schwerer Erkrankungen durch das Mittelglied der mercuriellen Stomatitis der Ausbruch der Noma begünstigt werden kann.

Wenn nun auch unzweifelhaft feststeht, dass nomatöse Brandformen bei besonders stark disponirten Individuen spontan, d. h. ohne Zusammenhang mit anderen Nomafällen, entstehen, so legt doch das nicht selten beobachtete gehäufte Auftreten von Nomafällen in Anstalten, sowie die vorwiegende Localisation der Noma auf der Schleimhaut der verschiedenen Körperöffnungen nach H. Ranke den Gedanken nahe, dass es sich bei Noma um das Eindringen mikroparasitärer Keime handle. Inwieferne endlich Anomalien der Gefässe, Thrombosen und Embolien, an der Entstehung der Noma Antheil haben, ist noch unbekannt; sicher aber ist, dass die Krankheit nicht contagiös ist.

Die Noma schliesst sich entweder an schon bestehende locale Erkrankungen, so z. B. an die Stomatitis ulcerosa des Zahnfleisches oder der Wange an, oder sie beginnt scheinbar primär als circumscripte, harte, kirschkern- bis haselnussgrosse Infiltration der Innenfläche einer, meist der linken Wange neben dem Mundwinkel, theils als blassrothes, mit trübem, braunem oder missfarbigem Inhalt gefülltes Bläschen. Zuweilen ist nicht zu entscheiden, welche dieser Veränderungen zuerst vorhanden war, zumal die Kranken meist erst im Stadium der Ulceration in Behandlung kommen. Man findet dann ein oberflächliches Geschwür mit missfarbigem Grunde auf harter, infiltrirter Basis, die auch von der Aussenfläche der Wange her fühlbar und auf Druck empfindlich ist. Die Zerstörung in der Mundhöhle schreitet täglich, ja stündlich weiter, so dass schon nach wenigen Tagen die Innenfläche der Wange, des Zahnfleisches und die Hälfte einer Lippe in eine fötide, schwarze oder schwarzbraune Masse umgewandelt ist. Gleichzeitig oder später schwillt die Haut der Wange und das untere Augenlid ödematös an, ihre Oberfläche zeigt einen fettigen, ölartigen Glanz und eine bläuliche marmorirte Färbung, die

Lymphdrüsen intumesciren, die Wange erscheint gedunsen und heiss, in der Mitte bildet sich ein bläulicher, livider, von einem dunklen Entzündungshofe umgebener Fleck, welcher in kurzer Zeit zu einem bräunlichen Schorfe vertrocknet und nach dessen Abstossung ein tiefes gangränöses Geschwür sichtbar wird. Ist die Wange durch fortschreitende Zerstörung von innen und aussen einmal durchbrochen, dann verbreitet sich die Gangrän nach allen Richtungen hin unaufhaltsam auf Lippen und Zunge, Nasenflügel, Augenlid bis zum Ohr, der Stirne und den Schläfen, nach abwärts bis zu den Schlüsselbeinen der befallenen Seite. Die Kiefer, die Knorpel und Knochen der Nase, Theile des Wangenbeines werden nekrotisch, die Zähne fallen aus, die ganze Wange wird abgestossen und so das Aussehen der Kranken in furchtbarster Weise bis zur Unkenntlichkeit verändert.

Zuweilen complicirt sich die Noma der Wangen mit Noma der äusseren Geschlechtstheile oder der Analöffnung, ja sogar, wie H. Ranke beobachtete, mit inselförmiger Gangrän der Haut. In dem betreffenden Falle begann die Affection unmittelbar nach Ausbruch des Masernexanthems in Form kleinerer und grösserer blasiger Erhebungen der Epidermis; der Inhalt dieser Blasen war anfangs milchig, dann eitrig, zuletzt bildete sich ein schwarzer Schorf mit brandiger Zerstörung der befallenen Partien.

Unter den subjectiven Erscheinungen der Noma ist im späteren Verlaufe die Apathie und tiefe Depression am auffallendsten, die Schmerzen sind oft gering, das Fieber fehlt im Anfange oder ist unbedeutend, der Puls beschleunigt, klein, Appetit anfangs oft normal, später verringert, Durst vermehrt, die Haut kühl, manchmal heiss. Die Secretion der Mundhöhle wird mit dem Fortschreiten des Processes immer profuser, blut- und jauchereicher, der Geruch von Tag zu Tag unerträglicher. Oedem der unteren Extremitäten, lobuläre Pneumonie, Lungengangrän oder profuse Diarrhoen beschleunigen den Kräfteverfall, so dass der tödtliche Ausgang schon nach einigen Tagen eintreten kann, bevor noch die örtlichen Erscheinungen eine besondere Höhe erreicht haben. In der Regel aber erfolgt der Tod 4—8 Tage nach der Perforation der Wange.

Die Symptome der übrigen Formen der Mundgangrän richten sich nach der Grundkrankheit, aus welcher sich dieselbe entwickelt. Der Zeitpunkt der Entwicklung der Gangrän ist höchst verschieden und hängt ab von dem Charakter und der Intensität der Entzündung. Die Schmerzen, die anfangs ausserordentlich heftig waren, können zwar nach dem Eintritte des Brandes noch fortdauern, werden aber meist gering oder können ganz schwinden. Die Speichelsecretion ist vermehrt, der Athem aashaft, manchmal treten durch Arrosion der meist thrombosirenden Gefässe profuse Blutungen ein. Die anfangs febrilen Erscheinungen machen später einer gewissen Gleichgiltigkeit und Depression Platz, die vorher heisse Haut wird kühl, die Züge verfallen, es treten Schüttelfröste auf und die Kranken gehen durch metastatische Entzündungen anderer Organe pyämisch oder septikämisch zu Grunde.

Die Prognose der Mundgangrän ist bei allen Formen eine höchst dubiöse; wenn auch bei sehr circumscriptem Auftreten und schneller energischer Behandlung noch die meisten Aussichten auf Heilung bestehen, so kann doch der Process plötzlich einen bösartigen Charakter annehmen. Sehr schlecht ist die Prognose bei allen diffusen Zerstörungen und der eigentlichen Noma, zumal wenn die äusseren Verhältnisse ungünstig oder schon Complicationen in anderen Organen eingetreten sind. Neigt sich der Process zur Heilung, so gibt sich dies durch einen Stillstand der Zerstörung kund; in der Umgebung des Brandschorfes entwickelt sich demarkirende Entzündung mit eitriger Secretion, durch welche die nekrotischen Schleimhautpartien als schwarze, stinkende Schorfe oder zunderartige, schwammige Massen abgestossen werden, während auf dem Grunde des Geschwüres gutartige Eiterung und Granulation eintritt. Stets geschieht die Heilung mit Narbenbildung; je hochgradiger die Zerstörung war, desto schwerer sind auch die zurückbleibenden Functionsstörungen, unter denen Difformitäten des Gesichtes, Verwachsungen der Schleimhäute, Verengerung der Mundspalte und der Nasenöffnungen, Ektropien der Augenlider und narbige Kieferklemme besonders erwähnenswerth scheinen. Nach Bohn kann eine in Heilung begriffene oder schon geheilte Noma recidiviren, in welch' letzterem Falle auch das feste Narbengewebe der Zerstörung anheimfällt.

Da man in der Regel nicht im Stande ist, die Ursachen, welche die Stomatitis gangraenosa hervorrufen oder begünstigen, zu entfernen, so muss die Behandlung auf möglichste Erhaltung der Kräfte, sorgfältige Reinigung und Ventilation gerichtet sein. Haben sich Schorfe gebildet, so müssen dieselben mittelst Scheere oder Messer abgetragen und der Versuch gemacht werden, dem Weiterschreiten des Processes Einhalt zu thun. Man bedient sich zu diesem Zwecke der Mineralsäuren, des Eisenchlorids, des Chlorzinks, des scharfen Löffels, des Thermocautère oder des Höllensteinstiftes, welcher etwas zugespitzt und tief in die gangränösen Stellen eingebohrt wird, bis man auf resistentes Gewebe stösst. Zur Reinigung und Desodorificirung bedient man sich des Jodols, Jodoforms, Carbolsäure, Sublimats, Wasserstoffsuperoxyds, Creosots, Salols, Thymols etc. Sehr günstige Resultate rühmt man dem absoluten Alkohol nach, der nach Entfernung der gangränösen Theile mit dem scharfen Löffel auf die betreffenden Stellen eingepinselt und mittelst Verbandgaze, die damit imprägnirt ist, einige Stunden auf derselben belassen wird. Zur Beförderung der Granulationen empfiehlt sich die Application von Tinct. Myrrhae, von Tinct. Benzoes, Bals. Peruv., Ol. Terebinth. oder Vinum camphorat.

Hinsichtlich der Ernährung und Kräftigung der Kranken stösst man leider in der Regel auf die grössten Hindernisse. Bei dem Widerwillen gegen Speisen und Medicamente und dem beständigen Abfliessen des allenfalls mühsam Beigebrachten durch die Perforationsöffnung kann der Erfolg kein nennenswerther sein. Auch die Ernährung mittelst Schlundrohr oder Clysma ist oft schwer durchzuführen oder unge-

nügend. Immerhin sind Chinadecocte, Kampheremulsionen innerlich oder Klystiere von Chinin oder Chloral, subcutane Morphiuminjectionen zur Erleichterung des trostlosen Zustandes angezeigt. Der sofortigen Versetzung der Kranken in reine, gute Landluft, welche nach Bohn die mächtigste Heilpotenz bildet, stehen leider nur zu oft sociale und andere Gründe entgegen.

Syphilis.

Die Mundhöhle wird von der Syphilis in ganz besonderer Weise bevorzugt.

Primäraffectionen, weiche und harte Schanker und nicht ulcerirte Sclerosen, Papeln an den Lippen, der Spitze der Zunge, den Wangen in Folge von unreinen Küssen und Berührungen oder des Gebrauches inficirter Gegenstände, so namentlich von Cigarrenspitzen oder Tabakspfeifen, Glasbläserröhren, Gläsern, Löffeln, Trompeten etc., sind durchaus nicht so selten, als man gewöhnlich glaubt. Die Schwellung der Sublingualis, Submaxillaris und der am Mundboden und den oberen Halspartien liegenden Lymphdrüsen ist stets eine sehr ausgesprochene, zuweilen kommt es sogar zur Abscedirung. Die bald nachfolgenden Affectionen der allgemeinen Decke und das Aussehen der ergriffenen Stellen lassen in der Regel keinen Zweifel an der Diagnose aufkommen.

Unendlich häufig sind unter den Secundäraffectionen die syphilitischen Schleimhautpapeln (Plaques opalines). Zuerst zeigen sich auf der Schleimhaut kreisrunde, linsen- bis erbsengrosse, geröthete, etwas erhabene Flecke; später trübt sich das dieselben bedeckende Epithel milchig oder perlmutterartig, ja wird zuweilen sogar blasig emporgehoben; wird dasselbe abgestossen, so erscheint die Unterlage hochroth, wuchern die Papillen oder Schleimhautfollikel auf dem Grunde des Geschwüres weiter, so wird die Oberfläche derselben uneben und mit spitzigen Excrescenzen und moleculärem Detritus bedeckt. Sitzen die Plaques, wie z. B. auf der Lippe, theils auf der Schleimhaut, theils auf der Cutis, so vertrocknet der auf der letzteren sitzende Detritus zu einer schwarzbraunen Borke, während derselbe auf der Schleimhaut die grauweisse Farbe beibehält. An den Mundwinkeln, sowie an den Zungenrändern nehmen in Folge der hier stattfindenden Zerrung, Reibung und Verunreinigung die Papeln gerne die längliche Form an; es entstehen dadurch strichartige und gewundene Zerklüftungen und Schleimhautfissuren, die sogenannten Rhagaden, welche spontan sehr schwer heilen und schon deshalb den Verdacht einer verheimlichten oder nicht beachteten Syphilis erwecken müssen. Als Lieblingssitze der syphilitischen Schleimhautplaques müssen die Lippen, Mundwinkel und die Ränder der Zunge, der Zungengrund, sowie die untere Fläche bezeichnet werden, in zweiter Reihe die Schleimhaut der Wangen, das Zahnfleisch, der harte und weiche

Gaumen. Wie an den Mundwinkeln, so finden sich auch an der Zunge und den Wangen zerklüftete Schleimhautpapeln, namentlich wenn dieselben durch scharfe Zahnkanten und reizende Ingesta gereizt und insultirt werden. Die Zahl der Papeln ist sehr verschieden; bald findet sich nur ein einziges Exemplar, bald mehrere, bald ist die Mundhöhle förmlich damit übersäet. Wenn es auch als Regel anzusehen ist, dass die Papeln zerstreut über der Schleimhaut sitzen und zwischen sich normale Stellen der Schleimhaut übrig lassen, so können doch auch ausnahmsweise grosse Strecken der Schleimhaut im Zusammenhang ergriffen werden. So sah Verf. mehrmals den ganzen harten und weichen Gaumen nebst Tonsillen und Hinterwand des Rachens, ja selbst Epiglottis und Kehlkopfinneres mit einer dicken Masse überzogen, die einer Pseudomembram oder Brandblase täuschend ähnlich sah.

Der Verlauf der syphilitischen Plaques ist ein relativ langsamer und chronischer; sie verschwinden zwar theils spontan, theils durch therapeutische Eingriffe oft sehr schnell, recidiviren aber auch nach kürzerer oder längerer Pause jahrelang immer wieder und gehören so zu den hartnäckigsten Erscheinungen der Lues. Bei confluirenden Papeln beginnt die Heilung in der Regel in der Mitte und schreitet von da gegen die Peripherie fort, indem sich die älteren Epithelschichten durch neue ersetzen; Narben bleiben nie zurück.

Die Beschwerden, welche durch zerfallende syphilitische Plaques erzeugt werden, bestehen in Schmerzen beim Essen, Trinken, Sprechen, Rauchen und Kauen; Rhagaden im Mundwinkel verhindern das stärkere Oeffnen des Mundes; wie bei jeder entzündlichen Reizung der Mundhöhle, ist auch hier die Speichelsecretion öfters vermehrt, fötider Geruch aus dem Munde jedoch nur bei sehr intensiver Erkrankung vorhanden.

In den späteren Stadien der Syphilis sind es knotige und gummöse Neubildungen, welche durch ihren Zerfall sich in Geschwüre umwandeln. Verhältnissmässig selten entwickeln sich Gummata in der Schleimhaut der Wangen und dann noch am ehesten in der Nähe der Mundwinkel oder in den Lippen in Form circumscripter Knoten oder diffuser, harter, mit getrübtem Epithel überzogener Einlagerungen, am seltensten auf dem Zahnfleisch oder dem Boden der Mundhöhle. Auch in den Masseteren, sowie an ihren Ansatzpunkten auf der äusseren Fläche des Unterkiefers hat Verf. schon Gummata gesehen. Am häufigsten ist unstreitig das Syphilom der Zunge, das theils von der Schleimhaut, theils von der Muskelsubstanz, theils vom interstitiellen Bindegewebe ausgeht, Erbsen- bis Wallnussgrösse erreicht und meist im vorderen Theile der Zunge, namentlich an den Rändern und in der Mitte, seinen Sitz hat. Nicht selten finden sich mehrere grössere und kleinere Gummata nebeneinander oder es ist eine Zungenhälfte oder der ganze vordere Theil der Zunge in eine harte, derbe Masse umgewandelt. Die Zungengummata entwickeln sich als derb-elastische circumscripte Knoten, welche bei oberflächlichem Sitze nur die Schleimhaut occupiren oder, unter derselben liegend,

dieselbe mehr oder weniger emporwölben. Sie stellen demnach meist grössere oder kleinere, flache oder höckerige Geschwülste von der Farbe der Zungenschleimhaut und derber Consistenz vor. Zerfällt die Geschwulst von der Oberfläche aus, so entsteht ein verschieden grosses Flächengeschwür mit buchtigen, unterminirten Rändern und speckigem harten Grund. Beginnt der Zerfall in der Tiefe, so zeigen sich an der Oberfläche oft nur schmale Risse und Spalten, welche nach Auseinanderziehen der Ränder eine tiefe Geschwürshöhle zu Tage treten lassen.

Mit besonderer Vorliebe wird auch der harte Gaumen ergriffen. Meist in der Mittellinie, bald vorne, bald weiter hinten, besonders gerne aber an der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen, bilden sich eine oder mehrere circumscripte lividrothe Stellen, welche allmälig die Schleimhaut emporwölben und so knotige Erhabenheiten vorstellen; nach längerem oder kürzerem Bestande, oft schon nach wenigen Tagen, zeigen sich in denselben gelbweisse Streifen und Punkte, welche mit Sicherheit beweisen, dass bereits ein Theil der Geschwulst eitrig geschmolzen ist; nicht selten findet sich bei ulceröser syphilitischer Caries des Nasenbodens die Raphe des harten Gaumens verfärbt, verdickt, leistenförmig hervorgewölbt oder gar schon ulcerirt. Durch den Zerfall solcher syphilitischer Knoten oder durch gummöse Ostitis oder Periostitis entstehen rundliche oder längliche, die ganze Schleimhaut und den Knochen durchsetzende Geschwüre, Perforationen und Communicationen mit der Nasenhöhle, die näselnde Sprache und Regurgitiren der Ingesta zur Folge haben. Der Process kann mit der Perforation des harten und weichen Gaumens ein Ende nehmen, aber auch nach Unterminirung des Septum narium zur Zerstörung der Nasenmuscheln etc. führen.

Die Beschwerden, welche nicht ulcerirte Gummata verursachen, sind im Allgemeinen gering; sitzen sie in der Zunge, so fühlen die Kranken eine gewisse Steifheit oder Schwerbeweglichkeit beim Sprechen und Essen, bei grossen oder zahlreichen Tumoren wird die Sprache undeutlich; sitzen sie im Mundwinkel, dann ist das Oeffnen des Mundes erschwert und mit einem Gefühle von Spannung und Zerrung verbunden. Schmerz tritt meist erst beim Zerfall ein und kann sehr heftig sein, wenn die Geschwüre an den Rändern der Zunge oder an Stellen sitzen, wo sie mechanisch gereizt werden. Bei umfangreicher Zerstörung der Lippen kann die Nahrungsaufnahme erschwert werden und heftige Blutung auftreten. Die unangenehmsten Folgeerscheinungen perforirender Geschwüre des harten und weichen Gaumens sind bereits erwähnt worden.

Die Diagnose der syphilitischen Schleimhautplaques ergibt sich aus dem objectiven Befunde und dem meist gleichzeitigen Vorhandensein anderweitiger Aeusserungen der Syphilis. Am häufigsten finden sich Plaques gleichzeitig mit maculös-papulösem Exanthem, mit Psoriasis palmaris und plantaris mit Condylomen am Anus, Scrotum, Genitalien. Sehr häufig ist auch noch die Infectionsstelle aufzufinden. Am nächsten liegt eine Verwechslung mit Aphthen und

Herpes. Während die letzteren Affectionen aber gleich beim ersten acuten Beginn äusserst schmerzhaft sind, schmerzen die syphilitischen Plaques erst nach längerem Bestande, d. h. nach Abhebung ihrer Epitheldecke Während Herpes stets mit der Bildung von Bläschen beginnt, stellen die syphilitischen Plaques im Anfange linsen- bis erbsengrosse rothe Flecken vor, die erst nach einiger Zeit sich mit einer weissen Epitheldecke bekleiden; während endlich die aphthösen und herpetischen Substanzverluste von der Peripherie zum Centrum heilen, heilen die Papeln meist vom Centrum gegen die Peripherie; während die die syphilitische Papel deckende Hülle dünn und locker ist, stellt die Aphthe eine viel dickere, fibrinöse, derbe und zusammenhängende Masse dar. Verwechslungen mit chronischer Hydrargyrose und Leukoplakie sind bei genauer Beachtung des in den betreffenden Capiteln Gesagten ziemlich leicht zu vermeiden. Die Diagnose der Gummata der Mundhöhle ist manchmal recht schwierig, besonders wenn dieselben, wie so häufig, als einzige Aeusserungen veralteter oder längst geheilt geglaubter Syphilis auftreten. Die sicherste Diagnose gestatten Gummata und die aus ihnen hervorgegangenen Geschwüre des harten Gaumens, die nur noch bei Phosphornekrose, perforirten Empyemen der Kieferhöhle, bösartigen Neubildungen, Carcinom oder Lupus vorkommen; doch herrscht bei letzteren mehr der Charakter der Neubildung vor. Gleichzeitige Narben auf der Haut und im Rachen, Defecte des Kehldeckels, des Septum narium, Substanzverluste der Stirnbeine, Tophi der Schienbeine sprechen mit Sicherheit für Syphilis. Die grösste Schwierigkeit bietet die Differentialdiagnose des Gumma und des Carcinoms der Zunge. Wenn es auch richtig ist, dass der Krebs nicht erst bei seinem Zerfalle, sondern schon im allerersten Beginn mit Schmerzen einhergeht, dass ferner Lymphdrüsenschwellung bei Zungensyphilis seltener und weniger ausgesprochen ist, als bei Krebs, dass ferner das Gumma mehr circumscript, die krebsige Infiltration mehr diffus auftritt, so sind doch alle diese Unterscheidungsmerkmale zu unverlässig; in vielen Fällen kann nur die mikroskopische Untersuchung herausgenommener Gewebstheile oder der therapeutische Versuch entscheiden; es gibt kaum ein Gumma, das durch Jodkali oder Quecksilber nicht schon nach wenigen Wochen gebessert oder geheilt werden könnte, während Carcinom oder Tuberculose durch diese Mittel nicht beeinflusst werden.

Die Prognose der Mundsyphilis ist günstig, wenn auch die Schleimhautpapeln grosse Neigung zu Recidiven haben und manchmal nach Heilung zerfallener Gummata irreparable Störungen, zerrende Narben, Kieferklemme, Verwachsungen und Perforationen mit Alteration der Sprache zurückbleiben.

Bei der Behandlung der Mundsyphilis hat man zuerst zu berücksichtigen, welcher Periode dieselbe angehört. Handelt es sich um Schleimhautplaques, dann ist eine Mercurialcur nöthig, namentlich bei solchen Kranken, welche noch keiner oder keiner gründlichen Cur unterworfen waren, oder bei Recidiven, die schon längere Zeit nicht mehr antisyphilitisch behandelt wurden, oder endlich bei solchen, bei

denen die Mundaffection sehr ausgebreitet und mit anderen Erscheinungen der Lues combinirt ist. Gegen vereinzelte Plaques immer wieder neue Mercurialcuren zu verordnen, ist unnöthig. Bei der ausserordentlichen Infectiosität der zerfallenen Papeln ist die grösste Vorsicht in der Benützung der Ess- und Trinkgeschirre, Tabakspfeifen etc. nöthig, und muss jeder intimere Verkehr zwischen Eheleuten, sowie das Küssen der Kinder und Angehörigen strengstens vermieden werden. Mit syphilitischen Rhagaden behaftete Dienstboten, namentlich Kindermädchen und Köchinnen, sollen auf jeden Fall sofort aus der Familie entfernt und in einem Krankenhause energisch behandelt werden.

Da bei vielen Kranken die Heilung durch Tabakrauchen und Alcoholica verzögert wird, so ist das Verbot derselben unbedingt nöthig. Auf welche Weise das Quecksilber einverleibt wird, richtet sich nach dem speciellen Falle, stets aber dringe man auf peinlichste Pflege der Mundhöhle. Ueberstreichen mit Lapis in Substanz oder Jodglycerinlösnng, Sublimat 0·1 : 10·0 bringt die Plaques meist auch ohne Allgemeinbehandlung zur Heilung. Ausserdem empfehlen sich Mundwässer aus Kali chloricum, Tinct. Ratanh., Acid. tann., Borsäure, Jodkali 5 : 300, Sublimat 0·1 : 500. Für die gummösen Processe ist Jodkali das specifische Heilmittel: man beginne mit einer täglichen Dosis von 1 Gramm, bei Kindern mit $^1/_4$ Gramm, und steige langsam bis zu 2·0 pro die. In seltenen hartnäckigen Fällen wechsle man mit dem Quecksilber oder dem Zittmann'schen Decocte. Local empfiehlt sich die Bepinselung der Geschwüre mit der Mandl'schen Solution (Rp.: Kali jod. 3·0, Jodi puri 0·5, Glycerin 50·0, Acid. carb. 0·5) oder das Bestreuen mit Jodoform. Hypertrophische Geschwürsränder cauterisire man mit Lapis, papillomatöse Excrescenzen trage man ab. Die durch umfangreichere Perforationen des harten Gaumens erzeugte Sprachstörung kann durch passende Obturatoren beseitigt oder wenigstens verbessert werden.

Tuberculose, Lupus, Lepra, Rotz.

Die Tuberculose des Mundes tritt sowohl primär als secundär auf; das primäre Vorkommen ist seltener, aber durch Beobachtungen von Fairlee Clerk, Gleitsmann, Michelson, Schliferowitsch und Anderen sicher constatirt; häufiger ist sie secundär, combinirt mit Lungentuberculose oder fortgeleitet vom weichen Gaumen oder Kehlkopf, namentlich der Epiglottis; sie befällt dann mehr die hinteren Partien der Mundhöhle, so besonders die Zungenwurzel, die Wangen und den harten Gaumen. Im Allgemeinen ist die Mundhöhle wie die Rachenhöhle für die Ansiedlung des Tuberkelbacillus wegen der Dicke des Epithels und dem nach aufwärts und aussen ziehenden Schleimstrom kein günstiges Object. Eine Verbreitung der Tuberkelbacillen kann nach Michelson nur stattfinden, wenn ungewöhnlich zahl-

reiche Bacillen einwandern und wenn die Schleimhaut Läsionen zeigt; deshalb ist es auch möglich, dass Erosionen und ursprünglich gutartige Geschwüre durch Infection sich in tuberculöse umwandeln.

Isolirt erkrankt am häufigsten die Zunge, an der die Tuberculose in zwei Formen zur Beobachtung gelangt, in Gestalt circumscripter Tumoren und als diffuse Miliartuberculose.

Bei der ersten Form bilden sich unmittelbar unter der Schleimhaut oder in der Tiefe der Zunge allmälig an die Oberfläche vordringende isolirte oder multiple Knoten von Erbsen- bis Haselnussgrösse, welche besonders an den Rändern, dem Rücken und dem Grunde der Zunge, aber auch an ihrer unteren Fläche ihren Sitz aufschlagen. Die Schleimhaut über diesen Knoten ulcerirt zuweilen erst nach sehr langem Bestande, wodurch charakteristisch geformte Geschwüre entstehen mit schlitzartiger Oeffnung und wenig klaffenden, öfters mit weissen Knötchen besetzten Rändern; zieht man die letzteren auseinander, so bemerkt man, dass die Zerstörung in der Tiefe viel weiter um sich gegriffen hat, als an der Oberfläche.

Anders verläuft die disseminirte Tuberculose. An den Rändern der Zunge und an anderen Stellen der Mundhöhle, so besonders an Lippen, Wangen, dem Frenulum labiorum bereits lungenphthisischer Personen, aber auch primär, sieht man hirsekorn- bis stecknadelkopfgrosse, prominirende, vereinzelte oder in Gruppen stehende Knötchen, welche durch die kaum veränderte Epithelschicht graugelb hindurchschimmern. Im weiteren Verlaufe hebt sich das Epithel über den miliaren Eruptionen ab, der käsige, gelbliche Inhalt wird entfernt und zurück bleiben oberflächliche, linsenförmige oder auch ausgedehntere, tiefe folliculäre, buchtige, ausgenagte Geschwüre, die mit einem graugelblichen, oft fötiden dünnen Eiter bedeckt sind und öfters lebhaft oder blassrothe Granulationen in sich schliessen. Diese Geschwüre behalten während ihres ganzen Verlaufes ihren atonischen Charakter bei, vergrössern sich dadurch, dass an den Rändern immer wieder neue miliare Eruptionen aufschiessen und haben keine oder eine wenig infiltrirte Basis; auch die Lymphdrüsen werden fast nie in stärkere Mitleidenschaft gezogen.

Nicht gar selten localisirt sich die Mundtuberculose theils primär, theils secundär auf den Lippen und den Wangen. So sah Verf. einige Male rhagadenförmige Geschwüre an den Mundwinkeln neben tiefen Ulcerationen der Wange und Larynxtuberculose. Die Basis des Geschwüres erscheint hart und derb infiltrirt, das Geschwür selbst atonisch. Sehr selten hingegen ist die Tuberculose am Zahnfleisch. Das Zahnfleisch schwillt an einer oder an mehreren Stellen unter blassrother Färbung zu einer schwammig-knolligen Masse an oder es bilden sich zahllose papilläre Auswüchse, welche theils von der Peripherie, theils vom Centrum aus zerfallen und zu Fistelbildung, Ulceration, Lockerung und Ausfallen der Zähne oder zu Durchbruch in die Kieferhöhle und Nase (Rethi, Neumayer) Anlass geben. Der Fötor ist äusserst widerwärtig, das Kauen schwierig und zuweilen äusserst schmerzhaft.

Am harten Gaumen kann die Tuberculose auch als Ostitis oder Periostitis beginnen und dann erst auf die Schleimhaut übergreifen und ähnliche Zerstörungen verursachen wie die Syphilis.

Der Verlauf ist sehr verschieden. Während die miliare Form so gut wie niemals heilt oder Stillstand erfährt und nach Wochen oder Monaten unter anderweitigen phthisischen Erscheinungen zum Tode führt, verläuft die knotig-ulceröse Form sehr chronisch; manchmal heilen die aus ihr hervorgegangenen Geschwüre spontan oder durch Kunsthilfe mit Hinterlassung von Narben vollständig, wie ein von Gleitsmann mitgetheilter sehr ausgebreiteter Fall beweist, manchmal nur theil- und zeitweise; manche bleiben stationär, bessern und verschlimmern sich abwechselnd. Meist verläuft aber auch diese Form durch spätere Mitbetheiligung der Lunge, des Gehirnes, Darmes, Kehlkopfes letal.

Unter den Symptomen sind die functionellen Störungen die wichtigsten. Während bei der knotigen Form die Schmerzhaftigkeit so gut wie ganz fehlen kann und nur eine gewisse Schwerbeweglichkeit der Zunge beim Sprechen und Kauen besteht, verursachen die aus miliaren Eruptionen hervorgegangenen Geschwüre meist sehr beträchtliche Schmerzen, perverse Geschmacksempfindungen, Salivation, Foetor ex ore etc.: öfters sind die Speichel- und Lymphdrüsen am Halse geschwellt.

Die Diagnose der disseminirten Tuberculose ist bei dem typischen Aussehen der Geschwüre nicht schwer, zumal wenn noch andere Organe, besonders die Lungen, miterkrankt sind. Sind diese letzteren aber nebst anderen Organen frei, dann liegt eine Verwechslung mit gutartigen oberflächlichen Excoriationen oder mit traumatischen, aphthösen, herpetischen, syphilitischen Geschwüren sehr nahe. Von den gutartigen Exfoliationen unterscheiden sich die tuberculösen durch ihren langsamen chronischen Verlauf und ihre äusserst geringe Tendenz zur Heilung, von den traumatischen durch ihr Vorkommen an Stellen, an denen eine Reibung durch Zahnkanten unmöglich ist, von den aphthösen und herpetischen durch den Mangel des rothen Entzündungshofes, hauptsächlich aber durch das Auftreten miliarer Knötchen an den Geschwürsrändern und den chronischen Verlauf.

Die Tuberkelknoten der Zunge geben am öftesten Anlass zu Verwechslungen mit Syphilis und Carcinom. Während die Gummata und die aus ihnen hervorgegangenen Substanzverluste durch Jodkali und Mercur in auffälliger Weise beeinflusst werden, zeigen die tuberculösen nicht die geringste Reaction; während das Zungencarcinom oft schon sehr früh mit heftigen lancinirenden Schmerzen und hochgradiger Lymphdrüsenschwellung einhergeht, sind die tuberculösen Tumoren sehr wenig oder gar nicht schmerzhaft, die Lymphadenitis ist viel geringer oder gar nicht vorhanden.

Am schwierigsten ist die Diagnose der tuberculösen Ulcerationen an den Lippen, den Wangen oder am Gaumen; sie können durch ihr schlechtes Aussehen, ihre harte, infiltrirte Basis, ihre zerfressenen Ränder, ihre übelriechende Secretion gleichfalls zu Verwechslungen

mit Syphilis oder Carcinom Anlass geben, zumal wenn die Kranken keine Erscheinungen von Tuberculose in anderen Organen, speciell in dem Kehlkopf und in den Lungen, darbieten. In solchen Fällen gibt einzig und allein die mikroskopische Untersuchung der Geschwürssecrete oder der exstirpirten Schleimhaut- und Geschwulsttheile, d. h. die Anwesenheit von Tuberkeln mit Riesenzellen und Bacillen, den Ausschlag.

Sehr schwer ist die Diagnose der Mischformen von Syphilis und Tuberculose. Verf. stimmt mit Nedopil darin überein, dass eine antisyphilitische Behandlung anfangs von entschiedenem Nutzen ist, im weiteren Verlaufe aber völlig wirkungslos wird und dass die Geschwüre immer mehr den tuberculösen Charakter annehmen.

Die Behandlung der Mundtuberculose muss eine allgemeine und eine locale sein. Da wir uns aber mit der Phthisiotherapie hier nicht weiter beschäftigen können, so wenden wir uns zur localen Behandlung.

Am empfehlenswerthesten erscheint bei localisirter Mundtuberculose die Milchsäure, welche in 20—80% Lösung energisch auf die Geschwüre eingepinselt resp. eingerieben wird und von der Verf. einige Male sehr gute Erfolge sah. Noch besser wirkt die Milchsäure nach vorhergegangenem Auskratzen der Knoten und Geschwüre mit dem scharfen Löffel oder Zerstörung mit dem Thermocautère oder der Galvanokaustik. Jodoformeinstäubungen, sowie desinficirende Mundwässer mit Kali chloricum, Borsäure, Carbolsäure, Thymol, Salol. Mentholölpinselungen beseitigen am besten den unangenehmen Geruch und reinigen die Geschwüre, während Bepinselungen mit Cocaïn oder 50—100% Antipyrin am sichersten den Schmerz coupiren. Primäre Tuberkelknoten, sowie primäre tuberculöse Geschwüre müssen umsomehr möglichst bald durch keilförmige Excision unschädlich gemacht werden, als das Fortbestehen derselben eine permanente Gefahr für den Organismus abgibt.

Lupus befällt theils primär, theils secundär besonders gerne die Lippen und setzt sich von da auf das Zahnfleisch und den harten Gaumen fort. Das Zahnfleisch erscheint aufgelockert, gewuchert, blutet leicht, die Zähne fallen aus; greift die Affection auf den weichen Gaumen über, dann entstehen Ulcerationen, durch welche das Velum zerstört oder, wenn Schrumpfung eintritt, narbig verkürzt wird. Lupus der Zunge ist ausserordentlich selten. Butlin beschreibt nur einen von Clarke und einen von ihm selbst beobachteten Fall; weitere Beobachtungen liegen von Bender, Garré, Idelson, Léloir, Michelson und Virchow vor. Bevorzugt wird der hintere Theil der Zunge, namentlich die Gegend der Balgdrüsen und der Uebergangsfalten auf den Kehldeckel, wo sich dicht aneinanderliegende knoten- und hahnenkammartige Excrescenzen bilden. Nach Kaposi sind Lupusknötchen auf der Mundrachenschleimhaut selten als stecknadelkopfgrosse, braunrothe, leicht blutende, derbe Prominenzen erkennbar; später confluiren sie zu grösseren Plaques mit rauher

Oberfläche, mattgrauem Epithelbelag oder tiefen schmerzhaften Einrissen oder rothen, feinkörnigen, wunden Flächen; schliesslich kommt es zu narbiger Schrumpfung; Tuberkelbacillen lassen sich sehr schwer finden.

Die Diagnose stützt sich theils auf das Vorhandensein frischer Lupusknötchen, theils auf den Charakter der Geschwüre, als deren Hauptmerkmale ihre Indolenz, Schlaffheit der Ränder, üppige Granulationsbildung, geringe Schmerzhaftigkeit und Nichtreagiren auf Jod und Quecksilber gegenüber den syphilitischen angeführt werden.

Die Behandlung kann nur eine locale sein und besteht in sorgfältiger Zerstörung der Eruptionen mit Lapis in Substanz, Milchsäure, Chromsäure. Aetzkali, Auskratzen mit dem scharfen Löffel, Galvanokaustik. Hanssen will ein lupöses Geschwür der Unterlippe durch Auflegen eines Eisbeutels geheilt haben.

Lepra befällt am häufigsten die Lippen, Wangen und das Kinn; die Lippen werden unförmig knotig verdickt, wulstig und aufgeworfen, die Unterlippe hängt als fingerdicker Körper auf das Kinn herab, auch in der Mundhöhle bilden sich Knoten, wodurch die Zunge hypertrophirt und rissig wird. Die Diagnose stützt sich auf das Vorhandensein anderweitiger ähnlicher Knoten und Geschwüre an den Augenbrauen, Ohrläppchen, Fingern, sowie die Anästhesie an verschiedenen Körperstellen.

Die Therapie muss dieselbe sein, wie bei Lupus.

In seltenen Fällen localisiren sich auch in Folge des Genusses von Milch kranker Kühe die Maul- und Klauenseuche und der Rotz auf der Schleimhaut des Mundes und des Rachens.

Nach Bollinger schiessen bei der Maul- und Klauenseuche unter Fiebererscheinungen, Kopfschmerzen, Hitze und Trockenheit im Munde Bläschen an den Lippen und der Zunge, seltener auch am harten und weichen Gaumen auf, die sich bis zur Grösse einer Erbse entwickeln und nach einigen Tagen dunkelrothe oberflächliche Geschwüre und Erosionen zurücklassen. Schmerzen im Munde beim Kauen und Sprechen mit diffuser Röthung der Schleimhaut, ferner Schlingbeschwerden bei Mitbetheiligung des Rachens sind die gewöhnlichen Symptome. Eine mit der Maul- und Klauenseuche der Hausthiere identische Krankheit beschrieb Siegel als „Mundseuche des Menschen“ (Stomatitis epidemica).

Dieselbe verdankt theils dem Genusse von Milch kranker Kühe, theils dem Manipuliren mit kranken Hausthieren ihre Entstehung. Nach 8—10tägiger Incubation stellen sich Schüttelfrost, Kreuzschmerzen, Schwindel, ja sogar Delirien und epileptoide Anfälle, sowie Brechneigung und Schmerzhaftigkeit in der Magengegend ein. Zunge und Zahnfleisch schwellen mächtig an, an Zahnrand, Lippen und Mundwinkel bilden sich kleine Blasen, welche platzen und sich in stecknadelkopf- bis fünfpfennigstückgrosse Geschwüre umwandeln. Auf der Haut oder am Zahnfleisch schiessen Petechien auf oder Blasen

mit serös-blutigem Inhalt. Wenn auch die Krankheit öfters tödtlich endet, so bilden sich in der Mehrzahl der Fälle doch in 2—3 Wochen die Erscheinungen in der Mundhöhle zurück, meist mit Hinterlassung grosser Schwäche und rheumatoider Schmerzen.

Die Behandlung muss eine allgemeine und eine locale sein. Die erstere besteht in der Darreichung grosser Dosen antipyretischer Mittel, so namentlich von Natr. salicyl. 8·0—10·0 pro die, die letztere in der Anwendung von Mundwässern, so namentlich von 2% Kali chloric. und in Bepinselungen der ergriffenen Theile mit Arg. nitr. 0·3—1·0 : 15·0 Aq. destill.

Bei Rotzinfection kommt es gleichzeitig oder nach der Eruption in der Nase zu kleineren und grösseren Knoten, welche erweichen und sich zu Ulcerationen umwandeln, die leicht bluten und üblen Geruch sowie Schwellung der Submaxillardrüsen zur Folge haben. Bekanntlich hat man in den Rotzknoten Bacillen gefunden, welche nach Weichselbaum den Tuberkelbacillen ähnlich, doch breiter sind und grössere Sporen besitzen, auch eine andere Tinctionsfähigkeit und ein anderes Verhalten der Culturen zeigen. Die Behandlung kann nur eine locale, auf die Zerstörung der Knoten und Heilung der aus ihnen hervorgegangenen Geschwüre mittelst Glüheisen, Chlorzink, Lapis gerichtet sein, ausserdem sind stark desinficirende Mundwässer zu verordnen.

Mykosen und Parasiten.

Eine eigene, nahezu exempte Stellung unter den Krankheiten des Mundes nehmen die Mykosen, die durch Parasiten verursachten Erkrankungen, ein.

Unter ihnen ist die bekannteste der Soor, das Schwämmchen, welcher hauptsächlich bei Kindern, seltener bei Erwachsenen vorkommt, in Form von weissen Flecken und Membranen auftritt und der massenhaften Wucherung des Soorpilzes, des Oidium albicans, seine Entstehung verdankt.

Die Art und Weise, wie der Soorpilz auf den Menschen gelangt, ist verschieden; entweder geschieht die Uebertragung durch die Luft, oder während des Geburtsactes durch den Contact des Kindes mit der soorbedeckten Vagina, oder, was die gewöhnlichste ist, durch Gegenstände, an welchen der Pilz haftet.

Der Soorpilz knüpft seine Existenz hauptsächlich an das Vorhandensein des Pflasterepithels, welches durch seine weichen geschichteten Lagen für seine Ansiedlung besonders geeignet erscheint; deshalb sind auch der Mund, Rachen, Aditus laryngis, Oesophagus bis hinab an die Cardia, ferner die Vulva und Vagina, sowie die Analöffnung die bevorzugten Localitäten. Auf Schleimhäuten mit Cylinderepithel nistet sich der Pilz selten ein, doch kommt er auch in der Nase, dem Kehlkopfe, Trachea und Bronchien vor.

Eine ganz hervorragende Disposition zum Soor zeigt das kindliche Alter.

Die Gründe liegen theils in den vielfachen antihygienischen Verhältnissen der Kinderstube, in der grösseren Ruhe der Mundhöhle, welche das Haften und Einnisten des Pilzes begünstigt, vor allen Dingen aber in der Ernährungsweise mit der leicht gährenden Milch, mit zuckerhaltigen Substanzen und Amylaceen. Während Brustkinder bei gehöriger Reinlichkeit auffallend wenig befallen werden, stellen die künstlich aufgepäppelten das grösste Contingent. Ein weiterer Grund liegt in der mangelhaften Pflege des Mundes, wodurch das Liegenbleiben und die saure Gährung der Ingesta förmlich grossgezogen wird. Dass das leider noch so vielfach angewendete Beruhigungsmittel, der ekelhafte mit Brod, Milch und Zucker gefüllte Lutschbeutel, vulgo Schnuller, der Haupturheber und Verbreiter des Soors ist, bedarf keiner weiteren Discussion. Schwächliche Constitution der Kinder muss gleichfalls als prädisponirendes Moment bezeichnet werden, zumal kräftige Kinder nur höchst selten von der Krankheit ergriffen werden. Nicht nothwendig ist, dass die Mundschleimhaut sich in katarrhalischem Zustande befinde und so einen besseren Nährboden für den Pilz abgebe; nöthig ist nur, dass der Pilz bei seiner Invasion ein gährungsfähiges Material vorfinde, auf welchem er sich niederlassen und fortwachsen kann.

Bei Erwachsenen wird der Soor meist im Gefolge schwerer die Blutmischung und Ernährung schädigender Krankheiten, so besonders bei Typhus, Tuberculose, Pneumonie, Diabetes mellitus, Carcinom etc., beobachtet. Die Ursachen liegen auch hier in der Aufnahme und Zersetzung leicht gährender Substanzen, in der geringeren Ergiebigkeit der Kaubewegungen und der durch das schwere Darniederliegen der Kräfte theilweise entschuldbaren weniger sorgfältigen Reinhaltung der Mundhöhle. Selten, aber doch sicher constatirt, ist Soor bei gesunden Erwachsenen, gar nicht selten hingegen ist er bei decrepiden alten Leuten.

Bei der Leichtigkeit der Uebertragung des Soorpilzes ist es nicht zu verwundern, wenn der Soor in Kinderspitälern, Findelhäusern, Gebäranstalten massenhaft, d. h. endemisch vorkommt.

Betrachten wir die objectiven Erscheinungen des Soors bei Kindern, so manifestirt sich derselbe im allerersten Beginne durch das Auftreten kleiner, hirsekorngrosser, in Gruppen oder zerstreut stehender weisslicher Punkte und Tüpfelchen auf normaler oder entzündeter Schleimhaut. Zunge, Wangen und Lippen werden stets zuerst ergriffen. Solche vereinzelte Soorflecke, die selbst bei aufmerksamster Pflege und grösster Reinlichkeit bei gesunden Brustkindern zuweilen über Nacht auftreten, machen, wenn sie baldigst entfernt werden, keine Beschwerden. Bleiben sie aber unbemerkt, dann vergrössern sich die Flecken durch Bildung neuer Eruptionen und durch Confluiren mehrerer benachbarter Herde, so dass schon nach einigen Tagen grosse Strecken, ja die ganze Schleimhaut mit einer zusammenhängenden weisslichen Masse bedeckt sein kann. Diese Soormembranen

haben eine unebene, körnige Fläche und bilden eine feste, zähe Masse, die durch Ingesta oder sonstige Farbstoffe eine gelbliche, bräunliche, selbst schwärzliche Farbe annimmt. Versucht man einen solchen Soorfleck zu entfernen, so gelingt es trotz des oberflächlichen Sitzes desselben auf dem Epithel nur schwer und unter leichter Blutung; sowohl die künstlich entfernten wie die im weiteren Verlaufe sich selbst abstossenden Membranen erneuern sich mit ausserordentlicher Schnelligkeit. Die darunterliegende Schleimhaut ist mehr oder weniger geröthet, geschwellt und empfindlich; in seltenen Fällen kommt es zu Abhebung des Epithels, zu Erosionen und Geschwüren.

Unter den subjectiven Beschwerden beherrscht der Schmerz beim Saugen und Essen die Situation. Kinder verweigern die Saugflasche, wollen die Brust nicht mehr nehmen oder lassen dieselbe unter kläglichem Wimmern sofort wieder los. Auch Erwachsene klagen über Brennen und Empfindlichkeit bei der Nahrungsaufnahme; allerdings sind dieselben mehr auf Rechnung der bereits vorher vorhanden gewesenen oder sich erst zum Soor hinzugesellenden Stomatitis zu setzen. Fehlt diese oder ist sie gering, so kann die Affection mehrere Tage unbemerkt bestehen, weshalb Mütter nie versäumen sollten, täglich die Mundhöhle ihrer Kinder genau zu untersuchen. In der Regel gesellt sich zu der localen Affection des Mundes ein Magendarmkatarrh, der theils eine zufällige schon vor dem Ausbruche des Soors vorhandene Complication bildet, theils direct durch das Verschlucken des sauern mit Pilzmasse vermischten Mundspeichels hervorgerufen wird. Durch profuse Diarrhoen wird die Aftermündung geröthet und excoriirt und ebenfalls vom Soor occupirt. Die grösste Gefahr besteht, wenn der Soor sich in den Rachen und Oesophagus fortsetzt; in letzterem kann derselbe so massenhaft werden, dass das Lumen der Speiseröhre vollständig aufgehoben wird. Die Nahrungsaufnahme wird dann immer schwieriger, zuletzt ganz unmöglich, da alles Genossene sofort wieder regurgitirt. Greift die Pilzwucherung auf den Kehlkopf über, so entsteht Heiserkeit, unter Umständen Athemnoth; durch Aspiration von Soormassen kann Bronchitis und Fremdkörperpneumonie entstehen. Verschleppung des Soorpilzes in das Gehirn (Sooremholie) gehört zu den grössten Seltenheiten, doch muss nach A. Heller das Eindringen des Pilzes in die Drüsen, das Bindegewebe und in die Gefässe, welche thrombosiren, als relativ häufig bezeichnet werden.

Die Prognose des Soors bei Kindern ist zum Mindesten eine dubiöse. Selbst in den leichteren Fällen wird durch denselben das Gedeihen der Kinder für einige Zeit unterbrochen; der ohne Durchfall verlaufende Soor der Brustkinder heilt in der Regel schon nach einigen Tagen. Gesellt er sich aber zu einer schon bestehenden anderweitigen Affection, so kann dieselbe dadurch in bedenklichster Weise verschlimmert werden. Die Prognose ist im Allgemeinen um so ungünstiger, je jünger das Kind, je hochgradiger der begleitende Darmkatarrh und je ausgebreiteter die Mundaffection ist. Sehr schlecht ist die Prognose beim Uebergreifen auf Rachen und Oesophagus, Kehlkopf oder Lunge; durch Abstossung grosser zusammenhängender Soor-

membranen können die Beschwerden zwar plötzlich schwinden, doch liegt die Gefahr der Regeneration sehr nahe.

Der Soor der Erwachsenen muss in der Regel deshalb als eine sehr ungünstige Erscheinung betrachtet werden, weil er nur bei höchst bedenklichem Kräftezustand vorkommt; die Prognose ist relativ noch am besten bei Typhus und Pneumonie oder anderen acuten Krankheiten, schlecht bei Diabetes, Tuberculose etc.

Die Diagnose gründet sich einestheils auf die soeben geschilderten subjectiven und objectiven Erscheinungen, anderentheils auf den Nachweis des Soorpilzes.

Entfernt man mit einem geeigneten Instrumente einen Theil der weissen Flecken und Punkte, so sieht man unter dem Mikroskope ausser Epithelzellen und Schizomyceten der verschiedensten Art zahlreiche Pilzfäden, die ungleich gegliedert und mit seitlichen Aesten und Knospen versehen sind. Diese letzteren sind von den Hauptfäden durch Einkerbungen oder Scheidewände getrennt; der Hauptfaden selbst ist verschieden lang, gerade oder gekrümmt, farblos, mit scharfen, dunklen Rändern und zeigt violette, mit Körnchen erfüllte Hohlräume; das Ende der Fäden ist abgerundet, manchmal kolbenförmig angeschwollen oder mit bläschenartigen Gebilden besetzt. Ausserdem finden sich meist in der nächsten Umgebung der Fäden runde, ovale, stark lichtbrechende Fruchtkapseln, Gonidien, den Hefezellen sehr ähnlich, dunkel gerandet und einzeln oder in Colonien zusammenstehend. Eine Verwechslung des Soors mit Aphthen und Herpes ist möglich, doch schützt das Fehlen der Thallusfäden sowie der Umstand, dass aphthöse und herpetische Belege sich nicht wegwischen lassen, vor Irrthum. Bei ganz oberflächlicher Betrachtung kann ferner eine Verwechslung mit zerstreuten in der Mundhöhle zurückgebliebenen Milchflecken stattfinden. Von den früher erwähnten Follicular geschwüren unterscheidet sich Soor durch die grosse Ausbreitung, während die ersteren durch ihren stercotypen Sitz am harten Gaumen charakterisirt sind.

Die Behandlung des Soors sei hauptsächlich eine prophylaktische. Unreine, verdorbene Luft, sowie das Aufbewahren leicht gährender und schimmelnder Substanzen in den Kinderstuben muss strengstens verboten werden. Mit besonderer Strenge dringe man auf sorgfältige Reinigung der Mundhöhle, die nach jeder Nahrungsaufnahme vorgenommen werden soll. Ist der Soor einmal ausgebrochen, dann muss die Pflege des Mundes noch viel peinlicher gehandhabt werden; auch nach jedem etwa auftretenden Erbrechen muss der Mund an allen Orten, besonders an den Uebergangsfalten der Wangen, mit einem in reines Wasser getauchten Leinwandlappen gesäubert und die Pilzmasse durch energischen Druck weggewischt werden. Unter den Medicamenten eignen sich besonders zu diesem Zwecke die Alkalien, Lösungen von Natron oder Kali carbon., ferner von 2—4% Borsäure, Natr. borac. 1:30—1:10 ohne Syrupzusatz, der die ganze Behandlung illusorisch machen würde. In schweren Fällen empfiehlt sich 3% Carbolsäure, sehr verdünnte Jodtinctur, Thymol, sowie das Argent.

nitr. 0·1 : 20·0—50·0 und der Sublimat 0·1 : 100·0, mit welchem nach Reinigung der Schleimhaut mittelst kalten Wassers die Mundhöhle stündlich ausgepinselt oder gewischt wird. Bei Erwachsenen bewährte sich vorzüglich eine 4% Creolinlösung. Der Magendarmkatarrh ist je nach dem Alter des Kindes durch Medicamente und entsprechende Diät zu bekämpfen. Bei Soor im Oesophagus errege man zuerst auf reflectorischem Wege durch den Finger oder eine Federspule Erbrechen, dann durch Cupr. sulf., Ipecacuanha oder, wenn das Schlucken ganz unmöglich ist, durch subcutane Injection von Apomorphin; lässt auch dieses im Stich, dann greife man zur Schwammsonde. Baginsky empfiehlt bei Kindern 0·1—0·5 Resorcin zu 100 Wasser innerlich, Aufrecht bei Erwachsenen 3% Natr. bicarb. Lösung, 2stündlich ein Esslöffel voll.

Tritt der in der Mundhöhle lebende sonst sehr harmlose Leptothrix buccalis in grösseren Massen auf, dann gibt derselbe zur Bildung weisser oder weissgelber, weicher, manchmal gestielter Knötchen und Flächen Anlass. Mit besonderer Vorliebe wird der Zungengrund befallen, und zwar die Gegend zwischen den Papill. circumvall. und dem Kehldeckel. Meist sind auch die Tonsillen mitergriffen, weshalb man die Affection auch als Pharyngomykosis benigna (B. Fränkel) oder leptothricica (Hering) bezeichnet hat. Die Details werden bei den Mykosen des Rachens geschildert werden.

Als eine weitere hiehergehörige Affection ist die Stomatomykosis sarcinica zu erwähnen.

Friedreich fand bei vielen marantischen Processen, bei protrahirtem Typhus, Phthisis, auf der Schleimhaut des Mundes, besonders der Zunge und des weichen Gaumens, ausgebreitete, weissliche, reifähnliche Anflüge und Beläge, welche aus zahlreichen kleinzelligen Sarcinepilzen bestanden. Spärliche Sarcinebildung im Mund und Rachen ist nach H. Fischer bei völlig Gesunden, sowie an leichter Stomatitis und Pharyngitis Erkrankten sehr häufig. Besondere Beschwerden veranlasst die Affection nicht, doch kann einer Verwechslung mit Soor nur durch die mikroskopische Untersuchung vorgebeugt werden.

Auch der Strahlenpilz befällt die Mundhöhle theils primär, theils secundär, theils metastatisch gar nicht selten (Actinomykosis oris).

Nach Israel begünstigten krankhafte Veränderungen der Schleimhaut mit Substanzverlusten und Geschwüren, namentlich aber cariöse Zähne, Kieferfisteln, entzündliche und ulceröse Processe des Pharynx, so namentlich auch die Krypten der Tonsillen, das Eindringen des Pilzes in die Gewebsmaschen. Hacker, Maydl u. A. beobachteten Actinomykose der Zungenspitze, Partsch der Wangen, Magnussen sah mehrere Fälle mit Schwellung der Zunge und des Mundbodens auf die Gegend zwischen Kehlkopf und Kieferrand übergehen und unter Fieber, Schlingbeschwerden und Ohrenschmerz den Abscess in

den Rachen perforiren. Besonders häufig finden sich actinomykotische Processe im Unterkiefer central oder im Periost in der Submaxillar- und Submentalgegend, im Gesichte und am Halse, in der Parotis, dem perilaryngealen Bindegewebe.

Die Erkrankung beginnt meist langsam und torpid mit der Bildung einer hanfkorn- bis olivengrossen, harten, soliden, mit normaler Haut bedeckten Geschwulst, welche mehrere Monate unverändert und kaum schmerzhaft bestehen kann; allmälig erweicht die Geschwulst oder sie vereitert und zeigt Fluctuation; ihr Inhalt ist dünnflüssig, mit Pilzkörnern vermengt; sie bricht meist nicht von selbst auf; zuweilen bleiben Fisteln zurück oder es tritt Heilung durch Schrumpfung ein oder ein Theil heilt, ein anderer schreitet weiter; auch stellt sich manchmal Kieferklemme ein. Seltener tritt die Actinomykose acut in Form einer acuten Phlegmone der Weichtheile in der Gegend der Submaxillaris auf, wie die von Roser und Kapper mitgetheilten Fälle beweisen.

Die Diagnose ist nicht leicht, zumal die Affection mit Abscess, Gumma, Tuberculose oder Carcinom verwechselt werden kann. Sicheren Aufschluss gibt die Punction resp. die mikroskopische Untersuchung der Geschwulst und ihres Inhaltes.

Die Prognose ist bei localisirtem Auftreten der Krankheit nicht ungünstig, wird aber infaust, je mehr und je lebenswichtigere Organe, Gehirn, Pleura, prävertebrales Bindegewebe etc., befallen werden.

Die Therapie kann nur eine chirurgische sein und muss in Eröffnung, sorgfältigster Auskratzung der Herde, Injectionen von Sublimat oder 5—10% Carbolglycerinlösung oder Tamponade mit Carbol- oder Jodoformgaze bestehen.

Von anderen Parasiten, welche zuweilen in der Zunge beobachtet werden, sind zu erwähnen: Cysticercus cellulosae, Echinococcus, welche beide in der Zunge mehr oder weniger grosse blasenartige Geschwülste hervorrufen, ferner die Trichine und der Guineawurm (Filaria medinensis). Senator sah in der Mundhöhle Fliegenlarven und Oxyuris vermicularis.

Blutungen.

Blutungen unter und auf der Scheimhaut kommen bei den verschiedensten Krankheitszuständen zur Beobachtung. Die Blutergüsse unter der Schleimhaut markiren sich als verschieden grosse, rothe oder blauschwarze Flecken, Ecchymosen, als Knoten und umfangreichere Blutsäcke. Beträchtlichere freie Blutungen sind nicht sehr häufig.

Aetiologisch kommen in Betracht hauptsächlich Verletzungen, Bisse in die Zunge und Lippen in Folge klonischer und tonischer Krämpfe, Extractionen von Zähnen, ferner Anomalien der Blutmischung. Bei Erwachsenen spielen die Hämophilie sowie die mit derselben nahe

verwandte Leukämie, Pseudoleukämie, Purpura rheumatica, Scorbut sowie Diabetes, Carcinom und anderweitige blutreiche Neubildungen eine Hauptrolle. Varicöse Venen am Zungengrunde geben theils zu kleineren und häufigeren, theils zu profusen Blutungen Anlass, sonst erzeugen sie meist das Gefühl eines Fremdkörpers im Halse, namentlich wenn die Varicositäten sehr umfangreich sind und Brombeeren ähnlich sehen. Dass, wie Manon behauptet, die Phlebectasie der Zunge besonders eine Erkrankung der Erwachsenen sei, bei deren Entstehung Arthritis, Herzleiden, wiederholte Entzündungen des Schlundes eine Rolle spielen, ist unrichtig. Das Auftreten von Blutungen auf der Schleimhaut der Lippen, Wangen, des Zahnfleisches, der Zunge, des Rachens bei Herzkranken spricht für die embolische Entstehung (septische oder mykotische Endocarditis); nicht selten verwandeln sich, wie bereits erwähnt, diese in der Mitte etwas farblosen Blutaustritte in oberflächliche Geschwüre resp. aphthöse Belege. Bei Kindern sind besonders Follicularverschwärungen des harten Gaumens, katarrhalische Stomatitis, Stomacace, Soor, Noma, Diphtherie, sowie Verletzungen und abnorme Spannung der Gefässe während der Keuchhustenanfälle für schwächere oder stärkere Blutungen verantwortlich zu machen. Nach Ritter und Epstein kommt bei Neugeborenen eine temporäre Disposition zu Hämorrhagien vor, welche sich durch multiple, parenchymatöse, innere und äussere Blutungen an verschiedenen Orten manifestirt und mit jeder folgenden Lebenswoche abnimmt. Wie es scheint, kommt diese Affection nur bei schwächlichen, syphilitischen, anämischen Kindern in Findelhäusern vor. Sehr profus und wiederkehrend sind die Blutungen meist bei dem Carcinom der Zunge durch Arrosion des Stammes oder namhafterer Aeste der Art. lingualis; seltener kommen Blutungen bei Abscessen, aneurysmatischen Geschwülsten oder gummösen Ablagerungen vor.

Die Prognose richtet sich einestheils nach der Intensität der Blutung, anderentheils nach deren Ursache; sie ist sehr ungünstig bei Hämophilie und Carcinom, weil eine Wiederholung derselben so gut wie sicher erscheint. Nach M. Schmidt sind die Blutungen der oberen Luftwege deshalb so stark und schwer zu stillen, weil das Blut oft durch enge Hemdkrägen oder durch Tympanie des Darmes gestaut wird.

Die Behandlung besteht ausser in adstringirenden Mundwässern in Touchirungen mit 4—5% Antipyrinlösung oder Lapis und anderen hämostatischen Mitteln, namentlich mit Liq. ferri sesquichl.: blutende Zahnalveolen müssen energisch mit Feuerschwamm oder Eisenchloridwatte tamponirt und dann comprimirt, Verletzungen der Zunge durch die Naht vereinigt werden; bei stärkeren arteriellen Blutungen kann das Leben nur durch Unterbindung der das betreffende Organ versorgenden Hauptarterie, so namentlich der Maxillaris oder Lingualis, gerettet werden.

Neubildungen und Geschwülste.

Wenn auch Neubildungen und Geschwülste so ziemlich an allen Stellen der Mundhöhle beobachtet werden, so kommen dieselben doch erfahrungsgemäss mit Vorliebe an den Lippen, dem Zahnfleische und der Zunge vor.

An den Lippen und Wangen finden sich polypoide Degenerationen der Schleimdrüsen, Schleimcysten, besonders auf der inneren Lippenfläche und dem Frenulum der Oberlippe, ferner Fibrome, Angiome, Papillome und Carcinome; letztere mit Vorliebe an der Unterlippe.

Unter den Neubildungen des Zahnfleisches ist die bekannteste die Epulis. Ihrem histologischen Baue nach ist sie theils Granulationswucherung, theils Fibrom und Sarkom, theils Carcinom. Häufig sind ferner Zahncysten und Odontome.

Vom Periost der Kiefer gehen aus und ragen mehr oder weniger in die Mundhöhle hinein die Fibroide, Myxome, Enchondrome, Osteome, Sarkome und Carcinome, sowie Echinococcus- und Actinomykosegeschwülste.

Als Retentionsgeschwulst zu bezeichnen ist die von W. Roth beobachtete Verstopfung der Zungenbalgdrüsen, deren Inhalt sich zu fettigen, schmierigen Pfröpfen umwandeln und durch Zersetzung Foetor ex ore verursachen kann. Ausdrücken des Inhalts beseitigt rasch die Erscheinungen. Verkalkt der Inhalt dieser Drüsen oder der Papillae circumvall., so entstehen die sogenannten Zungensteine, welche zeitweise Schmerzen beim Kauen und Schlucken verursachen und am besten mit der Löffelsonde entfernt werden.

Am harten Gaumen kommen Neubildungen sehr selten vor und sind zu erwähnen: Angiome, Lipome, Myxome, Sarkome, Fibrome, Aneurysmen der Art. palatina, Knochencysten, die zuweilen heterotyp und heterochron entwickelte Zähne enthalten, Enchondrome, Adenome, Angiosarkome und Carcinome.

Unter den mehr oder weniger gutartigen Geschwülsten der Zunge sind zu nennen: die Polypen oder Hypertrophien der Zungentonsille, die Cysten, rundliche, mehr oder weniger bläulich durchscheinende Erhabenheiten mit serösem, schleimigem oder auch eitrigem Inhalt, ferner die Papillome, flache oder gestielte, hahnenkammartige, blassrothe Gebilde, die Fibrome, reine und als Mischformen (Fibromyome), welche langsam wachsende, runde, harte, manchmal gelappte, blassrothe Geschwülste mit glatter Oberfläche darstellen, ferner die Chondrome, die Adenome, von der Umgebung scharf abgegrenzte weiche Geschwülste von höckeriger Oberfläche, endlich die Dermoide und Dermoidcysten. Auch accessorische Schilddrüsen hat man am Zungengrund beobachtet.

Die Erscheinungen, welche Geschwülste der Mundhöhle verursachen, sind verschieden nach der Grösse und dem Sitze. Kleinere Geschwülste an Zahnfleisch, Gaumen oder Wangen können

symptomlos verlaufen; Geschwülste an der Zunge können, auch wenn sie noch so klein sind, recht unangenehme Erscheinungen zur Folge haben, so namentlich Schwierigkeiten beim Kauen, Veränderungen der Sprache, Anstossen mit der Zunge, Lispeln, Gefühl von Schwerbeweglichkeit, bei Ulcerationen Schmerzen beim Sprechen und Essen. Geschwülste des Zungengrundes geben durch Contact mit der Epiglottis zu klosiger Sprache, Husten, Würgen, Fremdkörpergefühl, Leerschlucken Anlass. Sehr grosse Geschwülste haben Schluckbeschwerden, Regurgitiren des Genossenen, Schnarchen und hochgradige Athmungsnoth zur Folge.

Die Behandlung der gutartigen Geschwülste richtet sich nach der Form und dem Sitze. Gestielte Tumoren werden am besten mit der Scheere, der kalten oder heissen Schlinge entfernt, Cysten werden angestochen oder ein Theil ihrer Wand excidirt, breitgestielte Geschwülste müssen ausgeschält werden, wobei oft mehrere Arterien zu unterbinden und die Wundränder mit der Naht zu vereinigen sind.

Unter den bösartigen Neubildungen der Zunge verdient das Careinom eine eingehendere Besprechung.

Da dasselbe beim männlichen Geschlechte viel häufiger ist, so hat man den Tabak und Alkohol sowie Syphilis, Butlin Aetzungen der Zunge mit Lapis etc. als besondere prädisponirende Ursachen angesehen. Dass andauernde Reizungen der Mundhöhle zu Carcinom führen, ist sicher erwiesen; entwickelt sich doch der Krebs oft genug aus Erosionen und ursprünglich gutartigen Geschwüren und deren Narben; auf die Umwandlung leukoplakischer Producte in Carcinom wurde bereits früher hingewiesen; auch gutartige Geschwülste können sich bei jahrelanger Reizung in bösartige umwandeln. Am häufigsten ist das Zungencarcinom im Alter von 40—60 resp. 45—55 Jahren.

Die Entwicklung des Zungencarcinoms findet auf zweifache Weise statt. Es entsteht entweder ein primärer Knoten oder Infiltrat auf oder unter der Schleimhaut, die tief in die Musculatur hineindringen und nach längerem Bestande erweichen und zerfallen oder. was viel häufiger ist, die Basis und Ränder von ursprünglich gutartigen Schrunden, Erosionen und Geschwüren induriren sich, zerfallen und nehmen immer grössere Strecken des Organs in Beschlag. Die Epithelwucherung geht in der Regel von der Schleimhaut aus und bildet wuchernde Zapfen und Epithelnester, aus welchen sich die sogenannten Epithelpfröpfe auspressen lassen; manchmal ist die Geschwürsfläche mit papillomatösen Excrescenzen besetzt. Schon sehr frühzeitig entwickeln sich sympathische Schwellungen der Drüsen am Boden der Mundhöhle, im Unterkieferwinkel und am Halse. Die Neubildung kann zwar auf die Zunge beschränkt bleiben, wuchert aber erfahrungsgemäss meistens auf den Boden der Mundhöhle, den Gaumen und gegen den Kehlkopf zu weiter.

Die subjectiven Beschwerden des Zungencarcinoms bestehen, so lange der Tumor noch nicht ulcerirt ist, in einem Gefühle von Dicke oder Schwerbeweglichkeit des Organs beim Sprechen und Essen. Schmerz kann zwar Anfangs fehlen, tritt aber meist schon

sehr frühzeitig auf. Ganz constant aber und ausserordentlich heftig in das Ohr, die Kiefer oder den Kehlkopf ausstrahlend ist derselbe bei erfolgtem Zerfalle. Die Sprache wird undeutlich, lallend, die Bewegung der Zunge immer schwerer, festere Substanzen zu kauen, wird ängstlich vermieden. Die Speichelsecretion ist vermehrt, der Geruch aus dem Munde fötid, zuweilen stellen sich bedenkliche das Leben gefährdende Blutungen ein. Verfall der Kräfte, kachektisches Aussehen, Verminderung des Appetits, erschwerte Aufnahme der Nahrungsmittel, Schlaflosigkeit bleiben nicht lange aus und nach 1—3 Jahren tritt das letale Ende ein oft unter hydropischen Erscheinungen oder durch metastatische Pneumonie, acute Blutung.

Hinsichtlich der Differentialdiagnose muss auf das bereits im Capitel Syphilis Gesagte hingewiesen werden. Niemals versäume man die mikroskopische Untersuchung excidirter Gewebstheile; selbst bei grösster Erfahrung können Verwechslungen mit Ulcus simplex induratum, Actinomykose, Syphilis oder Tuberculose vorkommen. Esmarch macht darauf aufmerksam, dass wiederholt ulcerirende Gummata der Lippen und Wangen für Krebse gehalten und exstirpirt wurden.

Die Prognose des Zungencarcinoms ist sehr schlecht. Selbst bei frühzeitiger Exstirpation treten in der Regel Recidiven ein, zumal wenn nicht sehr grosse Stücke scheinbar gesunden Gewebes und die benachbarten Lymphdrüsen mit herausgenommen werden. Ist nochmalige Operation möglich, dann ist sie hier sicher angezeigt; ausserdem beschränke man sich auf Erhaltung der Kräfte, Reinigung der Mundhöhle mit Desinficientien, Stillung profuser Blutung durch Eis, Ligatur oder Ferrum candens und hauptsächlich dreiste Gaben schmerzstillender Mittel, local Cocaïn.

Eine relativ seltene Geschwulst ist das Zungensarkom. Es entwickelt sich nach Scheier meist schon vor dem 30. Lebensjahre und sitzt mit Vorliebe im hinteren Theile der Zunge, aber auch an den Rändern. Es entwickelt sich in der Muskelsubstanz theils submucös, theils intermusculär; meist ist die die Geschwulst bedeckende Schleimhaut glatt, seltener papillomatös oder stark verdickt. Die haselnuss- bis wallnussgrosse Geschwulst ulcerirt viel seltener, als das Carcinom. Drüsenschwellungen und Metastasen treten meist erst bei Recidiven auf.

Die Diagnose ist sehr schwer wegen der Verwechslung mit Syphilis oder Carcinom, oft entscheidet der therapeutische Versuch oder die Probeexcision.

Die Prognose ist nicht so ungünstig wie beim Carcinom, natürlich kann die Therapie auch nur eine operative sein.

Zum Schlusse dieses Capitels seien noch erwähnt die Geschwülste am Boden der Mundhöhle; abgesehen von den äusserst seltenen Riesenzellensarkomen, wie ein solches Schindler bei einem zwölfjährigen Mädchen beobachtete, stellen dieselben theils Atherome und Dermoidcysten, theils Retentionsgeschwülste oder sublinguale Cysten vor.

Am bekanntesten und häufigsten ist die Ranula, die Frösch-leingeschwulst. Sie ist meist einseitig, kann aber auch doppelseitig auftreten. Sie stellt eine bald langsam, bald in wenigen Tagen sich entwickelnde oder angeborene, verschieden grosse und verschieden geformte, blasenförmige, grauweisse, elastische, fluctuirende Geschwulst vor, welche am Boden der Mundhöhle unter der Zunge, rechts oder links vom Frenulum ihren Sitz hat und sich bei weiterem Wachsthum gegen die Zungenspitze resp. zwischen Zunge und Unterkiefer hervordrängt, so dass in hochgradigen Fällen der Boden der Mundhöhle und die zwischen den Unterkieferästen befindliche Haut bis zur Faustgrösse hervorgewölbt wird. Schmerzen sind in der Regel nicht vorhanden, doch wird die Sprache undeutlich, lallend, das Kauen erschwert. Bei sehr beträchtlicher Grösse wird die Zunge an den Gaumen angedrückt und so Schlingschmerz und Athemnoth erzeugt.

Ueber das Wesen der Ranula sind die Ansichten immer noch getheilt. Während die Einen dieselbe auf eine Verstopfung des Wharton'schen Ganges oder cystenartige Degeneration der Sublingualis zurückführen, Andere in ihr ein Hygrom eines an der Aussenseite des M. genioglossus liegenden Schleimbeutels erblicken, lassen Recklinghausen und Sonnenburg dieselbe von der im vorderen Theile der Zunge liegenden Blandin-Nuhn'schen Drüse ausgehen. Neumann hingegen führt, diese letztere Ansicht verwerfend, die Ranula auf eine Erweiterung der Bochdalek'schen Drüsenschläuche der Zungenwurzel zurück und stützt seine Ansicht auf das Vorkommen von Flimmerzellen auf der inneren Fläche der Ranulawand und auf die Thatsache, dass Flimmerzellen in der Zunge nur in den Bochdalek'schen Drüsenschläuchen vorkommen.

Die Prognose der Ranula ist insoferne ungünstig, als dieselbe grosse Neigung zu Recidiven zeigt.

Die Behandlung muss eine operative sein. Die mildeste Methode ist das von Billroth empfohlene Durchziehen eines Seidenfadens, welcher über der Geschwulst leicht geknüpft wird. Da sich aber nach dieser Methode sowie nach einfacher Incision mit oder ohne nachfolgende Jodinjection die Geschwulst leicht wieder füllt, so suche man nach vorheriger Fixation des Tumors mittelst zweier feiner Haken durch einen breiten Schnitt den Inhalt der Geschwulst zu entleeren; dann excidire man mit der Scheere ein Stück des Balges und vereinige die Wände der Cyste mittelst einiger Nähte mit der Schleimhaut; die Nachbehandlung besteht in antiseptischen Mundwässern, die Nähte können am vierten Tage entfernt werden.

Die Behandlung der übrigen oben aufgeführten Neubildungen und Geschwülste möge man nach den in den Lehrbüchern der Chirurgie angegebenen Regeln leiten.

Nervenkrankheiten.

Zu den constantesten Begleiterscheinungen der verschiedenen Mundkrankheiten gehören die Störungen der Sensibilität, und zwar sowohl im Bereiche des Tastsinnes als auch der Geschmacksempfindung.

Verminderung oder vollständiger Verlust der Empfindlichkeit der Mundhöhle (Anästhesie) findet sich ausser in schweren Fällen von Hysterie fast nur bei Erkrankungen des Gehirns oder bei peripheren Lähmungen des zweiten und dritten Astes des Trigeminus. Sie ist meist einseitig wie bei Herderkrankungen oder bei Hemianaesthesia hysterica oder bei Mittelohreiterung in Folge von Uebergreifen der Entzündung auf den Plex. tympanicus und erstreckt sich auf die Schleimhaut der einen Wange oder die Hälfte der Zunge und Lippen. Bei diffusen Gehirnerkrankungen sowie Rückenmarksaffectionen oder nach anhaltender Einwirkung kalter Luft kann die Anästhesie doppelseitig auftreten. Ist die Zunge mitbefallen, dann treten gleichzeitig Störungen des Geschmacks auf; so sah Verf. einmal beträchtliche Herabsetzung der Sensibilität der linken Zungenhälfte mit verringerter und verspäteter Geschmacksempfindung neben diphtheritischer Accommodations- und Gaumensegellähmung. Bei halbseitiger totaler Anästhesie können auf der betroffenen Seite die in den Mund gebrachten Speisen weder hinsichtlich ihrer Temperatur noch ihrer physikalischen Eigenschaften unterschieden werden; ein an den Mund gesetztes Glas hinterlässt den Eindruck, als ob es abgebrochen wäre; zwischen Wange und Zahnfleisch angesammelte Speisereste bleiben unbemerkt liegen. Die Zunge erscheint auf der anästhetischen Seite dick belegt, mit Einrissen, Bissen und Geschwüren versehen, welche sich die Kranken unbewusst über die jeweilige Lage ihrer Zunge beigebracht hatten, zumal wenn auch die motorische Portion des Trigeminus miterkrankt ist.

Die Hyperästhesie und Neuralgie der Mundhöhle kann zwar als Begleiterin centraler Erkrankungen oder von Hysterie oder als Reflexerscheinung im Gefolge anderer Neurosen, z. B. der Stenocardie, auftreten, ist aber in der Regel durch Trigeminusneuralgie bedingt. Sie erstreckt sich auf Gaumen, Wangen, Lippen, Zahnfleisch, Zunge, den Boden der Mundhöhle, die vorderen Gaumenbögen. Die Schmerzen tragen meist den neuralgischen Charakter, d. h. sie treten plötzlich in Anfällen auf, verschwinden nach wenigen Minuten, um zu bestimmter Zeit wiederzukehren. Die Speichelsecretion ist in der Regel während der Anfälle vermehrt, die Zunge belegt, das Sprechen und Kauen erschwert oder unmöglich.

Auf die Zunge localisirte Schmerzen bezeichnet man als Glossodynie, Glossalgie.

Dieselbe kann anfallweise mit Schmerzpunkten auftreten, aber auch ohne solche continuirlich Tage, Wochen, Monate, sogar Jahre fortdauern. Die Aetiologie ist sehr dunkel; zuweilen finden sich,

vielleicht in Folge allzu energischer Reinigung der Zunge oder aus anderen Ursachen, unbedeutende Veränderungen der Schleimhaut, wie Schwellung einzelner Papillen und Follikel, Epithelabschilferungen oder Excoriationen, Risse und Schrunden; in den ganz reinen Fällen ist die Schleimhaut völlig normal. Man muss wohl in allen Fällen eine Neurose der Zungennerven auf neuropathischer Basis als Ursache annehmen, auch kann der Schmerz vom Rachen aus irradiirt sein; Verf. sah wiederholt denselben nach Entfernung von Granulationen oder hypertrophischen Seitensträngen schwinden. Kaposi sah Glossodynie mehr bei Weibern, die an Anämie, Chlorose, Dyspepsie, Dysmenorrhoe und Hysterie litten, Schwimmer hingegen fast nur bei Männern, die weder an Constitutionsanomalien noch an Nervosität litten; Verf. hat am meisten Frauen im Klimakterium an dieser Affection behandelt.

Der Sitz des Schmerzes ist meist in der Zungenspitze und in dem vorderen Theile der Zunge, seltener an dem Zungengrunde oder an den Rändern der Zunge oder auch auf der Papilla foliata, die manchmal bei Berührung empfindlich erscheint, und wenn sie abnorm stark entwickelt ist, für ein Papillom und demnach auch für die Ursache der Glossodynie gehalten werden kann. Nicht selten ist das Herausstrecken der Zunge wegen allzu grosser Schmerzhaftigkeit unmöglich und das Sprechen und Kauen erschwert; die meisten Kranken treibt die Furcht vor dem Zungenkrebs zum Arzte.

Die Prognose der Glossodynie ist in Bezug auf rasche und völlige Heilung ungünstig, doch kann die Affection sich spontan verlieren.

Die Behandlung muss eine causale sein; bei rheumatischer Grundlage empfiehlt sich Chinin, Natr. salicylicum und das Dampf- und Schwitzbad, bei Verdauungsstörungen Soda, Magnesia, Magist. Bismuthi, Rheum, Karlsbad; bei neurasthenisch-hysterischer Basis Arsen, Bromkali, Valeriana, Phenacetin, Salipyrin, Antipyrin; bei Anämie Eisen, Franzensbad, Marienbad sowie Seebäder. Selbst unbedeutende Schleimhautläsionen, sowie chronische Rachenkatarrhe sind local zu behandeln; palliativ während der Anfälle empfiehlt sich Chloral, Morphium, Bepinselung der schmerzhaften Stellen mit 10% Cocaïnlösung oder der inducirte oder galvanische Strom. In sehr hartnäckigen Fällen ist die Dehnung oder Resection der Zungennerven angezeigt.

Der Parästhesie liegen in der Regel dieselben ätiologischen Momente zu Grunde. Bald klagen die Kranken über ein Gefühl von Ameisenlaufen, Jucken, Pelzigsein in den Wangen, bald über Eingeschlafensein, Prickeln, Brennen an der Zungenspitze, als ob Pfeffer aufgestreut sei, bald über Hitze und Kälte am Zahnfleisch und harten Gaumen. Die Parästhesie ist sehr oft der Vorläufer oder Begleiter motorischer oder sensibler Lähmungen oder combinirt mit Glossodynie.

Häufiger als die Anomalien des Tastsinnes sind die Störungen im Bereiche des Geschmackes.

Anästhesie der Geschmacksnerven, Anaesthesia gustatoria, Ageusia, kann auf rein mechanischem Wege durch erschwerte Einwirkung der Geschmacksstoffe auf die peripheren Nervenenden erzeugt werden, so z. B. durch abnorme Trockenheit der Schleimhaut, dicken Zungenbelag, abnorm hoch oder niedrig temperirte Speisen, zweitens aber auch durch centrale und periphere Leitungsstörungen im Trigeminus, Lingualis, Chorda tympani, Facialis, Glossopharyngeus oder durch Amputation der Zunge. Das Geschmacksvermögen kann einseitig oder doppelseitig, vollständig oder theilweise für alle oder nur für einige Geschmacksempfindungen, wie dies namentlich oft bei Affectionen der Nase der Fall ist, herabgesetzt oder aufgehoben sein. In den leichteren Fällen findet sich eine Verlangsamung der Geschmacksempfindung; Störungen im Bereiche des Trigeminus, Lingualis, der Chorda, wie z. B. nach Exstirpation von Ohrpolypen, sowie des Facialis beeinträchtigen hauptsächlich das Geschmacksvermögen in den vorderen Zweidrittheilen der Zunge und in der Zungenspitze und deren Rändern; Affectionen des Glossopharyngeus haben nach übereinstimmenden Beobachtungen Alienation des Geschmacksvermögens der Wurzel der Zunge, des Gaumens und der hinteren Pharynxwand zur Folge. Auffallend häufig finden sich Verlust oder Abnahme des Geschmackes mit oder ohne Verminderung des Tastgefühles bei chronischen Mittelohreiterungen (Läsion der Chorda und des Plexus tympanicus). Eine centrale Ursache darf angenommen werden, wenn Glossopharyngeus und Lingualis gleichzeitig befallen sind und Hautanästhesie besteht; auch Affectionen des hinteren Abschnittes der inneren Kapsel oder Thrombose der Art. vertebralis haben Geschmacksstörungen zur Folge. Totalexstirpation der Zunge hat, wie Thiery an einem Zungenlosen beobachtete, den Verlust der Geschmacksempfindung am harten Gaumen, Lippen, Wangen und Zahnfleisch zur Folge, während dem weichen Gaumen und den Gaumenbögen die Geschmacksfähigkeit erhalten bleibt.

Die Hyperaesthesia gustatoria ist öfters eine physiologische Erscheinung. Gleichwie es Menschen mit abnormer Sehschärfe, mit ausgeprägtestem Geruchsinn und Gehör gibt, so gibt es auch solche mit ausserordentlicher Feinheit des Geschmackes, besonders wenn der letztere von Jugend auf geschärft wird, wie man dies häufig bei Weinhändlern, Thee-, Tabak-, Kaffeeverkäufern, Gourmands findet, die im Stande sind, den Jahrgang oder die Herkunft des Weines, die Sorte des Thees, Tabaks, Spuren von Gewürzen zu bestimmen.

Die pathologische Hyperästhesie der Geschmacksnerven (Hypergeusie) kommt relativ am öftesten bei hysterischen oder nervösen Personen vor, die die geringsten Mengen von Salz oder Gewürzen schmecken, welche von Gesunden nicht mehr percipirt werden können. Verf. beobachtete einmal einen Fall von periodischer Hypergeusie bei einem jungen, gesunden Manne, dem ganz salzfreie Speisen zeitweise ausserordentlich scharf und ungeniessbar erschienen.

Sehr häufig sind perverse Wahrnehmungen des Geschmackes, Paraesthesia gustatoria, auch Allotriogeusia genannt. Sie ist ganz gewöhnlich bei fieberhaften Krankheiten, bei Affectionen des

Magendarmcanals, kurz bei allen jenen Processen, bei denen die Zunge belegt und die Schleimhaut der Mundhöhle in irgend einer Weise verändert ist. Auch Kranke mit rheumatischer Facialparalyse klagen öfters über faden, säuerlichen oder bitteren Geschmack, ebenso entstehen bei Kranken mit Mittelohreiterungen beim Ausspritzen, Insufflren, Sondiren oder bei der Entfernung von Polypen theils abnorm starke, theils perverse Geschmacks- und Gefühlsempfindungen auf der Zungenhälfte der befallenen Seite. Lieblingsspeisen haben in der Regel einen unangenehmen metallischen oder fauligen Geschmack. Zucker erscheint bitter, Salz süss, Kaffee schmeckt nach Cichorie, die Cigarre nach verbranntem Stroh etc. Hieher gehört auch die Vorliebe so vieler Chlorotischer, Hysterischer oder Schwangerer für ungewöhnliche, schlecht schmeckende, ja widerliche Dinge, als da sind: gebrannte Kaffeebohnen, Hanfkörner, Kalk, Zwiebeln, Asa foetida, Castoreum etc. Manche dieser Anomalien sind direct als Geschmackshallucinationen und Illusionen zu bezeichnen und als Theilerscheinungen psychischer Störungen zu betrachten.

Zur Diagnose der Geschmacksstörungen bedient man sich verschieden schmeckender Substanzen, welche in kleinen Mengen oder in Lösung mit einem Pinsel oder Glasstab auf die zu prüfenden Theile aufgetragen werden. Am besten eignet sich zur Prüfung des bitteren Geschmackes Chininlösung oder Tinct. Strychni, des sauren Salzsäure oder Essigsäure, des süssen Zuckerwasser, des salzigen Kochsalzlösung oder die Anode eines constanten Stromes. Da es sich vielfach um Störungen des Geruches handelt und nicht um solche des Geschmackes, wie z. B. bei aromatischen Substanzen, Wein, Cigarren etc., so untersuche man sorgfältigst die Nase und prüfe den Geruchsinn nach den später anzugebenden Methoden.

Die Behandlung dieser verschiedenen Zustände verspricht nur Erfolg bei sorgfältiger Berücksichtigung der Aetiologie: da aber eine eingehende Besprechung dieser äusserst zahlreichen Affectionen die Grenzen dieses Buches weit überschreiten müsste, so sei hier nur auf die günstige Wirkung der localen Behandlung der Nase, sowie der Elektricität aufmerksam gemacht; in der Regel erweist sich der constante Strom wirksamer als der indicirte. Dass die durch centrale Affectionen verursachten Störungen fast stets aussichtslos sind, ist leicht einzusehen.

Als Angioneurose ist das namentlich an den Lippen, der Zunge, den Augenlidern, den Wangen, den Seitentheilen der Nase, ferner im Rachen und im Kehlkopfe sowie an den Extremitäten auftretende acute Oedem zu betrachten. Als Ursachen sind zu nennen: Erkältungen, Traumen, operative Eingriffe in der Nase, Heredität. Ein constanter Begleiter dieser oft nur einige Stunden oder Tage, aber auch Wochen anhaltenden Affection sind Verdauungsbeschwerden, namentlich Erbrechen (Quincke, Strübing).

Die Störungen der Motilität äussern sich als Krampf und Lähmung.

Krämpfe kommen hauptsächlich in der Zunge vor; sie sind meistens Theilerscheinungen allgemeiner Nervenkrankheiten, Athetose, Chorea, Eclampsie, Epilepsie, Hysterie, und sind bald klonischer, bald tonischer Natur.

Idiopathisch auf die Zunge, ja sogar nur auf eine Hälfte derselben beschränkte Krämpfe sind äusserst selten und theils bei vollblütigen (Hoffmann), theils bei anämischen oder Excesse in Baccho et Venere geschwächten (Bernhardt), sowie neuropathisch belasteten Personen (Erlenmayer) oder nach Gemüthsbewegungen, einmal sogar nach Tonsillotomie (Fleury) beobachtet worden. Zuweilen treten sie coordinatorisch beim Sprechen, Kauen oder Clarinettblasen (Strümpell) auf, zuweilen spontan oder bei allgemeiner Chorea.

Beim klonischen Krampf wird die sich steif anfühlende Zunge stossweise nach vorne oder hinten gezogen oder nach verschiedenen Richtungen hin- und hergeworfen, beim tonischen Krampf wird sie gegen den harten Gaumen angedrückt gehalten; während der Anfälle ist das Sprechen, Kauen und Essen erschwert und unmöglich.

Krämpfe der Lippen sind meist Theilerscheinungen schwerer Neurosen, so hauptsächlich Trigeminusneuralgie, der Eclampsie, Epilepsie, Chorea oder des Tetanus.

Nicht gar selten sind Krämpfe im Orbicularis oris; sie sind bald tonische wie bei Tetanus, bald klonische wie beim mimischen Gesichtskrampf oder acuter und chronischer Hirnreizung; fibrilläre Zuckungen sind besonders häufig bei Bulbärparalyse und Gehirnhämorrhagien.

Relativ selten sind ferner tonische und klonische Krämpfe der Kaumuskeln. Die ersteren, auch als Trismus oder myogene Kieferklemme bezeichnet, sind meist doppelseitig.

Der Unterkiefer wird so fest an den Oberkiefer angepresst, dass weder die Zähne von einander entfernt, noch die Mundhöhle geöffnet werden kann; die Muskeln sind von einer brettartigen Härte und sehr schmerzhaft. Sind alle Kaumuskeln nicht gleichmässig oder nur einseitig befallen, so kommt es zu Verschiebungen des Unterkiefers, wie in einem Falle von Leube, wo bei einseitigem Krampf der Pterygoidei der Unterkiefer auf der befallenen Seite über den Oberkiefer hervorragte.

Bei der klonischen Form wird der Unterkiefer rasch gegen den Oberkiefer geschnellt, wodurch bei verticaler Richtung des Stosses Zähneklappern, bei horizontaler Verschiebung Zähneknirschen erzeugt wird. Dass es durch diese unwillkürlichen heftigen Bewegungen zu Bissen in die Zunge, Lippen und Wangen und zu Verletzungen des Zahnfleisches und der Zähne kommen muss, ist leicht einzusehen.

Als Ursachen der Kaumuskelkrämpfe müssen Meningitis, Gehirntumoren, Epilepsie, Hysterie, Encephalitis, besonders aber die verschiedenen Formen von Tetanus, Tetanie, sowie schwere Infections-

krankheiten, Typhus, angesehen werden; sehr selten sind dieselben durch periphere Reizungen im Gebiete des Trigeminus in Folge von Affectionen des Kieferknochen, schlechten Zähnen oder auch durch Gemüthsbewegungen, Schreck, bedingt. Bei Gumma oder Myositis gummosa befindet sich nicht selten der ganze Temporalis oder Masseter im Zustande tonischer Contractur.

Die Prognose ist bei cerebraler Ursache sowie bei Tetanus äusserst ungünstig, günstig bei peripheren Ursachen.

Die Behandlung muss zuerst darauf bedacht sein, die Ursache der Krämpfe zu beseitigen, was nur theilweise möglich ist. Bei Tetanus empfehlen sich grosse Gaben von Narcoticis, besonders Morphium subcutan, Chloroforminhalationen, Nervina, warme protrahirte Bäder. Bei rheumatischer Ursache sind Schwitzcuren, Natr. salicyl., bei Neurasthenie und Anämie Bromkali und Eisen, bei Syphilis Mercur und Jod anzuwenden. Bei Krämpfen des Orbicul. oris und der Zunge ist ausser den genannten Mitteln die Galvanisation des N. facialis resp. hypoglossus, sowie der Medulla oblongata zu versuchen. Bei Trismus kann die künstliche Ernährung nöthig werden entweder mittelst einer durch die Nase eingeführten Schlundsonde oder mittelst eines Rohres oder Schlauches, der durch die Lücke hinter dem letzten Backzahne eingeführt wird.

Ungleich wichtiger als die bisher besprochenen Neurosen sind die Lähmungen, welche die verschiedenen die Mundhöhle zusammensetzenden Organe befallen.

Die Lähmung der Lippen resp. des Orbicul. oris ist eine nahezu constante Begleiterin centraler oder peripherer Facialislähmung; sie ist in der Regel einseitig, betrifft bald nur die Oberlippe, bald nur die Unterlippe, bald beide, was bei progressiver Bulbärparalyse und amyotrophischer Lateralsclerose die Regel ist. Der völligen Lähmung geht meistens ein Gefühl von Spannung und Starrheit voraus. Die Articulation wird durch die partielle oder complete Unfähigkeit, die Lippenlaute zu bilden, undeutlich, das Pfeifen, Ausblasen eines Lichtes unmöglich, zumal wenn, wie so häufig, auch die Musculatur der Wangen mitergriffen ist. Bei totaler Lähmung kann der Mund nicht geschlossen werden, die Speisen fallen zum Theile wieder aus dem Munde heraus und fliesst der Speichel fortwährend über Lippen und Kinn herab. Schliesslich werden die Lippen atrophisch, ihre Ränder scharf, die sie bedeckende Haut runzelig; sehr oft sind auf der gelähmten Seite fibrilläre Zuckungen bemerkbar.

Die Lähmung der Kaumuskeln ist meist centralen Ursprungs, d. h. Theilerscheinung entzündlicher, degenerativer oder neoplastischer Erkrankung des Pons, der Medulla oblongata, vorzüglich der Bulbärparalyse und der Tabes (Schultze); relativ am häufigsten findet sie sich bei Erkrankungen der Schädelbasis, wobei die motorische Portion des Trigeminus comprimirt wird. Aeusserst selten ist sie durch periphere Compression der Nerven bedingt, dagegen ist fast constant Lähmung

und Atrophie der Kaumuskeln, der einen Hälfte der Zunge und des weichen Gaumens bei Hemiatrophia facialis vorhanden.

Zu den frühesten subjectiven Erscheinungen gehört die Schwierigkeit, feste Substanzen zu kauen; die Kranken klagen meist selbst über die Kraftlosigkeit ihrer Kaumuskeln. Objectiv lässt sich eine Anenergie der Muskeln oder ein Schlaffbleiben bei Kaubewegungen constatiren. Das Kauen wird allmälig immer schwieriger, zuletzt ganz unmöglich, der Unterkiefer hängt, falls die Erkrankung doppelseitig ist, schlaff herab, die Muskeln atrophiren oder verfallen zuweilen in Contractur, öfters bestehen gleichzeitige Sensibilitätsstörungen.

In besonders deutlicher Weise äussert sich die Lähmung der Zunge.

Aetiologisch spielen Erkrankungen des Gehirns und der Medulla oblongata, so besonders Meningitis und meningitische Schwarten, Gehirntumoren, progressive Muskelatrophie, Bulbärparalyse, essentielle Kinderlähmung, amyotrophische Lateralsclerose, Apoplexie und Embolie der Gehirnarterien, Diphtherie die Hauptrolle, während periphere Lähmungen des Hypoglossus durch Bleiintoxication, geschwellte Lymphdrüsen, Syphilis und andere Ursachen äusserst selten sind.

Ist die Lähmung einseitig, dann weicht die Spitze der herausgestreckten Zunge nach der gelähmten Seite hin ab, was darin seinen Grund hat, dass der nicht gelähmte Genioglossus der anderen Seite die Zungenspitze nach der entgegengesetzten Seite über die Unterkiefer hinauszieht, weil sein gelähmter Gegenpart keinen Widerstand entgegensetzt. In hochgradigen älteren Fällen ist Atrophie der gelähmten Zungenhälfte vorhanden.

Ist die Lähmung doppelseitig, wie dies im letzten Stadium der progressiven Bulbärparalyse oder in seltenen Fällen von Tabes der Fall ist, so kann die Zunge nicht zum Munde. oft nicht einmal bis zu den Zähnen hervorgestreckt werden; sie liegt als todte atrophische Masse, hie und da noch fibrilläre Zuckungen zeigend, in der Mundhöhle. Ist die Lähmung unvollständig (Parese), dann kann die Zungenspitze nicht so weit und schnell hervorgestreckt und so prompt nach den verschiedenen Richtungen hin gebracht werden, wie dies unter normalen Verhältnissen der Fall ist.

Die durch Glossoplegie erzeugten Störungen beziehen sich einestheils auf die Function des Kauens anderntheils auf die Articulation der Sprache.

Während unter normalen Verhältnissen die Bissen von der Zunge zwischen die beiden Zahnreihen zum Zerkleinern geschoben und dann nach hinten in den Schlund gebracht werden, bleiben bei der Zungenlähmung die Speisen auf dem Rücken der Zunge liegen und werden, selbst wenn sie in den Pharynx gelangen, leicht wieder in die Mundhöhle zurückgeschoben, weil der Abschluss zwischen Mund- und Rachenhöhle fehlt oder unvollkommen ist. Die Störungen der Articulation beziehen sich bei einseitiger Lähmung auf undeutliche Aussprache der Zungenlaute; bei doppelseitiger Lähmung, so besonders

bei Bulbärparalyse, ist die Sprache hochgradig lallend und nahezu unverständlich.

Die Prognose der Zungenlähmungen richtet sich nach der Ursache und dem Grade des Uebels. Bei peripherer Compression des Hypoglossus kann unter Umständen durch einen chirurgischen Eingriff, Exstirpation einer Geschwulst oder Extraction eines steckengebliebenen Geschosses oder sonstigen Fremdkörpers oder bei syphilitischer Basis durch eine antiluetische Behandlung die Lähmung behoben werden; die durch Apoplexien oder Embolien des Gehirns entstandenen Lähmungen geben insoferne eine nicht ungünstige Prognose, als sie sich mit der Zeit zurückbilden können; absolut infaust ist die Prognose bei Hirntumoren, encephalitischen Herden, Bulbärparalyse und bulbären Hämorrhagien.

Die Therapie der Zungen-, Lippen- und Kaumuskellähmungen besteht neben gleichzeitiger Behandlung des Grundleidens in der elektrischen Reizung des N. hypoglossus oder der Muskeln der Zunge und der Wange von der Mundhöhle aus. Bei Bulbärparalyse und der nahe verwandten progressiven Muskelatrophie und amyotr. Lateralsclerose wird man höchstens Stillstand, kaum eine Besserung oder gar Heilung erzielen, wenn auch Tommasi durch Faradisation und Benedikt durch Galvanisation des Sympathicus gute Resultate erhalten haben wollen.

Die

Krankheiten der Speicheldrüsen.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen.

Es gibt dreierlei Speicheldrüsen, die Parotis, die Glandula submaxillaris und die sublingualis.

Die grösste und wichtigste ist die paarige Ohrspeicheldrüse, die Parotis.

Sie liegt vor und hinter dem Ohre in dem Winkel, welcher zwischen dem Gelenkaste des Unterkiefers, dem Warzenfortsatz und dem äusseren Gehörgange übrig gelassen wird und schiebt sich von hier über die äussere Fläche des Masseter bis zum unteren Rande des Jochbogens vor. Nach innen dringt sie bis zum Proc. styloid. ein; sie hat ein gelapptes Aussehen und besteht aus rundlichen Körnern, Acini, welche durch Bindegewebe in einen gemeinschaftlichen Körper zusammengefasst sind. Ihr Ausführungsgang, Ductus Stenonianus, der sich durch die Dicke seiner Wand und die Enge seines Lumens auszeichnet, tritt am oberen Drittheile des vorderen Randes der Drüse hervor. Er entsteht durch successive Vereinigung der kleinen Ausführungsgänge der Acini, läuft mit dem Jochbogen parallel und unter ihm an der Aussenfläche des Masseter nach vorne, senkt sich am vorderen Rand desselben durch das Fettlager der Backe zum Musc. buccinator herab, welchen er in seinem Mittelpunkte durchbohrt, um an der inneren Oberfläche der Backe dem ersten oder zweiten oberen Mahlzahn gegenüber auszumünden. Am Lebenden erkennt man die Mündung des Speichelganges bei abgezogener Wange als ein kleines nadelstichgrosses, schwarzes Pünktchen oder längliches Grübchen, in das man eine feine Knopfsonde oder Canüle einführen kann. Manchmal ist die Mündung durch eine kleine, knopfähnliche Erhabenheit verdeckt. Nicht selten liegt vor der Parotis oder auf ihrem Ausführungsgange noch eine kleine Nebendrüse, Parotis accessoria, die ihren Ausführungsgang in den Duct. Stenon. münden lässt, und rings um die

Einpflanzungsstelle des letzteren in dem Buccinator lagert eine Gruppe hanfkorngrosser acinöser Glandulae buccales.

Die Unterkieferspeicheldrüse, die Gland. submaxillaris, ist etwa um die Hälfte kleiner als die Parotis, liegt unter dem M. mylohyoideus zwischen dem hoch- und tiefliegenden Blatt der Fascia colli, in dem dreieckigen Raume, der von dem unteren Rande des Unterkiefers und den beiden Bäuchen des M. biventer begrenzt wird. Ihr Ausführungsgang, Ductus Whartonianus, längs welchem sich noch eine Reihe von Läppchen als dünner Fortsatz der Drüse hinzieht, geht über die obere Fläche des Mylohyoideus zwischen ihr und der Gland. subling. nach innen und vorne und mündet an der stumpfen Spitze einer zu beiden Seiten des Zungenbändchens befindlichen Papille (Caruncula sublingualis).

Die Unterzungenspeicheldrüse, Gland. sublingualis, ist die kleinste und liegt auf der Oberfläche des Mylohyoideus, nur von der Schleimhaut des Bodens der Mundhöhle bedeckt, welche sie etwas hervorwölbt; ihr hinteres Ende stösst an das vordere der Gland. submaxill.; ihre feinen Ausführungsgänge, 8—12 an der Zahl, Ductus Rivini genannt, münden entweder hinter der Caruncula subling. in die Mundhöhle oder vereinigen sich nach Art der übrigen Speicheldrüsen zu einem gemeinschaftlichen Gange, dem Ductus Bartholini, welcher ebenso häufig eine besondere Endmündung der Caruncula besitzt, als er mit dem Duct. Wharton. zusammenfliesst.

Ob die im Spitzentheile der Zunge liegende Nuhn-Blandinsche Drüse unter die Speichel- oder Schleimdrüsen zu rechnen sei, ist zur Zeit noch unentschieden.

Das von den Speicheldrüsen gelieferte Secret, der Mundspeichel, hat die Function, die Mundhöhle feucht zu erhalten, die Nahrungsmittel zu durchtränken und dadurch schluckbarer zu machen, sowie das Amylum in Dextrin und Zucker zu verwandeln. Dass die Speichelsecretion in ausserordentlicher Weise vom Nervensystem, Facialis und Sympathicus beeinflusst wird, ist bekannt, ebenso, dass das Secret der Parotis Rhodankalium enthält, während das der Submaxillaris davon frei ist.

Vermehrung der Speichelsecretion, Speichelfluss.

Vermehrte Speichelsecretion (Salivation, Sialorrhoe, Ptyalismus) ist die constante Begleiterin der meisten Mundrachenaffectionen. Besonders häufig und hochgradig ist dieselbe im Kindesalter beim Durchbruch der Zähne, sowie bei Stomatitis mercurialis, Stomacace und den in dem Capitel Stomatitis exsudativa abgehandelten Processen. Auch die Untersuchung der Mundhöhle, des Rachens und des Kehlkopfes, sowie die Einverleibung pikanter Ingesta und gewisser Medicamente, so besonders des Blei, Curare, Herba Jaborandi, Pilocarpin, Jod, Kupfer.

Nicotin, Physostygmin und Quecksilber, haben ebenso wie operative Eingriffe an den Zähnen, im Rachen und Kehlkopf gesteigerte Speichelsecretion, oft mit ruckweisem, strahlenförmigem Ergusse zur Folge. Ausser bei den Krankheiten der Mundhöhle findet sich Salivation besonders häufig bei acuten und chronischen Magendarm- und Uterinaffectionen, ferner bei Erkrankungen der männlichen Sexualorgane (Pollutionen, Spermatorrhoe, sexuelle Neurasthenie [Peyer]), selbst schon bei Dyspepsie und Uebligkeit; auch die Anwesenheit von Entozoen im Darmcanale kann auf reflectorischem Wege Salivation zur Folge haben, ebenso Mittelohrkatarrhe, Anomalien der Blutmischung, Anämie, Chlorose, Schwangerschaft, Tuberculose. Am merkwürdigsten ist die Salivation bei hysterischen oder sonst nervösen Personen weiblichen und männlichen Geschlechts oder in Folge von Gemüthsbewegungen, Gesichts-, Zahn- oder Ohrschmerz; sie bestätigt die Thatsache, dass die Speichelsecretion in hohem Grade vom Nervensystem, speciell von der Reizung des Trigeminus, Facialis, Glossopharyngeus und Sympathicus abhängig ist. Ob die bei diphtheritischer Schlundlähmung, sowie bei manchen chronischen Gehirnkrankheiten, so besonders der Bulbärparalyse, der Paralysis agitans und der Mikrocephalie vorkommende Salivation (paralytischer Speichelfluss) nervöser Natur ist und wirklich auf vermehrter Secretion beruht oder nur auf behinderter Abfuhr, ist noch nicht endgiltig entschieden, doch spricht die meistens ausserordentliche Zähigkeit des Speichels mehr für eine Secretionsanomalie.

Der Ausbruch der Salivation ist öfters von einem unangenehmen, ziehenden, spannenden Gefühle in der Gegend der Parotis und des Unterkieferwinkels, nie von eigentlichen Schmerzen, wohl aber oft von einem faden, metallischen Geschmacke begleitet. Die Quantität des ergossenen Speichels ist oft eine ungeheure und schwankt zwischen 1—5 Litern im Tag. Es ist natürlich, dass die Mundhöhle solche Quantitäten nicht zu verarbeiten im Stande ist; ein Theil derselben wird verschluckt und kann namentlich bei Kindern Magendarmkatarrhe, Diarrhoen erzeugen, ein anderer Theil fliesst aus dem Munde ab und nöthigt die Kranken zu beständigem Ausspucken und Vorhalten des Taschentuches mit Störung der Nachtruhe, Husten etc. Bei der grossen Sensibilität der Haut, namentlich bei Kindern, entwickelt sich Röthung und Erosion des Halses und des Kinnes, ebenso kann nach Vogel durch die anhaltende Durchnässung der Kleidungsstücke und die dadurch bedingte Abkühlung des Thorax Bronchialkatarrh entstehen.

Eine Folge der vermehrten Ausscheidung des Speichels ist die verminderte Ausscheidung des Harns, sowie die abnorme Trockenheit der Fäces; zuweilen kommt es zur Abmagerung, welche wohl auf Rechnung des Appetitmangels in Folge der Verdünnung des Magensaftes und der beschränkten Verdauung der Amylaceen zu setzen ist.

Die Farbe des Speichels ist fast immer durch Beimengung von Epithelien trübe und opalisirend; bald ist er mehr zähe und fadenziehend, bald dünn und wässerig; bei Stomatitis hat er einen faden, ja üblen Geruch.

Das specifische Gewicht des Speichels ist im Anfange sehr beträchtlich (bis zu 1059) erhöht, sinkt aber allmälig immer mehr unter die Norm und beträgt oft nur 1001. Seine Reaction ist verschieden, bald normal, bald alkalisch oder sauer, selbst neutral. Der Gehalt an Rhodankalium ist meist beträchtlich vermindert; bei Mercurialptyalismus lässt sich nach Bamberger auf galvanischem Wege Quecksilber nachweisen.

Die Dauer der Affection ist sehr verschieden und schwankt von wenigen Minuten, Stunden und Tagen bis zu mehreren Monaten, selbst Jahren, je nach der Grundkrankheit. Der nervöse Ptyalismus ist sehr oft intermittirend, d. h. er tritt in grösseren und kleineren Intervallen auf.

Die Prognose ist in der Regel günstig, wenn auch, wie bereits erwähnt, bei sehr langer Dauer desselben Ernährungsstörungen beobachtet werden. Die Heilung erfolgt selten plötzlich, fast immer allmälig.

Die Therapie der Salivation kann nur selten, so namentlich bei der durch Mercur oder Jod etc. verursachten, eine prophylaktische sein; dass man mit der Darreichung des immer noch als Laxans so sehr beliebten Calomel im Verlaufe acuter Krankheiten vorsichtig sein muss, wurde bereits gelegentlich der Besprechung der Stomacace und der Noma erwähnt. Selbstverständlich muss bei den ersten Symptomen der Salivation das betreffende Medicament sofort und vollständig ausgesetzt werden. Krankheiten des Mundes, des Rachens und der Nase, sowie der Zähne, des Magendarmcanals, der Genitalien sind in entsprechender Weise zu behandeln. Schwierig ist die Behandlung jener Fälle, bei denen sich die Ursache nicht nachweisen lässt. Zuweilen gelingt es durch Anregung der Secretion der Haut, des Darmes oder der Nieren, durch Douchen, Dampfbäder, Frottirungen und sonstige Hautreize, durch milde Laxantia, sowie durch reichliches Wassertrinken Besserung zu erzielen.

Am hartnäckigsten ist der nervöse Ptyalismus, sowie jener der Schwangeren; noch am ehesten weicht derselbe dem Opium, Chloral, Morphium, Bromkalium, dem Arsenik oder der Tinct. Valer. Andere haben von Atropin 0·006—0·001 (innerlich und subcutan) und Pilocarpin, Plumb. acet. und Jodkali, Antipyrin, sowie subcutaner Injection von Cocaïn, Heymann von Bepinselungen mit Pyoctanin 1 : 1000 Erfolge gesehen.

Local, besonders bei gleichzeitiger Entzündung der Mundschleimhaut, empfehlen sich adstringirende Mundwässer.

Dass auch auf passende Ernährung, namentlich auf möglichste Beschränkung der Amylaceen Rücksicht zu nehmen sei, ist natürlich.

Verminderung der Speichelsecretion, Aptyalismus, Xerostomie.

Sie tritt auf nach Einverleibung gewisser Gifte, so namentlich von Atropin, Cicutin, Daturin, Jodäthylstrychnin und Nicotin in Folge der Lähmung der speichelsecernirenden Nerven; auch Arsenik, Alkalien und diluirte Säuren, sowie das Cocaïn sollen eine Abnahme der Speichelsecretion zur Folge haben. Bei Facialislähmung wird zuweilen eine Verminderung der Speichelsecretion auf der gelähmten Seite beobachtet, ebenso bei Sympathicuslähmung. Verringerung, selbst völlige Sistirung der Speichelsecretion beobachtet man ferner bei Verschluss der Ausführungsgänge der Speicheldrüsen, bei hohem Fieber, bei vermehrter Diurese (Diabetes mellitus und insipidus, Schrumpfniere), bei gesteigerter Diaphorese und profusen Diarrhoen (Cholera). Auch bei Hypochondern und Hysterischen, sowie im höheren Alter beobachtet man nicht selten in Folge von Verminderung der Speichelsecretion äusserst lästige Trockenheit der Mundrachenhöhle; man wird umsoweniger fehlgehen, die senile Speichelverminderung auf Atrophie der Speicheldrüsen zurückzuführen, als alle Versuche, die Speichelsecretion auf reflectorischem Wege durch Kauen reizender Mittel, Rheum, Tinct. Spilantis, Tinct. Pyrethri etc. anzuregen, sich in der Regel völlig nutzlos erweisen.

Die Xerostomie in Folge mangelnder Speichelsecretion tritt nach Hadden, Hutchinson und Seifert zuweilen bei Gesunden nach nervösen Erschütterungen oder nach Mumps oder auch ohne nachweisbare Ursache auf und hat durch mangelhafte Einspeichelung des Genossenen Beschwerden beim Schlucken und ein höchst unangenehmes Gefühl von Trockenheit im Munde zur Folge. Von der Stomatitis sicca unterscheidet sich die Xerostomie durch den Mangel an entzündlicher Röthe der Schleimhaut und vertrocknetem Secret.

Die Behandlung hat sich nach der Ursache zu richten; bei fieberhaften Krankheiten ist häufige Befeuchtung der Mundhöhle mit säuerlichen oder kohlensäurehaltigen Getränken angezeigt, bei den übrigen Formen suche man die Secretion auf reflectorischem Wege durch die oben genannten reizenden Mittel anzuregen; auch der constante Strom mit Einführen des einen Poles in Form einer Silbersonde in den Duct. Stenon. ist zu versuchen. Seifert verordnet Pilocarpin 0·25 : 10·0, Aq. destill. und lässt davon anfangs 5 Tropfen, später 8—9 Tropfen langsam steigend nehmen; dieses Mittel kann ohne Schaden monatelang gebraucht werden.

Parotitis epidemica.

Unter den Speicheldrüsen wird unstreitig die Parotis am häufigsten von Entzündungsprocessen befallen.

Die Parotitis kann eine primäre oder idiopathische und eine secundäre oder metastatische sein. Die letztere Form wird auch, da sie häufig mit Eiterung einhergeht, Parotitis suppurativa genannt.

In der Aetiologie der primären idiopatischen Parotitis spielen Affectionen der Mundhöhle, Verletzungen, Fremdkörper und Concretionen des Duct. Stenon, sowie Entzündungsprocesse der Nachbarschaft, Erkältungen und Intoxicationen nur eine sehr untergeordnete Rolle. Noch am ehesten können Kiefercaries sowie Mittelohreiterungen mit Uebergehung des äusseren Gehörganges durch die Fissura Glasseri Parotitis und Pharyngitis zur Folge haben.

Die idiopathische Parotitis ist meistens eine Infectionskrankheit und tritt demgemäss auch meist epidemisch auf. Wenn wir auch zur Zeit über die Beschaffenheit des Giftes noch im Unklaren sind, so lassen sich doch die verschiedenen Symptome nur aus der Annahme einer Infection erklären. Die Parotitis epidemica ist eine rein contagiöse Erkrankung, welche nur durch Vermittlung des specifischen, von einem Parotiskranken herstammenden Giftes mikroparasitischer Natur, meist durch directen Verkehr, aber auch durch dritte gesunde Personen verbreitet wird. Ob der Infectionsstoff zuerst in's Blut oder von der Mundhöhle aus durch den Ausführungsgang in die Drüse gelangt, ist noch unentschieden. Die Parotitis epidemica ist keine locale Infectionskrankheit, sondern eine infectiöse Allgemeinerkrankung mit primärer Localisation in den Speicheldrüsen. Sie befällt mit Vorliebe Kinder vom 2. bis 15. Lebensjahre, doch ist auch das Jünglingsalter noch ziemlich stark betheiligt und bleibt auch das Mannesalter nicht verschont, während das Säuglings- und Greisenalter eine auffallende Immunität zeigt; das männliche Geschlecht prädisponirt ganz besonders, auch kommt die Krankheit zur kälteren Jahreszeit, namentlich im Herbst und Frühjahr, häufiger vor. Sie beschränkt sich manchmal auf die Wohnung einer Familie, auf eine Erziehungsanstalt, ein Waisenhaus, ein Cadettencorps, eine Kaserne, einen Krankensaal, verbreitet sich aber auch auf alle Stockwerke eines Hauses, auf ein ganzes Dorf, eine Stadt, eine Provinz. Die Ausbreitung der Krankheit geht in der Regel langsam von statten, doch besitzt das Gift eine ausserordentliche und, wie es scheint, auch durch hohe Hitzegrade nicht zu vernichtende Tenacität. Die Dauer der Incubation schwankt nach den Angaben der verschiedenen Autoren zwischen 3—22 Tagen. Roth fixirte auf Grund einiger sehr beweiskräftiger Beobachtungen neuerdings die Incubationszeit auf 18 Tage, Lühe auf 20—22 Tage.

Das anatomische Substrat der epidemischen Parotitis bildet einestheils der Katarrh der Speicheldrüsengänge und fluxionäre Hyper-

ämie der Drüsenzellen, anderntheils die Schwellung des interacinösen und periglandulären Bindegewebes. Von Manchen, wie z. B. Gerhardt, Lebert, wird die Bezeichnung Periparotitis für passender erachtet, zumal die Function der Drüse während der Entzündung nicht wesentlich gehemmt ist.

Die Krankheit beginnt mit einem zuweilen deutlichen, zuweilen wenig ausgesprochenen Prodromalstadium, mit Allgemeinerscheinungen, Schüttelfrost, leichtem Frieren, Müdigkeit, Appetitmangel, Schlaflosigkeit, sowie mit flüchtigen Stichen vor dem Ohre oder einem Gefühle von Spannung beim Oeffnen des Mundes. Nach 2—3 Tagen, zuweilen schon früher, treten die Erscheinungen von Seite der Parotis mehr in den Vordergrund; das Oeffnen des Mundes sowie das Kauen ist schmerzhaft, die Gegend vor und unter dem Ohre oder der Raum zwischen dem Unterkieferwinkel und Proc. mastoideus ist geschwellt; die Schwellung erstreckt sich allmälig nach allen Richtungen hin, so dass das Ohrläppchen und die Ohrmuschel nach aussen gedrängt und abgehoben, die Gegend vor dem äusseren Gehörgang und am Proc. zygomaticus vorgewölbt erscheint; meist setzt sich die Schwellung auf die Wange und Lippe sowie die obere seitliche Halsgegend einerseits und die Augenlider und Orbita andererseits fort und erzeugt eine komische Verbreiterung und Entstellung des Gesichtes, welcher Umstand der Krankheit die Bezeichnung Tölpel, Bauernwetzel, Ziegenpeter, Mumps eintrug. Bald tritt die Affection halbseitig auf, bald doppelseitig. An der Schwellung der Parotis betheiligen sich noch anderweitige Drüsen, in erster Linie die Submaxillaris und Sublingualis, welche zuweilen allein oder wenigstens früher und stärker befallen werden, als die Parotis; ferner schwellen die Cervical-, Jugular- und Axillarlymphdrüsen sowie die Milz, worauf Gerhardt zuerst aufmerksam machte.

Bleibt auch meist die Schwellung der Parotis in Folge des Widerstandes der Fascia colli prof. und buccopharyngea eine oberflächliche, so kann dieselbe doch auch in die Tiefe dringend die seitliche Rachenwand und den Isthmus faucium mehr oder weniger bei Seite schieben, wodurch Schlingbeschwerden, anginöse Sprache, sogar Heiserkeit und Dyspnoe entstehen. Die Schlingbeschwerden sind theils bedingt durch directen Druck auf den Pharynx und die Zungenwurzel, theils durch die behinderte Function der Halsmuskeln in Folge des Druckes der vergrösserten Submaxillar- und Lymphdrüsen oder durch die zuweilen sehr stark ausgebildete Stomatitis und Pharyngitis. Die Kranken vermeiden ängstlich das Oeffnen des Mundes sowie das Kauen, halten den Kopf gerade und steif, klagen über Stechen, Sausen und Schwerhörigkeit. Kinder sind unruhig, missmuthig, apathisch, greifen beständig in die Gegend des Ohres, haben keinen Appetit und Schlaf. Die Haut über der Geschwulst ist gespannt, blass oder geröthet, ödematös und glänzend. Constant ist Fieber vorhanden, das zuweilen kaum bemerkbar, zuweilen deutlich ausgesprochen ist. Der Typus desselben ist ziemlich unregelmässig, doch sind meist abendliche Exacerbationen und Morgenremissionen zu constatiren. Das Fieber

hält sich zuweilen oft mehrere Tage in der Höhe von 39·5—40·0 und kann sogar in seltenen Fällen den Charakter der typhösen mit Apathie, Delirium, Somnolenz annehmen.

Ausser den Lymphdrüsen und der Milz betheiligen sich auffallenderweise besonders gerne die Genitalorgane. Die männlichen sind besonders bevorzugt, namentlich zur Zeit der Pubertät, dagegen selten afficirt bei Knaben oder Greisen. Die Orchitis parotidea befällt häufig nur einen und dann hauptsächlich den rechten, seltener beide Hoden; bald ist der Hoden allein ergriffen, bald der Nebenhode, bald beide, auch gesellt sich zuweilen acutes Oedem der Scrotalhaut und Hydrocele hinzu. Das Auftreten dieser Complication kündigt sich in der Regel durch erneutes oder erhöhtes Fieber, sowie durch ziehende und drückende Schmerzen im Hodensacke, der Leistengegend, den Obersehenkeln an. Meist geht die Orchitis in Zertheilung über, zuweilen bleibt Atrophie des Hoden mit Impotenz zurück, ab und zu gesellt sich zu ihr eine Entzündung des Samenstranges und Cystitis und Urethralblennorrhoe.

Bei dem weiblichen Geschlecht, zuweilen auch beim männlichen, beobachtet man Schwellung der Brustdrüsen, ferner Entzündungen der Vulva, der Vagina, der Eierstöcke mit mehr oder weniger beträchtlichen Schmerzen.

Ueber die Bedeutung dieser Complicationen war man von jeher getheilter Meinung. Während die Einen in denselben Metastasen erblicken, halten die Anderen dieselben für secundäre Localisationen des specifischen Giftes der Parotitis, wie bei Masern die Bronchitis, bei Scharlach die Rachen-, Nieren- und Gelenksaffection. Dass zwischen der Parotis und den Geschlechtstheilen ein Zusammenhang besteht, ergibt sich sowohl aus dem namentlich von Kocher beobachteten gehäuften Vorkommen von Hodenentzündungen ohne Erkrankung der Parotis im Verlaufe von Mumpsepidemien, als auch aus dem mehrfach constatirten Auftreten der Parotitis nach Ovariotomien, Hysterotomien und anderen Operationen an den weiblichen Geschlechtstheilen.

v. Preuschen, Rüttermann und Bumm glauben, dass es sich dabei um eine Infection handle, zumal der letztere sowohl in der Mundhöhle als auch in dem vereiterten Drüsengewebe Streptokokken fand. Die Infection kann sowohl vom Blute aus stattfinden, als ganz besonders auch von der Mundhöhle aus, in welcher in Folge der absoluten Diät, der mangelhaften Reinigung und vielleicht dem auf die Chloroformnarkose folgenden Aptyalismus eine Infection besonders erleichtert wird.

Die Parotitis der Ovariotomirten ist bald einseitig, bald doppelseitig, bald auf derselben Seite, wo das Ovarium entfernt wurde, bald auf der entgegengesetzten. Sie hat eine grosse Neigung, phlegmonös zu werden, und kann so eine lebensgefährliche Complication abgeben.

Ueber Complicationen der Parotitis simplex mit Affectionen des Gehirns, Meningitis, Hemiplegie, Aphasie, Sprachfehlern, Anästhesie liegen aus der neueren Zeit, so besonders von Lannois und Lemoine, beglaubigte Beobachtungen vor.

Die Dauer der Krankheit ist, je nach dem Charakter der Epidemie, sehr verschieden. Leichte Fälle gehen meist schon nach 3 bis 5 Tagen in Zertheilung über, schwerere, besonders solche mit Tendenz zur Abscedirung oder mit Complicationen in den Geschlechtsorganen, dauern meist 2—4 Wochen; noch langwieriger wird der Verlauf, wenn, wie wiederholt beobachtet wurde, Recidive eintritt; sie erfolgt dann meist 8—14 Tage, seltener, wie in einem von Gerhardt mitgetheilten Falle, 19 Tage nach völliger Rückbildung der ersten Attaque.

Die Prognose der epidemischen Form ist günstig, indem die Affection fast stets mit Zertheilung endet und nur ausnahmsweise in Abscedirung übergeht; bei bösartigen Epidemien kann immerhin durch die Höhe des Fiebers, Behinderung der Respiration und umfangreiche Drüsenvereiterung, Entzündung des Halszellgewebes und andere Complicationen das Leben in Gefahr kommen; auch sah man wiederholt acute Nephritis, Hämaturie auftreten, sowie Lähmung des Facialis, Sehstörungen, hochgradige Schwerhörigkeit und unheilbare Taubheit zurückbleiben, die nach Kipp in Embolien des Labyrinthes oder der Schnecke ihren Grund haben soll.

Die Diagnose ist bei Berücksichtigung der subjectiven und objectiven Erscheinungen, wenn es bereits zur Entstellung des Gesichtes gekommen, ausserordentlich leicht, zumal Verwechslungen mit Schwellung der Halslymphdrüsen nur bei völliger Unkenntniss der Anatomie möglich sind; schwieriger ist die Diagnose, wenn die Affection nicht die Parotis, sondern die Submaxillaris oder Sublingualis befällt, doch führt die bald sich anschliessende Mitbetheiligung der Parotis, sowie die vorausgegangene oder gleichzeitige Erkrankung eines oder mehrerer Familienmitglieder, das Herrschen einer Epidemie, auf die richtige Spur.

Die Behandlung kann in leichten Fällen eine exspectative sein; in schwereren Fällen, besonders bei hohem Fieber, gebe man Antifebrin, Chinin, Natr. salicyl., sorge für offenen Stuhl, aber nicht mittelst Calomel, sondern mittelst Natr. sulfur., Rheum, Ol. Ricini. Einige wollen von Brechmitteln im Beginne der Krankheit wesentliche Erleichterung gesehen haben; Andere erblicken in dem Pilocarpin insoferne ein Specificum, als schon nach 3 Stunden, selbst in schweren Fällen, Fieber und Geschwulst auffallend zurückgehen sollen. Local empfehlen sich Einreibungen mit Fett, Olivenöl oder Vaselin, sowie Bedecken mit Watte. Bei zögernder Rückbildung oder Induration empfehlen sich Bepinselungen mit Jodtinctur oder Jodoformcollodium 1:15. Die Orchitis behandle man mit passender Lagerung und kalten Umschlägen oder Eisbeutel. Bei Erkrankung der weiblichen Genitalien sind lauwarme Einspritzungen, warme Umschläge und Sitzbäder indicirt. Bei Dysphagie setze man Blutegel und lasse Eis gurgeln oder scarificire die ödematösen Stellen. Abscesse müssen gezeitigt und bald eröffnet werden. Bei zögernder Rückbildung resp. chronischer Hyperplasie empfiehlt sich die Massage, sowie das Ansetzen von Blutegeln.

Parotitis suppurativa.

Eine ungleich schwerere Erkrankung ist die suppurative oder metastatische Parotitis.

Sie schliesst sich meist an Infectionskrankheiten, so namentlich Abdominal-, exanthematischen oder Rückfalltyphus sowie an Scharlach an, wird aber auch zuweilen bei Masern, Variola, Puerperalfieber, Erysipel, Pyämie, Pneumonie, Cholera, Tuberculose, Carcinose, sowie bei Ovariotomirten und nach Trauma, Zahncaries, Periostitis der Schädelknochen, Otorrhoe oder bei Speichelsteinen angetroffen.

Ueber die Ursache der typhösen Parotitis waren die Ansichten früher sehr getheilt. Während die Einen dieselbe durch Eindringen von Entzündungserregern in den Duct. Stenon. von der entzündeten und mangelhaft gereinigten Mundhöhle aus entstehen liessen, hielten Andere, wie Hoffmann, die durch die Temperatursteigerung erzeugte parenchymatöse Degeneration des Drüsengewebes für die Ursache. Neuerdings kam Dunin zu dem Resultate, dass die eitrigen Entzündungen im Verlaufe des Typhus, also auch die Parotitis, nicht durch specifische Typhusbacillen, sondern durch Eitermikrokokken bedingt sind. Diese letzteren kommen durch das Blut in die Speicheldrüsen; in das Blut gelangen sie aber vom Darme aus, und zwar zu der Zeit, in welcher sich die Schorfe im Darme abstossen. Hanau behauptet, die Parotitis sei niemals metastatischer Natur; der Eiterungsprocess beginne immer zuerst in den grossen Ausführungsgängen der Speicheldrüsen, von hier gelangen die Kokken in die kleineren Gänge und schliesslich in's Parenchym der Drüse, wo sie multiple Abscesse bilden. Die Sistirung der Speichelsecretion scheine bei der Entstehung der Krankheit eine begünstigende Rolle zu spielen.

Die subjectiven Erscheinungen der secundären meist suppurirenden Parotitis sind im Anfange mit denen der idiopathischen identisch. Bei dem meist schweren Darniederliegen der Kranken und der oft gestörten Gehirnfunction sind die Klagen über Schmerzen im Ohre oder beim Oeffnen des Mundes etc. nicht sehr ausgesprochen. Die Schwellung ist meist sehr beträchtlich, mit der Bildung des Eiters röthet sich die Haut, es zeigt sich Fluctuation und die Reifung ist meist in wenigen Tagen, in protrahirten Fällen aber erst nach Wochen vollendet. Meist macht sich eine nicht unbeträchtliche Temperaturerhöhung bemerkbar. Der Zerfall localisirt sich nicht nur auf die Parotis, sondern schreitet auf die Nachbarschaft weiter und führt zu Venenthrombose, Vereiterung der Kaumuskeln und Caries der Gesichts- und Schädelknochen, zu Gangrän, Pyämie oder Meningitis. Der Durchbruch des Eiters erfolgt entweder nach dem äusseren Gehörgang zu oder durch die Haut über der Parotis; sehr grosse Gefahr besteht auch bei Senkung des Eiters zwischen die Blätter der Halsfascie. Läsion des Facialis hat öfters Lähmung einzelner Gesichtsmuskeln zur Folge.

Die Parotitis suppurativa tritt meist erst in der dritten oder vierten Woche und fast nur bei sehr schweren Typhen auf und muss als eine sehr schlimme Complication betrachtet werden, weil sie durch neues Fieber dem Kräfteverfall Vorschub leistet oder direct durch Pyämie das Leben bedroht.

Die Prognose ist um so ungünstiger, je frühzeitiger die Affection im Verlaufe der oben genannten Krankheiten auftritt und je geschwächter das befallene Individuum ist; immerhin ist ein glücklicher Ausgang nicht ausgeschlossen.

Als eine höchst merkwürdige Erscheinung muss die nach Heilung mancher Parotisabscesse zurückbleibende Ephidrosis parotidea bezeichnet werden. Ueber der Haut der Parotis wird beim Kauen eine klare Flüssigkeit ausgeschwitzt, während in der Ruhezeit zwischen den Mahlzeiten nichts zu bemerken ist.

Die Behandlung hat sich, wenn es nicht gelingt, die Entzündung durch Antiphlogose niederzuhalten, die möglichst frühzeitige Entfernung des Eiters zur Hauptaufgabe zu stellen. Da zuweilen die Duct. Stenon. verlegt sind, so empfiehlt es sich, durch Einführen von Canülen, sowie durch Druck auf die Parotis und Ausstreichen der Ausführungsgänge allenfallsige Hindernisse zu beseitigen und den Eiter zu entleeren. Gelingt dies nicht, so schreite man nach vorheriger Cataplasmirung zur Eröffnung mit dem Messer; der Schnitt soll entweder ausserhalb des Bereiches der Blutgefässe und des N. facialis gelegt werden oder, wenn nöthig, parallel mit denselben gehen und die Fascia parotidea durchdringen; antiseptischer Verband, sowie Drainage ist unbedingt nöthig. Dass bei heruntergekommenen Kranken auf roborirende Diät, Alcoholica und Chinin ein Hauptaugenmerk zu richten ist, ist selbstverständlich.

Sialodochitis.

Aehnliche Erscheinungen wie die Entzündung der Parotis macht die Verlegung oder Verstopfung ihres Ausführungsganges durch Fremdkörper, wie Himbeer- oder Johannisbeerkerne, durch Speichelsteine oder durch fibrinös-eitrige Entzündung (Sialodochitis fibrinosa Stenoniana). Kussmaul beobachtete eine periodisch, gewöhnlich beim Essen auftretende, mit beträchtlichen Schmerzen einhergehende Schwellung der Parotis mit Röthung der Haut. Bei Druck entleerte sich ein länglicher, fadenförmiger, fibrinöser Pfropf, dann folgte Speichel nach, worauf die Geschwulst abnahm und der Schmerz verschwand. Es kann in solchen Fällen wohl weniger von einer Entzündung als von Fluxion und Oedem der Drüsen und ihrer Nachbarschaft die Rede sein.

Derselbe Process mit demselben Verlaufe wurde von Ipscher, Schäffer und Beregszászy in der Submaxillaris resp. dem

Ductus Whartonianus beobachtet. In dem Falle von Ipscher entleerte sich bei Druck auf die geschwellte rechte Submaxillaris ein fibrinöser Pfropf und eine ansehnliche Menge Speichel, in dem Falle von Schäffer entleerten sich ausser Eiter auch einige Concremente, in dem Falle von Beregszászy betraf die Erkrankung beide Wharton'schen Gänge; es war starker Speichelfluss, Schmerz unter der Zunge und undeutliche Sprache vorhanden, der Eiter quoll namentlich nach Sondirung der Gänge reichlich hervor. Von Jahn wurden zwei weitere Fälle beschrieben, die nach Erkältung auftraten; im Ductus Warthon. sass ein Pfropf, nach dessen Entfernung sich Speichel entleerte; die Anschwellung der Drüse und ihres Ausführungsganges wiederholte sich mehrere Male.

Erkrankungen der Submaxillaris und Sublingualis.

Dieselben Krankheiten, welche die Parotis treffen, spielen sich auch in den anderen Speicheldrüsen ab. Am häufigsten geben entzündliche, namentlich ulceröse Processe der Mundrachenhöhle, sowie maligne Neubildungen zu sympathischen Schwellungen Anlass.

Primär erkrankt ziemlich häufig die Submaxillaris entweder allein oder in Verbindung mit der Parotis. Selbstständige Affectionen der Submaxillaris oder Sublingualis ohne Mitbetheiligung der Parotis während des Verlaufes von Mumpsepidemien wurden wiederholt von Fehr, Penzoldt, Soltmann und namentlich von Wertheimber beobachtet und als submaxillarer Mumps beschrieben; auch Henoch erwähnt einen solchen Fall bei einem Erwachsenen, dem im Verlaufe der Erkrankung der rechte Hoden anschwoll. Viel seltener wird die Sublingualis in ähnlicher Weise ergriffen. Nach Wertheimber kann sogar mit Umgehung sämmtlicher Speicheldrüsen die Mumpsinfection sich nur durch entzündliche Schwellung der cervicalen Lymphdrüsen oder nur durch das Auftreten einer Orchitis äussern. Der submaxillare Mumps ist ebenso infectiös wie jener der Parotis. Acute Infectionskrankheiten, namentlich Scharlach, Diphtherie, Typhus, phlegmonöse Angina, ferner ulceröse Stomatitis, Periostitis des Unterkiefers, Scrophulose, Tuberculose, führen nicht selten zu suppurativer Entzündung. Auch die Syphilis spielt eine Rolle; abgesehen von der häufigen indolenten Schwellung bei Primäraffecten der Mundrachenhöhle, sind gummöse Geschwülste mit oder ohne Zerfall in der Parotis, Submaxillaris und Sublingualis sicher constatirt.

Bei der phlegmonösen Form entsteht in der Regel einseitig, selten doppelseitig, an dem inneren unteren Rande des Unterkiefers mit oder ohne Fieber unter Schmerz und Spannung, sowie Unmöglichkeit, den Mund weit zu öffnen und zu kauen, eine pralle, derbe Geschwulst, welche bald langsam, bald schnell sowohl nach hinten

gegen das Ohr als auch gegen das Kinn zu sich vergrössert. Betrifft die Entzündung die Sublingualis, so entwickelt sich die Geschwulst in der Mitte zwischen den Unterkieferästen und wölbt die Haut unter und hinter dem Kinne vor sich her. Zuweilen erfolgt der Durchbruch des Eiters nach der Mundhöhle zu spontan und unerwartet, meist jedoch wird die Haut über der Geschwulst mit der letzteren verlöthet, sie röthet sich und zeigt Fluctuation; nicht selten erfolgt die Perforation gleichzeitig nach innen und nach aussen, der entleerte Eiter ist sehr übelriechend und mit Fibrin- und Gewebsfetzen untermischt.

Die Diagnose ist bei Berücksichtigung der anatomischen Verhältnisse nicht schwer; nehmen, wie dies öfters vorkommt, die benachbarten Lymphdrüsen an der Entzündung Theil, so ist es oft unmöglich, zu bestimmen, von wo die Krankheit ihren Ausgang nahm. Schliesslich ist auch nicht zu vergessen, dass die Actinomykose unter dem Bilde einer acuten Phlegmone der Submaxillargegend auftreten kann. Die Diagnose auf submaxillären Mumps lässt sich nur auf das gleichzeitige Vorkommen von Parotitis epidemica oder die nachfolgende Infection anderer Personen stützen.

Die Behandlung muss im Anfange bestrebt sein, durch resorbirende Mittel, Einpinselungen von Jod und Jodoformcollodium oder Einreibung von Ung. ciner., feuchtwarme Umschläge, die Geschwulst zurückzubilden. Gelingt dies nicht, so schreite man zur Cataplasmirung; zeigt sich Fluctuation, so indicire man sofort und schaffe dem Eiter durch Einlegen von Drainröhren Abfluss. Bei Perforation in die Mundhöhle verordne man desinficirende Mundwässer.

Angina Ludovici.

Mit diesem Namen oder als Cynanche cellularis maligna bezeichnet man eine entzündliche Infiltration des Mundbodens und der oberen seitlichen oder mittleren Halsgegend, welche von einer Entzündung der Submaxillaris oder nach König der benachbarten Lymphdrüsen und des dieselben umgebenden Bindegewebes ihren Ausgang nimmt.

Von der im vorigen Capitel beschriebenen Phlegmone der Submaxillaris unterscheidet sich die Angina Ludovici — nach dem Württemberger Arzte Ludwig (1836), ihrem ersten Beschreiber, so genannt — nicht nur durch die mit Mitbetheiligung des die Submaxillaris umgebenden Bindegewebes, sondern auch durch ihre weite Ausbreitung hinter der Fascie zwischen Unterkiefer, Zungenbein, Mylohyoideus und der Sehne des Digastricus. Einige französische Autoren behaupten, dass die Affection mit der Submaxillaris gar nichts zu thun habe, sondern eine eigengeartete infectiöse Krankheit vorstelle. Dass die letzte Ursache in der Einwanderung von Mikroorganismen, Streptococcus, Staphylococcus, das heisst in einer Infection vielleicht auf eine

epithelentblösste Stelle der Mundschleimhaut zu suchen sei, ist um so wahrscheinlicher, als von Roser und Anderen ein epidemisches Auftreten der Krankheit beobachtet wurde.

Aetiologisch spielen Verletzungen, Fall oder Stoss auf den Mundboden, ganz besonders aber acute Infectionskrankheiten, Scharlach, Masern, Typhus, Diphtherie, Variola, wahrscheinlich auch Scrophulose, Tuberculose und Syphilis die Hauptrolle. In zweiter Linie stehen jene Krankheiten, welche sympathische Schwellungen der Submaxillaris und der ihr benachbarten Lymphdrüsen zur Folge haben können. Dazu gehören phlegmonöse, erysipelatöse, diphtheritische, gangränöse Anginen und ulceröse Processe der Mundhöhle, ferner bei Kindern Eczeme des Ohres und Gesichtes. Anderweitige Infiltrate des Mundbodens, wie z. B. nach Caries des Unterkiefers, Erkrankungen der Zähne etc oder nach Eindringen von Fremdkörpern, gehören jedoch nicht hieher.

Die Angina Ludovici ist häufiger einseitig und kommt in jedem Lebensalter vor. Die Krankheit beginnt meist fieberlos oder mit geringer Temperaturerhöhung mit einem Gefühle von Spannung in der Gegend des Unterkieferwinkels beim Mundöffnen und Schlucken; die epidemisch auftretende Form hingegen beginnt fast stets mit Schüttelfrost und heftigem Fieber.

Der palpirende Finger entdeckt etwas nach vorne und innen vom Unterkieferwinkel eine circumscripte harte Schwellung, welche anfangs wenig schmerzt, allmälig aber schmerzhafter und immer grösser wird, die Mittellinie überschreitet und bald den ganzen Raum zwischen den Aesten des Unterkiefers ausfüllt. Die das brettharte Infiltrat überkleidende Haut ist anfangs normal, röthet sich aber später im Ganzen oder an einzelnen Stellen oder wird ödematös. Das Oeffnen des Mundes und das Schlucken wird immer schwieriger, die Sprache undeutlich, weil die Zunge durch das Infiltrat am Mundboden an den Gaumen oder gegen den Larynx angedrückt und das Hervorstrecken der Zunge unmöglich wird. In hochgradigen Fällen kommt es theils durch Oedem der Schleimhaut des Larynx, theils durch Compression der Trachea durch das sich mehr und mehr ausdehnende Infiltrat zu Dyspnoe und Asphyxie, durch Compression der Jugularvenen zu Cyanose des Gesichts, Schwindelanfällen, Ohnmacht, oder bei Thrombosirung zu Meningitis. In den gewöhnlichen Fällen spitzt sich die das Infiltrat überziehende Haut zu oder sie wird an einer Stelle ödematös und dann gangränös, es tritt Fluctuation ein und es entleert sich künstlich oder spontan ein übelriechender, jauchiger, mit brandigen Gewebsfetzen vermischter Eiter; nicht selten werden grössere Hautstrecken gangränös oder es bleiben eiternde Fistelgänge und entstellende, die Bewegungen der Halsmuskeln beeinträchtigende Narben zurück. In sehr schweren Fällen gesellen sich zu den localen Erscheinungen Symptome der Pyämie, heftiges Fieber mit Schüttelfrösten, icterische Färbung der Haut, Delirien, Adynamie, Schweisse, Diarrhoen, Affectionen der Gelenke und Albuminurie.

Die Prognose ist im Allgemeinen nicht so schlecht, als sie von manchen Autoren gestellt wird; Roser betont mit Recht, dass sie um so günstiger ist, je energischer und frühzeitiger eingegriffen wird; dass sehr schwere Fälle durch Mitbetheiligung des Kehlkopfes, durch Pyämie und Sepsis oder durch Blutung, Senkung des Eiters in's Mediastinum, Venenthrombose des Gehirns etc. eine sehr ungünstige Prognose geben, ist verständlich; immerhin kann aber auch in solchen verzweifelten Fällen noch Genesung eintreten, wie Verf. bei einem 6jährigen Knaben beobachtete, bei dem die Affection nach Scharlach aufgetreten war und bei dem sich bereits das volle Bild der Sepsis, Petechien der Haut, Darmblutungen und Nierenblutungen entwickelt hatten. Die Rückbildung des Infiltrates ohne Abscedirung ist der günstigste, aber auch seltenste Ausgang.

Die Therapie muss im Anfange eine antiphlogistische sein; man versuche durch Eisumschläge, Einpinselungen von Jod, Jodoformcollodium, Einreibungen von Ung. ciner. die Ausbreitung des Infiltrates zu verhindern; auch von parenchymatösen Injectionen von 2% Carbollösung wollen Einige Erfolge gesehen haben. Später empfehlen sich trockene, heisse oder feuchtwarme Umschläge und vor Allem möglichst frühzeitige Incision. Roser empfiehlt, nur den Hautschnitt mit dem Messer zu machen, den Eiter aber mit einer vorsichtig vorgeschobenen Kornzange hinter der Halsfascie aufzusuchen. M. Schmidt empfiehlt lange, über die Grenze der Schwellung hinausgehende, vom Zungenbein bis zum Kinn reichende Scarificationen, die mit Jodoform- oder Dermatolpulver bestreut werden müssen. Fieber bekämpfe man mit Chinin, Antipyrin, Antifebrin, Adynamie mit Stimulantien, Erstickungsgefahr durch die Tracheotomie, welche bei starker Infiltration der Haut immer eine sehr schwierige ist und das Einlegen sehr langer Canülen oder in Ermangelung solcher das Einführen eines langen, derben Gummirohres nöthig macht. Die eröffnete Abscesshöhle tamponirt man am besten mit Jodoformgaze, die nach Rosenbach in 3% Lösung von essigsaurer Thonerde getaucht ist; sodann wird ein nasser mit derselben Lösung getränkter Verband mit Guttaperchaabschluss angelegt.

Geschwülste, Neubildungen und Concretionen.

Einfache Hyperthrophie der Parotis scheint nach den neueren Untersuchungen durchaus nicht so häufig zu sein, wie man früher annahm. Sie ist bedingt durch Wucherung aller die Drüse constituirenden Theile oder durch Fetteinlagerung oder Wucherung des interalveolären und periacinösen Bindegewebes. Idiopathische oder secundäre Entzündungen und Abscedirungen der Parotis sind die gewöhnlichen Ursachen der zurückbleibenden Vergrösserung; zweimal sah Verf. bei Männern, die in kurzer Zeit sehr fett geworden waren, eine doppelseitige, weiche, nicht schmerzhafte, das Gesicht sehr entstellende Hypertrophie resp. Fetteinlagerung.

Auch Luftgeschwülste der Wange kommen vor durch Hineingelangen von Luft in die Speicheldrüsen in Folge von übermässigem Blasen oder Pressen. So beobachteten Tillaux und Deichmüller eine taubeneigrosse Geschwulst über der Parotis, die sich theilweise durch Druck entleeren liess. Solche Geschwülste entstehen entweder durch vermehrte Drucksteigerung und Zerreissung des Duct. Stenon. oder des Drüsenparenchyms selbst.

Cystengeschwülste der Speicheldrüsen (Speichelgeschwülste) sind ziemlich häufig; sie können bis zu Hühnereigrösse wachsen und haben theils einen serösen, theils atheromartigen Inhalt.

Die Cystengeschwülste der Parotis verdanken theilweise dem Verschlusse des Speichelganges durch entzündlich-ulceröse Vorgänge in der Mundhöhle ihre Entstehung; sie entwickeln sich allmälig und schmerzlos, sitzen in der Wange, dem Verlaufe des Duct. Stenon. entlang, seltener auf der Parotis selbst. Ihre Grösse variirt sehr, übersteigt aber kaum die einer Wallnuss; sie sind hart und derb, zuweilen fluctuirend und bei Druck knisternd. Die Heilung erfolgt nach Wiedereröffnung des Ausführungsganges oder durch Verödung und Atrophie, manchmal nach Abscedirung der Parotis und Fistelbildung.

Zu den häufigsten Neoplasmen gehören auch Chondrome. Sie nehmen vom Bindegewebsgerüste der Drüse ihren Ursprung und stellen nach König solitäre Knoten von wirklich hyalinem Knorpel vor, die aus der Tiefe der Drüse, das Gewebe verdrängend, herauswachsen und als ein- oder mehrlappige Knoten auf der Oberfläche erscheinen. Auch Sarkome, sowie Uebergangsformen, Myxochondrome, Myxosarkome, Fibromyxochondrome, kommen nicht selten vor.

Gar nicht selten sind Gummageschwülste in der Parotis, dagegen gehört primäre Tuberculose, die, wie v. Stubenrauch beobachtete, unter dem Bilde einer Speichelcyste verlief, zu den allerseltensten Vorkommnissen.

Ziemlich häufig ist das Carcinom der Parotis: es tritt als Scirrhus und als Markschwamm, namentlich im höheren Alter, auf. Das erstere bildet höckerige, unebene, derbe Geschwülste, welche oft

Jahre zu ihrer Entwicklung bedürfen, zumal die Fascie dem Wachsthum derselben Widerstand leistet; ist diese aber einmal durchbrochen, dann treten consecutive Schwellungen der Lymphdrüsen und Zerfall ein; die weichen Carcinome wachsen sehr rasch, vergrössern sich nach allen Richtungen, dringen in die Mundrachenhöhle ein und verwandeln sich bald in jauchende Geschwüre.

Die Erscheinungen der Parotistumoren bestehen ausser in Entstellung des Gesichtes in Behinderung des Oeffnens des Mundes und Kauens, ferner in Schmerzen, Schwerhörigkeit, Facialislähmung, Compression des Pharynx und Larynx, bei Wachsthum in die Orbita in Amaurose etc.

Die Diagnose der Parotisgeschwülste stösst zuweilen auf grosse Hindernisse; im Allgemeinen halte man sich an die von König gegebene Regel, dass eine Geschwulst um so eher der Parotis angehört, je mehr sie die vergrösserten Conturen dieser Drüse zeigt.

Die Prognose richtet sich nach der Grösse und dem histologischen Baue; auch Sarkome geben, frühzeitig operirt, eine günstige Prognose, da sie weder recidiviren, noch Metastasen machen; selbst gutartige, circumscripte Neubildungen können unheilbare Facialislähmung zurücklassen.

Die Behandlung kann nur eine operative sein; zuvor versuche man parenchymatöse Injectionen von Jod oder Chlorzink oder den innerlichen Gebrauch des Arsen, welcher bei malignen Lymphosarkomen zuweilen einen entschiedenen Nutzen hat. Lassen diese Methoden im Stiche, dann schreite man zur Exstirpation der Parotis, deren Beschreibung in den Lehrbüchern der Chirurgie nachzuschlagen ist. Syphilome müssen antiluetisch behandelt werden.

Geschwülste der Sublingualis gehören zu den grössten Seltenheiten. Albert erwähnt zwei Fälle von Enchondromen, während M. Zeissl einen Fall von Adenom beschreibt.

Die Speicheldrüsen sind auch der Sitz von Fremdkörpern und Concretionen

Die ersteren gelangen theils von der Haut aus durch Verletzungen, theils von der Mundhöhle aus in die Drüsen oder in deren Ausführungsgänge. So beobachtete Wertheimer einen Johannisbeerkern in dem Duct. Wharton.

Wie in der Nase, so bilden sich auch in den Speicheldrüsen und deren Ausführungsgängen um kleine Fremdkörper Concretionen, die sogenannten Speichelsteine, welche meist die Grösse einer Erbse besitzen, aber auch hasel- und wallnussgross werden. Sie haben einen geschichteten Bau mit abwechselnd weissen und gelben Schichten und bestehen grösstentheils aus kohlensaurem und phosphorsaurem Kalk und Magnesia, kleinerentheils aus organischen Stoffen; Maas fand in ihnen äusserst zahlreiche Bacterien: die Farbe ist gewöhnlich hellweiss oder gelb; zuweilen scheinen sie congenital zu sein.

Die Erscheinungen der Concretionen beziehen sich auf die Verstopfung der Ausführungsgänge, der Speichel staut sich, die Drüse schwillt wie bei Parotitis und Sialodochitis an, wird spontan und auf Druck schmerzhaft und vereitert; nicht selten bleiben Speichelfisteln zurück.

Zur Diagnose ist die Palpation mit dem Finger eventuell Untersuchung der Ausführungsgänge der Drüsen mittelst Sonden oder kleiner Röhrchen unentbehrlich. Zuweilen sind die in der Sublingualis sitzenden Steine als weiss oder gelbweiss durchscheinende Körper unter der Zunge sichtbar.

Die Behandlung besteht in Dilatation des Duc. Stenon. oder Wharton. Führt diese nicht zum Ziele, dann müssen die Concretionen excidirt werden; nicht selten entleeren sich dieselben nach spontaner oder künstlicher Eröffnung des Abscesses von selbst.

II. Abtheilung.

Die Krankheiten des Rachens.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen.

Unter Rachen, Rachenhöhle, Schlundkopf, Pharynx, versteht man einen länglich-viereckigen Raum, der sich von der Basis des Hinterhaupt- und Keilbeines bis zur Vorderfläche des fünften Halswirbels herab erstreckt, nach vorne mit der Nase und Mundhöhle, seitlich mit dem Mittelohr und nach unten mit dem Kehlkopf und Oesophagus in Verbindung steht. Dieser Raum wird ausgekleidet von einem fibrösen Balkengerüste, welches, mit Schleimhaut überzogen, an die vordere Fläche der Halswirbelsäule angeheftet ist und zahlreiche Muskeln, Nerven, Drüsen und Gefässe enthält. Die Anheftung geschieht an der Wirbelsäule durch das retropharyngeale Zellgewebe, das mit der Aponeurose der prävertebralen Muskeln in Verbindung tritt. Aus anatomischen sowohl wie aus klinischen Gründen theilt man den Pharynx in mehrere Abschnitte; den oberen von der Basis des Keilbein-Hinterhauptbeines bis zur Uvula reichenden Theil bezeichnet man als Pars nasalis oder Nasenrachenraum, Cavum pharyngonasale, den von der Uvula bis zur Basis der Zunge reichenden Theil nennt man Pars oralis, den zwischen der Basis der Zunge oder auch zwischen der Spitze der Epiglottis und dem Eingange zum Oesophagus liegenden Abschnitt Pars laryngea.

Da, wie nicht zu leugnen, diese Eintheilung eine ziemlich willkürliche ist, schlug Rückert vor, nur zwei durch den Isthmus faucium strenge von einander geschiedene Abtheilungen, den oberen, den „Luftweg“, und den unteren, den „Speiseweg“, gelten zu lassen. So sehr auch Verf. diesen Vorschlag billigt, so ist doch aus praktischen Gründen die ältere Eintheilung beibehalten worden

Der Nasenrachenraum (siehe Fig. 15) hat beiläufig die Gestalt eines abgerundeten Würfels. Seine obere Wand, das Rachendach, wird gebildet durch den Keilbeinkörper und die Pars basilaris des Hinterhauptbeines; sie geht ohne scharfe Grenze in die hintere Wand über, an deren Bildung sich die Vorderfläche des Atlas und des ersten Halswirbels betheiligt. Die vordere Wand des Nasenrachenraumes wird gebildet durch die Choanen, den Vomer, den horizontalen Theil des Gaumenbeines, die flügelförmigen Fortsätze des Keilbeines und die Rückfläche des weichen Gaumens, welcher bei seiner Con-

traction zugleich auch die untere Grenze des Nasenrachenraumes bildet. Die Seitenwand wird gebildet durch die Rosenmüller'schen Gruben, die Tubenwülste und die Ostien der Eustachischen Röhre.

Von Wichtigkeit ist die Schleimhaut der Pars nasalis (siehe Fig. 1). Sie ist am Dache und der hinteren und seitlichen Wand etwa bis zur Ebene der Tubenmündungen herab besonders reich an drüsigen Organen. Dieses cytogene follikelreiche Polster führt auch den Namen adenoides Gewebe oder Rachenmandel — Tonsilla pharyngea. Sie stellt ein weiches, über die Schleimhaut prominirendes Gewebe dar, welches durch engere und weitere Spalten in zahlreiche Wülste und Kämme getheilt und nahe an seinem unteren Ende in der Mitte mit einer verschieden grossen rundlichen oder länglichen Oeffnung versehen ist Fig. 1, 5).

Fig. 1. Nach Luschka.

Frontalansicht des Nasenrachenraumes.

1. Proc. pterygoideus; 2. Vomer; 3. hinteres Ende des Nasendaches; 4. Mündung der Ohrtrompete; 5. Eingang in die Bursa pharyngea resp. Recessus pharyngeus medius; 6. Rosenmüller'sche Grube; 7. hügelige, durch regellos angeordnete Spalten zerklüftete adenoide Substanz.

Diese Oeffnung führt in eine Einsenkung oder in einen buckelförmigen Anhang des Schlundkopfgewölbes, welcher früher als Bursa pharyngea bezeichnet wurde. Nach neueren Untersuchungen, besonders von Ganghofer und Schwabach, stellt die sogenannte Bursa pharyngea, oder wie sie von diesen Autoren genannt wird, der Recessus pharyngeus medius, nichts Anderes vor, als das hintere Ende der an allen normalen Rachentonsillen vorkommenden mittleren Spalte oder sie zeigt sich als Vereinigungspunkt der an dieser Stelle convergirenden und mit der mittleren Spalte communicirenden Seitenspalten resp. Lacunen. Was Tornwaldt Bursa pharyngea nennt, ist nach Schwabach ein pathologisches Gebilde, nämlich die durch Oberflächenverwachsung der beiden mittleren Leisten in einen blinden Canal umgewandelte mittlere Spalte der Rachentonsille.

Die wichtigsten Organe der Pars nasalis sind die Tubenwülste mit den Tubenmündungen. Durch das Vorspringen der Tubenwülste entsteht hinter denselben eine Vertiefung, die Rosenmüller'sche Grube, Recessus pharyngis, welche gleichfalls Schleimfollikel und adenoides Gewebe enthält. An dem Tubenwulste unterscheidet man eine vordere und eine hintere Lippe, zwischen denen sich der Tubeneingang befindet. Derselbe ist von verschiedener Grösse, bald trichterförmig, bald schlitzartig nach vorne und unten gerichtet. Die vordere Begrenzung des Tubeneinganges wird auch Haken genannt: er setzt sich in die Hakenfalte, Plica salpingopalatina, fort: dieselbe flacht sich während der Phonation und beim Schlingen in ihrer unteren Hälfte ab. (Siehe Fig. 3 Psp, Fig. 4 KF.)

Eine grosse praktische Bedeutung hat die von dem hinteren Ende des Tubenknorpels ausgehende drüsenreiche Plica salpingopharyngea, Wulstfalte (Siehe Fig. 3 Psph, Fig. 4 WF, Fig. 15 Psph.) Sie steigt, der Hakenfalte gleichlaufend, an der Seitenwand des Nasenrachenraumes herab und kreuzt sich mit dem äusserlich schräg von ihr absteigenden hinteren Rand des Levator veli palatini; unmittelbar über dem hinteren Gaumenbogen verflacht sie sich und setzt sich rückwärts und auswärts wendend gegen den hinteren Gaumenbogen fort, an dessen oberer Platte sie sich nach aussen anlegt. Durch ihre bei der Phonation und Deglutition eintretende Bewegung nach innen und unten trägt sie nach Zaufal zum Abschluss des unteren vom oberen Rachenraum bei.

Im Mundtheile des Pharynx interessirt uns besonders der weiche Gaumen, auch Gaumensegel, Velum palatinum. Er stellt ein von zwei Seiten mit Schleimhaut überzogenes, sich an dem harten Gaumen inserirendes, mit zahlreichen Muskeln versehenes vorhangartiges Gebilde dar, dessen vordere Fläche in die Schleimhaut der Mundhöhle und dessen hintere Fläche in jene des Nasenrachenraumes übergeht. Die vordere Fläche des Velum ist unter normalen Verhältnissen leicht geröthet, glatt und enthält die Mündungen zahlreicher, dicht bei einander stehender Schleimdrüsen, die sich als kleine, hirsekorngrosse, öfters mit winzigen Tröpfchen Schleims bedeckte Erhabenheiten markiren. In der Mitte findet sich ein cylindrischer drüsenreicher Fortsatz, das Zäpfchen, Uvula, während der untere freie Rand in zwei divergirende Schleimhautfalten ausläuft, in eine hintere schmälere, den hinteren Gaumenbogen, Arcus pharyngopalatinus, und in eine breitere, den vorderen Gaumenbogen, Arcus palatoglossus. Der erstere inserirt sich auf der hinteren seitlichen Rachenwand vor der Wirbelsäule, der letztere an dem Seitenrande der Zunge. Zwischen beiden Gaumenbögen, dem Interstitium arcuarium, befindet sich die Gaumenmandel, Tonsilla palatina. Der von den Mandeln, den Gaumenbögen, der Uvula und Zunge begrenzte Raum heisst Isthmus faucium, die beiderseits zwischen Uvula und Gaumenbögen freibleibenden Räume werden Arcaden genannt.

Die Gaumenmandel stellt ein paariges, bei normalen Erwachsenen beiläufig haselnussgrosses, länglichrundes Drüsenpaquet vor; ihre Grösse und Form ist beträchtlichen Schwankungen unterworfen, ebenso ihre Farbe: man darf behaupten, dass man bei Erwachsenen kaum jemals ganz normale Tonsillen vorfindet. An ihrer freien Oberfläche finden sich zahlreiche schmale, rundliche oder spaltförmige Oeffnungen, welche in kürzere oder längere, senkrecht oder schief verlaufende Spalten, Lacunen oder Crypten führen. Die Lacunen sind mit einer dünnen Epitheldecke ausgekleidet; über die ganze Tonsille erstreckt sich ein festes Bindegewebe, zwischen dessen Fasern die Drüsensubstanz, die Follikel, liegen; Schleimdrüsen kommen in der Mandel nicht vor. Aus den Mandeln wandern nach Ph. Stöhr fortwährend Leukocyten aus. Von besonderer Wichtigkeit ist die Umgebung der

Mandel. Sie ist vorne und hinten von lockerem, nach aussen von straffem Bindegewebe umgeben und an die Fascia buccopharyngea angeheftet. Nach aussen, 1½ cm von der Tonsille entfernt, liegt die Carotis interna, 2 cm entfernt die Carotis externa.

Die Pars oralis entbehrt einer vorderen Wand, insoferne als diese von einer Oeffnung, dem Aditus pharyngis, gebildet wird; nach abwärts bildet die Basis der Zunge die vordere Begrenzung.

Die Pars laryngea begrenzt sich vorne durch den Kehldeckel und den Aditus laryngis, seitlich durch zwei längliche Schleimhauttaschen, die Sinus pyriformes. Die hintere längs der Vorderfläche der Wirbelsäule herabziehende Wand der Pars oralis und laryngea erscheint eben oder schwach concav, zuweilen auch leicht convex, öfters auf einer Seite höher oder der Länge nach durch eine schmale erhabene Leiste gewölbt. In der Pars oralis finden sich bei den meisten Menschen bald in der Mittellinie, bald seitlich einige oder mehrere halblinsengrosse, gelblichrothe, prominente Stellen, die sogenannten Granula, die uns noch näher beschäftigen werden.

Die Schleimhaut der hinteren Rachenwand erscheint leicht geröthet, von zahlreichen Gefässen durchzogen, feucht, im unteren Theile leicht gekörnt.

Die Schleimhaut des Nasenrachenraumes trägt Flimmerepithel, die des übrigen Pharynx Pflasterepithel.

Die in die Schleimhaut eingebetteten Drüsen sind zweierlei Art, conglomerirte traubenförmige und folliculäre; die ersteren finden sich hauptsächlich in der Pars nasalis, besonders auf der Rückfläche des Velum, im Umkreise der Tuben und den Rosenmüller'schen Gruben; die Follikel, rundliche, umschriebene Gebilde, finden sich zahlreich in der Pars nasalis, so besonders in der Tonsilla pharyngea, den Tubenwülsten, Rosenmüller'schen Gruben, ferner in der Pars oralis

Die Lymphgefässe des Rachens bilden in der Schleimhaut ein dichtes Netzwerk, den von Waldeyer-Bickel beschriebenen, die Gaumen-, Pharynx-, Tubentonsillen und die Zungendrüssen umfassenden Pharynxring. Ein Theil dieses grösseren Ringes, von dem sich lymphatisches Gewebe auf den Boden der Mundhöhle, in die Nasenhöhle bis zu den vorderen Enden der mittleren und unteren Muscheln, ja bis zur Epiglottis und den Taschenbändern erstreckt, schliesst mit dem lymphatischen Gewebe des Velum einen kleineren Ring. Die mit diesen beiden Ringen in Verbindung stehenden Lymphdrüsen liegen im Kieferwinkel an der Theilungsstelle der Carotis unter und neben dem oberen Theile des Kopfnickers, an der Seite des Zungenbeines und des Kehlkopfes. Da die im Kieferwinkel liegenden Drüsen mit den Gaumenmandeln communiciren, so schwellen dieselben bei den verschiedensten hauptsächlich entzündlichen Affectionen der letzteren an.

Die Blutgefässe des Rachens sind arterielle und venöse. Unter den arteriellen sind zu merken die aus der Maxillaris interna entspringende Art. palatina superior (descendens) für den weichen

und harten Gaumen, die aus der Maxill. ext. entspringende Art palat. ascend. für die Schleimhaut, Muskeln und Drüsen des Gaumensegels und die Art. tonsillaris für die Mandeln, seitliche Schlundwand und Zungenwurzel. Ferner die Art. pharyngea ascend. und Endzweige der Maxill. intern., Art. vidiana, Art. pharyngea suprema, letztere für den Nasenrachenraum.

Die Venen bilden zwei Plexus, den Plexus venos. posterior, welcher mit den Venen der Nasenschleimhaut in Verbindung steht und sich in den Plexus der Schläfengegend ergiesst, und den Plex. ven. anter., der mit der Wurzel der Zunge communicirt und sich mittelst der Ven. pharyng. in die Jugularis int. ergiesst.

Von grösserer Wichtigkeit sind die Nerven und Muskeln des Schlundes.

Es gibt kaum ein Organ, das von so zahlreichen und so verschiedenen Nerven versorgt wird, wie der Rachen.

Die sensiblen Nerven, welche theils das Tastgefühl und die Empfindung, theils den Geschmack und die reflectorische Muskelcontraction sowie die Secretion beherrschen, stammen zumeist aus dem Trigeminus. Die Nervi palatini minores entspringen aus dem zweiten Aste und dessen Ganglion rhinicum und gehen an der Vorderseite des Gaumensegels bis zu den Rändern der vorderen Gaumenbögen herab. Die schmeckenden Theile des Rachens, die Seitentheile des weichen Gaumens, sowie die vorderen Gaumenbögen werden vom Glossopharyngeus innervirt, während die secretorischen Nerven in der Chorda tympani liegen.

Noch mannigfaltiger gestaltet sich die motorische Innervation.

Die motorischen Fasern stammen theilweise aus dem dritten Aste des Trigeminus; die Nervi petrosi superfic. minores, sowie die Rami pterygoidei int. gehen an den Tensor veli palatini. Der Facialis versorgt mittelst des Ram. palat. super. den Levator veli und Azygos uvulae, mittelst des Ram. palat. infer. den Musc. pharyngo- und glossopalatinus.

Der Accessorius innervirt bei manchen Menschen ganz, bei manchen theilweise den Constrictor pharyng. super.; er sendet ferner motorische Fasern zum Constr. phar. med., ganz besonders aber zum Levator veli, Azygos uvulae und Pharyngo- und Glossopalatinus. Nach Réthi wären der Vagus und seine Aeste, welche im Ramus pharyngeus enthalten sind, der einzige Motor. Den inneren Ast des Accessorius für den Levator rechnet er zum Vagus, während er den Facialis an der Innervation des Gaumensegels für vollständig unbetheiligt erklärt.

Die Auslösung des ersten und willkürlichen Theiles des Schluckactes findet nach den experimentellen Untersuchungen von Krause in dem Gyrus praefrontalis des Scheitellappens statt.

Unter den zahlreichen Muskeln des Rachens sind functionell die Constrictoren des Schlundes die wichtigsten.

Es gibt deren drei: Constrictor pharyngis superior, medius und inferior. Durch ihr Zusammenwirken wird der Pharynx verengert und der Bissen nach abwärts befördert.

Die im vorderen Gaumenbogen aufsteigenden Muskelbündel, die als M. glossopalatinus bezeichnet werden, bilden mit dem von dem hinteren Gaumenbogen in das Velum ausstrahlenden M. pharyngopalatinus einen Sphincter, welcher die Mundhöhle von der Rachenhöhle abschliesst und die beiden Gaumenbögen einander nähert.

Eine sehr wichtige Function kommt ferner dem Levator veli palatini zu. Er wirkt einerseits eröffnend auf das Lumen der Ohrtrompete, andererseits hebt er den weichen Gaumen in die Höhe, drückt ihn an die hintere Rachenwand an und schliesst so die Pars nasalis von dem übrigen Pharynx ab.

Dem Tensor veli palatini kommt nach Rüdinger nur eine geringe spannende Wirkung auf das Velum zu: hingegen trägt er gleichfalls zur Eröffnung der Tuba bei.

Der Azygos uvulae verkürzt das Zäpfchen in gerader Richtung, dasselbe hebend, so dass die Schleimhaut in quere Falten gelegt wird.

Von besonderem Interesse ist die Einlagerung der Drüsen zwischen den Muskelbündeln an der Mundhöhlenfläche des Velum, indem, wie Rüdinger zeigte, die einzelnen Drüsen von den quer und schief verlaufenden Muskelbündeln umgeben werden und zwischen den Drüsen und der Schleimhaut ein besonderes Muskelstratum aus quergestreiften Fasern hinzieht. Dadurch wirken die Muskeln des Velum comprimirend und secretentleerend auf die Drüsen.

Untersuchungsmethode.

Bei dem eigenthümlichen Bau und den relativ grossen Dimensionen des Rachens ist es erklärlich, dass man mit der gewöhnlichen Inspection nicht ausreicht. Immerhin bildet dieselbe die häufigste und wichtigste Untersuchungsmethode. Vorerst bedarf man einer passenden Beleuchtung; in der Regel genügt das directe Tageslicht. Ist der zu Untersuchende an das Bett gefesselt, also von dem Lichte weiter entfernt oder von demselben abgekehrt, dann bedient man sich mit Rücksicht auf den Kranken, der seine Lage nicht zu ändern braucht, des reflectirten Tageslichtes, bei trübem Wetter oder bei Nacht des reflectirten künstlichen Lichtes. Das noch so vielfach geübte Hineinleuchten in den Rachen ist nicht nur ungenügend, sondern auch lästig.

Da wenige Menschen die Fertigkeit besitzen, ihre Zunge durch eigene Muskelkraft auf dem Boden der Mundhöhle zu fixiren, so muss dieselbe mittelst geeigneter Instrumente niedergehalten werden; im Nothfalle bedient man sich eines Löffelstiels, eines Falzbeines, des Zeigefingers, des Stieles eines Kehlkopfspiegels, sonst der Mundspatel, von denen es eine grosse Auswahl gibt, als da sind: gerade, Winkelspatel, bogenförmige, Bajonettspatel, sowie die von Türck, B. Fränkel und Anderen angegebenen Instrumente. Welchem von denselben man auch den Vorzug geben mag, stets merke man sich als Regel, dass

die breite Fläche desselben langsam und vorsichtig auf den hinteren mittleren Theil der Zunge aufgesetzt und dann die Zunge mit wachsendem Drucke nach vorne zu auf den Boden der Mundhöhle niedergedrückt werde. Würgebewegungen, die fast nie ausbleiben, sind zwar manchmal sehr unangenehm, in anderen Fällen jedoch für die Untersuchung vortheilhaft. Man übersieht so den weichen Gaumen, die Tonsille und die hintere Rachenwand, einen Theil des Nasenrachenraumes bis zum Niveau des Kehldeckels, sehr oft auch noch diesen selbst. Anfänger fehlen meist darin, dass sie den Spatel nicht auf die Mitte der Zunge oder auch nicht mit gehörigem Drucke aufsetzen, was zur Folge hat, dass die oft mit staunenswerther Kraft sich aufbäumende Zunge das Instrument abwirft, wie das Ross den Reiter. Widerspenstiger Kinder wird man am besten nach vorheriger Fixirung des Kopfes und der Arme, welche in ein Tuch eingeschlagen werden, durch Zuhalten der Nase Herr, indem man schnell den Spatel zwischen die bei der Inspiration sich öffnenden Schneidezähne einzwängt; anderweitige Instrumente, wie Holzkeile, Metallfinger oder Mundsperrer, sind zur Untersuchung und den gewöhnlichen Manipulationen unnöthig, dagegen bei der Tonsillotomie und länger dauernden Operationen namentlich bei Kindern von grossem Nutzen. Erwachsene mit falschen Zähnen oder Solche, welche fürchten, durch die Instrumente des Arztes inficirt zu werden, setzen der Untersuchung oft hartnäckigen Widerstand entgegen. Bei diesen umwickle man den Spatel mit dem Taschentuch des Patienten; überhaupt kann dem Anfänger die peinlichste Reinlichkeit und Ordnung in der Aufbewahrung der Spatel, Spiegel, Pinsel etc. in getrennten Fächern nicht genug an's Herz gelegt werden. Sehr schwierig ist die Inspection des Rachens in jenen glücklicherweise seltenen Fällen, bei denen eine solch' enorme Reflexerregbarkeit besteht, dass schon der Gedanke an die Untersuchung oder das Oeffnen des Mundes, das Berühren der Zunge mit dem Spatel Erbrechen hervorruft.

Bei der Inspection des Rachens achte man mit schnellem, mit der Zeit sich immer mehr schärfendem Blicke auf Configuration, Farbe, Beweglichkeit des weichen Gaumens, der Uvula, der Gaumenbögen, auf die Grösse und das Aussehen der Mandeln, die Beschaffenheit der Hinterwand, die Secretion. Niemals versäume man, der seitlichen Rachenwand, besonders den hinter den Arc. pharyngopalatinus liegenden und sich nach oben und unten fortsetzenden Schleimhautpartien die vollste Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Ueber die tieferen Theile des Rachens kann nur die laryngoskopische Untersuchung und die Palpation Aufschluss geben.

Eines besonderen Verfahrens bedarf man zur Inspection des Nasenrachenraumes.

Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass die Pharyngoscopia sive Rhinoscopia posterior wegen ihrer unleugbaren Schwierigkeit bei weitem nicht die Verbreitung gefunden hat wie die Laryngoskopie, so kann doch nicht dringlich genug auf die Wichtigkeit derselben hingewiesen werden.

Die Schwierigkeiten liegen einerseits in dem anatomischen Bau des Nasenrachenraumes, andererseits in der Reizbarkeit der zu Untersuchenden. Man kann mit ziemlicher Sicherheit schon aus der Inspection des Rachens beurtheilen, ob Jemand leicht oder schwer oder gar nicht rhinoskopisch zu untersuchen sein wird. Je grösser der Abstand des weichen Gaumens von der hinteren Rachenwand, um so leichter und vollständiger, je geringer, um so schwerer ist die Untersuchung. Dass man bei sehr reizbaren Personen gar nicht zum Ziele kommt, ist richtig, doch wird sich mit wachsender Uebung die Zahl derselben mehr und mehr verkleinern; auch besitzen wir in dem Cocaïn ein vortreffliches, die Untersuchung sehr erleichterndes locales Anästheticum.

Die Beleuchtung ist dieselbe wie bei der Laryngoskopie, ebenso der Reflector. Verf. bedient sich kleiner, 1—1½ cm im Durchmesser haltender, an einem geraden Stiele befestigter, in einem fast rechten Winkel gebogener runder Planspiegel und macht von den eigentlichen Rhinoskopen mit Zungendepressor oder stellbarer Vorrichtung und Uvulahalter keinen Gebrauch. Nach Regulirung der Beleuchtung wird mit der linken Hand die Zunge niedergedrückt, so dass der weiche Gaumen mit dem Isthmus frei vor Augen liegt; allenfalls sich zwischen den Arcaden bildende Luftblasen werden mit dem Stiel des Spiegels zerrissen. Sodann wird der wohlerwärmte Spiegel mit nach oben gekehrter Spiegelfläche unter sorgfältigster Vermeidung des Anstreifens zwischen Uvula und Gaumenbogen, also in die rechte oder linke Arcade, mit der rechten Hand eingeführt und gegen die Hinterwand, jedoch ohne Berührung derselben, vorgeschoben, während der Patient gar nicht oder durch die Nase athmet. Zweck dieser Manipulation ist einzig und allein, das Gaumensegel in möglichst erschlafftem Zustande zu erhalten, wovon ja das Gelingen der Untersuchung stets abhängt. Tritt trotzdem durch Würgebewegungen Annäherung des Velum an die Hinterwand, also Verkleinerung, eventuell vollständiger Abschluss des zu inspicirenden Raumes ein, dann lasse man den Patienten noch energischere Athemzüge durch die Nase oder eine Inspiration wie beim Riechen vornehmen: gelingt auch jetzt die Erschlaffung des Velum nicht, so entfernt man den Spiegel und gönnt dem Kranken einige Ruhe, um die Untersuchung zum zweiten oder dritten Male, eventuell nach Cocaïnisirung, vorzunehmen. Man kommt auf diese Weise bei Erwachsenen und älteren Kindern fast stets zum Ziel. Dass die von verschiedenen Autoren empfohlenen Instrumente, wie die Gaumenhaken von Voltolini, Krause, Moritz Schmidt, Hopmann und Anderen (Fig. 2), ferner die Zäpfchenschnürer, Uvulahalter, das Durchziehen eines Seidenbandes oder einer Gummiröhre durch die Nase, welche sämmtlich eine Vergrösserung des Inspectionsraumes bezwecken, sehr nützlich sind, soll nicht bezweifelt werden, doch kommt man in der Regel bei Benützung des oben beschriebenen kleinen Spiegels ohne dieselben zum Ziel.

Die Gaumenhaken kann man eintheilen in solche, welche durch eine eigene Hand, entweder die des Untersuchers oder die des zu Unter-

suchenden, fixirt werden, und in solche, welche durch besondere Einrichtungen sich selbst fixiren. Zu der ersteren Classe gehört der Gaumenhaken von Voltolini mit seinen zahllosen Modificationen, zu den letzteren die Instrumente von Krause, Moritz Schmidt und Hopmann; bei letzterem findet die Fixirung durch ein Gummiband statt.

Es ist natürlich, dass bei der Application so kleiner Spiegel nicht der ganze Nasenrachenraum auf einmal übersehen werden kann,



Fig. 2. Verschiedene Gaumenhaken.
a) von Voltolini, b) von Krause, c) von Moritz Schmidt, d) von Hopmann.

sondern dass das Bild desselben durch Rotiren des Spiegels combinirt werden muss.

Seine ersten Studien mag der Anfänger an einem Phantome beginnen und dann erst zur Untersuchung Gesunder mit weitem Rachen und geringer Empfindlichkeit oder Defecten des Gaumens oder der Uvula und zuletzt Kranker übergehen. Die Orientirung in dem rhinoskopischen Bilde (Fig. 3) ist für den Anfänger ziemlich schwierig.

Stets beginne man mit dem Septum narium, jener auffallenden, genau in der Mittellinie gelegenen, biconcaven, unter normalen Verhältnissen blassrothen Knochenleiste, an deren lateralen Rändern die Choanen, zwei länglichovale Höhlen sichtbar werden. In den Choanen erblickt man, aber nicht immer, ganz oben die kleinste obere Muschel, unter derselben die stets sichtbare grössere mittlere und zu unterst die zumeist durch das contrahirte Velum etwas verdeckte oft nur zur Hälfte oder noch weniger sichtbare grösste grauweisse oder röthliche,

feuchtglänzende, in den Rachen vorspringende untere Muschel mit dem dazwischenliegenden oberen, mittleren und unteren Nasengange. Als eine ziemlich häufige Anomalie muss die kolbige selbst tumorartige Verdickung des mittleren und unteren hinteren Theiles des Septum erwähnt werden. Rotirt man jetzt den Spiegel nach aussen, dann trifft das Auge auf einen starken, von aussen nach innen vorspringenden rundlichen oder länglichen röthlichgelben Wulst, der in seinem unteren mittleren Theile eine blasse, manchmal auffallend anämische,



Fig. 3. Das rhinoskopische Bild.

S.	Septum narium.
Ch.	Die beiden Choanen mit den 3 Nasenmuscheln und Nasengängen.
WG.	Rückfläche des weichen Gaumens mit Uvula und Ansatzstelle des Velum und dem harten Gaumen; Levator in mässiger Contraction.
Te.	Tubeneingang.
Tw.	Tubenwulst.
Psp.	Plica salpingopalatina.
Psph.	Plica salpingopharyngea.
Lw.	Levatorwulst.
F.	Fornix vordere Wand.
A.	Adenoides Gewebe.
RG.	Rosenmüller'sche Grube.

von Gefässen durchzogene, trichterförmige, kirschkerngrosse, zuweilen noch umfangreichere Oeffnung trägt; ersterer ist der Tubenwulst, letztere der Tubeneingang. Derselbe wird von zwei Schleimhautfalten begrenzt, von denen die vordere Plica salpingopalatina, die hintere Plica salpingopharyngea genannt wird. Zwischen der vorderen und hinteren Plica erhebt sich der Levatorwulst. Die nach aussen von dem Tubenwulste bemerkbare im Schatten liegende Partie ist die Rosenmüller'sche Grube. Am schwierigsten gestaltet sich die Untersuchung des Rachendaches; man muss zu diesem Zwecke die

spiegelnde Fläche mehr horizontal stellen und den Griff des Spiegels stark heben. Unter normalen Verhältnissen erscheint das Rachendach (Fornix) als eine leicht geröthete, ebene oder bei Anwesenheit eines starken cytogenen Polsters zerklüftete, wellige, nach hinten abfallende Fläche. Auf derselben findet sich nach Tornwaldt bei fast allen Menschen, namentlich bei Anwendung des Gaumenhakens sichtbar, die Oeffnung der sogenannten Bursa pharyngea, resp. Recessus pharyngis medius, als eine Furche oder trichterförmige Grube oder als kreisförmiges, ovales Loch genau in der Mittellinie des Rachendaches, ungefähr in der Mitte des Abstandes zwischen oberem Choanenrand und Protuberantia atlantis. Am leichtesten gelingt die Untersuchung der



Fig. 4. Vergrössertes Bild des Nasenrachenraumes von vorne nach Zaufal: rechts in Ruhe, links in Bewegung.

S.	Septum narium (Vomer).	lTK.	Linker Tubenknorpel.
AUM.	Atrophische untere Muschel.	TÖ.	Tubenöffnung.
rHRW.	Rechte hintere Rachenwand.	TW.	Tubenwulst.
lHRW.	Linke hintere Rachenwand.	HF.	Hakenfalte.
RG.	Rosenmüller'sche Grube.	WF.	Wulstfalte.
rTK.	Rechter Tubenknorpel.	LW.	Levatorwulst.

hinteren Fläche des weichen Gaumens, der nur allzu oft das vollständige Ueberschauen der geschilderten Theile erschwert. Er markirt sich im Spiegel als eine quer durch das Gesichtsfeld ziehende, theils ebene, theils wellig convexe Linie. Es sei bemerkt, dass das rhinoskopische Bild bei sehr vielen Personen nur theilweise oder zur Hälfte sichtbar und das Aussehen der einzelnen Theile, besonders der Muscheln und der Tubenwülste, zahlreichen Schwankungen unterworfen ist.

Die Möglichkeit, einen Theil des Nasenrachenraumes von vorne durch die Nase zu inspiciren, muss zugegeben werden; meist sind es mit Muschelatrophie Behaftete, bei denen man ohne weitere Vorkehrung als Dilatation der Nasenöffnungen deutlich den Tubenwulst mit dem Tubenostium, die Rosenmüller'schen Gruben, die hintere Rachenwand mit ihren Längsfalten und einem Theile des adenoiden Gewebes zu erkennen vermag (siehe Fig. 4); noch freier gestaltet sich der Blick, wenn ausser der unteren Muschel auch noch der hintere

Theil des Septum durch Syphilis etc. zu Verlust ging. Dass man bei vollständigen Defecten des weichen Gaumens, bei grossen Perforationen und Gaumenspalten den freiesten Einblick hat, ist natürlich. Unter normalen Verhältnissen lässt sich von der Nase aus nur ein schmaler, länglicher, zuweilen zerklüfteter Streifen der Hinterwand erkennen, sehr oft nicht einmal dieser.

Bemerkenswerth ist das Verhalten des Tubenwulstes und der hinteren Rachenwand im Zustande der Ruhe und der Bewegung bei der Phonation oder Deglutition. Fig. 4 zeigt auf der einen Seite in der rechten Choane den Tubenknorpel in der Ruhe, auf der anderen Seite in Bewegung. Bei letzterer tritt der Tubenknorpel von aussen nach innen; er spitzt sich mitsammt der Tubenmündung zu, während gleichzeitig durch die Hebung des Gaumensegels von unten herauf ein horizontaler Wulst, der Levatorwulst, sichtbar wird.

Mit Rücksicht auf die Schwierigkeit der Rhinoscopia posterior hat Zaufal eine neue Methode der Untersuchung des Nasenrachenraumes mittelst Trichtern in die Praxis eingeführt (vgl. Fig. 16 *e*). Dieselben stellen 10—12 cm lange, mit einer trichterförmigen Mündung versehene, im Durchmesser 3—8 mm dicke, metallene Röhren vor, welche durch den unteren Nasengang unter Controle des Auges vorsichtig in den Nasenrachenraum ohne Berührung der Hinterwand desselben vorgeschoben werden. Die Beleuchtung findet mit künstlichem Licht und dem Stirnbindenreflector statt. Wohl selten hat eine Methode so verschiedene Beurtheilung erfahren, wie diese. Von den Einen wurde sie über Gebühr gepriesen, von den Anderen vollständig verworfen; die Wahrheit liegt in der Mitte. Dass die Methode eine Berechtigung hat und werthvolle Aufschlüsse besonders über die Tubenwülste und deren Mündungen, sowie die von ihnen ausgehenden Schleimhautfalten zu geben vermag, ist unleugbar. Ebenso wahr ist aber auch, dass die Einführung der Trichter ohne Cocaïn selbst bei ganz gerader Nase zum Mindesten sehr unangenehm, ja schmerzhaft und öfters mit Blutungen verbunden ist.

Als einer weiteren Untersuchungsmethode muss der Palpation mit dem Finger oder der Sonde gedacht werden.

Wenn dieselbe auch durch die verschiedenen Inspectionsmethoden einigermassen an Gewicht verloren hat, so ist dieselbe doch bei vielen Kranken, namentlich bei Kindern, unersetzlich und zur Vervollständigung und Ergänzung der Untersuchung, besonders zur Aufsuchung von Fremdkörpern, sowie zur Constatirung des Sitzes, der Ausbreitung, der Consistenz von Tumoren, Abscessen etc. unentbehrlich. Es bedarf allerdings einiger Uebung, um sich über das Gefühlte Rechenschaft geben zu können, zumal die Untersuchung möglichst schnell und schonend vorgenommen werden muss. Bei der Digitaluntersuchung des Nasenrachenraumes geht es selbst bei grösster Schonung in der Regel nicht ohne Blutung ab. Der zu Untersuchende sitzt auf einem Stuhle und wird am Kopfe mit der linken Hand fixirt; sodann bringt man womöglich im Momente der Inspiration den Zeigefinger der rechten Hand rasch zwischen Uvula und Gaumenbögen auf die

Rückfläche des Velum, das sich sofort contrahirt und den Finger einklemmt. Nach einigen Augenblicken hört die Contraction auf, wenn nicht, dann lässt man trotz derselben den Finger längs der Hinterwand gegen das Rachendach vordringen; man fühlt dabei die Tubenwülste, die ziemlich stark in die Rachenhöhle vorspringenden Enden der unteren Muscheln, überzeugt sich dann von dem Verhalten des Fornix und der Choanen und geht auf der anderen Seite wieder zurück. Hauptsächlich achte man darauf, ob der Raum zwischen beiden Tubenwülsten, sowie das Rachendach glatt und eben ist. Bei Kindern und unruhigen Erwachsenen ist man in Gefahr, gebissen zu werden; da die zur Abwendung dieser Gefahr empfohlenen gegliederten Metallfinger aber die Beweglichkeit beeinträchtigen, ist es vorzuziehen, die Unterlippe des zu Untersuchenden mit der freien Hand über die Schneidezähne zu schieben; beisst der Kranke doch, dann verletzt er sich selbst und steht von weiteren Beissversuchen ab. Sehr werthvoll ist auch die Palpation der Pars laryngea des Rachens zur Constatirung kleiner, spitzer Fremdkörper, der Consistenz und Anheftungsweise von Geschwülsten etc.

Allgemeine Symptomatologie.

Die Krankheiten des Rachens haben eine grosse Reihe von Störungen zur Folge, welche sich theils als allgemeine, theils als locale Erscheinungen äussern.

Die meisten acuten Rachenaffectionen, so besonders die verschiedenen Anginen, die Phlegmonen, Abscesse, Diphtherie, beginnen oder sind gefolgt von Allgemeinerscheinungen, so hauptsächlich von Fieber, das sich oft zum Schüttelfrost steigert, von allgemeinem Unwohlsein, Kopf- und Gliederschmerzen, Abgeschlagenheit, von Appetitlosigkeit, Durst- und Schlaflosigkeit. Bei Kindern und schwächlichen nervösen Personen leiten zuweilen Convulsionen oder heftiges Erbrechen die Krankheit ein. Sehr bald schliessen sich die localen Erscheinungen an, die bei chronischen Rachenaffectionen in der Regel die hervorstechendsten sind.

Unter den localen Erscheinungen spielen Schmerzen beim Schlucken, sowie Störungen der Sensibilität der mannigfaltigsten Art die Hauptrolle. Schluckweh, das sich sehr oft durch Verzerren der Gesichtszüge oder Schmerzenslaute manifestirt, findet sich bei allen acuten Affectionen, katarrhalischer und phlegmonöser Entzündung, bei Diphtherie, bei den meisten Geschwürsprocessen, Syphilis, Tuberculose, ferner bei Herpes, Aphthen, Soor, zerfallenden Neubildungen, spitzigen Fremdkörpern; in Anfällen auftretender Schmerz findet sich bei Neuralgien.

Wohl zu unterscheiden von der schmerzhaften Deglutition sind Schwierigkeiten beim Schlucken, das Gefühl, nicht hinabschlucken zu können, des Steckenbleibens des Geschluckten, ferner

das Hineingerathen von Ingesten in die Nase. Diese Erscheinungen finden sich meist bei grossen Neubildungen, retropharyngealen Strumen und Abseessen, Tonsillarhypertrophien, besonders aber bei Lähmung oder Krampf des Velum und der Constrictoren oder bei narbigen Verengerungen. Ausserordentlich häufig sind abnorme Sensationen, das Gefühl des Vorhandenseins eines Fremdkörpers oder Kitzeln, Kratzen, Stechen, das Gefühl eines sich im Schlunde bewegenden Körpers, das Gefühl von Wärme und Kälte. Da das Nähere in dem Capitel über Nervenaffectionen mitgetheilt werden wird, so soll hier nur erwähnt werden, dass alle diese Gefühle sowohl bei materiellen Veränderungen als auch bei vollkommenem Intactsein der Schleimhaut vorkommen.

Nicht minder häufig sind Störungen der Secretion. Ist diese vermehrt, so entsteht das Gefühl der Verschleimung, der Drang zu räuspern und die Secrete zu entfernen; ist die Secretion vermindert, dann klagen die Kranken über Trockenheit im Schlunde und das Bedürfniss, sich anzufeuchten und ebenfalls zu räuspern.

Freilich entspricht der objective Befund, d. h. das Verhalten der Schleimhaut, nicht immer den Klagen. Das Secret ist theils wässerig oder schleimig, von weisser oder grauweisser Farbe, theils schleimig-eitrig oder rein eitrig, zuweilen mit Blut vermischt oder borkig. Wässeriges oder schleimiges Secret findet sich am häufigsten bei acuten Affectionen, so namentlich bei Anginen und Erkrankungen des Isthmus faucium, eitriges Secret bei Ulcerationen, borkiges bei Pharyngitis sicca, blutig-schleimiges oder blutig-eitriges bei Ulcerationen, Diphtherie, Gangrän, zerfallenden Neubildungen, Abseessen. Nicht selten ist das Secret übelriechend, namentlich wenn die Mundhöhle in den Krankheitsprocess einbezogen ist, oder bei Ulcerationen, Diphtherie, Neubildungen, Gangrän.

Auch Störungen der Sprache werden häufig beobachtet; sie beruhen theils auf der Unmöglichkeit, die im Kehlkopfe producirten Schallwellen in regelrechter Weise in die Resonanzkästen, in die Mundhöhle, den Nasenrachenraum und die Nase eintreten zu lassen, wie dies bei Verengerungen des Isthmus, bei acuter und chronischer Tonsillitis, adenoiden Wucherungen, Geschwülsten, narbigen Stenosen der Fall ist, oder darauf, dass die Schallwellen gebrochen und anderswohin geleitet werden, wie z. B. bei grossen Perforationen oder Lähmung des Velum. Der Timbre der Stimme erscheint verändert: die Stimme ist klangarm, todt, sie erscheint klosig, undeutlich oder näselnd. Auch auf die Singstimme haben selbst unscheinbare Veränderungen der Rachengebilde grossen Einfluss.

Klangarme, todte Sprache findet sich hauptsächlich bei Verengerungen des Isthmus durch grosse Neubildungen, Tonsillarhypertrophien, adenoiden Wucherungen, Nasenrachenpolypen; näselnd ist die Stimme constant bei Lähmung oder grösseren Perforationen des Velum.

Störungen der Respiration werden in zweifacher Weise beobachtet. Entweder kann die eingeathmete Luft nicht oder nur

mühsam in den Kehlkopf eintreten, oder es ist die Passage durch die Nase resp. den Nasenrachenraum behindert. Ersteres findet sich bei membranösen Verwachsungen der tieferen Rachenabschnitte, Retropharyngeal-Abscessen oder -Strumen, sehr grossen Rachentumoren und Tonsillarhypertrophien, Fremdkörpern, letzteres bei adenoiden Wucherungen, Nasenrachenpolypen und Verwachsungen des Velum mit der Hinterwand.

Auch in entfernteren Organen können Rachenkrankheiten Erscheinungen hervorrufen. So beobachtet man bei Verlegung des Nasenrachenraumes Druck oder Schmerz im Kopfe, Schwindel, Unfähigkeit zu geistiger Arbeit, Gedächtnissschwäche, Aprosexie und andere Erscheinungen, welche bei den Krankheiten der Nase ausführlich besprochen werden; ferner Kitzeln, Stechen im Ohre und durch Fortpflanzung der Entzündung Gehörsstörungen; gar nicht selten sind ferner Husten, Würgen, Erbrechen, Dyspepsie, letztere hervorgerufen durch Speichel- und Luftschlucken, ferner neuralgische in die Schulter und Schlüsselbein-Umgegend ausstrahlende Schmerzen. Auch die Ernährung kann durch Schluckbeschwerden oder hypochondrische Stimmung sehr leiden.

Allgemeine Therapie.

Die bei der Behandlung der Pharynxkrankheiten zur Verwendung kommenden Heilmittel kann man in zwei Gruppen eintheilen: in solche, welche von der Haut, und solche, welche von der Schleimhaut aus applicirt werden.

Unter den externen Methoden nehmen die Halsumschläge die erste Stelle ein.

Man unterscheidet abkühlende oder kalte, und erregende oder erwärmende Umschläge.

Kalte oder abkühlende Halsumschläge werden entweder durch häufigen Wechsel mit ganz frischen oder mit Eiswasser getränkten Compressen oder durch Auflegen eines Eisbeutels oder der eigens construirten Cravatte hergestellt. Diese stellt einen etwa handbreiten, länglichen Gummisack vor, welcher entweder mit kleinen Eisstücken gefüllt oder von kaltem Wasser durchspült wird. Das letztere ist auch der Fall bei den Leiter'schen Röhren, die mit einer Wasserleitung in Verbindung gesetzt werden. Man hat vielfach die temperaturherabsetzende Wirkung dieser Umschläge bezweifelt und dieselben ganz verworfen. Wenn auch bei dem ausserordentlichen Blutreichthum der Halsregion eine Abkühlung der tieferen Theile, besonders der Schleimhaut, nur bei längerer Anwendung sehr niedriger Temperaturgrade zu erzielen ist, so steht doch fest, dass durch die Contraction der grösseren und kleineren Arterien des Halses die Blutzufuhr zu den Verästelungen der Carotis und zu den Gebilden des Rachens und Kehlkopfes ver-

mindert und deren Temperatur herabgesetzt werden kann, wie die schönen Versuche von Winternitz beweisen. Die kalten Umschläge und der innerliche Gebrauch des Eises in Form von Eispillen, Fruchteis, Eislimonade etc. sind indicirt bei allen acuten, entzündlichen und irritativen Processen des Rachens und des Kehlkopfes, besonders bei Phlegmone, Croup und Diphtherie.

Viel populärer und verbreiteter sind die warmen oder erregenden Umschläge. Man stellt sie in der einfachsten Weise dadurch her, dass man ein in kaltes Wasser getauchtes, gut ausgerungenes Taschentuch oder Handtuch um den Hals legt und entweder mit einem impermeablen Stoff, Guttaperchapapier, Wachsleinwand etc., oder mit einem einfachen trockenen wollenen Tuch umwickelt. Im Handel kommen jetzt auch eigens präparirte Halsumschläge vor, die man nur mit Wasser zu benetzen und dann umzubinden braucht. Die Erneuerung soll nur stattfinden, wenn die Feuchtigkeit verdunstet, der Umschlag also nahezu trocken ist. Nach Winternitz scheint sich die Frage, ob es besser sei, ein impermeables wasserdichtes Medium über dem Umschlage zu befestigen oder ein einfaches trockenes Tuch, zu Gunsten des letzteren zu entscheiden. Abgesehen davon, dass die Erweiterung der Hautgefässe bei der allmäligen Vertrocknung ohne impermeable Hülle eine mächtigere zu sein scheint, ruft die Bedeckung mit wasserdichten Stoffen durch Behinderung der Hautperspiration sehr oft ein unbehagliches, ängstliches Gefühl und lästige Hautausschläge hervor, während zu gleicher Zeit die Hyperämie der Haut sich nach einiger Zeit ganz verliert. Heisse, erregende Halsumschläge werden durch Eintauchen von Tüchern in heisses Wasser oder Kamillenthee hergestellt oder in Form der feuchten Breiumschläge, der Cataplasmen, angewendet. Die erregenden Umschläge bewirken durch die Gefässerweiterung in den peripheren Hautschichten ein Sinken der Temperatur in den entzündeten Partien der Schleimhaut, auch wird die Verflüssigung der Secrete durch dieselben begünstigt. Sie sind überall indicirt, wo es gilt, die Resorption entzündlicher Producte zu befördern, also in den späteren Stadien der acuten Entzündungen; heisse Umschläge, Cataplasmen, dienen hauptsächlich zur Beschleunigung der Eiterbildung bei Phlegmone des Rachens und des peritonsillären oder retropharyngealen Bindegewebes.

Die bei Gebildeten und Ungebildeten noch in so hohem Ansehen stehenden heissen Oel- und Fettumschläge, sowie das Umbinden von Speckschwarten sind unappetitlich und haben vor den Wasserumschlägen nicht das Geringste voraus.

Einreibungen medicamentöser, besonders quecksilber- und jodhaltiger Lanolinsalben sind bei der erwiesenen Resorptionsfähigkeit dieser Stoffe nicht zu verwerfen. Einreibungen von reizenden Stoffen, besonders Pustelsalben, auf die Haut des Halses, Vesicatore, Senfteige etc. werden mit Recht als antiquirt nur noch selten verordnet.

Von unstreitigem Nutzen bei allen lähmungsartigen Zuständen ist die cutane oder endopharyngeale Application der Elektricität, theils des constanten, theils des inducirten Stromes. Man bedient sich

dazu am besten der Kehlkopfelektrode. Von sehr zweifelhaftem Werthe ist hingegen die äussere Massage. So segensreich dieselbe auch sonst ist, so wenig leistet sie bei der Behandlung der Rachenaffectionen, wenn auch einige allzu begeisterte Anhänger acute Anginen und Mandelhypertrophien mit derselben schnell zum Schwinden bringen wollen. Inwieweit die innere Schleimhautmassage oder, wie sie auch nach M Braun und Laker genannt wird, die „Vibrationsmassage" bei chronischen Schleimhauterkrankungen den Vorzug verdient vor den anderen Behandlungsmethoden, muss die Zukunft entscheiden. Wir kommen übrigens bei den Krankheiten der Nase nochmals auf sie zurück.

Von Blutentziehungen macht man heutzutage wenig Gebrauch mehr. Dass Aderlässe bei Krankheiten des Rachens und Kehlkopfes nutzlos sind, ist jetzt sicher erwiesen. Von localen Blutentziehungen kommen die Blutegel noch am ehesten in Betracht. Man setzt dieselben gewöhnlich in den Winkel zwischen Unterkiefer und Process. mastoideus; die Urtheile über den Werth derselben sind jedoch sehr verschieden. Man muss beiderseits mindestens 3—6 Stück appliciren, wenn man überhaupt einen Erfolg sehen will.

Scarificationen der Schleimhaut lassen sich bei der Dignität der Rachengebilde meist nur an den Tonsillen oder weichem Gaumen vornehmen; es ist nicht zu leugnen, dass durch dieselben zuweilen eine wesentliche Erleichterung erzielt werden kann.

Unter den Mitteln, welche auf die Schleimhaut des Rachens applicirt werden, spielen die Gurgelwässer oder Gargarismen noch heute die wichtigste Rolle. Wenn man tagtäglich sieht, bei welchen Krankheiten des Rachens und Kehlkopfes Gurgelungen verordnet und von den Patienten monatelang ohne jeglichen Nutzen gebraucht werden, dann muss man staunen, wie gering noch im Allgemeinen das Verständniss für eine zielbewusste Therapie ist. Zum Mindesten sollte man doch wissen, welche Theile des Rachens von dem Gargarisma bespült werden. Durch zahlreiche Versuche, die Verf. und Andere mit färbenden Substanzen anstellten, lässt sich constatiren, dass bei grösstmöglicher Fertigkeit die vordere Fläche des weichen Gaumens, die Tonsillen und ein kleines, je nach der Bauart des Rachens verschieden umfangreiches Stück der Hinterwand der Pars oralis mit dem Gurgelwasser wirklich in Contact tritt. Die Gurgelflüssigkeit durch die Nase herauszuschleudern, bringen nur wenige Menschen fertig.

Daraus ergibt sich, dass Gurgelwässer einzig und allein bei Affectionen der den Isthmus faucium bildenden Organe indicirt sind.

Nicht gleichgiltig ist die Temperatur der Gurgelwässer. Im Allgemeinen gilt als Grundsatz, dass bei allen acuten, besonders phlegmonösen Processen im Anfang die Flüssigkeit kalt oder mit Eis vermischt anzuwenden ist; mit dem Nachlass der Erscheinungen oder wenn die Kälte unangenehm empfunden wird, soll die Temperatur des Gargarisma eine höhere werden, lauwarm oder sehr warm.

letzteres, wenn es gilt, Abscesse zur Reife zu bringen oder demarkirende Eiterung zu erzeugen und die Resorption entzündlicher Producte zu beschleunigen.

Eine andere sehr verbreitete Methode ist die Application zerstäubter Flüssigkeiten mittelst Inhalationsapparaten oder Sprays. Während die Meisten dieselben für unentbehrlich halten, verwerfen Andere sie als völlig nutzlos. Wenn Verf. auch behauptet, dass man mittelst Inhalation allein niemals im Stande ist, chronische Rachenaffectionen zu heilen, so wendet er dieselben doch sehr viel als Palliativ zur Befeuchtung und Reinigung, sowie zur Desinfection der Schleimhaut an; auch soll damit der Nutzen richtig angewendeter Inhalationen bei acuten Affectionen, so z. B. bei Diphtherie nicht geleugnet werden.

Verf. gibt bei chronischen Affectionen dem kalten oder Ballonspray den Vorzug, einestheils wegen der Bequemlichkeit und der Möglichkeit, der Inhalationsflüssigkeit die verschiedensten Temperaturgrade zu geben, anderntheils deswegen, weil die mit der Schleimhaut in Contact tretende Flüssigkeitsmenge eine grössere ist, als bei den feinen, nebelartig zerstäubenden Dampfinhalatoren. Ganz besonders zu empfehlen sind jene Zerstäuber, welche mit einem langen metallenen Mundrohre und einem verstellbaren Ansatzstücke versehen sind, so dass einestheils die Pars oralis und Pars nasalis und anderntheils die Pars laryngea und der Kehlkopf sicher von dem gerade nach hinten, nach oben oder unten gerichteten Strahle getroffen wird. Die einfachste Methode der Reinigung des Nasenrachenraumes ist das Einziehen kochsalz- oder natronhaltiger Flüssigkeit durch die Nase bei nach rückwärts geneigtem Kopfe. Die übrigen Methoden werden bei den Krankheiten der Nase besprochen werden.

Zu den wirksamsten Mitteln gehören die Bepinselungen und Touchirungen der Schleimhaut mit flüssigen oder festen Substanzen.

Man benützt zu den ersteren gerade an einem Holzstiele oder gekrümmte an einem Metallstiele befestigte Pinsel aus weichen Dachs- oder Marderhaaren. Der Effect hängt nicht nur von der Wahl der zu verwendenden Stoffe, sondern auch von der energischen und geschickten Führung des Pinsels ab, der sehr oft allzu schüchtern und in wahren Miniaturexemplaren gehandhabt wird. Dass zur Touchirung der Pars laryngea der Pinsel eine grössere, zu der des Nasenrachenraumes eine kürzere Biegung haben muss, ist selbstverständlich. Sehr praktisch ist auch die Touchirung mittelst eines Stückchens feinen Schwammes oder Watte, welche in eine Klemmpincette eingelegt oder an einem Holzstäbchen befestigt wird.

Die am häufigsten zur Verwendung kommenden Stoffe sind Tannin, Argent. nitr., Jodlösungen, Sublimat etc.

Zur localen Anästhesie benützt man jetzt vorzugsweise das Coeaïn in 5—20% Lösung; die speciellen Indicationen werden bei den einzelnen Krankheiten ihre Besprechung finden. Die übrigen

Anästhetica: Bromkali, Tinct. opii, Menthol in 20% Lösung mit Ol. olivar. sowie das Rhigolin stehen an Wirksamkeit dem Cocaïn weit nach.

Bei Cauterisationen mit Lapis in Substanz achte man besonders auf gute Befestigung desselben; die gewöhnlichen Lapisträger sollten von Anfängern wegen der Gefahr des Abbrechens des Stiftes ganz vermieden und durch Eisendrähte, an welche bei jedesmaligem Gebrauche ein kleines Stück angeschmolzen wird, oder durch den in Holz gefassten Heller'schen Lapisstift ersetzt werden. Sehr beliebt ist neuerdings die Trichloressigsäure und Chromsäure geworden; die letztere wird an eine Silbersonde oder Platinöse angeschmolzen, so dass diese von einer gleichmässigen rothen Perle überzogen erscheint; die Erhitzung soll langsam vor sich gehen; bei zu schneller Erhitzung bildet sich nichtätzendes Chromoxyd; die zu cauterisirenden Theile müssen zuvor gereinigt und nach der Cauterisation mit Sodalösung neutralisirt werden.

Arzneimittel können ferner auch in Pulverform applicirt werden. Man benützt dazu Pulverbläser oder Insufflatoren, die entweder in einen Ballon oder in einen ½ m langen Gummischlauch mit Mundstück enden und mit einer durch einen Schieber zu öffnenden Vertiefung versehen sind, in welche das betreffende Medicament eingeschüttet wird. Ganz besonders empfiehlt sich das von Bresgen verbesserte, zerlegbare und mit einem Ventil versehene Insufflationsrohr.

Bei der geringen Auswahl stärkerer nicht zerfliessender Aetzmittel muss die Einführung der Galvanokaustik in die Therapie der Rachen-, Kehlkopf- und Nasenerkrankungen als ein äusserst segensreicher Fortschritt bezeichnet werden. Ueber die Indicationen derselben wird der Leser bei den einzelnen Krankheiten das Nähere finden; hier können nur einige Bemerkungen über das Instrumentarium Platz finden. Ohne die Verdienste anderer Forscher, besonders von Bruns, Hedinger, Voltolini, im Geringsten zu unterschätzen, glaubt der Verf. doch, durch seine Instrumente für galvanokaustische Operationen in Nase, Rachen und Kehlkopf einem entschiedenen Bedürfnisse abgeholfen und dadurch der Verbreitung der Galvanokaustik Vorschub geleistet zu haben.

Fig. 5 zeigt des Verf. Universalhandgriff, in welchen nicht nur alle soliden Cauteren, sondern auch alle Röhren für die Schlingen eingelassen werden. Der drehbare Elfenbeinring hinten ist für die Aufnahme des Daumens, der ebenfalls aus Elfenbein gearbeitete feststehende Ring unten für den dritten, die drückerartige Schliessungsvorrichtung davor für den vierten und der bewegliche Ring oben mit dem Schlitten und Querbalken für den Zeigefinger bestimmt. Die Leitungsschnüre treten auf der unteren Fläche ein, wodurch die Schwere derselben einigermassen paralysirt und eine sichere Führung des Instrumentes ermöglicht wird. Soll der Handgriff für galvanokaustische Messer gebraucht werden, dann wird der Schlitten durch die an seinem hinteren Ende angebrachte Schraube festgestellt und der Ring als Stützpunkt für den Zeigefinger benützt.



Fig. 5. Universalhandgriff von Schech für galvanokaustische Operationen in Rachen, Nase und Kehlkopf.
a) Schlinge; b) spitziger Cauter zur Stichelung der Muscheln;
c) d) e) Cautern für Granula und hypertrophische Seitenstränge;
f) Flachbrenner zum Ueberstreichen der Muscheln.

In Fig. 5 sind auch einige der gebräuchlichsten in Rachen und Nase zur Verwendung kommenden Ansätze abgebildet. So stellt *a* die Schlinge für die Nase, *b* einen spitzigen Cauter zum Furchenziehen oder der galvanokaustischen Stichelung der Nasenmuscheln, *c*, *d*, *e* Brenner zur Zerstörung der Granulationen und Seitenstränge, *f* einen Flachbrenner für die Muscheln vor.

In dem von dem Universitätsmechaniker Eugen Albrecht in Tübingen um den Preis von 80 Mark nach meiner Angabe zusammengestellten grösseren Etui mit zwei Handgriffen befindet sich eine grosse Anzahl (15) Brenner von allen möglichen Formen und Biegungen für Rachen, Nase und Kehlkopf in musterhafter Ausführung. Das kleinere Etui mit dem Universalhandgriff und 8 Ansätzen kostet 48 Mark.

Unter den zahlreichen galvanokaustischen Batterien kann Verf. besonders die zweielementige Bruns'sche Zinkkohlentauchbatterie, die mit chromsaurem Kali und Schwefelsäure gespeist und ebenfalls von E. Albrecht für 90 Mark geliefert wird,

bestens empfehlen. Sie ist in Fig. 6 abgebildet: *a* und *c* sind zwei sehr kräftige Zinksterne, *b* und *d* je vier miteinander verbundene Kohlenplatten: *b c* ist die Verbindung zwischen den beiden Elementen: die eine Leitungsschnur wird in *a* eingehängt, die andere in *d*. Die Batterie eignet sich jedoch nur für die Sprechstunde, da sie kaum transportabel ist. Die Menge der Erregungsflüssigkeit, welche zur Füllung eines Elementes erforderlich ist, beträgt 4 Liter. Die schwache Lösung enthält in je 4 Liter 250 Gramm Kali bichromicum und 500 Gramm englische Schwefelsäure von 1·83 specif. Gewicht. Die starke Lösung enthält in derselben Flüssigkeitsmenge 500 Gramm Kali bichromicum und 1000 Gramm Schwefelsäure. Die Stärke des Stromes wird regulirt durch mehr oder weniger tiefes Eintauchen der Elemente in die Erregungsflüssigkeit. Die Batterie braucht höchstens alle 6—8 Wochen frische Füllung. Von transportablen Batterien sind die von Böcker



Fig. 6. Zweielementige Zinkkohlentauchbatterie nach von Bruns.

und Voltolini angegebenen zu empfehlen, doch muss ihre Füllung meist schon nach wenigen Tagen erneuert werden.

Die Mängel aller, selbst der besten Batterien, geringe Constanz, Abnützung der Zinke und Erregungsflüssigkeit, lassen es sehr wünschenswerth erscheinen, dass die Glühhitze auf anderem Wege erzeugt werde. Am bequemsten ist natürlich der Anschluss an ein Elektricitätswerk.

Einer grossen Verbreitung erfreuen sich jetzt auch die Accumulatoren, die selbstverständlich nur da zu gebrauchen sind, wo Gelegenheit zu ihrer Ladung gegeben ist. So compendiös aber auch die tragbaren kleineren Apparate sind, kann doch Verf. die Anschaffung derselben nicht empfehlen, da die Kraft derselben sich sehr bald erschöpft. Verf. zieht deshalb die grösseren nicht transportablen Accumulatoren vor und hat allen Grund, damit zufrieden zu sein.

Als Ersatz für die Galvanokaustik wurde neuerdings wieder der Thermocautère von Paquelin mit geeigneten Ansätzen für den Rachen und die Nase empfohlen.

Sehr wenig Eingang hat sich bis jetzt die Elektrolyse resp. Elektropunctur verschaffen können. Neuerdings wurde sie wieder von Voltolini, Michel, Kafemann, Keimer und Kuttner zur Entfernung sehr blutreicher Neubildungen, besonders von Angiomen, Telangiektasien in Mund, Rachen, Kehlkopf, ferner bei sehr blutreichen Geschwülsten des Nasenrachenraumes, bei Granulationen, Muschel- und Tonsillarhypertrophie, von Schäffer auch bei Struma und Lymphomen des Halses empfohlen.

Das Princip der Elektrolyse beruht darauf, dass, wenn man die in Platinnadeln endenden Pole einer galvanischen Batterie in lebendes Gewebe bringt, sich an der Anode Sauerstoff, an der Kathode Wasserstoff bildet und dem Gewebe durch Zersetzung des in ihm enthaltenen Wassers Wasser entzogen wird; am positiven Pole coaguliren die Gewebe, während sie am negativen zerfliessen. Die Anwendung der Elektrolyse geschieht unipolar und bipolar. Bei der unripolaren Methode wird die in eine Platinspitze endigende active Elektrode in das zu behandelnde Gewebe eingestochen, während die andere passive Elektrode in Form einer Metallplatte näher oder entfernter von der activen Elektrode an irgend einer Körperstelle aufgesetzt wird. Bei der bipolaren Methode werden beide in Platinnadeln endende Pole in das Gewebe eingesenkt.

Das Material der Nadeln besteht nach Heryng am besten aus einer Legirung von Platin und Iridium. Die Form der Elektrodennadeln muss natürlich den einzelnen Theilen des Rachens angepasst sein; ausser nadelförmigen gibt es noch steigbügelartige Elektroden (Kafemann). Als Elektricitätsquelle eignet sich eine Batterie mit Léclanché-Elementen oder auch die Stöhrer"sche Batterie mit Bunsen-Elementen; nöthig ist ferner ein Rheostat und ein Commutator. Die Stromstärke kann 20—80 Milliampère erreichen; die Dauer der einzelnen Sitzung beträgt je nach der angewandten Stromstärke $^1/_2$ bis 1 Minute. Die zu behandelnden Theile müssen zuvor cocaïnisirt werden.

Missbildungen, angeborene und erworbene Formfehler und sonstige Anomalien.

Unter den angeborenen Formfehlern sind die Spaltbildungen die häufigsten.

Sie erstrecken sich von den Schneidezähnen bis zum harten und weichen Gaumen und sind unter dem Namen Wolfsrachen bekannt. Ausserdem gibt es noch seitliche Gaumenspalten, die entweder nur den Knochen oder die Weichtheile betreffen.

Ferner können durch abnorme Processe der knöchernen Wandungen des Pharynx mannigfache Formanomalien und functionelle Störungen erzeugt werden.

Beginnen wir an der Schädelbasis, so begegnen wir zuerst einer abnormen Länge des Proc. styloid. Derartige Fälle sind anatomischerseits von W. Gruber, klinischerseits von Lücke, Weinlechner und Réthi beschrieben. Solche abnorm lange Griffelfortsätze sowie die Verknöcherungen des Ligam. styloid. können dadurch, dass sie bis an die Hinterfläche oder, wie in dem von Réthi mitgetheilten Falle, bis in die Mitte der Mandel herabreichen oder seitlich verbogen sind, zu abnormen Sensationen und dauernden Schluckbeschwerden Anlass geben. die Weinlechner in einem Falle durch Abbrechen des betreffenden Knochenfortsatzes beseitigen konnte. Réthi musste die Mandel spalten und den Proc. styl. reseciren. Auch Verf sah zwei solche Fälle, hält es aber für wahrscheinlicher, dass die in die Mandel eingewachsene Knochenmasse dem Processus pterygoideus des Keilbeines angehört.

Nicht gar selten werden durch Exostosen der Halswirbel (Zuckerkandl, Scheff), sowie durch Lordose oder durch Defectbildung eines Halswirbels mit Erkrankung der Wirbelsäule Schlingbeschwerden erzeugt, die zuweilen durch das Tragen einer passenden Cravatte behoben werden können (Heymann).

Wenden wir uns zu den Abnormitäten der Weichtheile des Rachens, so begegnen wir den congenitalen oder erworbenen Defecten oder abnormer Kürze des weichen Gaumens, angeborener oder erworbener schlitzförmiger oder runder Durchlöcherung der vorderen oder hinteren Gaumenbögen, dem Fehlen der Uvula. Nach Hajek kommen schlitzförmige Defecte besonders im Vereinigungswinkel beider Gaumenbögen vor und können die Länge von $^1/_2$ cm erreichen. Zum Unterschiede von den syphilitischen sind die angeborenen am freien Rande ziemlich scharf, dünn, die Schleimhaut am Rande und der Umgebung glatt. Kayser beobachtete abnorme Verkürzung des Gaumensegels in Verbindung mit einem dreieckigen Defecte des harten Gaumens, der nur von Schleimhaut überzogen war. Von den erworbenen Anomalien verdienen die später noch zu besprechenden Perforationen des Velum einstweilen Erwähnung.

Die Uvula kann angeboren abnorm klein oder auffallend gross sein, sie ist entweder in Verbindung mit dem Velum oder für sich allein gespalten und finden sich von der gewöhnlichen Einkerbung bis zum ausgesprochenen Wolfsrachen alle Uebergänge.

Nicht zu verwechseln damit ist die Uvula bifida, bei der die unteren Enden leyerschwanzartig von einander abstehen oder einander anliegen. In letzterem Falle muss man dieselben mit der Sonde trennen, um zu ermitteln, wie hoch die Spaltung gegen die Basis hinaufreicht. Die totalen Spaltungen der Uvula können durch zu weites Offenstehen des Isthmus pharyngonasalis nasales Timbre bedingen, welche Erscheinung auch den bereits erwähnten Perforationen und Defecten in erhöhtem Grade zukommt. Je grösser die Oeffnung, desto deutlicher treten auch die Beschwerden der Deglutition und Phonation hervor. Sehr oft ist die Uvula in Folge vorausgegangener Ulcerationen gekniekt, verzerrt und nach verschiedenen Richtungen verzogen; einmal sah Verf. ohne gleichzeitigen Wolfsrachen zwei Uvulae, welche wahrscheinlich durch Spaltung einer entstanden und 2 cm von einander entfernt waren.

Als weitere Anomalie muss das Fehlen der Mandeln und ihre rudimentäre Entwicklung erwähnt werden; relativ häufig ist die Einlagerung eines Theiles der Tonsille in den hinteren Gaumenbogen oder die hintere Rachenwand. Jurasz sah einmal eine Tonsilla pendula, welche mit einem schmalen Stiele am hinteren Gaumenbogen aufsass und in den unteren Raehenraum hinabhing, ferner eine Tonsilla accessoria auf dem oberen Theile der Plica salpingopharyngea.

Zu den häufigsten acquirirten Formfehlern gehören die Verengerungen des Pharynx in Folge von Narbenstrictur.

Aetiologisch kommen in Betracht die im Gefolge der Syphilis, des Lupus, des Seleroms, der Tubereulose, der Diphtherie auftretenden Geschwüre, sowie Verbrühungen und Verätzungen der Sehleimhaut.

Der Nasenrachenraum ist nieht selten dureh eine, wie Schrötter meint, von den vertiealen Theilen des Gaumenbeines ausgehende Knochenlamelle einseitig oder doppelseitig von den Choanen geschieden (knöcherner Choanenverschluss); auch Theilungen des Nasenrachenraumes durch ein bis zur Wirbelsäule vorgeschobenes Septum narium kommen vor. Ferner wird aueh membranöser Verschluss der Choanen theils angeboren, theils in Folge von Syphilis, Rhinosclerom und Störk'seher Blennorrhoe beobachtet.

Der complete Verschluss der Choanen geht nach Hopmann wahrscheinlich ursprünglich aus hochgradigen Stenosen, sichelförmigen Membranen oder Hyperostosen der Choanalränder, Verbiegungen des Vomer hervor. Verengerungen der Choanen kommen, wie auch Verf. bestätigen kann, nieht selten bei adenoiden Vegetationen vor. Ihrer Form nach unterscheidet man nach Hopmann schlitzförmige Verengerungen mit Verminderung des Breitendurchmessers und rundliche mit Verkürzung des Höhendurchmessers bei gleichzeitiger Schmalheit der Choanen. Bei den sehlitzförmigen Verengerungen sind die Proc. pterygoidei des Keilbeines einer oder beider Seiten der Mittellinie

allzu nahe gerückt oder zu stark medianwärts convex ausgebogen oder aber das Septum resp. der Vomer nach der verengten Seite ausgebogen oder schiefstehend; bei den rundlichen Verengerungen ist das ganze Schlundgewölbe auffallend niedrig, wie es scheint in Folge von abnormer Verkürzung des Vomer, und dabei die Proc pteryg. beider Seiten einander näher gerückt als normal. Bei beiden Formen, besonders aber bei den allgemeinen Stenosen, wird die knöcherne Enge zuweilen noch vermehrt durch Bindegewebsmassen, welche als sehnige Züge elastischen Gewebes bogenförmig, zuweilen sichelartig in der oberen Rundung, seltener in der unteren ausgespannt sind und den Bogenlinien der Knochen, denen sie dicht anliegen, folgen. Onodi sah einmal bei doppelseitigem Verschluss in der rechten Choane drei kleine Oeffnungen.

Verengerungen der Choanen machen nur dann Erscheinungen, wenn sie an und für sich oder in Verbindung mit pathologischen Zuständen eine nasale Stenose erzeugen. Weitere Erscheinungen sind anhaltende und excessive, zuweilen eitrige Nasenkatarrhe, Gehörstörungen, Veränderungen der Sprache und Articulation, Schwäche des Gedächtnisses, Störung des Allgemeinbefindens, Brust-, Magen- und Darmkatarrhe.

Die Diagnose kann nur durch Untersuchung des Nasenrachenraumes mit der Sonde von vorne, mit dem Spiegel oder dem Finger gestellt werden; bei ganz kleinen Kindern ist die Sondenuntersuchung das ausschliessliche Erkennungsmittel; man umwickelt den Knopf einer feinen, biegsamen Sonde mit Watte, ölt diese ein und dringt in die Choane vor. Bei der Palpation muss man mit der Fingerspitze in die Choane selbst einzudringen suchen; bei Kindern nimmt man den kleinen Finger, bei Erwachsenen den linken Zeigefinger, der unter normalen Verhältnissen ein Stück weit in die Choanen eingeführt werden kann; unterstützend wirkt die Rhinoscopia posterior, eventuell mit Gaumenhaken oder Vorziehen des Velum mittelst Gummischlauch.

Die Behandlung kann nur eine operative sein. In der Regel ist Chloroform nöthig. Man versuche zuerst nach Hopmann durch wiederholtes Einbohren des Fingers die Verengerung zu erweitern, was gewöhnlich bei Kindern und bei faserigen Verwachsungen gelingt. Gelingt dies aber nicht, dann bringe man ein glattes, vorne etwas zugespitztes Elevatorium oder eine Kornzange von vorne in die Nase und erweitere durch nach verschiedenen Richtungen gehende Hebelbewegungen langsam mit allmälig wachsendem Druck, im Nothfalle mit Gewalt und Zertrümmerung der Knochen.

Bei lamellösem knöchernen Verschluss kann der Knochen auch mittelst eines Troicars, Bohrers oder der Galvanokaustik durchbrochen werden; bei sehr beträchtlicher Dicke der Knochen muss die Verwachsung mit dem Meissel getrennt werden. Verlängerungen des Septum nach hinten werden durch Ausbrechen mittelst einer Knochen- oder des Verf. Choanenzange behoben.

Die membranösen Verwachsungen der Choanen werden am besten durch den von der Nase oder vom Rachen aus eingeführten Galvano-

cauter durchbrochen und durch eingelegte Metallbougies offen erhalten. Schrötter bindet zu diesem Zwecke die in die Nase eingelegten Bougies vorne durch einen Faden zusammen, so dass durch das Auseinanderweichen ihrer hinteren Enden ein fortwährender Druck auf die seitlichen Wandungen der künstlich geschaffenen Oeffnung ausgeübt wird.

Nicht selten kommt es hauptsächlich bei syphilitischen, diphtheritischen, scrophulösen Geschwüren mit Zerstörung des Tubenknorpels zu mehr oder weniger vollständigem Verschluss der Tubenmündungen, zuweilen in Folge heftiger nasaler Exspiration zu symmetrischer Dilatation der Rosenmüller'schen Gruben (Pertik).



Fig. 7. Verwachsung des perforirten weichen Gaumens mit der Hinterwand.

a) Nach oben durch Narben fixirtes Velum resp. vordere Gaumenbögen; b) mit der Hinterwand verwachsene hintere Gaumenbögen; c) Perforationen der verwachsenen narbigen hinteren Gaumenbögen; d) Rest der Uvula, an einem dünnen Stiele hängend; e) Granulationen und Narbenstränge der Hinterwand.

Am meisten aber interessiren den Praktiker die Verwachsungen des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand.

Aetiologisch kommen auch hier wieder syphilitische, tuberculöse, diphtheritische Geschwüre sowie ungeschickte Verwendung des Galvanocauters, nach Wolf auch das Umgehen mit Chromsäure in Betracht.

Die häufigste ist die partielle einseitige oder doppelseitige Verwachsung; die Anlöthung beginnt in der Regel von dem unteren Theile des hinteren Gaumenbogens und schreitet von da auf den mittleren Theil des Velum und die Uvula weiter. Die einfachste Form ist die, dass die hintere Fläche des Arc. pharyngopal. mit der Schlundwand in Verbindung tritt. Dass dadurch der Pharynx die mannigfaltigsten oft wunderlichsten Formen annimmt, ist leicht verständlich, zumal mit der Anlöthung und mehr oder weniger deutlichen Horizontalstellung der Gaumenbögen noch Durchlöcherungen der angehefteten Gaumenbögen, Defecte der Uvula oder weitere durch Narben der Hinterwand erzeugte Verschiebungen verbunden sein können. Fig. 7 ist ein Beispiel dafür. Manchmal ist die Uvula intact und bleibt hinter derselben eine kaum bleistiftdicke Communicationsöffnung bestehen.

Die Störungen der partiellen Verwachsungen beschränken sich meist auf die Sprache, welche klangarm und nasal erscheint, und auf erschwerte Respiration durch die Nase, seltener auf Behinderung der Deglutition.

Totale Verwachsungen des weichen Gaumens mit vollständigem Abschlusse des Nasenrachenraumes, bei deren Entstehung nach Lieven die Functionsvernichtung der Gaumenmusculatur durch Myositis specifica eine Hauptrolle mitspielt, gehören zu den Seltenheiten. Durch den completen Verschluss geht der Geruch und der Geschmack verloren und zu den oben erwähnten Beschwerden gesellt sich noch eine

gewisse durch das Offenhalten des Mundes bedingte Verblödung des Gesichtsausdruckes, Trockenheit der Mundhöhle, Belegtheit der Zunge, unruhiger Schlaf. Die Sprache ist nicht nur nasal, sondern auch oft nahezu unverständlich; öfters besteht gleichzeitig Tubenverschluss.

Betrachten wir die Anomalien der hinteren Rachenwand, so finden sich, meist in Folge von Syphilis, ausgebreitete weisse, strahlige Narben und leistenartige Kämme, welche von der Pars oralis nach oben und unten auslaufen; Verf. sah ferner einmal in Folge von Syphilis die hintere Rachenwand in grosser Ausdehnung durch eine mediane narbige hypertrophische Leiste förmlich in zwei Hälften getheilt, ein anderes Mal die vom Velum abgetrennte Uvula auf der Hinterwand festgewachsen oder am hinteren Gaumenbogen hängen, sehr oft auf die Rückfläche des Velum fixirt.



Fig. 8. Membranartige Verwachsung der Zunge mit der hinteren Rachenwand.

a) Zungenbasis; b) Membran; c) Oeffnung der Membran; d) Reste des vernarbten mit der Membran verwachsenen Kehldeckels.



Fig. 9. Membran- und bandartige Verwachsung der Zunge mit der hinteren Rachenwand.

a) Zungenbasis; b) Membran; c) Oeffnung in der Membran; d) strangartige Verbindung des Zungenrückens mit der Pars oralis der Hinterwand.

In den tieferen Abschnitten des Pharynx sind Stricturen viel seltener.

Die Bilder, welche solche tiefsitzende Stricturen geben, sind sehr verschieden und zuweilen erst nach wiederholten Untersuchungen verständlich, besonders wenn Wucherungen und Abschnürungen an der Zunge oder den Rachenwänden vorhanden sind.

Zu den einfachen Formen gehören jene, bei denen die Rachenhöhle in geringerer oder grösserer Ausdehnung durch eine von der Hinterwand oder den Seitentheilen bis zur Zungenbasis sich erstreckende Membran überbrückt wird. Es wird dadurch die eine Hälfte des Kehlkopfes verdeckt oder es bleibt eine bald mehr central, bald mehr peripher gelegene, verschieden oft nur noch stecknadelkopfgrosse Oeffnung übrig, durch welche man entweder nichts, wie in Fig. 9, oder Theile des normalen oder gleichfalls veränderten Kehlkopfes wahrnimmt. Manchmal ragt ein Theil der hohlsondenartig comprimirten Epiglottis aus der noch restirenden Oeffnung empor, manchmal sind die Ränder des Kehldeckels mit jenen der Oeffnung selbst verwachsen und durch Verdickung und Verzerrung kaum als der Epiglottis angehörig zu erkennen (Fig. 8). In anderen Fällen finden

sich ausser einer den ganzen Kehlkopf überbrückenden Membran noch strangartige Verbindungen der Zunge mit der Hinterwand, wie Fig. 9 zeigt. Solch' ausgedehnte ringförmige Stenosen gehen aus tiefen syphilitischen Ulcerationen der hinteren und seitlichen Pharynxwand und des Zungengrundes hervor. Nicht selten sind membranartige Verwachsungen an der Zungenbasis mit partieller oder totaler Verwachsung des weichen Gaumens combinirt, so dass der Rachen in drei selbstständige Theile zerlegt erscheint.

Sehr complicirte Bilder geben jene Fälle, bei denen Narbenstränge brücken- und gitterartig die Rachenhöhle durchziehen oder wie Coulissen sich in das Lumen derselben hineindrängen.

Die durch diese verschiedenen Stricturen hervorgebrachten Störungen beziehen sich meist auf die Deglutition. Abgesehen von der Unmöglichkeit, grössere Bissen durchpassiren zu lassen, gelingt sehr oft nicht einmal das Schlingen kleinerer, oder wenn, nur mit Aufwand vieler Mühe und Zeit, einestheils weil die Hauptmasse des Bissens zwischen den Narbensträngen und den dadurch gebildeten Taschen hängen bleibt, anderntheils weil durch die Umwandlung der Schleimhaut in Narbengewebe zahlreiche der Befeuchtung des Schlundes dienende Drüsen verödet und unter der Schleimhaut liegende Muskelfasern contractionsunfähig geworden sind. In hochgradigeren Fällen können die Kranken nur noch Flüssigkeiten zu sich nehmen, doch wird durch Uebung und Geschicklichkeit mit der Zeit das Schluckhinderniss theilweise überwunden. Störungen der Respiration müssen selbstverständlich in allen jenen Fällen eintreten, bei denen die Communication mit dem Kehlkopfe in beträchtlicherem Grade behindert ist; auch kann durch das Steckenbleiben eines zu grossen Bissens in der Communicationsöffnung plötzliche Asphyxie auftreten.

Die Prognose der durch Narbenstricturen erzeugten Pharynxstenosen richtet sich nach dem Grade und dem Sitze und ist durch die Vervollkommnung der laryngoskopischen Technik gegen früher eine viel günstigere geworden; immerhin bleibt ein Theil der Fälle ungeheilt oder nur zeitweise gebessert.

Die Behandlung der Pharynxstricturen sei natürlich womöglich zuerst eine prophylaktische; durch sorgfältige Allgemein- und Localbehandlung der Geschwüre, durch Einlegen von Tampons wird man noch am ehesten im Stande sein, die Verwachsung gegenüberliegender epithelloser Flächen zu verhindern oder schon bestehende frische Adhäsionen zu lösen. Ist die Stenose aber schon älter, dann können verschiedene Wege eingeschlagen werden.

Bei Verwachsungen der Tubenmündungen hat man forcirte Lufteinreibungen, das Einführen von Bougies sowie die Durchschneidung der vorderen Wand der Tuba empfohlen; leider sind diese Proceduren alle sehr unzuverlässig. Bei vollständiger Verwachsung des Tubeneingangs empfiehlt sich zur Beseitigung der Taubheit die Perforation des Trommelfells, eventuell mit Exstirpation des Hammers und Eintreibung von Luft durch den äusseren Gehörgang.

Partielle Verwachsungen des weichen Gaumens bedürfen keiner Behandlung, da sie in der Regel keine namhaften Beschwerden verursachen.

Anders ist dies bei den totalen Verwachsungen. Hier müssen der weiche Gaumen von der Hinterwand abgetrennt, die Ränder des ersteren umsäumt und die Wiederverwachsung hindernde Bougies eingelegt werden. Man benützt dazu am besten dicke durch die Nase gezogene Kautschukdrainagen oder nach Kuhn eine die ganze Breite des Rachens einnehmende nach vorne convexe Hartkautschuk- oder Silberplatte, welche durch eine federnde Vorrichtung an zwei gegenüberliegenden oberen Backzähnen befestigt werden kann. Lublinskï wölbt mittelst eines durch die Nase eingeführten Katheters das Gaumensegel vor, schneidet es ein und legt durch den klaffenden Spalt passende Bougies oder Bleisonden ein, die täglich längere Zeit hindurch liegen bleiben. Lieven operirt in der Chloroformnarkose bei herabhängendem Kopfe. Er trennt zuerst die Gaumenbögen von der Hinterwand mit der krummen Scheere los, dann die weiter oben befindlichen Verwachsungen. Zur Verhütung der Wiederverwachsung legt er nach dem Vorgange von Dionisio ein colpeurynterartiges Instrument, das mit einem Gummischlauch versehen ist und von der äusseren Nasenöffnung her aufgeblasen wird, in den Nasenrachenraum ein. Die Excision des Gaumensegels ist nach Ried angezeigt bei hochgradigen Flächenverwachsungen oder da, wo eine Ablösung des Gaumensegels zu schwierig wäre. Complete mit Perforation des Velum verbundene Verwachsungen lässt man am besten unbehelligt.

Die Resultate sind in Bezug auf Wiederherstellung der Nasenathmung in der Regel günstig, wenn auch die Tendenz zu nochmaliger Verengerung eine ausgesprochene ist und öfters eine zweite Operation nöthig wird. Sehr unbefriedigend jedoch sind meist die Erfolge in Bezug auf Verbesserung und Wiederherstellung der Sprache. Der Grund liegt hauptsächlich in der Schwierigkeit, dem Gaumensegel die normale Länge und Beweglichkeit wiederzugeben, zumal wenn die Muskeln bereits atrophirt sind und die Schleimhaut durch bindegewebige Narben unnachgiebig geworden ist.

Die Behandlung der membranösen Verwachsungen der tieferen Rachengebilde richtet sich nach der Intensität und Form der Stenose. Am einfachsten ist die Durchtrennung und Excision der Membranen von der noch bestehenden Oeffnung aus durch geknöpfte Messer oder Scheeren unter Leitung des Kehlkopfspiegels. Zur Entfernung grösserer Vorsprünge und Vegetationen eignet sich am besten die Glühschlinge. Die Nachbehandlung besteht in fleissiger Reinigung der Wundflächen und dem längeren Liegenlassen der Schrötter'schen Dilatationsrohre. Recidiven sind jedoch auch hiebei nicht ausgeschlossen.

Hinsichtlich der Behandlung des Wolfsrachens und der anderen meist angeborenen Anomalien, sowie die Ausführung der plastischen Operationen muss auf die Lehrbücher der Chirurgie verwiesen werden; doch sei bemerkt, dass die durch Defecte und Spaltungen des harten und weichen Gaumens verursachten Sprachstörungen zuweilen durch

Obturatoren beseitigt oder doch gebessert werden können und dass der operative Verschluss erworbener Defecte meist sehr günstige Resultate liefert.

Ausser Verengerungen kommen aber auch Erweiterungen des Pharynx zuweilen vor.

Weiten, geräumigen Rachen findet man sehr häufig bei chronischen Katarrhen, wenn die Schleimhaut in ausgedehntem Grade atrophisch geworden ist, ferner bei hochgradigen Lähmungen der Rachenmuskeln. Ringförmige Erweiterung oberhalb einer verengerten Stelle ist selten.

Zu den seltensten Vorkommnissen aber gehört die partielle Erweiterung des Pharynx, die Pharyngocele.

Man versteht darunter eine mehr oder weniger hochgradige, meist einseitige, den unteren hinteren oder seitlichen Pharynxabschnitt und den Anfangstheil des Oesophagus betreffende sackartige Erweiterung, in welcher die Speisen zurückgehalten werden. Die Geschwulst ist bei seitlicher Entwicklung auch aussen am Halse neben dem Kehlkopfe bis zum Unterkieferwinkel hinauf sicht- und fühlbar. Ist der Divertikel mit Luft gefüllt, dann erscheint die Geschwulst elastisch, comprimirbar; ist er hingegen durch Speisen ausgedehnt, dann fühlt er sich hart oder teigig an. Als Ursache beschuldigt man Missbrauch der Stimme, Spielen von Blasinstrumenten; doch kommt die Pharyngocele auch angeboren vor; möglicherweise spielen auch Verletzungen und Atrophie der Muskeln eine Rolle.

Die Symptome betreffen meistentheils die Deglutition. Ist der Divertikel gefüllt, dann ist das Schlingen in hohem Grade behindert oder ganz unmöglich; ist der Divertikel aber leer oder durch Druck von aussen seines Inhaltes beraubt worden, dann geht das Schlingen anstandslos von statten.

Die Diagnose stützt sich einestheils auf den häufigen Wechsel der Erscheinungen und die Anwesenheit einer comprimirbaren Geschwulst, anderntheils auf die laryngoskopische Untersuchung und die Sondirung.

Die Behandlung muss darauf gerichtet sein, den Divertikel zu entleeren oder die Eingangsmündung desselben zu verschliessen; meist führt jedoch nur die Exstirpation des Divertikels durch Eröffnung des Pharynx zwischen seitlichem Zungenbeinrand und Ringknorpel zur Radicalheilung.

Pharyngitis catarrhalis acuta.

Wie die Mundhöhle, so wird auch der Rachen weitaus am häufigsten von katarrhalischen Entzündungen ergriffen. Man versteht unter katarrhalischer Pharyngitis (Angina catarrhalis) einen durch Röthung, sammtartige Schwellung der Schleimhaut und vermehrte Secretion sich markirenden oberflächlichen Entzündungsprocess. Nicht

selten steigert sich derselbe in einzelnen Gebilden der Schleimhaut, so besonders in den Drüsen, bis zur Vereiterung und stellt dann eine Combination mit Phlegmone dar.

Die Ursachen des acuten Rachenkatarrhs sind äusserst zahlreich. Dass auf Erkältungen, Zugluft, Durchnässen der Haut, des Halses, des Nackens, ja selbst entfernterer Körpertheile, besonders der Füsse, bei vielen Personen Katarrhe der verschiedenen Schleimhäute entstehen, ist eine feststehende Thatsache. Deshalb trifft man den acuten Rachenkatarrh auch häufig in Gesellschaft einer acuten Rhinitis, Laryngitis und Bronchitis oder im Vereine mit Muskel- und Gelenkrheumatismen, besonders von Torticollis und Lumbago. Unter die primären oder idiopathischen Rachenkatarrhe gehören ferner auch jene, welche durch Concremente in den Mandeln, durch Zufuhr zu scharfer, gewürzter, zu heisser Speisen und Getränke oder durch Einathmen heisser Dämpfe entstanden sind. Als secundäre oder symptomatische Erscheinung findet sich der acute Rachenkatarrh im Gefolge der meisten Infectionskrankheiten, so besonders der Masern, des Scharlachs, der Rötheln, Blattern, des Typhus, der Syphilis, ferner nach Aufnahme gewisser Arzneistoffe und Gifte, so besonders der Belladonnapräparate (Atropin), des Jodkali, Quecksilber, Antimon, der Säuren und Alkalien (toxische Angina). Die von Löri, Danziger und Anderen beschriebene Angina arthritica, die sich als Vorbote oder im Verlaufe eines Gichtanfalles entwickelt, sowie die im Verlaufe einer regulären oder larvirten Intermittens auftretende Angina intermittens scheint selten zu sein.

Wenn auch, wie oben bemerkt, der Einfluss von Erkältungen in Folge von schroffen Temperatursprüngen, rascher Abkühlung bei schwitzendem Körper unleugbar ist, so scheinen doch auch noch andere Momente bei der Entstehung acuter Rachenkatarrhe mitzuwirken. Namentlich erscheint es so gut wie sicher, dass die Angina lacunaris eine durch niedrige Organismen, pyogene Kokken, erzeugte Infectionskrankheit ist. Dafür spricht ausser dem zeitweise massenhaften Auftreten der Affection das Nacheinandererkranken verschiedener Familienglieder, namentlich solcher, welche die Kranken pflegten oder mit ihnen in demselben Raume schliefen, das Auftreten von Fieber- und Allgemeinsymptomen vor dem Erscheinen der localen Veränderungen, die Schwellung der Milz, das Mitergriffenwerden der Gelenke und die langsame Reconvalescenz. Wahrscheinlich sind es verschiedene Arten von pyogenen zahlreich in den Concrementen der Mandeln enthaltenen Mikroorganismen, welche acute lacunäre oder phlegmonöse Anginen erzeugen können; so sah Verf wie auch Strümpell dem Ausbruche des Gesichtserysipels eine laeunäre Angina mit consecutiver Lymphdrüsenschwellung vorausgehen, ferner einmal eine nasenkranke Dame, welche ein an laeunärer Angina leidendes Kind gepflegt hatte, an Gesichtserysipel erkranken. Pfannenstiel beobachtete, dass dem Ausbruch einer Puerperalfieberepidemie in der Berliner Frauenklinik mehr oder weniger schwere Tonsillaranginen unter den Hausbewohnern vorausgingen. Sendtner fand in vier Fällen von Angina laeunaris

und einem Fall von Angina phlegmonosa einen Streptococcus, der baeteriologiseh von dem Streptocoecus pyogenes und erysipelatos nicht zu unterseheiden war. Dass die Mikroorganismen des Erysipels und jene der Phlegmone zuweilen dieselben Erscheinungen zur Folge haben, ist durch vielfaehe experimentale Untersuchungen sichergestellt. B. Fränkel und Czajkowski züchteten aus dem Secrete der Lacunärangina drei Arten, den Staphylococcus pyogenes aureus, St. albus und den Streptocoeeus pyogenes; beide glauben, dass Erkältungen, Traumen etc. dadurch von Einfluss sind, dass sie die Resistenz der Gewebe gegen die Einwirkung der Mikrokokken herabsetzen.

Entweder ist die ganze Raehensehleimhaut oder nur ein Theil derselben Sitz der Entzündung.

Localisirt sich dieselbe im Nasenrachenraum, dann ergibt die objective Untersuehung naeh Entfernung der meist reichlichen Schleimmassen geringere oder stärkere Röthung und Schwellung der Sehleimhaut, besonders des drüsenreichen Polsters der hinteren und oberen Wand; aueh die Tubenwülste und die von ihnen ausgehenden Schleimhautfalten nehmen an der entzündliehen Schwellung Theil, die sieh auch auf die Rüekfläche des Velum und die Uvula erstreckt, deren Sehleimhautoberfläehe in Folge der Schwellung der Follikel uneben erscheint. Zuweilen sieht man aus den Spalten der geschwellten Pharynxtonsille weissgelbe Pfröpfe hervordringen (Pharyngotonsillitis laeunaris) oder es vereitern die Follikel in grösserer Anzahl und verleihen der Sehleimhaut ein gesprenkeltes Aussehen (Paulsen); sehr oft ist die Sehleimhaut trocken und mit einem blutigen, dem pneumonischen Sputum ähnliehen Sehleimklumpen überzogen.

Besonders häufig erkrankten die Pars oralis und die den Isthmus faueium bildenden Theile.

Ist die längs der Wirbelsäule herabziehende Sehleimhaut befallen, so findet sieh oft nur ein leieht rosa oder tiefroth gefärbter Streifen auf derselben, meist aber ist die Hinterwand in eine grosse, intensiv geröthete Fläehe umgewandelt. Anfänglich erseheint, namentlieh bei den aeuten Exanthemen, die Schleimhaut fleckig, marmorirt, später eonfluiren die Fleeken; ebenso erscheint die Mueosa im Beginne der Krankheit mit spärlichem Seerete bedeckt und trocken, später von diekem, zähem, glasigem, schleimeitrigem Seerete überzogen, durch Sehwellung der Drüsen uneben; ab und zu findet sich aueh ein grösserer an der Spitze einen gelben Eiterpunkt tragender Follikel oder ein rundliches kraterförmiges Follieulargeschwür.

Die Regio interarytaenoidea sowie die Lig. aryepigl. und die Stimmbänder zeigen sehr oft dieselben Veränderungen.

Der weiehe Gaumen nimmt meistens an der Entzündung Theil. Er erseheint verdiekt, mehr oder weniger geröthet und deutlieh von dem viel blässeren harten Gaumen abgegrenzt. Auf geröthetem Grunde finden sieh zahlreiehe Gefässramifieationen, ektatisehe Venen, selbst kleine Hämorrhagien. Die Uvula ist der Länge und der Quere naeh vergrössert, in ihrem unteren Theile ödematös, ihre Spitze weicht seitlieh ab oder ist hornartig gekrümmt, ihr Sehleimhautüberzug

milchig getrübt oder durch Schwellung der Drüsen uneben und gekörnt. Sehr oft steht die erkrankte Seite des Velum tiefer als die gesunde und bleibt bei der Phonation zurück oder ist ganz unbeweglich oder wird nach der entgegengesetzten Seite verzogen.

Die Mandeln erkranken sehr oft allein oder gemeinschaftlich mit der Hinterwand oder dem Velum.

Die einfachste Form des Tonsillarkatarrhs ist durch gleichmässige Röthung der Schleimhaut und mehr oder weniger beträchtliche Schwellung und Schleimsecretion gekennzeichnet. Anders ist das Bild, wenn die Entzündung in den Lacunen ihren Sitz aufschlägt (Angina lacunaris). Auf gleichmässig gerötheter geschwellter Schleimhaut machen sich entweder schmale weissliche oder gelbe längliche, dreieckige, oft deutlich sternförmige Streifen oder rundliche Flecken bemerkbar, die an Zahl, Grösse, Form und Vertheilung den Eingangsöffnungen der Lacunen entsprechen und an der Oberfläche sehr oft zu grösseren Tropfen und Flecken confluiren. Das Secret stammt aus der Tiefe der Lacunen und besteht aus geronnenem Eiter, gequollenen Epithelien und Pilzen und lässt sich meist ohne Schwierigkeit entfernen. Dass sich in den Lacunen öfters auch fibrinöse Auflagerungen finden, ist richtig, berechtigt aber noch nicht, wie Sokolowski und Dnockowski gethan haben, zu der Annahme eines auf die Lacunen beschränkten diphtheritischen Processes. Im Gegentheil sprechen alle neueren Beobachtungen, auch die von Sendziak, dafür, dass die Tonsillitis lacunaris und follicularis selbstständige Krankheiten sind.

Eine andere Form oder vielmehr eine Combination mit phlegmonöser Entzündung ist die Angina follicularis.

Auf einer, meist auf beiden stark gerötheten und vergrösserten Tonsillen finden sich entweder in Gruppen zusammenstehende oder unregelmässig vertheilte, zum Theil confluirende weisse oder gelbe, gelbgrünliche erhabene Punkte und Flecken, welche vereiterte Drüsenfollikel vorstellen. Im weiteren Verlaufe entstehen nach Durchbruch des Eiters je nach der Tiefe, in welche die Eiterung vorgedrungen war, oberflächliche oder tiefere, kraterförmige Substanzverluste, welche rasch heilen und netzartige Narben oder schüsselförmige, durch bindegewebige Brücken von einander getrennte Vertiefungen zurücklassen. In der Regel tritt die Angina follicularis wie die Angina lacunaris von Anfang an doppelseitig auf, sehr oft beginnt sie aber auch einseitig, um nach einigen Tagen auf die andere Seite überzuspringen; nicht selten entwickelt sich aus der Verschwärung einzelner Follikel, ebenso aus der Angina lacunaris eine diffuse Phlegmone beider Mandeln, des Velum oder peritonsillären Bindegewebes, zuweilen tritt im Bereiche der vereiternden Follikel superficielle Nekrose und Gangrän ein; nicht selten finden sich endlich über oder neben den vereiternden Follikeln echte Croupexsudate.

Unter den objectiven Erscheinungen ist bei den intensiveren Erkrankungen der fieberhafte Beginn der constanteste. Entweder nach leichtem Frösteln, allgemeinem Unbehagen und Kopfweh oder nach einem deutlichen Schüttelfrost, erhöhter bis zu 40·0 und

mehr gesteigerter Temperatur und einer Pulsfrequenz bis zu 120, bei Kindern bis zu 140, nach wiederholtem Erbrechen, Unruhe, allgemeiner Abgeschlagenheit, unruhigem Schlaf, Appetitlosigkeit, vermehrtem Durst, bei Kindern nicht selten unter Convulsionen, stellen sich Schmerzen beim Schlingen ein, die beim Ergriffensein der Hinterwand, hauptsächlich aber bei der lacunären und follicularen Angina am heftigsten sind. Beim acuten Retronasalkatarrh fehlen meist eigentliche Schmerzen, doch erscheint das Sprechen und Schlucken empfindlich, die Athmung durch die Nase behindert; nicht selten erkrankt das Ohr unter Ohrensausen, Schwerhörigkeit mit subjectiven Geräuschen in Folge von Tubenverschluss oder von Mittelohrentzündungen mit Perforation des Trommelfells. Wenn es, wie Laker beobachtete, dabei zu schweren Allgemeinerscheinungen, heftigem Fieber, Diarrhoen etc. kommt, muss man annehmen, dass ganz besonders virulente Kokken sich angesiedelt haben und in die Lymphbahnen eingedrungen sind.

Ganz constant sind Klagen über Trockenheit im Halse, die jedoch meist bald gesteigerter Schleimsecretion Platz macht und zu vermehrten Schluckbewegungen und Räuspern veranlasst. Bei Mitaffection des Kehlkopfes ist Heiserkeit und Hustenreiz vorhanden. Sehr charakteristisch ist das Verhalten der Stimme; die Sprache ist klanglos, nasal oder als ob die Kranken einen Fremdkörper im Halse hätten. Die anginöse Sprache ist wie das Regurgitiren des Genossenen grösstentheils die Folge der Functionsunfähigkeit des Gaumensegels. Sehr oft klagen die Kranken beim Kopfumdrehen über Schmerzen aussen am Halse, welche entweder durch gleichzeitige rheumatische Affection der Halsmuskeln oder durch sympathische Lymphdrüsenschwellung bedingt sind. Wirkliche Gelenksaffectionen mit Schwellung und Exsudation in die Gelenke, erythematöse oder purpura- und urticariaähnliche Hautausschläge gehören zwar nach des Verf. Beobachtungen zu den grossen Seltenheiten, sprechen aber ebenfalls für die infectiöse Natur der Krankheit. Nach Buss finden sich in den Gelenkexsudaten dieselben pathogenen Mikroorganismen wie auf den Tonsillen, was zu dem Schlusse berechtigt, dass von den Rachenorganen aus eine Infection des Körpers mit Erkrankung der Gelenke stattfindet.

Der acute Rachenkatarrh verläuft meist in wenigen Tagen, doch kann er bei ungeeignetem Verhalten auch längere Zeit, 10 bis 14 Tage dauern, namentlich wenn sich Complicationen, diffuse Phlegmone, Peritonsillitis oder Gelenksschwellungen einstellen.

Die Diagnose ist aus dem objectiven Befunde leicht zu stellen. Praktisch von grösster Wichtigkeit ist die Differentialdiagnose zwischen Angina laeunaris, A. follicularis und Diphtherie. Da die subjectiven Beschwerden sich vollständig mit jenen der Diphtherie decken können und auch die Lymphdrüsenschwellung bei Angina eine constante und oft sehr hochgradige ist, so muss der objective Befund im Rachen allein den Ausschlag geben. Bei Erwachsenen, bei denen Diphtherie zu den Seltenheiten gehört, spricht die gleichmässige Vertheilung und das Beschränktsein der Flecken auf die Mandeln, ihre mehr gelbe

oder grüngelbe Farbe, ihre geringe Tendenz zu flächenhafter Ausbreitung, das Vorhandensein noch nicht völlig reifer eitergefüllter Follikel, die rasche Abstossung und Verkleinerung der Flecken, das baldige Sichtbarwerden schüssel- oder trichterförmiger Substanzverluste an Stelle der früheren Auflagerungen gegen Diphtherie. Bei Kindern ist der Entscheid zuweilen ausserordentlich schwer oder erst nach mehrtägiger Beobachtung möglich, da auch die Diphtherie lacunär und multipel beginnen und einige Tage so bleiben kann; doch confluiren meist die diphtheritischen Belege sehr rasch und greifen auf die Gaumenbögen, Uvula und Hinterwand über. Einen nahezu sicheren Entscheid gibt die freilich praktisch oft schwer durchführbare mikroskopische und bacterielle Untersuchung der Belege. Tonsilläre oder peritonsilläre Abscesse kommen bei Diphtherie kaum vor, während Paralyse des Velum ganz besonders häufig diphtheritischen Ursprunges ist.

Die Prognose ist günstig, indem sich die durch die Krankheit gesetzten Veränderungen in der Regel völlig zurückbilden. Dass aber auch der Tod eintreten kann, beweisen die von Metzner, Kiemann und Petersen mitgetheilten Fälle, in denen die Weiterwanderung der Staphylo- und Streptokokken eitrige Infiltration des Mediastinum, hämorrhagisch-eitrige Pleuritis und Pericarditis zur Folge hatte. Dass die meisten Anginen einen günstigen Verlauf nehmen, beruht wohl darauf, dass die Streptokokken in der Regel nur die oberflächlichen Gewebsschichten occupiren.

Die Therapie muss bei der ausserordentlichen Disposition vieler Menschen für acute Rachenkatarrhe vor allen Dingen eine prophylaktische sein.

Zu einer vernünftigen Hygiene sollte freilich schon in frühester Jugend der Grund gelegt werden; allein wie sehr hier gefehlt wird, lehrt die tägliche Erfahrung, und so sehen wir denn auch, dass gerade diejenigen Kinder, welche am sorgfältigsten vor jedem kalten Luftzuge gehütet und zum Schutze gegen die Unbilden des Wetters mit möglichst vielen Tüchern umwickelt werden, ganz besonders häufig von Anginen befallen werden. Diese Verhätschelung und Luftscheu setzt sich in systematischer Weise in das Mannesalter fort und wird besonders durch die bei Beamten und Gelehrten so sehr beliebte Ueberheizung der Bureaux und Wohnräume oder den methodischen Gebrauch zu warmer Bäder, namentlich der Dampfbäder, sowie mangelhafte Ventilation der Schlafräume bis zu vollständiger Erschlaffung der Haut und beständiger Neigung zu Transspiration in bedenklichster Weise gesteigert. Es mag zugegeben werden, dass auch wetterfeste Naturen und nicht in Treibhauswärme Auferzogene den Unbilden und Schwankungen der Temperatur nicht immer ungestraft trotzen, immerhin aber kann als Grundsatz gelten, dass, je kräftiger und abgehärteter die äussere Haut ist, desto seltener die Schleimhäute von entzündlichen Processen befallen werden. Dass man durch Einwirkung auf die vasomotorischen Nerven der Haut eine Aenderung der Circulation und Secretion und eine Kräftigung der Cutis bewirken

kann, ist unzweifelhaft. Bei vielen zu Schleimhautkatarrhen Disponirten genügt oft schon das Tragen von Wollkleidern, um den erstrebten Zweck zu erreichen. Die Wolle verhütet am besten Schwankungen in der Oberflächentemperatur der Haut, auch saugt sie von allen Stoffen am meisten Flüssigkeit auf und lässt dieselbe am langsamsten wieder verdunsten. Ebenso begreift man, dass mit der Beseitigung der abnorm hohen Zimmer- und Badetemperaturen ein weiteres Moment für die Relaxation der Hautgefässe wegfällt. In directer Weise kann die Haut gekräftigt und widerstandsfähiger werden durch die verschiedenen hydropathischen Procedureu, besonders durch tägliche am Morgen vorzunehmende kalte Waschungen, Abreibungen, Wickelungen, Douchen, im Sommer durch Fluss-, Sturz- und Wellenbäder. Am besten wirkt unstreitig ein längerer Aufenthalt an der See mit täglichem Seebade und beständigem Genusse der Strandluft oder eine Cur in einer gut geleiteten Kaltwasserheilanstalt.

Mit der Abhärtung der äusseren Haut verbindet man zweckmässig die Abhärtung der Schleimhäute durch methodische, monatelang fortgesetzte Gurgelungen oder Ausspritzungen mit kaltem Wasser, dem man irgend ein Adstringens, z. B. Alaun, Tinct. Ratanh. etc., beisetzen kann.

Bei Disposition zu acuten Anginen untersuche man sorgfältig die Mandeln und verhüte durch Schlitzung der Mandeln, Abtragen überhängender Theile das Ansammeln von Concrementen.

Bei der Infectiosität der Lacunär-Angina sowie in zweifelhaften Fällen empfiehlt sich die Isolirung der Erkrankten, namentlich in kinderreichen Familien oder bei schwächlichen Leuten.

Um den Ausbruch der acuten katarrhalischen oder phlegmonösen Angina zu verhindern resp. um dieselbe zu coupiren, hat man verschiedene Mittel in Vorschlag gebracht. In England sind die von M. Mackenzie empfohlenen, 0·2 Resina Guajacis oder Resina Gagais enthaltenden und beim Auftreten der ersten Symptome sofort zweistündlich zu nehmenden Pastillen sehr gebräuchlich; auch Tinct. Aconiti, dreistündlich 6 Tropfen, wird empfohlen, ebenso das Bepinseln mit Cocaïn, das nicht nur anästhetische, sondern auch anämisirende Eigenschaften besitzt. Unna empfiehlt das Ichthyol in Form von Bepinselungen (Ichthyoli 2·0, Ol. Ricini 4·0, Cumarini 0·1, Spir. vini 20 0) oder als Spray (Ichthyoli 1·0, Spir. vini, Aether āā 50·0); Concato-Bufalini den Aetherspray von 3—4 Minuten Dauer.

Ein sehr beliebtes Coupirungsmittel sind ferner Dampfbäder und sonstige Schwitzcuren. Wenn nun auch nicht zu leugnen ist, dass in einzelnen Fällen durch die oben genannten Medicamente oder durch kräftige Ableitung auf die Haut eine beginnende Angina oder Coryza zurückgedrängt werden kann, so lehrt doch die Erfahrung, dass man in der Regel post festum kommt. Bei den mit Muskel- und Gelenksrheumatismen einhergehenden Anginen ist das Natron salicylicum pro die 5·0—8 0 zu versuchen.

Ist die Krankheit schon ausgebrochen, so ist mit Rücksicht auf das Fieber angezeigt, Antipyrin, Phenacetin oder Chinin bis zu 1·0 Gramm Abends zu geben; auch wird der Verlauf der Krankheit beträchtlich abgekürzt. Durch Priessnitz'sche oder Eisumschläge auf den Hals, durch Verschlucken von Eispillen und Trinken eisgekühlter Getränke, kalte oder nach Umständen warme Gargarismen und die Darreichung eines Laxans, das allzu oft vergessen wird, gelingt es meist, die Beschwerden zu mässigen und den Verlauf abzukürzen. Dass bei starkem Schluckweh auf breiige oder flüssige Consistenz sowie passende Temperatur der Ingesta Rücksicht zu nehmen ist, ist selbstverständlich. Da in der Regel nach 2—3 Tagen eine gewisse Intoleranz gegen die äusserlich und innerlich applicirte Kälte eintritt, so gehe man zu warmen erregenden Umschlägen, warmen Gurgelungen und warmen Getränken, besonders alkalischen Wässern über, indem durch dieselben die Resorption der entzündlichen Producte beschleunigt und dem subjectiven Gefühle des Kranken Rechnung getragen wird.

Als Gurgelwässer und Inhalationen und zum Durchspülen des Cavum pharyngonasale eignen sich am besten verdünnte lauwarme Milch, Emserwasser, schleimige Decocte, Glycerinlösungen 10 : 100, 1—2% Lösungen von Natr. bicarb. oder Natr. chlorat., ferner das Natr. biborae. Ist die Secretion reichlicher geworden, dann gehe man bei Affectionen des Isthmus faucium zu den adstringirenden Gurgelwässern Alaun, Tannin, bei Angina lacunaris und follicularis zu Kali chlorie. als Gurgelwasser (5%) und innerlich 5 : 150 über. In letzteren Fällen ist auch die 4% Borsäure und 1—3% Carbolsäure angezeigt. Auch Kalkwasser mit gleichen Theilen Aq. dest. wirkt gut, ebenso Pinselungen mit 5% Chinolinlösung (M. Schmidt).

Bei Entzündung der tieferen Theile der Pars oralis und der Pars laryngea verdient die Inhalation warmer zerstäubter Medicamente, welche wirklich, wenn auch immerhin noch in geringen Quantitäten, an die erkrankten Stellen hingelangen, den Vorzug. Zieht sich die Rückbildung in die Länge, dann kann man durch Bepinselungen mit Tannoglycerin 1:10 oder Arg. nitr. 1:30 oder die später zu erwähnende Mandl'sche Jodsolution die Resorption beschleunigen.

Grösste Sorgfalt erheischt die Miterkrankung des Ohres. Man beginne bei den ersten Erscheinungen sofort mit der Luftdouche, bei stärkerer Verlegung mit dem Katheterismus, der jedoch im acuten Stadium sehr schmerzhaft ist; in der Regel reicht man mit dem Politzer'schen Verfahren namentlich bei Kindern aus. Die sich entwickelnde Otitis media bekämpfe man mit den üblichen Mitteln, Blutegeln, Eisumschlägen, eventuell Paracentese des Trommelfells.

Pharyngitis chronica.

Die Ursachen der chronischen, auf der ganzen Welt verbreiteten Pharyngitis lassen sich in prädisponirende und in direct anregende eintheilen.

Dass schwächliche Personen, Scrophulöse, Tuberculöse, Herzkranke, Reconvalescenten von schweren, besonders acuten Infectionskrankheiten, nach Rühle auch Hämorrhoidarier, ebenso Syphilitische zu Rachenkatarrhen ganz besonders disponirt sind, kann keinem Zweifel unterliegen.

Unter den direct wirkenden Ursachen sind stets wiederkehrende oder rasch aufeinander folgende Nasenrachenkatarrhe wohl die häufigsten. Wenn man bedenkt, wie selten die vollständige Rückbildung einer Angina oder eines Retronasalkatarrhs abgewartet wird resp. nicht abgewartet werden kann, dann kann man sich nicht wundern, wenn bei jeder neuen Attaque nicht resorbirtes Material zurückbleibt und die acute Schwellung der Schleimhaut chronisch wird.

Der chronische Rachenkatarrh hat äusserst häufig seinen Grund in Verengerungen der Nase. Vielleicht ebenso häufig muss eine ungeeignete Lebensweise, speciell der Genuss von Bier oder starken alkoholischen Getränken sowie scharfer, gewürzter, gepfefferter Speisen und das Rauchen angeschuldigt werden. Dass auch das Tabakschnupfen und das noch ekelhaftere Kauen dieselbe Wirkung entfaltet, bedarf keiner Auseinandersetzung.

Auch Stauungszustände und gewisse Beschäftigungen, Berufsarten und Gewerbe geben zu chronischen Rachenkatarrhen Anlass; Leute, die in staubiger Luft leben oder arbeiten, Müller, Stein-, Feilenhauer, Feuerarbeiter, Schmiede, Schlosser, besonders auch Schreiner, Drechsler, Arbeiterinnen in Cigarrenfabriken etc., werden fast noch öfter von Rachenkatarrhen als von Kehlkopfentzündungen heimgesucht.

Von Vielen wird auch auf die Schädlichkeit stimmlicher Ueberanstrengung und die relative Häufigkeit des chronischen Rachenkatarrhs bei Lehrern, Sängern, Schauspielern, Predigern, Officieren und Anwälten hingewiesen. In England bezeichnet man den chronischen Rachenkatarrh kurzweg als Predigerhalsweh.

Bresgen, der stimmliche Ueberanstrengung allein nicht als Ursache gelten lassen will, erklärt die scheinbar hohe Morbiditätszahl der in Rede stehenden Berufsclassen aus dem Umstande, dass dieselben viel eher als andere Menschen durch die Folgen ihrer Erkrankung in ihrem Berufe gestört würden; dagegen gibt er zu, dass durch anhaltende Ueberanstrengung der Stimme schon bestehende Rachenkatarrhe wesentlich verschlimmert werden.

Verf. ist der Ansicht, dass Ueberanstrengung der Stimme zwar für sich allein zur Pharyngitis chronica, besonders zu Hypertrophie

der Seitenstränge, Anlass geben kann, glaubt aber, dass dieselbe weitaus am häufigsten erst im Bunde mit einer oder mehreren anderen Schädlichkeiten ihre Wirkung entfaltet. Dem Verf. ist wenigstens stets die geringe Betheiligung des lehrenden, schauspielenden und singenden weiblichen Geschlechtes und die starke Frequenz des im Freien bei jedem Wetter und auf staubiger Reitbahn commandirenden und das savoir vivre wohlverstehenden Officierstandes aufgefallen. Auch bei Lehrern konnten in der Regel neben stimmlicher Ueberanstrengung Constitutionsanomalien oder Disposition zu Erkältungen verantwortlich gemacht werden.

Im Allgemeinen kann man also Rühle, der für die grosse Häufigkeit der Rachenerkrankungen in den Rheinlanden die Cigarre, den Wein und den Gesang anklagt, nur beipflichten und die von ihm gegebene Aetiologie mit einigen Modificationen in Bezug auf Quantität und Qualität der Alcoholica und die mehr oder weniger künstlerische Verwendung der Stimmwerkzeuge für überall gelten lassen.

Der chronische Rachenkatarrh kann nicht nur den ganzen Rachen befallen, sondern sich auch in einzelnen Abschnitten localisiren; allerdings schneidet der Process meist nicht scharf ab, sondern erstreckt sich noch von einer Partie mehr oder weniger auf die andere. Wenn Roth aber behauptet, dass der pathologische Process stets die Rachenschleimhaut in ganzer Ausdehnung treffe und dass eine räumliche Trennung der Entzündung ungerechtfertigt sei, so muss ihm Verf. vom klinischen Standpunkte aus widersprechen.

Als das charakteristische Merkmal aller, sowohl des diffusen als des localisirten chronischen Rachenkatarrhs muss die Hypertrophie der betroffenen Theile angesehen werden; dieselbe erstreckt sich einestheils auf Follikel und Balgdrüsen, anderntheils auf die ganze Schleimhaut und das submucöse Bindegewebe (Pharyngitis chronica hypertrophica). Da jedoch viele Pharyngitiden mit Atrophie der Schleimhaut enden, so unterscheidet man auch eine Pharyngitis chronica atrophica sive sicca.

Der chronische hypertrophische Katarrh des Nasenrachenraumes setzt Veränderungen, welche von den bei den anderen Formen beobachteten wesentlich abweichen; er soll deshalb an erster Stelle besprochen werden.

Die Schleimhaut der Tubenwülste und der von ihnen ausgehenden Schleimhautfalten sowie der Rosenmüller'schen Grube, die Rückfläche des Velum erscheint verdickt, serös infiltrirt, mehr oder weniger hyperämisch, von erweiterten Gefässen durchzogen, selbst ecchymosirt, manchmal durch Epithelwucherung oder Erosion grauweiss verfärbt. Die Schleimdrüsen sowie die Follikel treten deutlicher hervor, die hinteren Enden der Nasenmuscheln sind hypertrophisch oder zu blasenartigen, froschlaichähnlichen Wülsten degenerirt, die Schleimhaut der Pars oralis kann normal sein, häufiger ist sie gleichfalls hypertrophisch und mit Granulationen besetzt, die Gaumenmandeln vergrössert. In der Regel besteht copiöse Secretion eines grauweissen,

dicken, zähen oder auch rahmartigen, zu Klumpen und Borken eintrocknenden Schleimeiters.

Nach Tornwaldt, dessen Beobachtungen im Allgemeinen von Broich, Kafemann, Keimer, Schäffer, Walb und Anderen bestätigt wurden, ist öfters die Bursa pharyngea oder richtiger der Recessus pharyngeus medius der Rachentonsille allein befallen. Nach Réthi ist nicht selten ein seitlich gelegener Recessus erkrankt. Der chronische Katarrh resp. die Hypersecretion der Pharynxtonsille, die nicht selten aus einem acuten Nasenrachenkatarrh hervorgeht, kennzeichnet sich dadurch, dass aus einer oder aus mehreren ihrer Furchen oder der grössten, dem Recessus medius, ein schleimiges oder eitriges Secret abfliesst und, wenn es flüssiger Consistenz ist, die nach unten und hinten von der Rachentonsille gelegene Partie des Rachendaches und der hinteren Rachenwand bedeckt, wenn es mehr zähe und klebrig ist und vertrocknet, sich als muschelförmige Borke auf die nächste Umgebung der Drüse beschränkt. Im Gegensatz zu Ozaena oder allgemeinem Nasenrachenkatarrh bleibt der Theil des Rachendaches, welcher zwischen der Oeffnung der Bursa und den Choanen liegt, in den nicht mit dieser Krankheit complicirten Fällen von Secret frei. Dass das Secret in der That aus der Rachentonsille kommt, lässt sich einestheils durch directe Beobachtung nachweisen, anderntheils durch das Sistiren der Secretion nach zeitweiligem Verschluss der Hauptöffnungen, wie es durch den Galvanokauter erzeugt wird, sowie durch die definitive Beseitigung der Secretbildung mittelst therapeutischer Eingriffe, welche sich ausschliesslich auf die Rachentonsille beschränken. Die Schleimhaut der Hinterwand erscheint in der Regel atrophisch, mit eingetrocknetem Secret bedeckt, seltener hypertrophisch und granulirt. Nach des Verf. und Chiari's Erfahrungen gehören selbstständige Erkrankungen des Recessus medius zu den Seltenheiten; dagegen findet sich bei den diffusen chronischen Nasenrachenkatarrhen, besonders den trockenen mit Ozaena combinirten Formen, die Bursa häufig mitergriffen.

Die subjectiven Beschwerden, welche beim chronischen Katarrh oder bei Cystenbildung der Tonsilla pharyngea auftreten, sind im Allgemeinen dieselben, wie sie jedem chronischen Nasenrachenkatarrh zukommen: auch Reflexe in anderen Organen sind beobachtet; das Specielle findet sich am Schlusse des Capitels.

Die Diagnose stützt sich auf die Spiegeluntersuchung, die eventuell mit Gaumenhaken zu bewerkstelligen ist, auf das Hervorquellen von Secret aus den Mündungen der Rachentonsille, sowie die anderen objectiven und subjectiven Erscheinungen.

Die Behandlung des chronischen Katarrhs der Rachentonsille und ihrer Recessus muss zuerst auf Entfernung der Secrete mittelst Nasendouche oder Spray (Kochsalzcarbollösung), eventuell mit der Pincette, gerichtet sein; dann insufflire man Tannin, Alaun, Argent. nitr. 1·0—10·0 Amylum oder pinsele mit Lapislösung oder Jodglycerin. Bei sehr enger Oeffnung führt Tornwaldt eine mit Lapis überzogene Sonde in den Recessus ein oder injicirt mittelst Spritze concentrirte

Lapislösung. Noch rascher wirkt galvanokaustische Spaltung der Bursa, sowie wiederholte Cauterisation ihrer Wände mit einem Spitzbrenner. Am raschesten führt die Abtragung der ganzen Rachentonsille bis auf das Periost mittelst scharfer Löffel (Kafemann) oder des Lange'schen oder Hartmann'schen oder Gottstein'schen Ringmessers mit darauffolgender Aetzung mit Lapis oder Chromsäure zum Ziele. Die Blutung ist eine sehr geringe, ebenso die Reaction, wie Verf. bestätigen kann. Schäffer zerstört die Rachentonsille mit dem Flachbrenner.

Unstreitig am häufigsten unter allen Abschnitten des Rachens erkrankt die Pars oralis.

In seiner einfachsten Form manifestirt sich der chronische Katarrh derselben durch gleichmässige Röthung und sammtartige Schwellung der Schleimhaut. Die Röthe ist zuweilen so unbeträchtlich, dass nur ein geübtes Auge im Stande ist, dieselbe als pathologisch zu agnosciren; meist ist sie gesättigt, mit einem Stich in's Blaurothe; in anderen Fällen erscheint die Schleimhaut wie marmorirt, im grossen Ganzen aber glatt oder durch erweiterte geschlängelte Blutgefässe und geschwellte Schleimdrüsen leicht uneben und mit einem grauen, grüngelben Secret bedeckt. Manchmal erscheint die hintere Rachenwand in mehrere platte oder rundliche Längsstreifen getheilt, welche seichte Furchen zwischen sich lassen; es sind dies jene Fälle, bei denen es bereits zu einer partiellen Hypertrophie der Schleimhaut gekommen ist. Der diffuse einfache Rachenkatarrh kommt hauptsächlich beim männlichen Geschlechte vor, namentlich bei Individuen, welche sich in unreiner, staubiger, rauchiger Luft aufzuhalten haben; auch das Tabakrauchen spielt dabei die erste Rolle (Jurasz).

Die am häufigsten vorkommende Form ist die granulöse (Pharyngitis granulosa).

Untersucht man eine grössere Anzahl jugendlicher und erwachsener Personen beiderlei Geschlechtes, so erblickt man auf der längs der Wirbelsäule herablaufenden Schleimhaut des Rachens, hauptsächlich aber auf der Pars oralis und ihrer nächsten Umgebung, intensiv rothe, manchmal blassrothe oder gelbliche, längliche oder ovale Erhabenheiten von der Grösse einer Linse oder Erbse, selbst Bohne Bald ist nur ein einziges Exemplar vorhanden, bald mehrere in gleichmässiger Zerstreuung über die Schleimhaut, bald stehen sie in Gruppen bei einander, nicht selten bilden sie flache, verschieden breite Platten. Durch die Untersuchungen von Saalfeld und Roth ist endgiltig sichergestellt, dass die Granula eine circumscripte Wucherung des lymphatischen Gewebes in der Umgebung des Ausführungsganges einer Schleimdrüse darstellen.

Der Ausführungsgang der Drüse ist nur im Bereiche des geschwellten Gewebes erweitert, das Pflasterepithel der Schleimhaut setzt sich auf die Granula fort und erscheint zuweilen auf der Höhe

derselben verdünnt, manchmal fehlt es sogar völlig. Die zwischen den Granulationen liegende Schleimhaut ist theils normal, theils hyperämisch und von erweiterten Gefässen durchzogen. Unendlich viel seltener als in der Pars oralis kommen Granula in den tieferen Theilen des Rachens vor; zuweilen sieht man auch ein oder das andere Exemplar in die beiden Gaumenbögen oder das Velum eingelagert.

Bresgen hält die Granula für angeboren; Roth widerspricht ihm und behauptet, dieselben bei Neugeborenen niemals gesehen zu haben; bei Kindern unter 6 Jahren sind sie sehr selten, während sie nach dem 6. Jahre allmälig häufiger werden; Roth sah dieselben wiederholt bei Erwachsenen sich erst entwickeln. Die Zunahme der Granula mit dem wachsenden Alter erklärt sich wohl aus der Intensität und Vielfältigkeit der Reize, welche in allmäliger Progression die Rachenschleimhaut treffen. Während bei Säuglingen und jüngeren Kindern durch die reizlose und milde Kost und die seltene Gelegenheit zu Erkältungen die Entwicklung der Granula verhindert wird, werden dieselben im späteren Kindesalter durch die Theilnahme am Tische der Eltern sowie in Folge der beim Schulbesuche unvermeidlichen Erkältungen und die intercurrirenden, durchweg mit acuten Anginen verlaufenden Kinderkrankheiten allmälig häufiger. Dazu gesellen sich mit dem 12. Lebensjahre, oft noch viel früher, der Reiz der Cigarre und die erwachende, im Jünglings- und Mannesalter sich noch steigernde Vorliebe für Alcoholica sowie die eingangs beschriebenen Berufsschädlichkeiten. Was Wunder also, wenn es kaum einen erwachsenen Menschen gibt, der völlig frei wäre von Granulationen. Wenn das weibliche Geschlecht auch nicht ganz von denselben verschont bleibt, so erkrankt dasselbe doch nicht in dem Maasse wie das männliche, das nach Jurasz gerade doppelt so häufig ergriffen wird. Bei der Entstehung der Granula kommen nach Jurasz mechanische, chemische und thermische Reize, letztere häufig in Folge von Nasenverstopfung, ganz besonders in Betracht. Die Disposition zu Granulationenbildung ist bei manchen Menschen ganz auffallend gross. So erinnert sich Verf. mehrerer Patienten, welche schon kurze Zeit nach der gründlichen galvanokaustischen Zerstörung der Granula wieder mit solchen behaftet waren, und zwar an Stellen, die vorher frei geblieben. Die Anwesenheit von Granulationen bedingt jedoch durchaus nicht immer Beschwerden; diese letzteren entstehen meistens dann, wenn das hyperplastische, um die erweiterten Ausführungsgänge der vergrösserten Schleimdrüsen gelegene lymphatische Gewebe oder die zwischen den einzelnen Granulationen befindliche Schleimhaut sich entzündet oder die Granula durch ihre Grösse und Lagerung die Endausbreitungen der sensiblen Rachennerven irritiren.

Combinationen der granulösen Form mit der einfachen Form des chronischen Rachenkatarrhs kommen unendlich häufig zur Beobachtung. Ab und zu finden sich auf der Schleimhaut hirsekorn- bis linsengrosse Erhabenheiten, welche an der Spitze einen gelben Punkt

tragen und verstopfte Balgdrüsen vorstellen; häufig begegnet man denselben auf den Gaumenbögen und auf den Tonsillen, deren Follikel ausgedehnt und mit eingedicktem verfetteten Eiter gefüllt sind.

Localisirt sich der Entzündungsprocess an den Seitenwänden des Rachens, so bezeichnet man denselben als Pharyngitis lateralis hypertrophica oder als Entzündung der Seitenstränge (Michel, M. Schmidt, Hering) oder als retroarcualen chronischen Rachenkatarrh (Jurasz).

Bei der Inspection der Hinterwand sieht man, weniger deutlich oder auch gar nicht bei ruhigem Velum, hingegen deutlicher bei Würgebewegungen, unmittelbar hinter dem Arcus palatopharyngeus einen bald blass-, bald intensiv rothen, länglichrunden oder platten, selten höckerigen Wulst, der gegen die Mittellinie vorspringt und sich nach oben oder nach unten, meist nach beiden Richtungen, fortsetzt. Der Umfang dieses Wulstes oder Stranges oder Schleimhautfalte wechselt zwischen der Dicke eines dünnen Bleistiftes und eines kleinen Fingers. Wie man durch Inspection und Palpation eruiren kann, verliert sich derselbe nach oben zu in den Tubenwulst, stellt also eine wahre Hypertrophie der Plica salpingopharyngea vor. Dieselbe kann eine längliche, haselnussgrosse, fleischähnliche Geschwulst bilden, die sich nach unten verschmälert und sich zuweilen mit einem mit vielen Trachomkörnern besetzten Conjunctivalwulst vergleichen lässt. Sehr oft geht der entzündete Seitenstrang nicht in die Plica salpingophar. über, sondern hält sich ganz in der äussersten seitlichen Ecke des Rachens und verliert sich unterhalb und nach aussen vom Tubenwulst oder zieht in leichtem Bogen nach vorne gegen die Hakenkrümmung zu Die Tubenwülste und seine Falten zeichnen sich in der Ruhe und bei Bewegung scharf von diesem Strange ab, welcher bei der Phonation und beim Schlucken eine leichte Einwärtsbewegung ausführt. In der Nähe der Insertion des hinteren Gaumenbogens verbreitert sich sehr oft die hypertrophische Schleimhautfalte zu einer flachen, glatten oder unebenen, oft ganz aus Granulationen bestehenden oder mit einzelnen Granulis besetzten Coulisse, welche bei Würgebewegungen nach einwärts vorgedrängt wird. Diese oft perlschnurartige Verdickung der Schleimhaut verliert sich entweder im Niveau der Insertion des hinteren Gaumenbogens oder setzt sich nach unten zu fort, um in der Höhe der Kehldeckelspitze plötzlich oder allmälig in die normale Schleimhaut überzugehen. Die Pharyngitis lateralis ist meist doppelseitig, häufig aber auf einer Seite stärker entwickelt. Die zwischen den hypertrophischen Seitensträngen liegende Schleimhaut kann normal oder mit Granulationen besetzt oder in anderer Weise verändert sein. Hering unterscheidet die Pharyngitis lateralis granulosa von der eigentlichen Pharyng. lat. hypertr. Unter ersterer versteht er ein Conglomerat von Granulationen, welche auf den geschwellten und congestionirten Falten der Seitenwand um die Plica salpingopharyngea herum oder unterhalb derselben ihren Sitz haben, unter letzterer die oben beschriebene Hypertrophie der Plica

salpingopharyngea und ihrer nach unten sich fortsetzenden Schleimhautpartien.

Die chronische Entzündung des weichen Gaumens ist meist eine Theilerscheinung des chronischen Katarrhs der Hinterwand, oft ist sie die einzige Veränderung, welche im Rachen wahrzunehmen ist.

Ihre objectiven Erscheinungen bestehen in Röthung des Velum, das von erweiterten Gefässen durchzogen und durch die Schwellung zahlreicher Drüsen uneben ist. Das Velum erscheint ferner verdickt, die Gaumenbögen sind in dicke, rothe Wülste umgewandelt, ihre Beweglichkeit ist mehr oder weniger beschränkt. Die blaurothe, ödematöse, an ihrer Vorderfläche durch geschwellte Follikel unebene Uvula stellt einen langen, dicken, plumpen Zapfen vor, der mit nach einer Seite gewendeter Spitze auf den Rücken der Zunge herabhängt oder durch Schleimfäden an die Hinterwand angeklebt ist. Die Schleimhaut der Uvula hängt besonders in ihrem untersten Theile als leerer Sack herab; zuweilen erscheint das Epithel getrübt und milchig. Nicht selten sind die Schleimdrüsen der Uvula ektatisch und ragen als linsen- bis erbsengrosse, grauröthliche Erhabenheiten über die übrige Schleimhaut hervor; auch finden sich zuweilen am Rande der Uvula oder den Gaumenbögen kleine gestielte Papillome.

Eine ebenfalls nicht seltene Form der chronischen Pharyngitis ist der chronische Katarrh der Lacunen der Gaumenmandeln. Man trifft denselben sowohl in hypertrophischen als auch atrophischen Mandeln; bei Druck auf dieselben oder auch spontan entleert sich eine milchig-eitrige Flüssigkeit, welche, wenn sie sich verdickt, die sogenannten später zu beschreibenden „Mandelpfröpfe“ bildet, die wieder entzündungserregend wirken.

Mit der Pars oralis zusammen oder auch für sich allein erkrankt die Pars laryngea pharyngis.

Der objective Befund gestaltet sich hier ziemlich einfach: die hintere Rachenwand erscheint im Kehlkopfspiegel mehr oder weniger geröthet, mit Schleim bedeckt, uneben und leicht höckerig. Die Unebenheiten sind fast durchweg durch die Schwellung der Schleimdrüsen bedingt, seltener durch Granula, welche sich durch ihren grösseren Umfang und ihre Form deutlich von den ersteren unterscheiden. An der Erkrankung der tieferen Rachentheile nimmt sehr oft der Kehlkopf Theil. Die Ligam. aryepigl., die Incis. interaryt., manchmal die ganze Hinterwand erscheinen mehr oder weniger geröthet und geschwellt, die Schleimhaut der Regio interarytaen. convex nach vorne gewölbt und mit zähem Schleim bedeckt. Seltener verbreitet sich die Röthe auch auf die Stimmbänder; in der Regel ist in Folge der erwähnten Schleimhautschwellungen und durch Muskelparesen der Verschluss der Glottis ein mangelhafter.

Nachdem wir gesehen haben, dass die Pharyngitis chronica weitaus am häufigsten mit Hypertrophie der Schleimhaut einhergeht, müssen wir auch des Ausganges in Atrophie gedenken.

Man bezeichnet diese Form als Pharyngitis chronica atrophica sive sicca oder auch als rareficirenden Rachenkatarrh. Die Atrophie betrifft die Schleimhaut in verschiedener Ausdehnung und in verschiedenem Grade. Im Allgemeinen zeigt sich das Bindegewebe vermehrt, das Drüsengewebe verringert. Ganz besonders muss betont werden, dass neben atrophischen Stellen häufig hypertrophische sich vorfinden. Wenn auch der Beweis, dass die Atrophie sich stets aus der Hypertrophie entwickelt, nicht stricte zu erbringen ist, weil man selten in der Lage sein wird, den chronischen Rachenkatarrh von seinem ersten Anfange an bis zu den letzten Veränderungen zu verfolgen, so dürfte dies doch aus Gründen der Analogie höchst wahrscheinlich erscheinen Die Frage, ob die Atrophie sich nicht manchmal primär, d. h ohne vorausgegangene Hypertrophie, entwickelt, muss als offene bezeichnet werden.

Der unstreitig am häufigsten von Pharyngitis sicca befallene Theil des Rachens ist der Nasenrachenraum und die Pars oralis, sehr häufig schneidet dieselbe haarscharf in der Höhe der Uvula oder im Niveau der Insertion derselben an dem Velum ab; schon viel seltener setzt sich dieselbe in die Pars laryngea und sogar den Kehlkopf fort, am allerseltensten aber wird die vordere Fläche des Gaumensegels und die Mundschleimhaut befallen. Die Schleimhaut erscheint dünn und zart, glänzend, und legt sich bei der Contraction der Muskeln in feine, deutliche Lichtreflexe zeigende Fältchen. Die unter der Schleimhaut sichtbaren Muskeln verleihen derselben das Aussehen von rohem geräucherten Fleisch und purpurrother bis blassrother Farbe. Die Rachenhöhle erscheint, wenn die Atrophie grössere Strecken ergriffen hat, weiter, was besonders bei dem Schwunde des cytogenen Gewebes der Pars nasalis hervortritt. Die Tubenwülste springen theils in Folge der Atrophie ihres Ueberzuges, theils ihrer nächsten Umgebung deutlich vor, ebenso die hinteren Muschelenden.

In Folge des Unterganges zahlreicher Schleimdrüsen ist die Secretion mehr oder weniger vermindert und verändert. Das meist spärliche Secret überzieht wie eine Tapete oder eine dünne Collodiumschicht die Schleimhaut und verleiht derselben einen firnissartigen Glanz; es haftet in Folge des geringen Wassergehaltes der Unterlage so fest an, dass man es in Form einer Borke mit der Pincette abziehen muss. So unzweifelhaft aber auch im Rachen wirkliche Atrophie vorkommt — nach M. Schmidt jedoch nur im hohen Alter —, so sicher ist anderseits, dass dieselbe nicht bei jeder Pharyngitis sicca vorgefunden wird. Das Secret stammt in der Mehrzahl der Fälle aus der Nase und verdankt der Ozaena oder Eiterungen der Nebenhöhlen, besonders der Keilbeinhöhlen oder dem chronischen Katarrh der Bursa pharyngea oder luetischen Affectionen am Rachendach oder Vomer seine Entstehung, und fliesst in den Nasenrachenraum, wo es vertrocknet und haften bleibt. In einer anderen Reihe von Fällen fehlt

jede Erkrankung der Nase und ihrer Nebenhöhlen, das Secret wird im Rachen selbst producirt, wie man sich bei Tuberculösen, Scrophulösen, Anämischen überzeugen kann. Auch Jurasz und M. Schmidt, finden die Schleimhaut durchaus nicht immer atrophisch, der erstere sogar häufig mit ganz kleinen Granulationen besetzt, der letztere glaubt, dass ein eigenthümlicher Stoff, das Siccativ, die Austrocknung verursache und Atrophie vortäusche, denn es könne völlige Heilung erfolgen, was unmöglich sei, wenn die Drüsen zu Grunde gegangen seien. Sicher geht es aber zu weit, wenn Manche, wie z. B. Krebs, die Existenz eines atrophischen Rachenkatarrhs vollständig leugnen.

Der Vollständigkeit wegen sei erwähnt, dass Atrophie nicht nur der Schleimhaut, sondern auch aller Rachengebilde, namentlich des weichen Gaumens und der Uvula, wahrscheinlich in Folge vorausgegangener acuter und chronischer Entzündungen bei Tuberculösen sowie im Greisenalter beobachtet wird. Das Gaumensegel erscheint blass, dünn und mager, die Uvula klein und spitzig. Die Atrophie der Tonsillen ist fast immer das Product vorausgegangener entzündlicher, namentlich lacunär-follicülär-ulceröser Processe; sie ist bald einseitig, bald doppelseitig, oder, was sehr häufig ist, die eine Tonsille ist hypertrophisch, die andere atrophisch. Die Oberfläche solcher atrophischer Mandeln ist meist stark zerklüftet und uneben, die Schleimhaut blass, verdickt und narbig.

Es erübrigt nur noch, jener Form des chronischen Rachenkatarrhs zu gedenken, welche man als stinkende oder fötide Pharyngitis bezeichnet. Nach den bisherigen Beobachtungen scheint der Process mit dem der Rhinitis foetida identisch zu sein. Roth konnte sich durch die Tamponade der Choanen überzeugen, dass das fötide Secret nicht aus der Nase stamme, sondern auf der Rachenschleimhaut selbst erzeugt werde. Die Affection tritt theils in Combination mit Ozaena und Nebenhöhleneiterungen, theils selbstständig auf. Mit der Störk'schen Blennorrhoe scheint sie sehr nahe verwandt zu sein, doch ist es ein Charakteristicum der ersteren, dass der Process stets in der Nase beginnt und sich erst im weiteren Verlauf auf Rachen, Kehlkopf und Luftröhre ausbreitet.

Wir wenden uns nun zur Symptomatologie.

Zu den frühesten und constantesten Erscheinungen gehören perverse Sensationen im Rachen.

Am häufigsten wird über Trockenheit im Halse geklagt, nicht minder über Verschleimung. Man würde sich jedoch sehr täuschen, wollte man annehmen, dass in ersterem Falle die Schleimhaut ausnahmslos trocken und mit wenig, in letzterem Falle feucht und mit dünnem und reichlichem Secrete bedeckt wäre. Constant sind die Klagen über Trockenheit nur bei Pharyngitis sicca, weshalb die meisten Kranken, ohne gerade Durst zu empfinden, den Rachen öfters anfeuchten. So verschieden wie die Quantität ist auch die Qualität des Secretes. Dasselbe ist in der Regel grau, glasig, zäh, bald mehr

schleimig, schleimig-eitrig, blutig gestreift oder sehr selten rein blutig. Gelbes, rein eitriges, flüssiges oder zu Borken eingetrocknetes Secret deutet meist auf Ulcerationsprocesse oder Naseneiterungen hin. Das Secret haftet entweder nur an einzelnen Stellen der Schleimhaut in Form kleiner grauer Klümpchen oder überzieht, wie bei dem trockenen Katarrh, die ganze Schleimhaut gleichmässig. Die natürliche Folge dieser Secretionsanomalien ist das Bedürfniss, durch Räuspern das vorhandene oder eingebildete Secret zu entfernen. Die Entfernung geschieht theils durch kräftige, tönende Exspiration, das sogenannte „hem hem", oder auch bei geschlossenem Munde durch rasches Einziehen von Luft in den Nasenrachenraum oder unter gleichzeitiger heftiger Erschütterung des weichen Gaumens.

Ein weiterer Grund für das häufige Räuspern liegt in dem Gefühl des Kranken, einen Fremdkörper, ein Haar, eine Gräte, eine Nadel, Sandkörner und andere Dinge im Halse zu haben. Durch die fruchtlosen, immer wiederholten Versuche, diesen Fremdkörper oder den angesammelten und zu Klumpen vertrockneten Schleim zu entfernen, steigert sich die Röthung und Empfindlichkeit der Schleimhaut derart, dass Brechen und Würgen und vermehrtes Schluckbedürfniss, namentlich am Morgen, eintritt. Das letztere führt nicht selten zu abnormer Luftauftreibung des Magens, Appetitlosigkeit und Verdauungsbeschwerden; der Vomitus matutinus ist viel häufiger eine Rachen- als eine Magenaffection.

Wirkliche Schmerzen beim Schlucken fehlen in der Regel, doch können entzündete Seitenstränge, eingetrocknete harte Secretmassen, besonders bei der trockenen Form, zu stechenden Schmerzen Anlass geben.

Unangenehme, brennende, manchmal auch Kältegefühle, Kratzen, Drücken, treten spontan oder bei der Nahrungsaufnahme, beim Rauchen und dem Genusse zu heisser oder gewürzter Speisen, hauptsächlich der Alcoholica auf. Manchen Kranken verursacht selbst der Genuss einfachen frischen Wassers abnorme Sensationen; bei der trockenen Form werden die Beschwerden sehr oft bei Aufenthalt an der See oder Regenwetter, ferner nach dem Genusse reizender Ingesta, wahrscheinlich in Folge der durch die vermehrte Blutzufuhr momentan gesteigerten Secretion, gelindert, zuweilen für einige Stunden völlig beseitigt, hingegen bei trockener Luft, Menstruation, körperlicher Anstrengung und gemüthlichen Erregungen gesteigert (M. Schmidt).

Dass viele mit zahlreichen entzündeten Granulationen und Hypertrophie der Seitenstränge, selbst mit Pharyng. sicca Behaftete keine Beschwerden haben, während Andere bei Anwesenheit geringfügiger Veränderungen die alarmirendsten Erscheinungen darbieten, hängt theils von der verschiedenen Erregbarkeit des Nervensystems, speciell der Schlundnerven, theils von dem Grade der begleitenden entzündlichen Erscheinungen ab. M. Schmidt erklärt das Fehlen jeglicher Symptome trotz der Anwesenheit entzündeter Seitenstränge aus dem Umstande, dass dieselben in diesen Fällen nicht bis zum Constrictor pharyngis supr. hinaufragen und bei der Contraction dieses Muskels nicht insultirt

werden. Sehr häufig sind, namentlich bei Hypertrophie der Seitenstränge, die Beschwerden wechselnd; auf wochen-, selbst monatelange Euphorie folgen Zeiten der quälendsten Belästigung.

Bei sensiblen, zuweilen aber auch bei robusten Personen, gehören neuralgische, in entfernten Organen sich abspielende Erscheinungen — Reflexneurosen — zu den gewöhnlichen Vorkommnissen. Bei weiblichen Personen sind reflectorische Krämpfe des Oesophagus ziemlich häufig. Ebenso können Asthma, Migräne, Brustschmerz am Sternum und andere Reflexerscheinungen, auf die wir bei den Krankheiten der Nase näher eingehen müssen. Folgen eines gewöhnlichen Rachenkatarrhs oder katarrhalischer und cystöser Erkrankung der Bursa pharyngea sein. Es ist ein Verdienst von Hack, auf die angedeuteten Krankheitszustände sowie auf das Vorkommen spontan auftretender, plötzlich durchfahrender Stiche zwischen den Schulterblättern und rheumatischer, meist nur bei Muskelcontractionen sich einstellender Schmerzen über den Schlüsselbeinen aufmerksam gemacht zu haben.

Eine ebenfalls hieher gehörige Reflexerscheinung ist Husten. Wenn auch in der weitaus grössten Zahl der Fälle bei Pharyng. chron. kein Husten beobachtet und derselbe meist mit Räuspern verwechselt wird, so ist doch jetzt durch exacte Beobachtungen unumstösslich sichergestellt, dass in der That von der Pharynxschleimhaut aus Husten erzeugt werden kann. Verf. hat wiederholt Hustenanfälle (Rachen- oder Spinnenhusten) sowohl spontan entstehen sehen, als auch dieselben durch Berührung der Granula und Seitenstränge mit auffallender Promptheit erzeugen können. Der sogenannte „Rachenhusten", nach Schadewaldt und Wille pharyngealer Trigeminushusten genannt, hat, abgesehen von den positiven Experimenten Kohts, seine entschiedene Berechtigung. Wenn Störk denselben aus der Reizung des Kehlkopfes durch Hinabfliessen des Secrets erklärt, so ist dies nur zum Theile richtig; bei Miterkrankung des Kehlkopfes, mag sie noch so unbedeutend sein, bedarf das Auftreten von Husten ohnehin keiner weiteren Erklärung.

Höchst schädlich wirkt der chronische Rachenkatarrh, namentlich die Hypertrophie der Seitenstränge, auf die Stimme.

Mag man einen Lehrer oder Officier, einen Sänger oder Schauspieler hören, alle klagen über rasche Ermüdung der Stimme, über den Verlust des Metalles, über Schwierigkeit bei der Production höherer Töne. Diese Symptome erklären sich theils aus der Reibung und Reizung des Kehlkopfes in Folge des ewigen Räusperns, theils aus den anatomischen Veränderungen, welche die Rachenschleimhaut erlitten hat. Miehel, dessen Erörterungen sich der Verf. vollständig anschliesst, erklärt sie folgendermassen:

Die Rachenwand bildet den hauptsächlichsten Reflector für die aus der Kehle strömenden Schallwellen; hier und gegen das Velum schlagen sie zuerst an. Ist diese Wand nun nicht glatt, sondern höckerig, uneben durch Granulationen und Hypertrophien, so müssen sich Klangschatten bilden, gerade so wie eine buckelige Spiegelfläche

von einem vorgehaltenen Gegenstande nur ein entstelltes Bild geben kann. Durch den mangelhaften Reflex erleidet also der Ton Einbusse; er wird abgeschwächt, er trägt nicht weit oder, was dasselbe ist, er verliert sein Metall Granulationen und Flächenhypertrophien, die an den hinteren Gaumenbögen sitzen, oder abnorme Verbindungen der Gaumenmandel mit den Gaumenbögen belasten dieselben, machen sie steif, mehr oder weniger starr, wodurch ihre Beweglichkeit vermindert wird: dann aber werden letztere auch schwingungsunfähiger, pflanzen die sie treffenden Schallwellen nicht weiter fort und dadurch geht wieder ein Theil von diesen verloren. Die Pharyng. lat. hypertr. beeinträchtigt die Beweglichkeit des Gaumensegels dadurch, dass sie dem Emporsteigen desselben hinderlich ist, auch verschlechtert sie als eine fleischige Masse die Resonanz. Ein weiteres Hinderniss für die Entfaltung der Stimme liegt in der durch anhaltend lautes Sprechen und Singen hervorgerufenen Schwellung, Erhitzung und Trockenheit der Schleimhaut. Durch den Versuch, diese verschiedenen Hindernisse zu überwinden und den Ausfall an Klang zu ersetzen, wird deshalb die Stimme oft über Gebühr angestrengt und forcirt, was Schwäche der Stimme und Verlust des Metalles zur Folge hat. Phonische Paresen kommen häufig vor, nach Jurasz namentlich im Gefolge des trockenen und retroarcualen Katarrhs; in manchen Fällen scheint es sich um eine reflectorische vom Rachen ausgehende Atonie der Larynxmuskeln zu handeln.

Störungen des Gehörs kommen bei chronischen Katarrhen des Nasenrachenraumes äusserst häufig vor. Die Ohraffection ist theils primär, theils secundär, d. h. von der Schleimhaut des Rachens auf jene der Tuba und des Mittelohres fortgeleitet, und wird deren Rückbildung durch die bestehende Rachenaffection verhindert oder verzögert. Die die Tonsillarhypertrophie so häufig begleitende Schwerhörigkeit hat weniger ihren Grund in directem Verschluss (Compression) des Tubeneinganges durch das vergrösserte Organ, als vielmehr in dem die Tonsillarhypertrophie begleitenden entzündlichen Katarrh der Tubenmündungen.

Bei der Summe der verschiedenen Störungen ist es nicht zu verwundern, wenn der chronische Rachenkatarrh auch auf das Allgemeinbefinden, besonders auch auf das Gemüthsleben in äusserst schädlicher Weise einwirkt.

Deprimirte Gemüthsstimmung, Sterbegedanken, die Idee, dass sich eine unheilbare Halsschwindsucht oder ein Krebsleiden entwickelt habe, führen durch mangelhafte Ernährung, unruhigen, ungenügenden Schlaf zu Mattigkeit, Anämie, Lebensüberdruss mit Selbstmordgedanken und kennzeichnen so die echte Hypochondrie des Halses. Die Sorge um die Erhaltung des Lebens veranlasst die Kranken zu peinlichster Auswahl der Speisen und Getränke, zu Vermeidung aller, selbst der schwächsten Alcoholica, ja selbst aller festen Nahrung, zu dem Gebrauche der ekelhaftesten Medicamente, zu möglichst dicker Umhüllung des Halses und zu einer bis zum Fanatismus gesteigerten Scheu vor frischer Luft und Berührung mit kaltem Wasser.

Oftmals entwickelt sich das volle Bild der Hysterie mit allen möglichen anderweitigen Störungen.

Zum Schlusse erübrigt noch, auf die Beschwerden einzugehen, welche die Hypertrophie der Uvula hervorbringt.

Man hat dem hypertrophischen Zäpfchen so schauderhafte Folgen nachgesagt, dass es nicht unnöthig erscheint, die wirklichen Störungen von den eingebildeten zu sondern.

Dass die Vergrösserung der Uvula die Ursache der Lungenschwindsucht sei, glaubt heutzutage kaum mehr ein altes Weib. Dass die Uvula durch Herabhängen auf die Stimmbänder Erstickungserscheinungen verursache, gehört gleichfalls in das Bereich der Fabel. Richtig ist, dass dieselben in höchst seltenen excessiven Fällen bis zum Kehldeckel herabreichen und dadurch Reizhusten, unter Umständen eine Art Glottiskrampf erzeugen kann. Hyrtl erwähnt ferner einen Kranken, der sich seine abnorm vergrösserte Uvula beim Husten abbiss. Für gewöhnlich beschränken sich jedoch die durch Herabhängen der Uvula auf den Zungengrund verursachten Beschwerden auf das Gefühl eines Fremdkörpers, auf Kitzel und Verschleimung, Würge- und Brechreiz. Die Stimme ist öfters unrein, durch Parese des Azygos uvulae und Mehrbelastung des Velum leicht nasal.

Die Diagnose des chronischen Rachenkatarrhs stützt sich auf die subjectiven und objectiven Erscheinungen. Der Anfänger beherzige stets, dass in zahlreichen Fällen der objective Befund in keinem Verhältnisse steht zu der Heftigkeit der subjectiven Beschwerden und lasse sich dadurch in seiner Diagnose nicht beirren. Nur beim gänzlichen Mangel oder äusserster Geringfügigkeit der objectiven Veränderungen im Rachen und am Zungengrund stelle man die Diagnose auf nervöses Halsleiden. Da Geschwüre bei dem idiop. chron. Rachenkatarrh niemals vorkommen, so denke man bei der Anwesenheit solcher in erster Linie an Syphilis, dann an Tuberculose, Lupus, Herpes etc. Die Differentialdiagnose zwischen Larynx- und Bronchialkatarrh und Pharyngitis ist in der Regel leicht, manchmal erst nach längerer Beobachtung sicherzustellen. Auf die Angaben des Kranken, dass der Schmerz oder die unangenehmen Empfindungen nur auf einer Seite, hoch oben, in der Mitte oder tief unten ihren Sitz hätten, kann man sich bei dem geringen Localisationsgefühl des Rachens nicht verlassen. Nach Schadewaldt verlegen die meisten Kranken den Sitz ihrer unangenehmen Sensationen in die Regio laryngotrachealis, gleichviel, ob die pathologischen Veränderungen im Nasenrachenraum oder der Pars oralis, Pars laryngea des Rachens oder im Kehlkopfe selbst ihren Sitz haben. Immerhin hat sich dem Verf. die Berührung der erkrankten oder verdächtigen Schleimhautpartien, besonders der Granula und Seitenstränge, mittelst der Sonde insoferne als ein diagnostischer Behelf erwiesen, als die gänzlich unvorbereiteten Patienten meistens über plötzlichen Schmerz klagen und die betreffenden Schleimhautstellen mit Bestimmtheit als den Sitz ihrer Beschwerden bezeichnen. Granula können mit nichts Anderem verwechselt werden, dagegen hat

man sich zu hüten, eine syphilitische Infiltration der seitlichen Pharynxtheile nicht mit entzündeten Seitensträngen zu verwechseln. Bei dem trockenen Katarrh untersuche man stets die Nase und ihre Nebenhöhlen sowie den Urin, der nicht selten Zucker und Eiweis enthält

Der Verlauf kann sich über viele Jahre, selbst das ganze Leben erstrecken. Zeitweise, namentlich bei Witterungswechsel psychischer Erregung, Aufnahme gewisser Ingesta, werden die Beschwerden weniger, zeitweise stärker empfunden. Der Status der Schleimhaut kann lange Zeit völlig unverändert bleiben, in der Regel aber nimmt die Hypertrophie stetig zu oder es tritt endlich Atrophie ein.

Die Prognose ist quoad vitam günstig. Wenn auch der chronische Rachenkatarrh niemals direct zum Tode führt, so kann derselbe doch, wie aus den geschilderten Beschwerden hervorgeht, den damit Behafteten das Leben gründlich verbittern. Während noch vor einem Decennium der chronische Rachenkatarrh zu den unheilbaren Krankheiten gezählt wurde, ist dies jetzt anders geworden. Die hypertrophische Form kann gründlich und dauernd geheilt werden, eine schlechte Prognose gibt nur die atrophische Form, da wir zur Zeit noch kein Mittel besitzen, eine atrophische Schleimhaut wieder zur Norm zurückzuführen. Jurasz und M. Schmidt halten die Prognose des trockenen Rachenkatarrhs keineswegs für schlecht, nur sei der Verlauf äusserst hartnäckig.

Therapie. Bei wenigen Affectionen findet man noch so unklare Ansichten über die Behandlung als beim chronischen Rachenkatarrh. Die ausführliche Besprechung der modernen Behandlungsmethoden der chronischen Pharyngitis hält deswegen der Verf. sowohl im Interesse des Arztes als des Patienten für äusserst nothwendig.

Die Kranken, welche ernstlich gewillt sind, von ihrem Leiden loszukommen, mögen jedoch niemals vergessen, dass eine Heilung nur bei grösster Consequenz und Ausdauer möglich ist und dass eine Affection, die schon Jahre bestanden hat, sich nicht in wenigen Tagen oder Wochen beseitigen lässt. Anderseits soll der Arzt jedem Einzelfalle seine Behandlungsweise genau anpassen und nicht nach der Schablone verfahren.

Da man der Indicatio causalis fast nie genügen kann, so muss man sich in den meisten Fällen mit einem prophylaktischen und mehr hygienisch-diätetischen Verfahren begnügen. Es ist selbstverständlich, dass Anämie, Scrophulose und Hämorrhoidalzustände beseitigt, der Genuss stärkerer Alcoholica und scharfer oder gewürzter und zu heisser Speisen sowie das Rauchen und Schnupfen verboten oder thunlichst eingeschränkt werden. In staubiger Luft Arbeitende müssen sich durch respiratorähnliche Vorrichtungen schützen und während der Dauer der Behandlung die gewohnten Räume meiden, Berufsredner müssen sich beurlauben lassen, eventuell von ihren Sprachwerkzeugen möglichst wenig Gebrauch machen. Personen, die sich leicht erkälten, sollen sich warm kleiden, dabei aber vernünftig abhärten. Da der chronische Rachenkatarrh ein örtliches Leiden vorstellt, so muss die Behandlung auch vorzüglich eine örtliche sein.

Es ist daher einleuchtend, dass Bade-, Trink- oder hydropathische Curen ohne gleichzeitige Localbehandlung nicht die richtigen Heilmittel sein können. Am ehesten ist noch bei der diffusen chronischen Pharyngitis der mehrwöchentliche Gebrauch alkalischer, kochsalz- oder schwefelhaltiger Quellen von Nutzen.

Bei allen anderen Formen ist die Localbehandlung unentbehrlich und kann der Brunnencur nur eine unterstützende Wirkung beigemessen werden.

Einen ähnlichen Werth haben die Gurgelungen, Inhalationen und Berieselungen mit dem Spray. Die ersteren haben, wie bereits erwähnt, nur einen Nutzen bei den Erkrankungen des Isthmus faucium; die letzteren sind zwar zur Reinigung und Befeuchtung der Schleimhaut nicht zu entbehren, besitzen aber durchaus keine Heilkraft. Verf. zieht den kalten Spray vor, theils zur schnelleren Abstumpfung der übergrossen Reizbarkeit, theils um die meist schon allzu sehr an die Wärme gewöhnten Schleimhäute allmälig widerstandsfähiger zu machen, und verwendet nur die Resolventia, besonders 1 bis 2% Lösungen von Natr. bicarb., Kali carb., Natr. chlorat., verdünntem Emsersalz; in manchen Fällen wirkt 4% Bromkalilösung beruhigend. Zur Reinigung des Nasenrachenraumes lasse man entweder die Nasendouche gebrauchen oder die obengenannten Lösungen einfach aufschnupfen, bei Kindern mit dem Löffel eingiessen.

Rationelle Mittel besitzen wir hingegen in den Bepinselungen oder Insufflationen.

Handelt es sich um gleichmässige diffuse Röthung und Schwellung, dann beginne man mit täglichen Bepinselungen einer starken Tanninlösung (5:20), die man später durch allmälig stärker werdende Höllensteinlösungen (1:20—10) ersetzt. Weil empfiehlt bei der hypertrophischen Form Pinselungen mit Acetum pyrolignosum crudum, Jurasz mit 1—2% Chlorzinklösung oder Acid. trichloraceticum 0·3 zu Jodi puri 0·15, Kali jodat. 0·2, Glycerini 30·0.

Bei einigermassen beträchtlicher Schwellung bewährt sich jedoch kein Mittel so gut wie das Jod resp. die Mandl'sche Solution. Es empfiehlt sich, je nach der Schwere des Falles, mehrere Concentrationsgrade vorräthig zu haben. Mandl setzte seiner Lösung zur Anästhesie der Schleimhaut Carbolsäure bei, Verf. zieht des besseren Geschmackes wegen Ol. menth. pip. vor. Die drei verschiedenen Concentrationen enthalten:

	1	2	3
Kali jodat . . .	1·0	2·0	3·0
Jodi puri . . .	0·25	0·5	0·8
Glycerin . . .	20·0	20·0	20·0

Ol. menth pip. gutt. duas.

Bresgen wendet noch stärkere Lösungen an, doch reicht man mit den angebenen völlig aus; auch die schwächste von ihnen verursacht anfangs heftiges Brennen, das jedoch meist schon nach einigen Minuten vergeht. Die Bepinselungen, welche die ganze erkrankte Partie

treffen, und bei Localisation in der Pars nasalis und laryngea mit dem gekrümmten Pinsel, bei chronischem Lacunärkatarrh mit der mit Watte umwickelten Sonde vorgenommen werden müssen, sind anfangs täglich, später, wenn man zu den stärkeren Lösungen übergeht, jeden dritten Tag auszuführen.

Die Behandlungsdauer richtet sich nach dem Grade der Schwellung und erstreckt sich meist auf 4—8 Wochen.

Zu Insufflationen, welche jedoch weniger wirksam sind, eignet sich am besten Arg. nitr. 0·5 : 10·0 Amylum; M. Mackenzie empfiehlt Pulv. Catechu 0·03 pro dosi, Ferr. persulfur. 1 : 3 Amylum oder Resina Eucalypti 1 : 3 Amylum.

Zur Beseitigung kleinerer und weicherer Granula greife man zur Chromsäure oder Trichloressigsäure. Lässt auch diese im Stich, was bei schon lange bestehenden hypertrophischen Seitensträngen die Regel ist, dann gibt es nur noch ein Mittel, die von Michel in die Praxis eingeführte galvanokaustische Zerstörung.

Gegen den Paquelin'schen Thermocautère in der von Krieg, C. Weil und Anderen modificirten Form wäre selbstverständlich nichts einzuwenden, wenn die Scheu der Kranken vor der Einführung eines schon glühenden Instrumentes nicht wäre.

Man bedient sich zur Cauterisation der Granula entweder eines in eine kleine rundliche Platte endenden Galvanokauters oder bei grösseren flächenartigen Granulationen sowie zur Zerstörung der Seitenstränge eines transversalen, im rechten Winkel je nach der Grösse der zu cauterisirenden Fläche umgebogenen galvanokaustischen Messers, das bei niedergedrückter Zunge kalt auf die betreffende Stelle aufgesetzt und dann erst zum Glühen gebracht wird. Sind nur wenige Granula vorhanden, dann zerstört man sie am besten alle auf einmal, sind deren aber sehr viele, dann ist nach Ablauf der Reaction eine zweite, eventuell dritte Sitzung nöthig.

Sehr grosse Vorsicht und Uebung erheischt die Cauterisation der Seitenstränge. Sie sind in der Ruhe oft so völlig von den hinteren Gaumenbögen verdeckt, dass man sie am besten während der Phonation oder des Würgens cauterisirt. Stets vermeide man sorgfältigst, die hinteren Gaumenbögen oder andere gesunde Theile zu berühren. Bei Hypertrophie der Plica salpingopharyngea lasse man den Patienten mittelst des Winkelspatels die Zunge selbst fixiren, während der Operateur, um möglichst hoch hinaufzukommen und das Velum vor Verletzung zu schützen, das letztere mit irgend einem geeigneten Instrumente, z. B. Gaumenhaken, nach vorne oder in die Höhe schiebt und in langen Strichen von oben nach unten die Cauterisation vornimmt. Bei der meist ausserordentlichen Derbheit der Stränge und seitlich gelegenen Granula kann nur durch eine energische und öfters wiederholte Cauterisation die vollständige Zerstörung alles Krankhaften erreicht werden.

Während das Brennen der auf der Mitte befindlichen Granulationen meist wenig Schmerz und geringe Reaction hervorruft, ist die Cauterisation der seitlich gelegenen Granula, besonders aber die der

Seitenstränge, selbst nach tüchtiger Cocaïnisirung mit 20% Lösung zuweilen äusserst schmerzhaft. Bei Doppelseitigkeit der Erkrankung ist es deshalb besser, mehrere Sitzungen anzuberaumen. Die Reaction ist häufig eine sehr stürmische; die Schlingbeschwerden erreichen meist nach 6—12 Stunden eine solche Höhe, dass die Kranken nur noch flüssige Nahrung aufnehmen können und selbst diese verweigern, um nur nicht schlucken zu müssen. Selten ist die Reaction so heftig, dass die Operirten wegen Kopfweh, Fieber, allgemeinen Unbehagens einige Tage das Bett hüten müssen.

Man applicire dann Eisumschläge auf den Kopf, lasse Eisstückchen schlucken und anfangs kalt, später lauwarm gurgeln Ist man nicht zu energisch vorgegangen, dann verliert sich der heftige Schmerz meist am 3. bis 5. Tage, um einem leichten Unbehagen oder flüchtigen Stechen beim Schlucken Platz zu machen. Der sich nach der Cauterisation bildende ein veritables Croupexsudat vorstellende Brandschorf stösst sich meist erst nach 8—14 Tagen, manchmal noch später ab; eine frühere Abstossung erfolgt, wenn nach der Cauterisation die Brandwunde mit Pyoctanin bestrichen wird. Ob eine nochmalige Sitzung nöthig ist, kann und soll erst entschieden werden, wenn die reactive Entzündung und Schwellung vollständig beseitigt ist; dann schreite man zur Zerstörung des noch übrigen Restes oder des auf der anderen Seite gelegenen Stranges. Die Zerstörung der Granula kann bei der geringen Reaction früher vorgenommen werden. Bei grosser Dicke und Derbheit der Seitenstränge empfiehlt sich als kürzeres Verfahren die Excision mit der gebogenen Scheere oder auch nach M. Schmidt die Entfernung mittelst eines scharfen, kleinen Trautmann'schen Löffels.

Zur Nachbehandlung empfehlen sich Inhalationen oder Gurgelungen mit antiseptischen Substanzen; auch verbiete man den Kranken das Rauchen sowie das Sprechen und den Genuss reizender oder fester Ingesta, den Besuch von Wirthshäusern oder Theatern, staubenden Localitäten etc.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass von Unberufenen viel Unheil mit der Galvanokaustik gestiftet wird. Einsenken des Galvanokauters bis auf die Wirbelsäule, Umwandlung der Hinterwand in eine einzige narbige Masse, Verbrennungen gesunder Theile, künstlich geschaffene Verwachsungen etc. sind Vorkommnisse, die nicht der Methode, sondern der Gewissenlosigkeit der betreffenden Heilkünstler zur Last gelegt werden müssen.

Lässt sich die Hypertrophie der Uvula nicht durch die obengenannten Touchirungen zurückbilden, dann kommt die Amputation derselben in Frage. Bei dem heute noch vielfach geübten Unfug des Abschneidens des Zäpfchens zur Heilung aller möglichen Krankheiten erscheint es nöthig, die Indicationen näher zu fixiren.

Die Uvulotomie oder Kiotomie ist, wie auch Semon hervorhebt, nur indicirt, wenn die Uvula wirklich auf die Zunge und Epiglottis herabhängen und dieselbe zu Würgen, Husten und krampfartiger Respiration reizen sollte, wenn sich anderweitige Erscheinungen

von Seite des Rachens nur auf die Vergrösserung der Uvula zurückführen lassen, wenn die Uvula bei der Operation endolaryngealer Geschwülste, Spaltung von Abscessen, localer Behandlung etc. hinderlich und endlich, wenn sie der Sitz bösartiger Neubildungen ist.

Man vollführt die Operation entweder mit der Störk'schen Kehlkopf-Guillotine oder mittelst Scheere oder Messer, nachdem man mit einer Pincette oder Zange den untersten Theil der Uvula fixirt hat. Die ganze Uvula zu entfernen, ist nicht gestattet, es muss mindestens ein 1 cm langes Stück erhalten bleiben. Die Wunde heilt bei geringer Schmerzhaftigkeit nach einigen Tagen, doch ist Vorsicht in der Auswahl und Temperatur der Speisen nöthig; auch erscheint es rathsam, desinficirende Gargarismen zu verordnen.

Die Pharyngitis sicca erfordert eine sehr energische und langwierige, vor allen Dingen causale und gleichzeitig auf die Nase gerichtete Behandlung. Jurasz empfiehlt das Auswischen der Secrete mit Wattebäuschchen, die in 1—3% Carbol- oder Creolinlösung getaucht sind. Aufenthalt an der See erweist sich gleichfalls von Nutzen. Ausserdem müssen täglich zweimal Spülungen des Nasenrachenraumes mittelst Nasendouche oder Spray mit indifferenten Mitteln, warmer Milch, schleimigen Decocten, schwachen Glycerinlösungen, 1% Natron- oder Kochsalzsolutionen, Schwefelwässern und Soolquellen, Emserwasser gemacht werden. Flüssige oder pulverförmige Adstringentia schaden meist, dagegen können durch Bepinselungen mit den stärkeren Jodglycerinlösungen oder 3—5% Lanolinparaffinsalben mit Europhen die Beschwerden zeitweise gemässigt und zum Verschwinden gebracht werden. Französische Autoren empfehlen Bepinselungen mit Tinct. Capsici annui 1·0—2·0:50 Glycerin, Fritsche und M. Schmidt Einblasungen von Sozojodolzink 1:10—1:5 oder Aristol; Réthi verordnet Zeltchen aus Jodkali mit 0·001 Pilocarpin, Göbel Pillen aus 0·1 Ammon. sulfoichthyol. In sehr hartnäckigen Fällen ist auch die Vibrationsmassage angezeigt.

Die Behandlung der Pharyngitis foetida sowie der Störk'schen Blennorrhoe muss nach den bei den Krankheiten der Nase zu schildernden Principien geleitet werden.

Hypertrophie der Rachenmandel.

Die Hypertrophie der Rachenmandel, die auch als Hyperplasie der Luschka'schen oder dritten Mandel oder als „adenoide Wucherungen" bezeichnet wird, wird von Manchen zu den Neubildungen gerechnet, jedoch mit Unrecht, da dieselbe nur eine Hypertrophie und excessive Wucherung eines normal vorhandenen Gewebes darstellt.

In Bezug auf die Aetiologie wissen wir, dass acute und chronische Entzündungen des Rachens und der Nase, namentlich in Folge von Infectionskrankheiten, so besonders von Masern, Scharlach,

Influenza, Keuchhusten, am häufigsten zu deren Entstehung Anlass geben; nach Löwenberg kommen die adenoiden Wucherungen auch bei angeborenen Gaumenspalten vor. Manche, wie Bresgen, V. Lange, Semon, glauben, dass sie angeboren seien; dass dieselben erst einige Jahre nach der Geburt bemerkt werden, habe in der langsamen Entwicklung des Leidens seinen Grund. Die Heredität scheint eine wenn auch nur geringe Rolle zu spielen. Uebrigens kann die Prädisposition des kindlichen Alters insoferne nicht auffallen, als auch andere drüsige Organe, die Gaumenmandeln, die Lymphdrüsen, gleichzeitig sehr häufig von Hyperplasien betroffen werden. Man hat auch geglaubt, die adenoiden Wucherungen als den Ausdruck eines constitutionellen Leidens, speciell der Scrophulose, ja sogar als die Ursache der Scrophulose betrachten zu müssen. Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass scrophulöse Kinder und anämische junge Leute ein grösseres Contingent stellen als blühende und wohlgenährte, so hält Verf. doch die Hyperplasie der Rachentonsille für eine selbstständige, gewisse Constitutionsanomalien nur besonders gerne begleitende Affection. Alle Beobachter stimmen darin überein, dass die Krankheit vom 5. bis 20 Lebensjahre am verbreitetsten ist, d. h. dass dieselbe in diesem Zeitraume am häufigsten zur Beobachtung gelangt. Sie kann jedoch schon im 3., ja sogar im 2. Lebensjahre auftreten; nach dem 20. Jahre wird die Affection auffallend selten, was die Einen aus der spontanen Rückbildung der Vegetationen erklären, die Anderen daraus, dass die im Wachsthum zurückbleibenden Wucherungen in dem sich nach allen Seiten hin vergrössernden Rachen keine Erscheinungen mehr machen. Während man früher glaubte, die Krankheit bevorzuge die Seeküsten, ist jetzt sicher constatirt, dass sie überall, auch in Binnenländern, vorkommt; immerhin erwähnt Massei die grosse Seltenheit in Neapel.

Unter den Symptomen ist das früheste und constanteste die Behinderung der Nasenathmung mit allen ihren Folgen, welche bei der allgemeinen Symptomatologie der Nasenkrankheiten eine ausführliche Besprechung erfahren werden.

Die häufige Abhängigkeit der Enuresis nocturna von Vergrösserung der Rachenmandel ist von G. Mayor, Ziem, Sehmaltz, Körner, Grönbech und Anderen sicher constatirt, ebenso das Vorkommen von Sprachfehlern und ephemerer zuweilen Jahre hindurch sich wiederholender Fieberanfälle (Bloch, Siebenmann), welche letztere M. Schmidt aus acuten Entzündungen der Rachentonsille entstehen lässt.

Die Schleimsecretion in Nase und Rachen ist vermehrt; behufs Entfernung der Secrete werden die angestrengtesten Schneuz-, Räusper- und Hustenbewegungen angestellt; das Secret ist meist sehr dick und zähe, glasartig, bisweilen blutig gefärbt, dem pneumonischen Sputum auffallend ähnlich. Sehr oft finden sich im Gefolge der adenoiden Wucherungen Hyperplasie der Gaumenmandeln, nach Schäffer in 19% der Fälle, ferner Granulationen der hinteren Rachenwand, chronische Rhinitis und nach Hopmann Choanalstenose. Die Schleimhaut der Nase ist meistens nur leicht geröthet, zuweilen, namentlich in

den hinteren Theilen hypertrophisch, das Schwellnetz an den unteren Muscheln stark gefüllt; diese Schwellung dürfte theils dem erschwerten Abflusse des Blutes, theils activer reflectorischer Reizung ihre Entstehung verdanken.

Besonders häufig sind endlich — nach den Untersuchungen von Hartmann und W. Mayer in circa 74% — Störungen des Gehörs von den leichtesten vorübergehenden Störungen der Gehörschärfe und dem unbedeutendsten Ohrensausen bis zu hochgradiger Schwerhörigkeit und perforativer Otitis media. Dass diese Hörstörungen, wenn sie sehr frühzeitig auftreten, zu Taubstummheit führen können, wird mit Wrowlewski Niemand bezweifeln wollen.

In den weniger entwickelten Fällen von Hyperplasie der Rachentonsille sind Sprache und Nasenathmung weniger alterirt; die Kranken klagen über Verschleimung des Halses oder über Fremdkörpergefühle,



Fig. 10. Adenoide Wucherungen schweren Grades bei einem 14jährigen Knaben.

sie spucken und räuspern viel oder treiben die Luft stossweise durch die Nase, als ob sie ein Hinderniss beseitigen wollten. Sehr oft werden alle geschilderten Erscheinungen von den Angehörigen oder Lehrern, ja sogar von den Aerzten übersehen, nicht beachtet oder gar wie das beständige Offenhalten des Mundes für üble Gewohnheiten erklärt, die man den Kindern mit der Ruthe austreiben müsse!

Der objective Befund ist je nach dem Grade der Erkrankung verschieden. Im Allgemeinen kann man drei Grade unterscheiden: leichte Hypertrophie der Rachenmandel, bei der die untere Grenze der Rachentonsille im Spiegelbild den oberen Choanalrand nicht erreicht, mittelschwere Fälle, bei denen der obere Choanalrand von der Geschwulst erreicht und schwere Fälle, bei denen der obere Choanalrand bis zur Insertion der mittleren Nasenmuschel verdeckt und überlagert wird (Fig. 10). Die Form der Wucherungen ist sehr verschieden. W. Mayer, dem das grosse Verdienst gebührt, zuerst in ausführlicher Weise auf diese eigenartigen Gebilde aufmerksam gemacht zu haben, theilt sie in blattförmige und zapfenförmige; als Unterarten erwähnt er die kamm- und plattenförmigen. Am häufigsten treten sie in Form grauröthlicher oder blassröthlicher zapfen-, beeren- und stalaktitenartiger Gebilde auf, die oft mehr oder weniger mit

dickem, zähem, grüngelbem oder blutigem, zu Brocken eingetrocknetem Secrete bedeckt sind, oder als gleichmässiges breites, rundliches oder durch senkrechte Einschnitte mehrfach getheiltes fächerförmiges Polster.

Als Grundlage zeigt die hypertrophische Rachenmandel ein bindegewebiges Maschennetz bald aus dickeren, mehr glänzenden Balken mit engeren und rundlichen Maschen, bald aus dünnen Fasern mit weiten, oft gestreckten Maschen. Auffallend stark entwickelt ist das venöse und arterielle Gefässsystem. Die Hauptmasse der Wucherungen besteht aber aus kleinen Rundzellen, Lymphkörperchen, ohne jegliche bindegewebige Zwischensubstanz. Die Epitheldecke besteht aus flimmernden und nicht flimmernden Cylinderzellen, seltener aus Pflasterepithel, letzteres constant da, wo sich ein Follikel der Oberfläche nähert. Die Consistenz der adenoiden Wucherungen ist namentlich bei jüngeren Kindern eine sehr geringe, so dass sie mit dem palpirenden Finger zerrissen werden könnten; bei älteren Kindern oder Erwachsenen ist ihre Oberfläche derber und fester, ihre Basis ausserordentlich widerstandsfähig.

Ueber die Zahl und Grösse der Geschwülste gibt weder die Rhinoscopia anterior noch posterior ganz befriedigende Aufschlüsse. Bei der starken perspectivischen Verkürzung, mit der sich die untersuchten Theile bei der Rhinoscopia posterior präsentiren, können meist nur die zu unterst sitzenden Geschwülste genauer übersehen werden, während die oberhalb liegenden dem Auge verborgen bleiben oder kleiner erscheinen. Umgekehrt kann man bei der Rhinoscopia anterior die Geschwülste leicht für zu gross halten.

Der gewöhnliche Sitz und Ausgangspunkt der adenoiden Wucherungen ist der obere Theil der Hinterwand des Nasenrachenraumes: von da aus ziehen sie bis zu den Tubenmündungen, seltener noch weiter nach abwärts; sie überbrücken das Rachendach bis zu den Choanen herab; seltener trifft man sie in der Rosenmüller'schen Grube oder auf den Tubenwülsten, was Trautmann jedoch in Abrede stellt.

Der Verlauf der adenoiden Wucherungen ist ein äusserst langsamer. Sie können viele Jahre ziemlich symptomlos verlaufen, bis sie unter allmäliger Volumzunahme die oben citirten Erscheinungen hervorrufen. Spontane Rückbildung wird von mehreren Autoren mit Bestimmtheit behauptet.

Die Prognose ist günstig sowohl in Bezug auf die Beseitigung der Beschwerden als auch auf völlige Heilung. Recidiven kommen zuweilen, namentlich bei pastösen scrophulösen Kindern, vor, doch möchte sich der Verf. B. Fränkel anschliessen, der behauptet, es seien dies keine wirklichen Recidiven, das schon einmal Entfernte wachse nicht wieder nach, hingegen könnten kleinere nicht operirte Wucherungen nach Entfernung der grösseren sie im Wachsthum hindernden Stücke allmälig so gross werden, dass von Neuem Erscheinungen auftreten. Dass die Wiederherstellung des Gehörs in sehr

schweren und veralteten Fällen nicht immer möglich ist, ist verständlich.

Die Diagnose stützt sich einestheils auf die Symptome, anderntheils den rhinoskopischen Befund.

Stets beginne man mit der Untersuchung der Nase von vorne, die sich auch unbändige Kinder viel eher gefallen lassen und die meistens sehr brauchbare, theils positive, theils negative Resultate ergibt. Sehr oft gelingt es nämlich, besonders nach vorheriger Cocaïnisirung, die Wucherungen direct zu sehen oder wenigstens zu constatiren, dass das Athmungshinderniss nicht in der Nase liegt. Misslingt die Rhinoscopia anterior wegen Enge der Nase oder wegen Verbiegungen und Auswüchsen des Septum, dann versuche man die Rhinoscopia posterior. Lässt auch diese im Stich, dann schreite man zur Digitaluntersuchung; man kann sich namentlich bei älteren Kindern oder jungen Leuten mittelst derselben auch sehr gut über die Zahl, Grösse und den Sitz der Geschwülste orientiren. Auch die Untersuchung mit einer dicken, passend gekrümmten und in einen erbsengrossen Knopf endigenden Sonde vom Mund aus gibt sehr verwerthbare Resultate. Um die bei Kindern immerhin schwierige und schmerzhafte Digitaluntersuchung zu ersetzen, empfiehlt F. Semon, die Durchgängigkeit des Nasenrachenraumes durch Injection einer kleinen Quantität warmen Wassers mit Hilfe der Ballonspritze zu prüfen. Fliesst das injicirte Wasser nicht sofort und im Strome aus dem anderen Nasenloch, sondern durch den Mund ab, dann ist man berechtigt, ein Hinderniss im Naseurachenraum anzunehmen; auch empfiehlt sich dieses Verfahren als Prüfstein, ob durch die Operation die freie Passage hergestellt wurde. Ein weiterer diagnostischer Behelf ist die Sondirung des Nasenrachenraumes von vorne; bei Anwesenheit von Wucherungen stösst die Sonde nicht auf die hart sich anfühlende hintere Rachenwand, sondern auf ein weiches, elastisches Polster, welches die unter normalen Verhältnissen vorhandene freie Beweglichkeit des Instrumentes verhindert.

Behandlung. Als Palliativ zur leichteren Beseitigung des die Choanen theilweise verlegenden und den Wucherungen anhaftenden reichlichen Schleimes kann der Nasenspray oder die Douche mit 1% Kochsalz-, Soda- oder Boraxlösung dienen. Wenn auch einzelne Beobachter, wie Hartmann, durch Einblasungen von Borax-, oder wie M. Schmidt von Sozojodolpulver, oder durch Brunnen-, Bade- und Luftcuren, namentlich den Gebrauch eines jodhaltigen Wassers (Tölz, Adelheidsquelle, Hall) in Verbindung mit Spülungen des Nasenrachenraumes oder durch Jodeisen, Jodkali und Leberthran, adenoide Wucherungen geringeren Grades sich zurückbilden gesehen haben, so muss doch in den entwickelteren Fällen die Behandlung eine rein chirurgische sein.

Wenn es auch möglich ist, weiche Wucherungen durch Zerquetschen mit dem Fingernagel zum Schwinden zu bringen, so bedürfen wir doch meist eingreifenderer Mittel. Die Frage, in welchem Alter Kinder operirt werden sollen, beantwortet sich aus dem jeweiligen

Status. Bestehen Gehörstörungen, Anämie, Engbrüstigkeit, dann muss sogleich operirt werden. Ist die Nase aber noch durchgängig und bestehen weder Gehör- noch sonstige Entwicklungsstörungen, dann kann man allenfalls zuwarten, bis die Kinder grösser geworden sind oder sich die Erscheinungen steigern; rationeller ist es jedoch, die volle Entwicklung der Krankheit nicht abzuwarten, sondern bald einzugreifen.

Eine weitere Frage ist die, ob es möglich und nothwendig ist, unter Controle des Spiegels zu operiren.

Die Möglichkeit, mit dem Spiegel zu operiren, kann nicht geleugnet werden; doch ist die Controle mit dem Spiegel, da die weitaus grösste Zahl der Patienten Kinder sind, in praxi kaum jemals auszuführen. Der einzig richtige, weil einzig praktische Standpunkt, den die Mehrzahl der Operateure einnimmt, ist der, die Operation ohne Spiegel auszuführen, an dieselbe aber erst dann heranzutreten, wenn man sich durch vorherige Inspection oder Palpation über Sitz und Ausdehnung der Wucherungen genügend informirt hat. Wer unter diesen Cautelen operirt, kann keinen Schaden anrichten.

Eine weitere Frage ist, ob die Operation in einer oder mehreren Sitzungen und ob mit oder ohne Narkose vorzunehmen sei.

Verf. operirt stets in einer Sitzung, selbst wenn, wie so oft, auch die hypertrophischen Gaumenmandeln entfernt werden müssen, am liebsten ohne Narkose. Unvernünftiger oder nervöser Kinder, namentlich solcher, welcher jeder Manipulation des Arztes handgreiflichen Widerstand entgegensetzen, kann man nur mit Gewalt oder in der Narkose Herr werden. In ersterem Falle sind mindestens zwei kräftige Hände nöthig, meistens sogar vier, so dass sich die Zahl der bei der Operation direct Betheiligten auf drei beläuft. Abgesehen von der Schwierigkeit, in der Privatsprechstunde oder auf dem Lande sofort die nöthige Assistenz zu bekommen, übt auch die gewaltsame Fixation, die unendliche Aufregung und das Geschrei der nach Leibeskräften sich wehrenden kleinen Patienten auf die Eltern einen sehr unangenehmen Eindruck. Aus diesen Gründen vollzieht Verf. bei solchen Kindern die Operation in der Narkose resp. in der Halbnarkose mittelst Chloroform oder Bromäther. Durch dieselbe soll nur der Widerstand gebrochen, die Reflexerregbarkeit aber nicht aufgehoben werden. Auf diese Weise wird die gegen die Narkose in's Feld geführte Aspiration von Blut, Schleim und exstirpirten Geschwülsten sicher vermieden und nicht der mindeste Schaden angerichtet. Der Rath, mit der Operation zu warten, bis die Kinder vernünftiger geworden sind und die Operation ohne Narkose gestatten, ist bei vollentwickelter Krankheit der denkbar schlechteste.

Ueber den Modus der Operation gehen die Ansichten auseinander. Die Einen ziehen den Weg durch die Nase vor und entfernen die Wucherungen mittelst des W. Mayer'schen Ringmessers oder des Drahtecraseurs oder der galvanokaustischen Schlinge. Dass der Weg durch die Nase der kürzeste und namentlich bei Wucherungen am Tubenostium der bequemste ist, ist richtig: allein man kann dieser

Methode mit Recht vorwerfen, dass man von der Nase aus nicht alle, besonders nicht die am vordersten oberen Theile des Fornix sitzenden Vegetationen zu erreichen vermag. Abgesehen von der Unmöglichkeit, die betreffenden Instrumente durch eine enge, verkrümmte und mit Auswüchsen versehene Nase durchzuführen, darf man nicht vergessen, dass die weitaus grösste Anzahl der zu Operirenden Kinder sind, bei denen schon aus anatomischen Gründen der Weg durch die Nase unthunlich erscheint; nicht unerwähnt kann Verf. lassen, dass er bei den durch die Nase Operirten auffallend häufig Recidiven sah.

Deshalb wird der Weg durch den Mund von den Meisten und auch dem Verf. vorgezogen. Manche empfehlen mit besonderer Wärme den Schlingenschnürer; da aber das Einführen wegen Verbiegung des Drahtes sehr schwierig ist, so construirte Hartmann einen gedeckten Schlingenschnürer, der vor dem ungedeckten den Vorzug verdient. Die galvanokaustische Schlinge ist bei der Weichheit der Tumoren zum Mindesten unnöthig. Die massenhaften Wucherungen aber mit dem galvanokaustischen Brenner zerstören zu wollen, hiesse einfach die Operation in's Unendliche verlängern. Die beste Methode ist die, durch welche möglichst schnell möglichst viel entfernt werden kann. Dazu eignen sich der scharfe Löffel, der hauptsächlich von Justi und Trautmann angewendet wird, ferner das Ringmesser von Gottstein und die schneidenden Curetten von Lange und Hartmann. Das Instrument von Gottstein (Fig. 11), das neuerdings von M. Schmidt modificirt wurde, ist ein birnförmiges Ringmesser, welches von oben nach unten schneidet, wenn es an die hintere Rachenwand angedrückt wird. M. Schmidt empfiehlt, durch Einführung des Instrumentes bis an die Choanen erst das Gaumensegel nach vorne zu ziehen, um sicherer zwischen Mandel und Vomer eingehen zu können. Dann wird zuerst in der Mitte, dann in der Gegend der Rosenmüller'schen Gruben eingegangen und je ein kräftiger Strich nach unten geführt. Das Ringmesser von Lange (Fig. 12) ist ein ovaler Ring, welcher seitlich schneidet, je nachdem er von der einen zu der anderen Seite der hinteren und oberen Rachenwand geführt wird. Das Hartmann'sche Instrument ist nach demselben Principe construirt und nur etwas modificirt (Fig. 13). Das Löwenberg'sche stellt ebenso wie das von Schütz construirte ein gedecktes Ringmesser vor. So grosse Vorzüge nun auch die erwähnten Instrumente haben, so kommt man doch nicht in allen Fällen, namentlich bei der Anwesenheit sehr derber Wucherungen, mit ihnen aus. Nicht aus Sucht, die grosse Zahl der schon vorhandenen Instrumente zu vermehren, unter welchen das stellbare schneidende Adenotom Delstanches' und Bezold's verlängerter Fingernagel besonders erwähnt sein mögen, sondern aus rein praktischen Bedürfnissen construirte Verf. eine Choanenzange, die Miehel's Doppelmeissel oder jenen von Löwenberg, Solis-Cohen, Störk, Kuhn, Jurasz ähnlich ist. Wie die Abbildung in Fig. 14 zeigt, hat dieselbe eine doppelte Krümmung, eine am Hangriff und eine andere im Bogen nach vorne concave für den Nasenrachenraum.

Die stark gehaltene Zange — die Stärke ist zum Schneiden unbedingt nöthig — endet in zwei löffelförmige, genau auf einander passende, auf allen Seiten scharfe, ovale, 14 mm hohe und 12 mm breite Branchen. Dadurch ist es möglich, jeden Theil des Nasenrachenraumes zu erreichen. Will man die auf der Hinterwand sitzenden Vegetationen entfernen, dann führt man die Zange bei niedergedrückter Zunge unter Hebung des Griffes an die gewünschte Stelle; wenn nöthig,

Fig. 11. Ringmesser von Gottstein.

schiebt man dieselbe möglichst hoch in verticaler Richtung an den Fornix und von da aus unter leichter Senkung des Griffes an die vordere Fläche gegen die Choanen, um die dort befindlichen Tumoren

Fig. 12. Ringmesser von V. Lange.

zu beseitigen. Ein weiterer Vortheil des Instrumentes besteht in der Möglichkeit, sehr grosse und derbe Stücke, in welchen sich der scharfe Löffel oder das Ringmesser fangen würde oder nicht einpressen liesse,



Fig. 13. Curette von Hartmann, in drei verschiedenen Grössen.

mit einem einzigen Drucke abzuquetschen. Ist die bindegewebige Basis sehr dick und sehr derb, so kann es wohl wie bei den Ecraseuren vorkommen, dass die Branchen nicht ganz durchschneiden: in der Regel gelingt es aber, durch einige rotirende Bewegungen die Geschwulst abzutrennen, eventuell das noch nicht ganz Durchschnittene loszureissen.

Bei Erwachsenen und grösseren Kindern bedient man sich der Zange stärkeren Kalibers, bei sehr kleinen Patienten und sehr beträcht-

licher Enge des Operationsfeldes gebraucht man ein schlankeres Exemplar. Die Zangen sind von dem Instrumentenfabrikanten Katsch oder von Stiefenhofer in München zu beziehen.

Die Blutung ist bei der Zangenoperation meist gering und steht entweder von selbst oder nach Injection kalten, eventuell mit Liq. ferri sesquichl. versetzten Wassers oder Insufflation von Alaun, Tannin. Weit unangenehmer sind die gottlob sehr seltenen Nachblutungen, die theils einige Stunden, theils mehrere Tage nach der Operation auftreten; bei heftiger Blutung ist sofort die Tamponade des Nasenrachenraumes mittelst Bellocque'scher Röhre auszuführen. Der Schmerz ist meist gering, doch werden zuweilen von den Kranken



Fig. 14. Choanenzange von Schech.

in die Zähne und Ohren ausstrahlende Schmerzen angegeben. Da aber auch manchmal mit der Zange nicht Alles entfernt werden kann, namentlich nicht die sehr flach aufsitzenden oder kleinen, hinter den Tubenwülsten befindlichen Vegetationen, so bedient sich Verf. in solchen Fällen auch noch der obenerwähnten Ringmesser von Gottstein, Hartmann oder Lange, um die Wände des Nasenrachenraumes noch völlig auszuglätten.

Wenn Manche es für unnöthig halten, alles Krankhafte zu entfernen, da das Uebriggebliebene atrophire, so muss Verf. gegen diese Anschauung umsomehr protestiren, als einestheils zurückgebliebene Reste und kleinere Vegetationen wieder wachsen und von Neuem Erscheinungen machen, und man anderntheils trotz sorgfältigster Operation nicht selten, nach M. Schmidt in circa 3% der Fälle, von Recidiven überrascht wird.

Es ist selbstverständlich, dass bei der Operation auch die hypertrophischen Gaumenmandeln mit zu entfernen sind. In solchen Fällen erscheint die Narkose um so nöthiger, als kaum ein Kind in bewusstem Zustande sich diese wiederholten Eingriffe gefallen lässt. Man thut gut, die Eltern aufmerksam zu machen, dass das Kind das geschluckte Blut erbrechen wird und dass dies nichts zu bedeuten habe.

Die Reaction ist, selbst wenn in einer Sitzung Alles operirt wurde, meist eine sehr geringe; nur ausnahmsweise treten Kopfschmerzen, Fieber, Schlingbeschwerden, vermehrte Absonderung eines blutig-eitrigen Schleimes und allgemeines Unbehagen ein und zwingen die Kranken auf einige Tage in's Bett. Nachtheilige Folgen für das Ohr, namentlich eitrige Mittelohrentzündungen, kommen glücklicherweise nur selten vor und verdanken entweder einer Infection der Wunde mit Ausbreitung der Entzündung auf die Nachbarschaft oder dem Hineingerathen von Eiterflocken bei der Nasenreinigung ihre Entstehung. Aus letzterem Grunde haben einzelne Autoren gerathen, von einer Desinfection der Wunde ganz abzusehen, was aber dem Verf. mit den Principien der modernen Wundbehandlung im Widerspruche zu stehen scheint. Verf. verbietet auf's Strengste die Reinigung des Nasenrachenraumes mit der Spritze oder Nasendouche, lässt aber — bisher immer ohne Nachtheile — täglich zweimal den lauwarmen Borwasserspray anwenden oder 1—3% laue Borlösung mit einem Kaffeelöffel durch die Nase giessen.

In der Sprechstunde operirte Kinder dürfen das Zimmer erst nach völligem Aufhören der Blutung und dann nur mittelst Wagen verlassen. Zu Hause sollen sie sich einige Tage ruhig verhalten und nur kalte, flüssige oder weiche Nahrung (Fruchteis, eisgekühlte Milch mit Thee oder Kaffee, weiche Eier, weiches Fleisch) geniessen. Die Schule dürfen sie erst nach einer Woche besuchen, während die Desinfection der Wunde noch weitere drei Wochen fortzusetzen ist.

Mag man die Operation mit einem Instrumente vollziehen, mit welchem man wolle — und dies bestimmt Uebung, Gewohnheit und Vorliebe —, der Effect ist stets der gleiche. Ist die Athmung durch die Nase wieder hergestellt, dann verschwindet der stupide Gesichtsausdruck, die Sprache wird wieder klangvoll und laut, das Stottern verliert oder bessert sich, wenn auch nicht immer, die übermässige Schleimsecretion sistirt, die Gehörstörungen gehen zurück, die Gedächtnisschwäche verliert sich, die Blässe macht allmälig einer gesünderen Farbe Platz, der Thorax wölbt sich. Die einfache Schwellung des erectilen Gewebes der Nase bedarf keiner Behandlung, während die Rhinitis hypertrophica in entsprechender Weise zu behandeln ist. Die Schwerhörigkeit muss mit Luftdouche beseitigt werden; zuweilen ist es nöthig, die Operirten durch Hinaufbinden des Unterkiefers wieder an die Athmung durch die Nase zu gewöhnen, sowie durch Sprachübungen allenfallsige Sprachfehler zu beseitigen. Je länger die Nase verstopft war, um so längere Zeit braucht die Stimme, um ihr normales Timbre wieder zu erlangen.

Hypertrophie der Gaumenmandeln.

Die Aetiologie ist eine sehr mannigfache. Bei vielen Kranken kommen häufig acute, katarrhalische, phlegmonöse sowie syphilitische oder diphtheritische Anginen in Betracht. Manchmal gelangt ein intratonsillärer Abscess nicht zum Durchbruch, sondern verläuft chronisch mit beträchtlicher Volumzunahme des Parenchyms. Eine besondere Disposition zeigt das Kindesalter; mit Vorliebe werden anämische und scrophulöse Kinder befallen, zuweilen scheint die Disposition zu Tonsillarhypertrophie angeboren. Bei Kindern können deshalb auch weniger recidivirende Anginen, als vielmehr eine gewisse lymphatische Disposition oder, wie Sokolowski und Dwochowski sich ausdrücken, eine allgemeine Proliferationsstörung der gesammten lymphatischen Apparate als ätiologisches Moment herangezogen werden. Gerhardt glaubt, in derselben manchmal die letzten Ausläufer elterlicher Syphilis zu erblicken. Für das Vorkommen in den ersten Lebensmonaten dürfte nach M. Mackenzie Eczem und Impetigo des Gesichtes und Kopfes sowie Blennorrhoea neonatorum, Rhinitis blennorrhoica verantwortlich gemacht werden; das Auftreten der Krankheit zur Pubertätszeit wollen Manche auf einen sympathischen Zusammenhang mit den Genitalien zurückführen. Relativ selten ist Tonsillarhypertrophie bei lymphatischer Leukämie und Pseudoleukämie.

Die Hypertrophie betrifft sämmtliche Gewebe. Die Follikel sind vergrössert, vermehrt, das interstitielle Bindegewebe verdickt, ebenso der Schleimhautüberzug. Die Consistenz der vergrösserten Mandeln ist verschieden, bei scrophulösen Kindern weich, elastisch, bei den aus häufigen acuten Anginen entstandenen Formen meist sehr hart; nicht selten finden sich weiche Pfröpfe in den Lacunen oder Kalkeinlagerungen (Tonsillarsteine).

Bei der Inspection fällt besonders die Volumzunahme einer oder beider Tonsillen auf. Die Vergrösserung hat meistens nach allen Richtungen stattgefunden; die Organe ragen weit in den Isthmus faucium herein, in hochgradigen Fällen berühren sie sich oder lassen nur einen schmalen Raum zwischen sich übrig, in dessen oberem Theile die oft gleichfalls hypertrophische Uvula hervorschaut. Nach oben und hinten zu ragen die Mandeln in den Nasenrachenraum, nach unten bis auf den Zungengrund, nach vorne drängen sie das Velum in die Mundhöhle herein. In seltenen Fällen findet die Vergrösserung hauptsächlich nach aussen statt. Die Schleimhaut ist bald geröthet, bald blass, ja sogar von leicht gelblicher Farbe, ihre Oberfläche meist uneben und von netzförmigen Narben und schüsselförmigen Vertiefungen bedeckt, ihr Parenchym zerklüftet, zerfetzt, an einzelnen Stellen sogar atrophisch und defect. Die Lacunen sind häufig an ihrer Mündung verengt, während sie in der Tiefe erweitert erscheinen und auf Druck einen bald eitrigen flüssigen oder käsigen eingedickten Inhalt austreten lassen. Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass

dadurch ein ständiger Reiz ausgeübt und auch neue Entzündungen verursacht werden.

Sehr häufig combinirt sich die Hypertrophie der Gaumenmandel mit jener der Rachenmandel oder mit Pharyngitis granulosa oder Hypertrophie der Seitenstränge. Da die Tonsillarhypertrophie theilweise aus entzündlichen Processen hervorgeht und umgekehrt auch wieder zu acuten Anginen und Follicularverschwärungen Anlass gibt, so finden sich bei ihr sehr häufig indolente Schwellungen der Halslymphdrüsen. Selbst sehr beträchtlich vergrösserte Tonsillen können aussen am Halse nicht gefühlt werden; was man hier fühlt, sind geschwellte Lymphdrüsen oder Infiltrate des Bindegewebes.

Die Erscheinungen sind den bei Hyperplasie der Rachenmandel angegebenen sehr ähnlich. Die Respiration ist hier sowohl bei Körperbewegungen als auch in der Ruhe oft laut hörbar, der Schlaf unruhig und durch plötzliche Erstickungsanfälle und Aufschrecken unterbrochen, durch Schnarchen äusserst störend. Das Gesicht bekommt den bekannten blöden Ausdruck, oft sind auch Gehörstörungen vorhanden. Die Sprache klingt matt, dumpf und klanglos, oft mit nasalem Timbre und klosig Schmerzen beim Schlingen fehlen, die Deglutition ist für festere, gröbere Substanzen und grössere Bissen erschwert und verlangsamt und dadurch zuweilen auch die Esslust verringert. Durch Verschlucken des ungemein reichlich producirten Schleimspeichels wird der Magensaft verdünnt, wodurch die Verdauung leidet und Magenkatarrhe entstehen. Die Klagen über Fremdkörpergefühle, vermehrte Schleimabsonderung, vermehrtes Räuspern und Schluckbedürfniss fehlen ebensowenig, wie die Entwicklungsstörungen, die bei den Krankheiten der Nase geschildert werden sollen. Ein weiterer Nachtheil hypertrophischer Mandeln ist eine ausgesprochene Neigung zu häufigen lacunären und phlegmonösen Anginen, zu Diphtherie und Asthma; die vergrösserte Oberfläche der Mandeln mit ihren Vertiefungen und Unebenheiten bietet den verschiedensten Spaltpilzen einen sehr geeigneten Ansiedlungspunkt und passenden Nährboden.

Die Behandlung der Tonsillarhypertrophie kann nur in einer Verkleinerung oder Entfernung der erkrankten Organe bestehen. Man hat dazu die verschiedensten Mittel in Vorschlag gebracht. Abgesehen von Pinselungen mit Arg. nitr., Tannin, Jodglocerin, die jedoch nur in ganz frischen Fällen einigen Erfolg versprechen, hat man eine Verkleinerung durch Einreibung von Alaunkrystallen mit oder ohne Massage, durch Einbohren von Zink-, Kupfer- und Höllensteinstiften, von Jodkalikrystallen, durch parenchymatöse Injectionen von Jod, Essig- oder Chromsäure und ähnlichen Stoffen zu erzielen gehofft. Abgesehen von ihrer Umständlichkeit und Schmerzhaftigkeit, sind diese Methoden durchweg völlig nutzlos.

Rationeller erscheint zwar die allmälige Verkleinerung durch Einstechen eines spitzigen Galvanokauters oder elektrolytischer Nadeln, allein die Langsamkeit der Methode, die Nothwendigkeit wiederholter

Eingriffe, namentlich im Kindesalter, lassen dieselbe doch nur für einzelne später zu besprechende Fälle für geeignet erscheinen.

Das rationellste Mittel ist die Amputation mit schneidenden Instrumenten. Dass das Tonsillotom bei Kindern vor der Messeroperation den Vorzug verdient, kann keinem Zweifel unterliegen. Welches Tonsillotom aber das beste ist, ist schwer zu sagen, da Gewohnheit und Uebung zu sehr in's Gewicht fallen.

Unzweckmässig sind jene, deren grösster Durchmesser in horizontaler Richtung, d. h. von vorne nach hinten liegt, weil die Mandel fast stets in der Richtung von oben nach unten am grössten ist; es ist gut, mehrere Tonsillotome von verschiedener Grösse vorräthig zu haben. Dass trotz vieler Vortheile das Tonsillotom auch manche Nachtheile hat, ist richtig; wenn Manche dasselbe aber ganz verwerfen, so zeugt das nur von geringer praktischer Erfahrung. In jenen Fällen, bei denen die Mandeln hauptsächlich nach oben und aussen vergrössert und hinter den Gaumenbögen verborgen sind, führt nur die Amputation mit dem Messer nach vorherigem energischen Hervorziehen mittelst scharfer Haken zum Ziele.

Als Indicationen der Tonsillotomie sind zu erwähnen: Behinderung der Respiration, mangelhafte Entwicklung des Thorax, ungenügende Decarbonisation des Blutes, „klosige" Sprache, Disposition zu immer wiederkehrenden Anginen. Wenn auch die letztere durch die Operation nicht immer beseitigt werden kann, so treten die Anginen doch in der Regel seltener und weniger intensiv auf. Dass durch die Herausnahme der Mandeln die Geschlechtsfunction beeinträchtigt oder die Stimme ruinirt würde, ist eine Fabel; immerhin entschliesse man sich, namentlich bei Sängern oder Schauspielern, wie auch Beschorner sehr richtig bemerkt, nur im Nothfalle zur Operation; man könnte es am Ende erleben, dass solch ausgesungene und im Niedergange begriffene Grössen den Arzt für den Verlust ihres phänomenalen Organes verantwortlich machen.

Die ganze Mandel herauszunehmen, ist wegen der Gefahr der Blutung verwerflich; meist genügt es, den über die Gaumenbögen vorstehenden Theil zu entfernen, zumal sich der übrigbleibende Rest meist von selbst zurückbildet.

Tödtliche Blutungen aus der Carotis sind bei richtiger Anwendung des Tonsillotoms unmöglich, bei der Messeroperation nicht ganz ausgeschlossen; ist die Carotis eröffnet, dann ist die Unterbindung das einzige, wenn auch sehr zweifelhafte Rettungsmittel; starke Blutungen, die gerne bei sehr fester Beschaffenheit der Mandeln oder bei vollblütigen oder älteren Leuten mit schon atheromatösen Gefässen vorkommen, werden am besten durch Torquiren oder die etwas schwierige Digitalcompression oder durch Anwendung des Galvanokauters oder des Glüheisens zum Stehen gebracht; bei jugendlichen Personen stammen sie meist aus erweiterten Venen oder aus der im vorderen Gaumenbogen verlaufenden Arterie; mässige Blutungen, die häufigsten, stehen meist nach wenigen Minuten von selbst nach

Gurgelungen mit Eiswasser oder durch Betupfen der blutenden Stelle mit einem Tropfen reiner Eisenchloridlösung.

Bisweilen treten Nachblutungen auf, bald einige Stunden, bald einige Tage nach der Operation; Verf. beobachtete dieselben bis jetzt nur bei Erwachsenen und glaubt derselbe, dass atheromatöse und sonstige Veränderungen der Gefässe die Ursache sind; allzu häufiges und energisches Gurgeln, sowie reichlicher Genuss der Alcoholica oder vieles Sprechen in den ersten Tagen nach der Operation können gleichfalls zu Nachblutungen Anlass geben und müssen deshalb strengstens verboten werden. Steht die Blutung durch Eisgurgelungen oder Compression mit einem in Eisenchlorid getauchten Wattebausch nicht, dann lege man einen dicken Seidenfaden um den Rest der amputirten Tonsille und schnüre fest zu.

Nach O. Zuckerkandl liegt die Ursache der heftigen Blutungen nach der Tonsillotomie in dem Verhalten der Arteria tonsillaris zu der Kapsel der Tonsille. Wird die Arterie in der Ebene der Kapsel durchschnitten, mit welcher sie in sehr innige Verbindung tritt und welche sie oft erst nach Zurücklegung mehrerer Windungen durchbohrt, dann wird die Retraction und Contraction des Gefässes verhindert und eine Thrombosirung bei Durchschneidung an der Durchschnittsstelle unmöglich gemacht. Ist hingegen die Abtragung der Tonsille im Gewebe selbst erfolgt, so schliessen sich die sehr kleinen, im lockeren Bindegewebe gelegenen Aeste prompt und es erfolgt keine Blutung; ebenso tritt leicht spontane Stillung der Blutung bei Durchschneidung der A tonsillaris vor ihrem Eintritt in die Kapsel ein, so lange sie eben im lockeren Zellgewebe liegt. Holst warnt davor, die Mandel allzu sehr zwischen den Gaumenbögen hervorzuziehen, B. Fränkel, sie durch Druck von aussen stärker nach innen zu drängen, da dadurch benachbarte Schleimhautfalten mitverletzt würden und bluteten.

Durchaus contraindicirt ist die Wegnahme der Tonsille mit schneidenden Instrumenten bei Hämophilen oder sonstigen Personen, welche grosse Neigung zu Blutung haben, bei Hypertrophie des linken Ventrikels sowie bei jenen Formen von Tonsillenvergrösserung, bei denen der Hauptbestandtheil aus erectilem Gewebe resp. aus Gefässen besteht. Verf. sah einen solchen Fall bei einem 11jährigen Mädchen, bei der die kolossal vergrösserten Tonsillen nach Bepinselung mit Cocaïnlösung fast völlig verschwanden. Solche Kranke eignen sich für die Ignipunctur resp die allmälige galvanokaustische Verkleinerung.

Eine andere Gefahr, welche Viele von der Tonsillotomie abschreckt, ist die der Diphtherie.

Dass diese in der That schon Opfer gefordert hat, ist richtig, doch gehört ein solches Ereigniss zu den grössten Seltenheiten; immerhin sollte die Tonsillotomie nicht in einem Krankenhause, sondern in einer gesunden Privatwohnung, und namentlich nicht zu Zeiten einer Diphtherie- oder Scharlach-Epidemie, vorgenommen werden.

Im Hinblick auf die erwähnten Eventualitäten ist deshalb die Entfernung der Gaumenmandeln mittelst der galvanokaustischen

Schlinge vorzuziehen. M. Schmidt, der nur noch nach dieser Methode operirt, sucht zuerst das untere Ende der Mandel in die Schlinge zu bekommen, dann legt er dieselbe um und drückt das Ende der Röhren in die Nische zwischen beide Gaumenbogen Ist die Mandel gestielt, so zieht er die Schlinge kalt zu und lässt sie dann erst erglühen; ist die Mandel aber breitbasig, so lässt er die Schlinge zuerst erglühen und schneidet dann durch. Zuweilen bleibt ein Stück stehen, das dann ebenfalls entfernt wird. Verf. übt jetzt auch diese Methode und kann sie namentlich bei Erwachsenen bestens empfehlen.

Die Nachbehandlung besteht in Vermeidung harter oder chemisch-reizender Speisen, in Genuss von Fruchteis, Gurgelungen mit Borlösung, Salol etc.

Bei gewissen Formen hypertrophischer Rachenmandeln, wie z. B. bei solchen, welche völlig mit den Gaumenbögen verwachsen sind oder unten einen starken Fortsatz haben, oder solchen, welche nicht mit dem Tonsillotom oder der galvanokaustischen Schlinge gefasst werden können etc, kann man sich der von Kretschmann angegebenen Zange mit ineinander gehenden schneidenden Ringen bedienen. Ein der Krause'schen Doppelcurette ähnliches Instrument sah Verf. bei M. Schmidt zur Entfernung überhängender und die Ausgänge concrementhaltiger Lacunen verdeckender Vorsprünge und Lappen.

Pharyngitis phlegmonosa.

Befällt die Entzündung nicht nur die Schleimhaut, sondern auch das submucöse Gewebe oder das Parenchym der Organe, dann spricht man von phlegmonöser oder parenchymatöser oder auch, weil die Phlegmone mit Oedem einhergeht und meist mit Eiterbildung endet, von ödematöser oder abscedirender Pharyngitis, wohl auch von Erysipel des Rachens.

Aetiologie. Die Phlegmone des Rachens entsteht wie die katarrhalische Entzündung primär, scheinbar durch Erkältungen, ferner durch mechanische oder thermische Einflüsse, Einspiessen von Fremdkörpern, Aetzungen und namentlich nach Operationen in der Nase etc.; es gibt viele Menschen, besonders solche mit Tonsillarhypertrophie, welche mit einer auffallenden Disposition für pharyngeale Phlegmonen behaftet sind. Wie die Angina lacunaris, so entsteht auch die phlegmonöse Angina immer durch Infection, auch schliesst sich die letztere sehr häufig an die erstere an; wie es scheint, können verschiedene pyogene Mikroorganismen, namentlich jene, welche in den bereits mehrfach erwähnten Mandelpfröpfen enthalten sind, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, der Pilz des Scharlachs, letzterer auch ohne allgemeine Infection, im Rachen Phlegmone erzeugen. In sehr naher Beziehung steht das Erysipel zur Phlegmone; man spricht deshalb von Erysipel oder Rothlauf des Rachens oder von erysipelatöser Angina.

Dieselbe geht entweder dem Ausbruche des Gesichtserysipels voraus oder sie folgt dem letzteren nach. In den nicht seltenen, von Gerhardt, Gubler, Panthel, Pozzi, Strümpell, Trosseau und vom Verf. beobachteten Fällen, in welchen eine phlegmonös-ödematöse oder lacunäre oder diphtherieähnliche Angina mit Schwellung der Lymphdrüsen dem Erysipel der Gesichtshaut vorausgeht, muss die Infection zuerst im Rachen stattgefunden haben. Als Eingangspforten des Infectionsstoffes sind einestheils Epithelverluste oder Erosionen, anderntheils die im Epithelüberzug der Mandeln liegenden normalen Lücken zu betrachten, aus welchen nach Ph. Stöhr fortwährend Leukocyten auswandern.

Die Weiterverbreitung aus dem Rachen auf die Gesichtshaut findet statt entweder durch die Tuba, Paukenhöhle und äusseren Gehörgang oder durch den Thränennasengang oder am häufigsten durch den unteren Nasengang. Die Affection des Rachens kann aber auch umgekehrt durch das Weiterkriechen des Erysipels von der äusseren Haut auf den ebengenannten Wegen erzeugt werden. Der Zusammenhang von gehäuftem Vorkommen von Anginen und Erysipel ist nach Gerhardt, welcher sich am eingehendsten mit dem Rothlauf des Rachens beschäftigt hat, wahrscheinlich auf wahre Erysipelanginen zurückzuführen, welche auf den Rachen beschränkt bleiben.

Secundär gesellt sich die phlegmonöse Angina mit Vorliebe zu acuten Infectionskrankheiten, namentlich zu Scharlach. Sehr selten ist sie gichtischen oder toxischen Ursprunges in Folge des Genusses von Mineralsäuren, kaustischen Alkalien etc. und mit Verschorfung der Schleimhaut combinirt. Endlich ist es sehr wahrscheinlich, dass durch schwere, die Ernährung und den Schlingact beeinträchtigende Allgemeinleiden in Folge von Zersetzung der Secrete und Ingesta und dadurch bewirkter Pilzentwicklung die Disposition zu phlegmonösen Entzündungen gesteigert wird; ein von Eberth einen Kranken mit Bulbärparalyse betreffender Fall spricht in hohem Grade für diese Ansicht.

Die Phlegmone kann zwar alle Theile des Rachens treffen, doch bevorzugt sie ganz besonders die Tonsillen und das peritonsilläre Bindegewebe, letzteres ausnahmslos mit dem weichen Gaumen. Seltener afficirt wird der Nasenrachenraum und die Hinterwand.

Die subjectiven Beschwerden sind bei allen Formen mit geringen Ausnahmen so ziemlich dieselben. Die Phlegmone entwickelt sich entweder aus einer Lacunärangina allmälig oder plötzlich spontan, in letzterem Falle unter heftigen Allgemeinerscheinungen, Frost, Fieber bis zu 40°, beschleunigtem Puls, Kopfschmerzen, Mattigkeit und grosser Schmerzhaftigkeit beim Schlingen. Das anfangs vorhandene Gefühl von Trockenheit macht bald der Secretion eines dicken, zähen Schleimes, später einer hochgradigen Salivation Platz; auch die Mundhöhle betheiligt sich an der Entzündung, die Zunge ist dick belegt, Brechneigung, Appetitlosigkeit, Durst und übler Geruch aus dem Munde vorhanden. Im weiteren Verlaufe steigert sich das Schluckweh bis zur

Unerträglichkeit; es stellen sich heftige Ohrenschmerzen ein, so dass man behaupten kann, die Phlegmone des Rachens sei neben der Tuberculose die schmerzhafteste aller Rachenaffectionen. Durch das Fieber, die Schmerzen, die Schlaflosigkeit, Behinderung der Respiration und die auf ein Minimum beschränkte Nahrungsaufnahme kommen selbst kräftige Kranke in einigen Tagen sehr herunter. Speise und Trank werden entweder ganz verweigert oder unter den heftigsten Schmerzensäusserungen und Verziehen des Gesichtes mühsam hinuntergepresst oder durch Nase und Mund wieder herausgeschleudert. Die Sprache ist in hohem Grade coupirt, klanglos und nasal, der Mund kann in Folge der entzündlichen Infiltration der Fascia buccopharyngea oder des Kiefergelenkes und des äusseren Gehörganges nicht oder sehr wenig geöffnet und so die Inspection und Medication wesentlich erschwert werden. Heiserkeit kommt nur bei der nicht gar seltenen Mitbetheiligung des Kehlkopfes vor, Athmungsbeschwerden sind bedingt durch Verengerung des Isthmus faucium oder durch ödematöse Laryngitis. Regelmässig findet sich beträchtliche Schwellung der Halslymphdrüsen. In seltenen Fällen wird das in's submucöse Gewebe und in's Parenchym gesetzte Exsudat unter allmäligem Nachlass der Beschwerden resorbirt, weitaus am häufigsten geht es aber in Eiterung über unter weiterer Zunahme der Beschwerden. Wird dem Eiter nicht künstlich Abfluss verschafft, so entleert er sich spontan, zuweilen während des Schlafes, beim Räuspern oder Gurgeln; seine Quantität ist oft beträchtlich, er ist dick, mit Blut und Bindegewebsfetzen vermischt und meist sehr übelriechend. Mit der Entleerung ändert sich das Krankheitsbild wie mit einem Schlage; die heftigen Schmerzen sind nahezu verschwunden oder machen einem erträglichen Zustande Platz, die Athmung wird freier, das Schlucken wieder möglich, es tritt erquickender Schlaf ein.

Die objectiven Erscheinungen der sehr seltenen Tonsillitis phlegmonosa bestehen in ungewöhnlicher Schwellung, Röthung und Vergrösserung einer oder beider Tonsillen; die ergriffene Mandel drängt den vorderen Gaumenbogen vor sich her, drückt den Arc. pharyngopalatinus an die Hinterwand, schiebt die Uvula auf die Seite und verkleinert den Isthmus faucium. Sind gleichzeitig beide Tonsillen ergriffen, was aber seltener ist, dann wird die Uvula zwischen denselben eingeklemmt, gekrümmt und aus ihrer normalen Lage verschoben, der Isthmus zu einem schmalen Spalt verengt oder völlig verschlossen; nicht selten besteht gleichzeitig Follicularvereiterung oder Lacunärangina. Die Nachbarschaft der Tonsillen, der weiche Gaumen, die Uvula, sind theils nur mässig geröthet und geschwellt, theils intensiv hyperämisch und ödematös, das Kiefergelenk in seiner Bewegung beschränkt und druckempfindlich. Die Abscedirung findet bald in der Tiefe, bald an der Oberfläche statt, entweder in Form mehrerer kleinerer zerstreuter Herde oder eines grösseren Herdes. Nach Entleerung des Eiters, die oft auf der hinteren Fläche der Mandel vor sich geht, kehrt die Tonsille nach einigen Tagen zur Norm zurück.

Wird, wie fast immer, das zwischen Tonsille und weichem Gaumen liegende Bindegewebe befallen, so bezeichnet man die Krankheit als Peritonsillitis.

Dieselbe schliesst sich offenbar durch Resorption eitriger Massen sehr oft an eine Lacunärangina an oder sie entsteht primär, wobei alle bereits eingangs erwähnten Schädlichkeiten, namentlich Mandelpfröpfe, in Betracht kommen. Zu den grössten Seltenheiten dürfte ihre Entstehung aus einem Kieferhöhlenempyem gehören in Folge Fortpflanzung der Entzündung oder Durchbruch des Eiters durch die hintere Wand der Höhle (Ziem). Verf. sah bisher nur einen einzigen solchen Fall. Die Tonsille selbst ist dabei wenig betheiligt, meist nur geröthet und wenig vergrössert, ja sie erscheint zuweilen durch die kolossale Schwellung der Gaumenbögen verkleinert, überlagert oder nach vorne oder gegen die Mitte zu verdrängt. Am auffallendsten sind die Veränderungen am Gaumensegel, den Gaumenbögen und der Uvula. Auf der befallenen Seite sind dieselben intensiv geröthet, ödematös geschwellt; auf der convex gegen die Mundhöhle zu vorgewölbten Gaumensegelhälfte bildet sich entweder eine dunkelrothe, fluctuirende oder den Eiter gelb durchschimmern lassende Geschwulst oder die ganze Gegend von den letzten Backzähnen bis zur Uvula bildet eine gleichmässige entzündlich-ödematöse Fläche. Wieder in anderen Fällen ist nur der vordere Gaumenbogen gegen die Mundhöhle zu vorgetrieben und ebenso wie das Interstitium pharyngomaxillare ödematös.

Sehr selten befällt die Phlegmone die Hinterwand des Rachens und den Nasenrachenraum. Einige Male sah Verf. die hintere seitliche Rachenwand und die Plica salpingophar. ergriffen werden von einer Entzündung des hinteren Gaumenbogens aus, und bot die Schleimhaut das Bild eines fingerdicken, tiefgerötheten, an Retropharyngealabscess erinnernden Wulstes dar. Wird der Nasenrachenraum afficirt, so schwillt die Schleimhaut, namentlich über den Tubenwülsten und dem adenoiden Gewebe derartig an, dass das Lumen des Rachens völlig aufgehoben und die Athmung durch die Nase unmöglich wird. Die Secretion ist eitrig, zuweilen blutig, öfters sind Hämorrhagien in der Schleimhaut vorhanden, die Mitbetheiligung des Mittelohres gewöhnlich. Manchot secirte einen Diabetiker, der mit typhösen Erscheinungen und Schmerzen im Nacken erkrankt war und bei dem sich eine retropharyngeale Phlegmone mit Eiteransammlung in der Keilbeinhöhle vorfand.

Der Verlauf der Tonsillitis phlegmonosa beträgt in der Regel 5—8 Tage, selten 10—14 Tage; die Peritonsillitis hingegen erfordert meistens längere Zeit zur Heilung, circa 10—20 Tage, doch kommen auch kürzer dauernde Fälle zur Beobachtung. Auch Recidiven kommen nicht selten vor, ebenso wie gleichzeitige doppelseitige Erkrankung oder das Uebersprungen von einer Seite zu anderen.

Die Diagnose stützt sich auf den objectiven Befund, namentlich die mehr und mehr zunehmende ödematöse Schwellung, die bei katarrhalischer Angina meist ganz fehlt oder doch nur sehr unbedeutend ist. Die Differentialdiagnose zwischen Tonsillarphlegmone

und Peritonsillitis stützt sich auf das Verhalten der Mandel und des weichen Gaumens. Während bei Phlegmone der Mandel diese selbst kolossal vergrössert, die Nachbarschaft aber nur wenig verändert ist, erscheint bei Peritonsillitis die Mandel von den Gaumenbögen überlagert, verschoben, normal gross oder sogar verkleinert, das Gaumensegel nebst Uvula und Gaumenbögen hochgradigst ödematös, geröthet, vorgewölbt.

Die Schluckbeschwerden und Ohrenschmerzen, Sprachstörungen und die Unmöglichkeit, den Mund zu öffnen, sind bei Peritonsillitis durchaus intensiver. Die grössten Schwierigkeiten erwachsen der Diagnose bei der Bestimmung, ob und wo Eiter vorhanden ist; unmöglich ist die Constatirung des Eiters durch die Palpation bei kleinen und tiefliegenden Mandelabscessen; leichter gelingt der Nachweis der Fluctuation bei Peritonsillitis, am leichtesten ist die Diagnose da, wo gelbe Punkte oder Streifen den Sitz der Eiterung verrathen. Da das starke Oedem der ergriffenen Theile zu Täuschung Anlass geben kann, empfiehlt sich bei Peritonsillitis die Probepunction durch die Mitte des vorderen Gaumenbogens gerade nach hinten. Die Diagnose des Rachenerysipels ist nur gesichert, wenn sich die Schwellung auch auf das Gesicht ausgebreitet hat; bei Localisirtbleiben im Rachen ist die Diagnose unmöglich, zumal die gewöhnlich als charakteristisch beschriebene purpurrothe, glänzende, ödematöse Schwellung der ganzen wie lackirt aussehenden Rachenschleimhaut jeder phlegmonösen Angina zukommt; sicher wäre die Diagnose, wenn in den Gewebsäften Erysipelkokken vorgefunden würden.

Die Prognose ist fast immer günstig, doch bleibt bei unvollkommener Resorption zuweilen Hypertrophie der ergriffenen Theile, namentlich der Mandeln, zurück, während Atrophie derselben meist nach umfangreichen centralen Vereiterungen beobachtet wird. In seltenen Fällen pflanzt sich die Affection nach aussen fort und gibt zu Abscessen hinter dem Kopfnicker Anlass oder zu Abscedirung der Submaxillaris und der Zunge. Von ungünstigen Ausgängen ist namentlich bei Kindern Tod durch Erschöpfung oder Erstickung durch Verlegung des Isthmus faucium oder durch Aspiration von Eiter zu erwähnen; bei Fortpflanzung der Phlegmone auf den Larynx kann in wenigen Stunden, selbst Minuten, Asphyxie eintreten; die Mitbetheiligung des Kehlkopfes ist zwar gar nicht selten, aber glücklicherweise fast immer nur eine einseitige und ungefährliche. Todesfälle sind ferner constatirt in Folge von Arrosion der Carotis, von Pyämie, Gangrän und Eitersenkung in's Mediastinum. Dass die Gefahr der Arrosion der Carotis am nächsten liegt bei Peritonsillitis, erhellt aus der Anatomie. Nicht selten bleibt einseitige oder doppelseitige Lähmung des weichen Gaumens zurück.

Therapie. Bei der ausserordentlichen Schmerzhaftigkeit der Pharynxphlegmone erscheint ein Versuch mit den bereits früher erwähnten Abortivmitteln zwar angezeigt, ist aber meistens erfolglos. Helbing will von Einreibungen von 3—4 Tropfen Crotonöl mit Watte in die Haut unterhalb des Kieferwinkels der ergriffenen Seite sofort

beim ersten Auftreten von Halsbeschwerden wiederholt die Krankheit coupirt haben. Kommen die Kranken gleich in Behandlung, dann empfiehlt sich die Anwendung von Eis theils innerlich in Form von Eiswasser, Eisstückchen, Eiscrême, theils äusserlich als Eiscravatte oder Eiscompressen, wenn auch die Hoffnung, den Process rückgängig zu machen, sich fast nie erfüllt. Bepinselungen mit Cocaïn haben nur eine geringe und kurze Schmerzlinderung zur Folge; besser sind die von B. Fränkel empfohlenen Injectionen von Cocaïn in die Gaumenbögen oder Tonsillen. Zur Beschleunigung der Eiterung empfehlen sich Cataplasmen, warme Gurgelungen und Inhalationen heisser Dämpfe: zeigt sich Fluctuation, so indicire man und verschaffe dem Eiter durch Einführung einer Hohlsonde Abfluss. Bei Peritonsillitis geschieht sowohl die Probepunction als auch die eigentliche Entleerung nach Chiari am besten mit einem spitzen Tenotome oder mit einem mit Heftpflaster umwickelten spitzen Bistouri in der Mitte einer Linie, die man sich von der Uvula zur Krone des oberen Weisheitszahnes gezogen denkt, oder auch 1 cm über dem freien Rande des vorderen Gaumenbogens, gerade in der Richtung nach hinten und innen, 1—2 cm tief. Zeigt sich irgendwo anders eine gelb durchschimmernde Stelle, so sticht man natürlich hier ein. In seltenen Fällen bricht der Eiter auf der Rückseite des weichen Gaumens spontan durch. Das sehr frühzeitige Incisionen zuweilen den Kranken, auch wenn kein Eiter entleert wird, durch Entspannung der Gewebe Erleichterung verschaffen, ist ebenso wahr, als dass sie häufig im Stiche lassen und von den Kranken als die Ursache der weiteren Zunahme ihrer Beschwerden gefürchtet und verweigert werden. Ist die Athmung nach Eröffnung des Abscesses immer noch ungenügend, dann ist die Tonsillotomie, bei Mitbetheiligung des Kehlkopfes die Tracheotomie angezeigt, vorausgesetzt, dass man durch Scarification der ödematösen Theile keine Erleichterung verschaffen konnte. Dass die Tonsillotomie bei Entzündung der Mandeln gefährlich und deshalb zu vermeiden sei, ist unrichtig: immerhin muss man aber auf eine stärkere Blutung gefasst sein.

Eine von den bisher besprochenen Formen verschiedene Affection ist die von Senator, Landgraf, Samter, M. Schmidt, Massei und Anderen beschriebene acute infectiöse Phlegmone des Rachens.

Dieselbe ist eine glücklicherweise sehr seltene, fast immer tödtlich endende Infectionskrankheit; welcher Natur das Gift ist, ist noch völlig unbekannt; wahrscheinlich findet dasselbe, wie das Erysipelgift, durch Verletzungen beim Essen, Rauchen etc. in die Gewebe seine Aufnahme; auffallend ist, dass die Krankheit wiederholt nach dem Genusse von Fleisch oder Würsten zum Ausbruche kam, was Landgraf zu der Ansicht bestimmt, dass das Gift durch die Nahrung aufgenommen werde.

Die Krankheit befällt gesunde Personen ohne nachweisbare Ursache, unter mässiger Temperaturerhöhung und Schmerzen beim Schlucken. Gewöhnlich treten sehr bald starke Schwellung der

Weichtheile des Halses, Heiserkeit, Athemnoth sowie Störungen des Sensorium, Delirien oder Sopor auf; einige Male fand sich Zucker im Harn. Der Tod erfolgt unter den Erscheinungen der acuten Herzparalyse. Die Section ergab bisher diffuse Eiterung der tieferen Gewebe der Rachenschleimhaut, die sich von da auf den Kehlkopf und die Drüsen oder auf das Mediastinum, Pleura und Pericard fortsetzt; auch hämorrhagische Gastritis, Hepatitis mit Icterus, Vergrösserung der Milz, Phlegmone und Verjauchung der Extremitäten etc. wurden constatirt.

Die Prognose ist fast immer letal, nur Hager berichtet von Heilung, auch der einzige vom Verf. beobachtete Fall endete mit Genesung: bei diesem Kranken bildete sich in der Tiefe der rechten seitlichen Rachenwand eine Oeffnung, aus der spontan und noch mehr bei Druck auf die infiltrirte rechte Halsgegend sich jauchiger Eiter entleerte, auch das hochgradige Oedem des Kehlkopfes bildete sich zurück, doch war die Reconvalescenz eine sehr schwere und langdauernde. Die Therapie ist meist ohnmächtig; sie muss eine antiphlogistisch-antibacterielle sein; bei Abscessbildung ist der Eiter zu entleeren, bei Athemnoth zu tracheotomiren und sind Reizmittel zu verabreichen.

Retropharyngealabscess.

Unter den entzündlichen Affectionen des vor der Wirbelsäule liegenden Bindegewebes ist der Retropharyngealabscess die häufigste.

Man unterscheidet idiopathische und symptomatische Retropharyngealabscesse.

Der idiopathische Retropharyngealabscess ist hauptsächlich eine Krankheit des kindlichen Alters; halbjährige Kinder, zuweilen noch jüngere, werden besonders oft ergriffen. Nach den Untersuchungen von Bokai, Kormann, Schmitz, Pauly ist derselbe die Folge einer Lymphadenitis. Nach Henle liegen nämlich in der Höhe des 2. und 3. Halswirbels zwischen beiden Seiten der Mittellinie zwei Lymphdrüsen, deren Volumen im kindlichen Alter am grössten ist, während jenseits des 5. Lebensjahres nur noch eine oder auch gar keine Drüse mehr vorgefunden wird; diese Drüsen müssen als der Ausgangspunkt der Vereiterung angesehen werden.

Als Ursachen des idiopathischen Retropharyngealabscesses resp. der Lymphadenitis sind in der Mehrzahl der Fälle acute katarrhalische und phlegmonöse Entzündungen der Mundrachenhöhle sowie der Nase verantwortlich zu machen. Man muss annehmen, dass phlogogene Stoffe (Streptokokken) in das submucöse Bindegewebe und die Drüsen verschleppt werden und dort ihre Wirksamkeit entfalten. Wiederholt wurden Abscesse in Folge von Verletzungen durch Fremdkörper sowie im Verlaufe von Otitis media suppurativa und Gesichtserysipel beobachtet, ebenso von acuten Infectionskrankheiten, so namentlich bei

Scharlach und Diphtherie. Schlecht genährte scrophulöse Kinder oder mit Eczem des behaarten Kopfes und Gesichtes behaftete werden mit Vorliebe ergriffen.

Der symptomatische Retropharyngealabscess, Senkungsabscess, ist eine Folge von Krankheiten der Halswirbelsäule, so besonders von Periostitis, Ostitis, Caries auf scrophulöser, rhachitischer, tuberculöser, syphilitischer oder traumatischer Basis.

Die durch Retropharyngealabscesse verursachten Erscheinungen können plötzlich in wenigen Tagen, aber auch erst nach Wochen und Monaten zu Stande kommen. Eine schnelle Entstehung beobachtet man, wenn der Abscess aus einer Bindegewebsphlegmone hervorgeht, eine langsame bei Lymphadenitis und bei den Senkungsabscessen.

Das erste Symptom ist stets ein Hinderniss beim Schlucken. Bei acuter Entwicklung treten unter heftigen Fiebererscheinungen, schnellem Pulse, Schluckbeschwerden, bei Kindern mit schmerzhafter Verzerrung des Gesichtes, auf, welche theils in der Entzündung, theils in der Hervorwölbung und Raumbeengung des Rachens begründet sind. In chronisch verlaufenden Fällen kann der Schmerz fehlen oder unbedeutend sein, dagegen fehlt nie die Behinderung im Schlucken durch die Unmöglichkeit der Aufnahme fester Nahrung und durch Regurgitiren des Genossenen. Brustkinder lassen die Brust nach einigen Zügen wieder los, schreien, husten und befördern die eben genossene Milch wieder heraus. Bei kleinen Kindern ist ein beim Schlafen hörbarer schnarchender Ton eine sehr verdächtige Erscheinung. Mit der Ausbreitung des Abscesses stellen sich heftige, bis zur Cyanose sich steigernde Athembeschwerden ein, durch Compression des Kehlkopfes oder seiner Nerven Heiserkeit und pfeifende Respiration. Der gleichzeitig vorhandene Husten ist bedingt theils durch Herabfliessen des reichlich producirten Schleimes, theils durch Mitbetheiligung des Kehlkopfes, besonders durch entzündliches Oedem. Die Respiration ist selbst bei Freibleiben des Kehlkopfes oft stertorös, von einem schnarchenden, rasselnden Geräusch begleitet, das sofort stärker wird, wenn man den Kopf des Patienten nach vorne überbeugt.

Entwickelt sich der Abscess in der Nähe des Atlas, so treten dieselben Erscheinungen auf wie bei Hypertrophie der Rachenmandel. Es ist natürlich, dass durch die Behinderung des Schluckens besonders bei Kindern die Ernährung leidet und dass Abmagerung, Schwäche, Anämie bei langsamer Entwicklung der Affection unausbleiblich sind.

Als eine seltene Complication ist die Lähmung des N. facialis zu betrachten; sie ist nach Bokai durch entzündliche Schwellung des um die Austrittsstelle des Nerven liegenden Gewebes, seltener durch directes Uebergreifen der Entzündung auf den Nerven selbst bedingt. In einem vom Verf. beobachteten Falle ging die Facialislähmung voraus.

Bei dem secundären Retropharyngealabscess gesellen sich zu den erwähnten Beschwerden die Erscheinungen der Spondylitis cervi-

calis, als da sind: Unmöglichkeit, den Kopf nach den verschiedenen Seiten zu bewegen, Schmerzhaftigkeit, Steifigkeit des Nackens, Dislocation und Difformität der Halswirbelsäule. Nach Neureutter soll das Schnarchen im Schlafe gerade für die durch Wirbelerkrankungen bedingten Abscesse charakteristisch sein.

Die objective Untersuchung, die durch das jugendliche Alter der Erkrankten sehr erschwert wird, ergibt auf der hinteren Rachenwand grössere oder kleinere, erbsen- bis wallnussgrosse Hervorwölbungen, die von entzündeter oder normaler Schleimhaut, je nach dem Verlauf der Krankheit, überzogen sind. Je grösser die Abscesse, um so deutlicher sind die Hervorwölbungen des weichen Gaumens und der Tonsillen, um so enger erscheint das Lumen des unteren Pharynxabschnittes. Bei der Palpation, die bei tiefsitzenden Abscessen und bei sehr kleinen Kindern allein die Diagnose sichern hilft, zeigt sich die Geschwulst prall, elastisch fluctuirend. Ist aber auch die Palpation wegen allzu beträchtlicher Enge des Isthmus faucium oder wegen der Schwierigkeit des Mundöffnens unmöglich, so kann nach Kohts die Inspection und Palpation der seitlichen Halspartien wesentlich zur Fixirung der Diagnose beitragen. Der Hals zeigt nämlich schon im Beginne der Erkrankung eine grössere Steifheit, die später immer mehr zunimmt, während sich auf einer oder beiden Seiten der oberen Halsgegend in der Unterkiefergegend eine deutliche, sicht- und fühlbare Anschwellung constatiren lässt. In der Tiefe fühlt man mässige Lymphdrüsenschwellung, welche ziemlich resistent und schmerzhaft ist und Fluctuation erkennen lässt. Bei stärkerem Druck auf diese Drüsen können besonders bei Anwesenheit grösserer Abscesse Suffocationserscheinungen und Athembeschwerden auftreten. Dass bei älteren Kindern und Erwachsenen die laryngoskopische Untersuchung am besten über Sitz, Grösse und Beschaffenheit des Abscesses Aufschluss geben kann, ist natürlich; man erblickt auf der seitlichen Rachenwand in verschiedener Ausdehnung, meist von der Insertion der hinteren Gaumenbogen an bis zum Kehlkopfeingang, eine pralle, derb-elastische, bei Druck fluctuirende Geschwulst von dunkelrother Farbe.

Die Diagnose des Retropharyngealabscesses ist unter Berücksichtigung der subjectiven Beschwerden und Ergebnisse der objectiven Untersuchung in der Regel nicht schwer. Besondere Schwierigkeiten bietet die Diagnose dann, wenn die Erscheinungen durch anderweitige Affectionen des Mundes und Rachens, namentlich Scharlach oder Diphtherie, verdeckt werden oder wenn gleichzeitig der Kehlkopf erkrankt ist. Das Hauptgewicht ist stets auf die eventuell in der Narkose auszuführende Digitaluntersuchung zu legen, auf das Vorhandensein von Fluctuation, die ausser bei dem später zu besprechenden retropharyngealen Hämatom bei keiner anderen Rachenaffection beobachtet wird. Die secundären Senkungsabscesse bieten im Hinblick auf die gleichzeitig bestehenden Erscheinungen der Spondylitis meist keine diagnostischen Schwierigkeiten. Verwechslungen mit weichen Geschwülsten, so besonders mit retropharyngealen Lipomen, wie

Taylor einmal beobachtete, sind immerhin möglich, doch wird eine Probepunction die Diagnose sichern.

Die Prognose der idiopathischen Retropharyngealabscesse ist bei langsamer Entwicklung der Erscheinungen und bei energischem Eingreifen ziemlich günstig. Je zarter das Alter und je schwieriger der Zugang zu der Geschwulst ist, um so ungünstiger gestalten sich die Aussichten, ebenso, je stürmischer und je acuter die lebensbedrohlichen Erscheinungen sich entwickeln. Dass secundäre Abscesse eine absolut schlechte Prognose geben, liegt in der Natur der denselben zu Grunde liegenden Krankheiten. Tiefer liegende Eitersenkungen sowie Perforationen in Kehlkopf und Luftröhre können durch Asphyxie oder Fremdkörperpneumonie letalen Ausgang zur Folge haben. In äusserst seltenen Fällen kann sich nach Henoch der Abscess bis unter die äusseren Theile des Halses weiterverbreiten und durch langwierige Eiterung und Erschöpfung zum Tode führen; Abscesse der seitlichen Rachenwand hinter den Tonsillen, welche spontan in den äusseren Gehörgang durchbrachen, wurden ebenfalls von Henoch beobachtet.

Aufgabe der Therapie ist es, der Entwicklung des Abscesses vorzubeugen; leider gelingt der Versuch, die Lymphadenitis durch Eis zu coupiren, bei der Kleinheit der Patienten nur äusserst selten. Schmitz und Gautier schlagen zur Coupirung und schnelleren Reifung des Abscesses Pinselungen des Gaumensegels und der hinteren Rachenwand mit Jodtinctur oder Jodkalilösung vor.

Sobald sich Fluctuation zeigt, muss der Abscess eröffnet werden, wenn auch noch keine lebensbedrohenden Erscheinungen vorhanden sind. Die Eröffnung geschieht entweder mit dem Messer, das bis auf die Spitze mit Heftpflaster umwickelt ist, oder durch eine Cachirung durch Druck erst im Momente der Operation vorgeschoben wird, oder mittelst eines Troicart. In beiden Fällen darf mit Rücksicht auf die Carotis int. nicht mehr als 3—4 mm von der Mittellinie entfernt eingestochen werden Damit der Abscess im Moment der Incision nicht ausweiche, schlug man vor, durch einen Gehilfen einen Druck auf die Gegend des Unterkieferwinkels ausüben zu lassen; um die Aspiration des Eiters zu verhüten, soll der Kopf des Operirten sofort nach der Incision nach vorne gebeugt werden; ist trotz aller Vorsicht dennoch Eiter aspirirt worden, dann empfiehlt sich nach Bokai die Anwendung des Inductionsapparates, mittelst dessen es wiederholt gelang, die drohende Asphyxie zu beseitigen. Ob ein blosser Einstich oder eine breite Incision angezeigt sei, hängt von der Grösse und Reife des Abscesses ab; füllt sich derselbe nochmals, dann ist eine zweite Operation nöthig. Senkungsabscesse sollen nur dann eröffnet werden, wenn lebensbedrohliche Erscheinungen auftreten.

Die Nachbehandlung besteht in Ausspritzungen des Rachens mit warmem Wasser oder 4% Borsäurelösung, bei älteren Kindern in Gurgelungen oder Inhalationen. Burckhardt empfiehlt bei Kindern, wenn Dyspnoe vorhanden ist, sowie bei septischen und spondylitischen Abscessen die Eröffnung von aussen durch einen Schnitt, welcher am inneren Rande des Kopfnickers in die Tiefe dringt.

Pharyngitis exsudativa.

(Miliaria, Herpes, Erysipel, Pemphigus, Erythema exsudativum, Variola, Pharyngitis fibrinosa, Aphthen, Oedem.)

Auf der Schleimhaut des Rachens kommen ebenso wie auf der der Mundhöhle Bläschen und Blaseneruptionen sowie anderweitige Exsudationen vor.

Die Miliaria hat besonders am weichen Gaumen, den Tonsillen und der Hinterwand ihren Sitz und stellt kleine, hirsekorngrosse Erhabenheiten dar, welche mit einem glänzenden, durchsichtigen Inhalte gefüllt sind; sie machen keine oder leicht anginöse Beschwerden, vertrocknen und hinterlassen keine Substanzverluste oder Geschwüre.

Häufiger ist der Herpes pharyngis (Herpes gutturalis, Angina herpetica, Angine couenneuse). Derselbe tritt zuweilen in Combination mit Herpes faeialis auf, stellt jedoch viel häufiger eine selbstständige Krankheit vor.

Hinsichtlich der Aetiologie herrscht noch grosse Meinungsverschiedenheit. Während die Einen Erkältungen und dumpfe, schlechte Luft, nasskaltes Wetter für seine Entstehung verantwortlich machen, wollen ihn Andere mit geistiger Ueberanstrengung, Uterinleiden, Störungen der Menstruation, Gemüthsaffecten in Verbindung bringen. Für den Einfluss der Witterung spricht ausser der Ansicht der meisten französischen Autoren die Beobachtung Semon's, welcher Rachenherpes in England hauptsächlich in den Frühjahrs- und Herbstmonaten beobachtete. Herzog glaubt, dass derselbe durch Reizzustände im Bereiche des Ramus pharyngeus und N. nas. post. sowie des N. Vidianus erzeugt werde, und stützt seine Ansicht von der neuropathischen Natur des Leidens auf die Einseitigkeit der Erkrankung, den heftigen einseitigen Kopfschmerz im Beginne desselben, sowie auf den Umstand, dass nach seinem Ablauf Lähmungen des Velum zurückbleiben. Auch Andere, wie z. B. Ollivier und Bride, glauben an den neuropathischen Ursprung desselben. Eichhorst und Ziemssen sahen Herpes gutturalis epidemisch auftreten, auch wurde er wiederholt bei den letzten Influenza-Epidemien beobachtet.

Der Rachenherpes beginnt in der Regel plötzlich, meist unter allgemeinen und gastrischen Erscheinungen, starkem Fieber und Kopfschmerz, der häufig einseitig ist und den Charakter der Migräne zeigt. Nach 12—15 Stunden entstehen brennende Schmerzen im Halse, die sich bei der Deglutition beträchtlich steigern, sowie vermehrte Speichelsecretion, Bedürfniss zum Räuspern. Bei der objectiven Untersuchung finden sich am Isthmus, auf den Tonsillen, dem harten und weichen Gaumen, den Gaumenbögen, der Uvula, in seltenen Fällen auch auf der Hinterwand, stecknadelkopf- bis linsengrosse, gelbliche, in Gruppen oder einzeln stehende, von einem Entzündungshofe umgebene Bläschen. Ihre Zahl ist sehr verschieden, oft sind nur einige, oft sehr viele vor-

handen, so dass der ganze Rachen wie getüpfelt erscheint. Die Eruption ist bald einseitig, bald doppelseitig und nicht mit einem Male beendet, indem meist noch weitere Nachschübe stattfinden. Nach kurzem Bestande bersten die Bläschen, an ihrer Stelle erscheint entweder eine rothe, epithelberaubte Schleimhaut, welche sich rasch überhäutet, oder es bilden sich pseudomembranöse Auflagerungen, welche, wenn sie confluiren, Diphtherie vortäuschen und nach deren Abstossung verschieden tiefe Geschwüre zurückbleiben können. Der Schmerz ist in diesem Stadium äusserst heftig. Nach 5—10 Tagen tritt meistens Heilung ein, nachdem noch anderweitige Herpeseruptionen an der Nase, den Lippen oder dem Präputium, der Vulva oder am Larynxeingang sich eingestellt hatten. Die herpetischen Geschwüre können jedoch auch in eine sehr beträchtliche Tiefe dringen und Perforation der Gaumenbögen und des Velum, nach Hallopeau sogar durch Gangrän Tod zur Folge haben.

Der Verlauf ist stets ein acuter, doch kann ausnahmsweise die Krankheit auch einen chronischen Verlauf nehmen und einen gewissen Typus einhalten; auch ist sicher constatirt, dass dem Rachenherpes zuweilen nicht nur Lähmung des Gaumensegels, sondern auch allgemeine Lähmung mit Ataxie nachfolgt.

Die Diagnose bietet keine Schwierigkeiten, wenn man neben schon ausgebildeten Geschwüren noch frische Bläschen im Mundrachenraum oder Herpeseruptionen an anderen Hautstellen entdeckt; fehlen diese letzteren, dann ist die Diagnose schwierig und die Verwechslung mit anderen Affectionen möglich. Die von M. Schmidt als Eczem der Mundrachenhöhle beschriebenen Fälle sind wahrscheinlich auch herpetischer Natur gewesen.

Die Behandlung ist eine locale und eine allgemeine. Da, wo sich die Krankheit auf eclatante Erkältung und rheumatische Einflüsse zurückführen lässt, empfiehlt sich das Natr. salicyl. oder die Tinct. Colchici, Tinct. Aconiti. Bei neuropathischer Grundlage hat man gute Erfolge vom Antipyrin und Arsenik gesehen. Die Localbehandlung beschränkt sich auf Gurgelwässer aus schleimigen, einhüllenden Mitteln, eventuell unter Zusatz von Opiumtinctur oder Cocaïn, das zur Linderung sehr heftiger Schluckbeschwerden auch eingepinselt werden kann.

Grössere Blasen im Rachen kommen ausser bei dem Erysipelas pharyngis, das wegen der vorherrschenden hochgradigen diffusen Entzündung der Schleimhaut bei der Phlegmone erwähnt wurde, besonders bei Pemphigus vor.

Derselbe tritt theils als Vorläufer des Pemphigus cutaneus, theils als selbstständige Form auf.

Die Aetiologie ist noch sehr dunkel; dass derselbe auf syphilitischer Basis entstehen kann, ist zweifellos, ebenso, dass er manchmal im Gefolge von Uterinleiden vorkommt.

Er beginnt wie der Herpes meist mit Fieber, Schüttelfrost, Uebligkeit und Erbrechen. Auf der Schleimhaut des Velum, der Uvula schiessen erbsen- bis nussgrosse, mit einem milchig-weissen Inhalt

gefüllte Blasen auf, deren Epitheldecke sich nach kurzer Zeit trübt, macerirt und abgestossen wird. Dadurch entstehen scharf begrenzte rothe Substanzverluste, die sich mit einem weissen, croup- oder aphthenähnlichen Belag bedecken und entweder rasch heilen oder bei längerem Bestande sich in Geschwüre umwandeln. Nach Mandelstamm und Killian tritt der Rachenpemphigus durchaus nicht immer in Form von Blasen auf, sondern sehr häufig in Form von soorähnlichen Auflagerungen oder Excoriationen. Dass der Pemphigus des Rachens ausser Schmerzen beim Schlingen und undeutlicher Sprache durch Raumbeenguug die Deglutition fester Stoffe erschwert und unter Umständen Dyspnoe verursachen kann, ist erklärlich.

Die Therapie besteht in dem längeren Gebrauch von Arsenik; M. Schmidt empfiehlt laue Thermalbäder oder prolongirte Bäder zu Hause; die locale Therapie ist dieselbe wie bei Herpes.

Auch das Vorkommen von Erythema exsudativum multiforme im Rachen ist von Poletebnoff, Schoetz und Anderen beobachtet. Die unter Fieber, Kopfschmerz erfolgende Eruption ist anfangs knötchenförmig, solide, entzündeten Granulationen ähnlich; später bilden sich Geschwüre mit gelbgrauem Grunde, die ohne Narbe heilen; gewöhnlich ist auch die äussere Haut stark befallen. Die Beschwerden bestehen in starker Salivation, Schmerz beim Schlucken.

Eitergefüllte Blasen, Pusteln, entstehen entweder durch spätere Veränderung des Inhaltes der soeben erwähnten Eruptionen oder durch Variola.

Die eigentliche Rachenvariola, die von der die Blattern begleitenden Entzündung der Schleimhaut zu trennen ist, ist fast stets eine Theilerscheinung der Hautvariola; in selteneren Fällen localisirt sich die Allgemein-Infection nur oder vorzugsweise in der Mundrachenhöhle. Nach vorausgegangenem Schüttelfrost, Kreuzschmerzen, Fieber bis zu 41° entwickeln sich auf der gerötheten, marmorirten Schleimhaut des Velum, der Hinterwand und öfters auch des Mundes linsengrosse, runde Knötchen, die meist schon am zweiten oder dritten Tage in der Mitte ein Bläschen zeigen und sich in Pusteln umwandeln. Um die Pusteln herum befindet sich ein stark gerötheter Halo, die Speichel- und Lymphdrüsen schwellen an, es besteht hochgradige Salivation und heftiger Schmerz beim Schlucken, der sich beim Platzen der Pusteln noch mehr steigert; bei zahlreicher Eruption auf der Hinterwand kann durch Oedem des Kehlkopfes Erstickungsgefahr eintreten. Im Nasenrachenraum kommt es nach Wendt zu Hyperämie, Hämorrhagie und diffuser Schwellung der Schleimhaut, zur Bildung einer membranartigen Auflagerung mit nachfolgender Verschwärung. Sowohl diese wie die aus wirklichen Pusteln hervorgegangenen Geschwüre können in die Tiefe gehen und das Velum perforiren.

Die Diagnose ist bei gleichzeitiger Variola der Haut leicht, ohne dieselbe aber nur unter Berücksichtigung des fieberhaften Beginnes, des Herrschens einer Blatternepidemie und der objectiven Untersuchung möglich.

Die allgemeine Behandlung beschränkt sich auf die Bekämpfung des Fiebers, Linderung der äusserst heftigen Hals- und Kopfschmerzen, die locale Behandlung in fleissiger Reinigung der Rachenhöhle mittelst nicht reizender antiseptischer Gurgelwässer.

Ein anderer Exsudationsprocess ist die Pharyngitis fibrinosa. Man versteht darunter eine Affection, welche eine Steigerung des entzündlichen Processes darstellt und theils nicht, theils nur in geringem Grade infectiös ist. Das Vorkommen der Angina crouposa benigna, wie man sie im Gegensatz zu der echten Diphtherie genannt hat, wird auch von Bamberger, B. Fränkel, Hajek, Réthi, Henoch und Strümpell bestätigt. Nicht infectiöser Natur sind die artificiellen Croupexsudate nach Application der Chrom- und Trichloressigsäure und des Galvanokauters. Wahrscheinlich in geringerem Grade infectiös dagegen sind die im Verlaufe der folliculären, lacunären oder zuweilen auch phlegmonösen Tonsillitis auftretenden Flecken. Dieselben bestehen nämlich nach des Verf. Untersuchungen nicht immer nur aus Eiterkörperchen, sondern auch aus Fibrin. So stellt zuweilen die äussere Schicht eines solchen Fleckens eine kleine Scheibe eines echten Croupexsudates vor, während die innere, direct der Schleimhaut aufliegende und in dieselbe eindringende Schicht aus reinem Eiter besteht. In anderen Fällen ist die Grenze zwischen fibrinösem und eitrigem Belag weniger scharf ausgeprägt und fibrinöses und eitriges Exsudat innig und gleichmässig mit einander vermischt. Das fibrinöse Exsudat findet sich jedoch in manchen Fällen von folliculärer und lacunärer Angina nicht nur über den vereiternden Follikeln oder den aus den Lacunen hervortretenden Eiterpfröpfen, sondern auch zwischen denselben und ist so nicht selten die Ursache des Auftretens grösserer zusammenhängender Flecken, welche um so leichter mit echter Diphtherie verwechselt werden, wenn derartige schleierartige Anflüge auch auf der Uvula oder den Gaumenbögen angetroffen werden. Auch Henoch erwähnt das Vorkommen solcher Fälle und meint, sie seien rein entzündlichen Ursprunges, combinirten sich manchmal mit Tonsillarabscessen und hätten mit Diphtherie nichts gemein, wie das äussere Ansehen. Strümpell und neuerdings auch Sokolowski hingegen glauben, die gutartige croupöse, auf den weichen Gaumen beschränkte Angina, die auch in Combination mit lacunärer und parenchymatöser Tonsillitis vorkäme, stelle wahrscheinlich nur die leichteste Form der specifischen Diphtherie vor, doch sei es möglich, dass Entzündungen der Gaumenschleimhaut mit der Bildung eines croupösen Exsudates auch von anderen ätiologischen Momenten abhängig seien; jedenfalls sei es eine praktisch wichtige klinische Thatsache, dass es eine leichte Form echt croupöser Angina gebe, welche gutartig verlaufe und keine Neigung zu diphtheritischer Geschwürsbildung und zum Uebergreifen auf den Larynx habe. Eine Regeneration der bei lacunärer Angina oder nach galvanokaustischen Eingriffen vorkommenden Croupexsudate hat Verf. noch nicht beobachtet. Hajek sah die Pharyngitis fibrinosa öfters im Gefolge acuter Pharyngolaryngitis, ferner ebenso wie Réthi bei Influenza, und meint,

eine gemeinsame Ursache liesse sich bis jetzt nicht nachweisen; gemeinsam sei nur der gutartige Verlauf, obwohl er Wiederneubildung der Membranen beobachtete. In den Membranen fand er Streptokokken und Staphylokokken, doch glaubt er, ein abschliessendes Urtheil sei noch nicht erlaubt.

Die Diagnose ist bei der ausserordentlichen Verbreitung der Diphtherie nur mittelst bacteriologischer Untersuchung möglich.

Die Behandlung ist dieselbe wie bei acuter katarrhalischer Angina.

Die Aphthen stellen gleichfalls pseudomembranöse Producte dar und localisiren sich auf denselben Stellen wie die Herpes. Das Nähere wurde bei den Krankheiten der Mundhöhle mitgetheilt.

Zum Schlusse soll noch das Oedem des Rachens erwähnt werden. Ausser den häufigen namentlich die Phlegmone begleitenden entzündlichen Oedemen kommt auch zuweilen das Stauungsödem zur Beobachtung. Es schliesst sich an uncompensirte Herzfehler, chronische Nephritis, Scharlachnephritis an. Die Schleimhaut des Rachens, namentlich des weichen Gaumens, erscheint blassroth, prall und derb. Die Behandlung muss gegen das Grundleiden gerichtet und gleichzeitig eine locale sein: am raschesten führen Scarificationen zum Ziele.

Pharyngitis ulcerosa.

Es ist sehr schwer, eine genaue Grenze zu ziehen zwischen den Exsudations- und Ulcerationsprocessen, zumal die ersteren grossentheils mit letzteren combinirt sind oder mit letzteren enden. Es sollen daher nur jene Geschwürsformen besprochen werden, die eine mehr selbstständige oder auch ätiologisch unklare Stellung einnehmen, während die diphtheritischen, scrophulösen, syphilitischen, tuberculösen, lupösen, leprösen Geschwüre in den betreffenden Capiteln abgehandelt werden.

Relativ häufig sind traumatische Geschwüre. Sie entstehen durch mechanische, chemische oder thermische Einwirkungen, durch Einspiessen von spitzen Fremdkörpern, durch Schnittwunden, Zerreissungen des Velum durch in den Mund gehaltene Gegenstände, durch Anätzung und Verschorfung der Schleimhaut in Folge von Lapis, ätzenden Alkalien oder Säuren; nach Wolf sollen bei Arbeitern in Chromsäurefabriken häufig Geschwüre am weichen Gaumen vorkommen, welche zu Verwachsungen führen. Diese Geschwüre können oberflächlich bleiben, aber auch phlegmonöse Entzündung mit Abscedirung, ja selbst Gangränescirung zur Folge haben.

Eine Form gutartiger Pharynxgeschwüre ist neuerdings von Heryng beschrieben worden. Sie treten gewöhnlich solitär und einseitig, selten doppelseitig am vorderen Gaumenbogen auf, in der

Form seichter, länglicher, 1 cm langer, 7—8 mm breiter Ulcerationen, deren Ränder scharf und deren Grund etwas vertieft mit grauweissem, nicht abstreifbarem Beleg bedeckt ist. Die Umgebung zeigt meist keinen Hof, die Geschwüre bluten bei Berührung nicht und sind ziemlich indolent. Sie entstehen niemals aus Bläschen oder Pusteln und sind niemals von ähnlichen Eruptionen am weichen Gaumen, hinterer Rachenwand oder Mundhöhle begleitet. Nach 2—3 Tagen treten auf dem Geschwürsgrund rothe Pünktchen auf, der Papillarkörper reinigt sich, der Beleg verschwindet und nach 10—12 Tagen ist das Geschwür geheilt. Mehrmals begann die Erkrankung unter den Symptomen einer leichten Angina tonsillaris mit Klagen über Brennen und Trockenheit im Halse, worauf am dritten Tage sich die Geschwüre bildeten. Die bacteriologische Untersuchung führte noch zu keinem bestimmten Resultate; die Aetiologie ist noch vollkommen dunkel. Am meisten Aehnlichkeit hat die Affection offenbar mit Aphthen, doch unterscheidet sie Heryng von denselben.

Oberflächliche Geschwüre kommen ferner bei der sogenannten Angina cachectica — Angine pultacée — vor. Sie wird nur bei Schwächezuständen acuter oder chronischer Natur, so besonders bei Pneumonie, Phthise, Typhus, Marasmus senilis, beobachtet. Nach E. Wagner finden sich bald mehr circumscripte, bald mehr diffuse, weisse oder weissgelbliche, über die Oberfläche schwach vorragende Flecken auf der Schleimhaut des Gaumens und den Tonsillen, welche einer Ephitheleiterung ihre Entstehung verdanken. Die obersten Epithellagen fehlen meist, die zunächst folgenden zeigen die Epithelien blasig, hydropisch und mit einzelnen Eiter- und Blutkörperchen durchsetzt. Manchmal zeigt die Oberfläche ein unebenes, rauhes, grauliches Aussehen, die Epithelien sind in Abschuppung begriffen, zwischen denselben finden sich vielfach grosse Fetttropfen.

Ob die von M. Mackenzie beschriebene Angina ulcerosa, welche besonders bei Anatomen, Medicinern, Krankenwärtern in Folge leichter septischer Infection vorkommen soll, mit der Angina cachectica identisch ist, lässt sich nicht entscheiden.

Auch im Gefolge des Scorbutes und der Stomacace finden sich Geschwüre. Nach Wertheimber kommt bei Kindern eine der Stomacace völlig gleiche isolirte Erkrankung des Rachens vor. Schmutziger Beleg auf den Mandeln, übler Geruch aus dem Munde, Schwellung der Submaxillardrüsen, selbst Albuminurie geben dem Bilde der Diphtherie grosse Aehnlichkeit; das Hauptmerkmal bleibt der charakteristische Fötor aus dem Munde sowie die sichere Wirkung des Kali chloricum. Es kommen sogar kleine Epidemien dieser Art neben Stomacace vor. Barthez und Sanné nennen die Erkrankung „Angine ulcero-membraneuse“.

Einige Autoren nehmen endlich auch das Vorkommen specifisch-typhöser Geschwüre an. Nach E. Wagner und Cahn treten im Anfang des Typhus am Velum und Gaumenbögen gleichzeitig mit Roseola rundliche oder ovale, bis über linsengrosse, grauweisse, flache, scharf abgeschnittene Geschwüre auf, welche geplatzten

Herpesbläschen gleichen, fast gar keine oder nur geringe Beschwerden verursachen und ziemlich rasch heilen. Wagner fand in denselben weisse Blutkörperchen, Plattenepithelien und Mikroorganismen, aber keine Typhusbacillen. Eugen Fränkel und Landgraf bestreiten das Vorkommen der specifisch-typhösen Geschwüre und behaupten, dieselben seien verursacht durch mangelhafte Reinigung der Mundrachenhöhle resp. durch das massenhafte Auftreten der normalerweise vorkommenden Mikroorganismen, welche Epithelnekrose erzeugten.

Die subjectiven Beschwerden der angeführten Geschwürsarten bestehen in mehr oder weniger heftigen Schlingbeschwerden, Trockenheit im Halse oder auch vermehrter Speichelabsonderung oder dem Gefühle der Anwesenheit eines Fremdkörpers. Bei tiefer gehenden Geschwüren, so namentlich den scorbutischen und den bei Stomacace, schwellen die Lymphdrüsen, es tritt Foetor ex ore auf.

Die Behandlung besteht bei den traumatischen Geschwüren in der Entfernung allenfallsiger Fremdkörper, Vereinigung zerrissener Theile durch die Naht, bei den übrigen Formen in fleissiger Reinigung der Rachenhöhle mit Desinficientien und Sorge für passende Ernährung.

Ulcerationen und daraus hervorgehende Zerstörungen können auch durch specifische Infectionsstoffe erzeugt werden. So beobachtete Eichhorst bei Endocarditis ulcerosa in Folge von Pilzembolien ausgedehnte nekrotische Zerstörungen am Zäpfchen und den benachbarten Rachentheilen. Auch aus Blutungen können solche Geschwüre hervorgehen; die embolischen Blutungen unterscheiden sich von den gewöhnlichen durch ihr farbloses Centrum.

Pharyngitis diphtheritica.

Mit dem Namen Pharyngitis, Angina diphtheritica, Rachendiphtherie, Cynanche contagiosa, bezeichnet man eine Infectionskrankheit, welche sich durch das Auftreten von Pseudomembranen auf der Schleimhaut des Rachens, des Kehlkopfes und der Nase charakterisirt. Die Diphtherie ist meistens eine primäre selbstständige Erkrankung; sie befällt vorher ganz gesunde Theile oder sie gesellt sich zu Wunden im Rachen und den benachbarten Schleimhäuten. Die manche schwere Infectionskrankheiten, wie Scharlach, Typhus, Masern etc., begleitende oder denselben folgende Erkrankung wird neuerdings als eine verschiedene Affection, als Pseudodiphtherie, angesehen. Die echte genuine Diphtherie ist eine Infectionskrankheit, welche sich localisiren, aber auch von den zuerst ergriffenen Theilen aus den ganzen Körper inficiren kann.

Die Verbreitung der Krankheit geschieht durch den Verkehr, hauptsächlich durch Kindergärten und Schulen, entweder durch directe Uebertragung, d. h. durch die Secrete, Exspirationsluft der Kranken,

durch Krankenpflege, Küsse, Benützung ungereinigter Löffel, Gabeln, oder auch durch Kleider und Gegenstände. Das Diphtheriegift kann ausserhalb des menschlichen Körpers auf leblosen Gegenständen monatelang wirksam bleiben, wie der Ausbruch der Krankheit nach dem Beziehen eines inficirten Zimmers beweist; in Membranstücken sind die Diphtheriebacillen im trockenen Zustande 4—5 Monate lebensfähig. Läsionen der Schleimhäute der ersten Wege begünstigen das Haften des diphtheritischen Giftes; empfängliche Individuen können aber auch ohne solche Läsionen erkranken. Die Ansteckung durch Thiere, namentlich Hühner, Tauben, Kälber, Schweine, wird von Löffler geleugnet und wird die Krankheit dieser Thiere als eine von der menschlichen Diphtherie gänzlich verschiedene bezeichnet.

Die Incubation beträgt in der Regel 2—7 Tage, doch werden auch längere Zeiträume, bis zu 14 Tagen, angegeben; bei directer Ansteckung, z. B Verletzungen der Haut oder wie bei Aerzten durch Anhusten, beginnt die Krankheit meist schon am dritten Tage.

Die Diphtherie ist vorzugsweise eine Krankheit des kindlichen Alters. Nach den Zusammenstellungen von Brühl und Jahr über Diphtherie und Croup im Königreiche Preussen in den Jahren 1875 bis 1882 ist die Sterblichkeit am grössten bei Kindern vom 1. bis 2. Lebensjahre, dann folgt das 2. bis 5. Jahr, dann die Periode der Schulpflicht; über das 15. Lebensjahr hinaus ist die Betheiligung eine geringe. Das männliche Geschlecht sowie die Landbevölkerung zeigt eine grössere Sterblichkeit als das weibliche Geschlecht und die Stadtbevölkerung. Die Krankheit nimmt von Osten nach Westen zu ab, die grösste Mortalität liegt in Preussen zwischen den niedrigsten, das Minimum zwischen den höchsten Jahresisothermen. Brühl und Jahr halten deshalb Gegenden mit einer weniger gleichmässigen Temperatur und Luftfeuchtigkeit in Bezug auf das Auftreten der Diphtherie für geeigneter als solche mit einer gleichmässig temperirten, trockenen und warmen Luft. Auch Monti glaubt, dass plötzlich eintretende Kälte, übermässige atmosphärische Feuchtigkeit, rapide Temperatursprünge, unrein gehaltene, feuchte Wohnungen, Neubauten, schlecht gereinigte Aborte, Cloaken und Canäle zur Verbreitung der Diphtherie beitragen, während bei reiner, trockener, sauerstoffreicher Luft und guten sanitären Verhältnissen die Krankheit weniger Boden fasst. Die Constitution hat keinen Einfluss; sicher ist jedoch, dass Kinder mit acuten und chronischen Entzündungen des Rachens, der Nase, der Bronchien dem Infectionsstoffe einen geeigneteren Boden bieten.

Als Ursache der Diphtherie kennt man jetzt specifische Spaltpilze, die von Klebs-Löffler entdeckten Diphtheriebacillen. Sie stellen gebogene Stäbchen mit abgerundeten Ecken vor, welche in die Epithelien eindringen, Nekrose der obersten Schichten erzeugen und zu Membranbildung auf den ergriffenen Stellen Anlass geben. Wenn die Diphtherie zu einer Allgemeinerkrankung wird oder zu Erkrankungen anderer Organe führt, so muss man annehmen, dass die Diphtheriebacillen eine giftige Substanz, das Toxin, erzeugen und dass gleichzeitig noch eine andere Infection (Mischinfection) mit Strepto-

coccus etc. stattgefunden hat. Es ist gelungen, durch Reinzüchtung und Verimpfung auf Thiere nicht nur die localen Erscheinungen der menschlichen Diphtherie hervorzurufen, sondern auch postdiphtheritische Lähmungen.

Zweimaliges Erkranken kommt vor, gehört aber immerhin zu den Ausnahmen; die Behauptung, dass einmaliges Ueberstehen der Diphtherie zu neuen Attaquen disponire, ist unzutreffend; es handelt sich in solchen Fällen fast stets um Lacunärangina.

Das Wesen der Diphtherie besteht nach Heubner in einer innigen Verquickung von Entzündung und Nekrose. Die Nekrose ist die Folge localer, bis zu vollkommener Stase sich steigender Circulationsstörungen mit gleichzeitiger Erkrankung der Gefässe selbst. Dadurch kommt es nicht nur zur Exsudation weisser Blutkörperchen in die Schleimhaut, sondern auch zur Entstehung einer croupösen Pseudomembran auf der Schleimhaut selbst. Localisirt sich der Process in den oberflächlichen Schichten, dann hat man die primäre genuine Oberflächendiphtherie vor sich; stirbt das Gewebe der Schleimhaut oder das Parenchym des ergriffenen Organes ab und wird dasselbe von einer faserstoffigen Exsudation infiltrirt, dann nennt man dies echte Gewebsdiphtherie. Für die Nachschübe ist das wesentliche Moment in dem fortdauernd krankhaften Zustand der Gefässwände gegeben. Sobald sich diese von der Erkrankung erholen und zur Norm zurückkehren, hört auch die Neubildung von Croupmembranen auf. Bei der eigentlichen Gewebsdiphtherie sind die Gefässe von dem abgestorbenen Gewebe allseitig umschlossen; hier hat der Gewebstod, welcher bei dem Croup die unterliegenden kranken Gefässe unbetheiligt liess, auch den schliesslichen Tod der eingeschlossenen Blutgefässe zur Folge. So weit die Gewebsdiphtherie reicht, muss Alles zu Grunde gehen; ist die Abstossung vollendet, so bleibt ein Substanzverlust, ein Geschwür zurück, während sich in der Umgegend demarkirende Eiterung bildet.

Ueber die Scharlachdiphtherie sind die Ansichten der Autoren immer noch getheilt. Während die Einen, wie Henoch, dieselbe streng von der eigentlichen Diphtherie scheiden und die bei Scharlach auftretenden Veränderungen als nekrotisirende Angina auffassen, rechnen sie die Anderen zur wahren Diphtherie, zumal das Freibleiben des Kehlkopfes, das man als Hauptunterscheidungsmerkmal aufstellte, nichts Charakteristisches habe. Nach Heubner handelt es sich bei Scharlachdiphtherie nicht um einfachen, gewöhnlichen Brand, sondern um entzündlichen, mit entzündlicher Ausschwitzung verbundenen Brand, um die Diphtherie im Sinne Virchow's, der Coagulationsnekrose Weigert's. Nach Löffler und Ganghofner ist die Scharlachdiphtherie eine Pseudodiphtherie und durch Streptococcus verursacht. Klinisch unterscheidet Heubner eine leichte und eine schwere Form der Scharlachdiphtherie. Die leichte Form kennzeichnet sich durch das Auftreten zerstreuter gelber Flecken oder Streifen, welche sich vergrössern und oft die ganze Mandel überziehen und Lymphgefässschwellung zur Folge haben; bei diesen Formen

handelt es sich um ein oberflächliches, in das Epithel abgelagertes Exsudat, das aus Fibrin besteht und keine echten Diphtheriebacillen enthält. Unter den schwereren Formen ist am sichersten tödtend die pestartig verlaufende; in wenigen Tagen tritt Rachengangrän auf mit phlegmonöser Infiltration des Halszellgewebes und kolossaler Lymphdrüsenschwellung. In anderen Fällen entwickelt sich die Gangrän langsam unter Lymphadenitis, Geschwüren an den Mandeln und Gaumenbögen, eitrigen Geschwüren der Mund- und Nasenwinkel, Fötor und derben Infiltraten und tödtet durch septische Nierenentzündung, eitrige Pleuritis, septische Thrombose, eitrige Gelenksentzündung.

Vom anatomischen und klinischen Standpunkte aus theilt man die genuine Diphtherie am besten in zwei Formen, in die croupöse und in die septische; für beide ist das Vorhandensein von Pseudomembranen charakteristisch.

Wenn auch nicht geleugnet werden soll, dass zuweilen die Infection mit diphtheritischem Contagium nicht eine pseudomembranöse, sondern eine katarrhalische oder phlegmonöse Entzündung der Schleimhäute zur Folge hat, so ist man doch nicht berechtigt, derartige Erkrankungen gleichfalls als Diphtherie (resp. „katarrhalische Diphtherie") zu bezeichnen, zumal dadurch der persönlichen Willkür Thür und Thor geöffnet würde.

Die Rachendiphtherie beginnt bei Kindern oft plötzlich und stürmisch unter Frost, allgemeinem Unbehagen, Hitze, Durst, Erbrechen, Schmerzen im Kopfe, Nacken, Rücken und in der Lendengegend, bei älteren Kindern und Erwachsenen beginnt sie mehr allmälig, mit geringem Fieber, ganz so wie eine Angina. Nicht selten ist der Ausbruch der Diphtherie von eigenthümlichen Erscheinungen auf der Haut begleitet, am öftesten findet sich erythematöse Röthung der Arme, des Nackens, Halses oder der Brust, der Schenkelbeuge, so dass man im Zweifel sein kann, ob nicht Scharlach vorliegt; auch urticariaartige Efflorescenzen auf der Streckseite der Extremitäten kommen zur Beobachtung. Als sicheres Zeichen für die Schwere des Falles und den meist septischen Verlauf muss das Auftreten von Petechien und Blutextravasaten am Stamm oder Extremitäten betrachtet werden.

Kurze Zeit, meist schon wenige Stunden nach dem Beginne der Allgemeinerscheinungen, treten die localen Beschwerden in den Vordergrund. Sie können sehr unbedeutend sein, aber auch sehr ausgeprägt und bestehen in Brennen, Trockenheit im Halse, Schmerzen beim Schlucken oder dem Gefühle, als ob ein Fremdkörper im Halse stecke.

Die objective Untersuchung kann, wenn man sehr frühzeitig den Kranken sieht, nur die Erscheinungen des acuten Katarrhs ergeben, meist aber sind schon deutliche Zeichen der Exsudation zu constatiren. Dieselbe kann sich auf einzelne Gebilde des Rachens beschränken, aber auch vom Anfang an diffus auftreten. In leichteren Fällen localisirt sich das Exsudat auf eine oder beide Mandeln, auf

das Zäpfchen, die Gaumenbögen oder die Hinterwand. Die Mandeln erscheinen geröthet, geschwellt und mit einem grösseren zusammenhängenden oder mehreren kleineren, zerstreut liegenden, weissen, milchigen Flecken oder reifähnlichen Auflügen besetzt. Nicht selten entsprechen die Auflagerungen den Mündungen der Lacunen und geben so zu Verwechslungen mit Lacunärangina Anlass. Ist die Uvula ergriffen, dann erscheint sie ödematös und ganz oder theilweise von einer weissen Masse umhüllt, welche auf die Gaumenbögen und den centralen Theil des Velum Ausläufer ausschickt. Auf der gerötheten Pars oralis der Hinterwand treten die bald punktförmigen, bald flächenartigen Exsudationen besonders deutlich hervor. Uebersehen kann die Krankheit werden, wenn sie im Nasenrachenraum beginnt und die rhinoskopische Untersuchung mit grossen Schwierigkeiten verbunden ist.

In schweren Fällen sind gleich anfangs beide Tonsillen, die eine oft mehr als die andere, oder der ganze weiche Gaumen befallen. Die Pseudomembranen sitzen zwar grösstentheils auf der Epithelschichte, haften aber ziemlich fest an ihrer Unterlage und dringen sehr oft in die tieferen Schichten der Schleimhaut und das Parenchym der Organe ein. Die Speichel- und Schleimsecretion ist sehr reichlich, namentlich erscheint die Hinterwand mit einem dicken, grünen, eitrigen Secret überzogen Die Nahrungsaufnahme ist durch die beträchtliche Schwellung der ergriffenen Theile und die Lähmung des Velum nicht nur schmerzhaft, sondern auch wesentlich erschwert, in manchen Fällen wiederum gar nicht oder nur sehr wenig beeinträchtigt.

Eine constante Begleiterscheinung ist die Schwellung der Lymphdrüsen. Sie fehlt auch in den leichtesten Fällen nicht und erreicht in schweren eine ausserordentliche Intensität. Die Lymphdrüsen unter dem Unterkieferwinkel, die Gland submaxillares, sowie die hinter und unter dem Kopfnicker befindlichen Drüsen schwellen an, werden schmerzhaft und bilden grosse harte Hervorwölbungen oder rosenkranzartige Paquete, welche zuweilen den ganzen Raum zwischen Unterkiefer und Clavicula einnehmen und die Physiognomie des Kranken in eigenthümlicher Weise verändern (Apparence proconsulaire). Sie bleiben entweder während des ganzen Verlaufes hart und bilden sich mit der Heilung zurück oder sie erweichen und entleeren jauchigen, mit Gewebsfetzen vermengten Eiter.

Das Fieber ist zuweilen unbedeutend oder erreicht erst mit dem Fortschreiten der Exsudation die Höhe von 39·5—40·5 oder es ist gleich anfangs sehr beträchtlich. Im Allgemeinen steht das Fieber im Beginne der Erkrankung mit der Mächtigkeit der diphtheritischen Producte in directem Verhältniss, es steigt oder fällt, wenn die Exsudation zu- oder abnimmt. Macht die Exsudation Stillstand, wenn auch nur einen temporären, so fällt das Fieber zuweilen auf die Norm. So gesetzmässige typische Curven, wie sie bei anderen fieberhaften Krankheiten, namentlich bei Pneumonie oder Typhus, vorkommen, werden bei Diphtherie nicht beobachtet. Plötzliches Sinken der Tem-

peratur ist bedingt durch beginnende Herzlähmung oder durch Kohlensäure-Intoxication in Folge Diphtherie der Luftwege.

In ähnlicher Weise verhält sich der Puls.

Anfangs meist hart wie bei jeder febrilen Krankheit, zeigt er bei älteren Kindern eine Vermehrung bis auf 100—120 Schläge, bei jüngeren auf 130 und noch mehr, bei Erwachsenen auf 90—110. Mit dem Nachlasse des Fiebers und der Abstossung der Membranen wird er weich und weniger frequent. Bei der septischen Form ist der Puls schon anfangs sehr beschleunigt und klein, selbst bei beträchtlicher Temperatursteigerung. Lässt die Herzkraft nach oder tritt Collaps oder Kohlensäure-Intoxication ein, dann wird der Puls äusserst frequent, 130—180, kaum fühlbar und intermittirend.

Mehrfache Veränderungen erleiden die Sprache und die Respiration.

Die Sprache ist coupirt, anginös, nasal, bei Mitbetheiligung der Nase exquisit nasal und undeutlich; die Respiration ist je nach dem Grade der Schwellung der Rachentheile schnarchend und rasselnd, Dyspnoe tritt meist erst bei vollkommenem Abschluss des Isthmus sowie bei Mitbetheiligung des Kehlkopfes oder der Trachea und der Bronchien ein.

Die Verdauungsorgane sind mehr oder weniger betheiligt. Das initiale Erbrechen ist Infections- und Fiebererscheinung und centralen Ursprungs; im späteren Verlauf ist es oft reflectorischer Natur, durch den Reiz der flottirenden, noch nicht völlig abgestossenen Membranen erzeugt, oder es ist das erste Symptom beginnender Urämie oder Septikämie. Der Appetit liegt meist völlig darnieder und müssen die Kranken förmlich zum Essen gezwungen werden, der Durst ist vermehrt, der Stuhl angehalten, doch kommen bei einzelnen Epidemien Diarrhoen vor, meist Zeichen des Collaps oder beginnender Blutvergiftung.

Die Harnmenge ist beträchtlich vermindert, der Urin dick, concentrirt, reich an harnsauren und phosphorsauren Salzen, zuweilen schon im allerersten Stadium eiweisshaltig.

Im weiteren Verlaufe ist fast jeder einzelne Fall verschieden.

In den leichtesten Fällen geht die Affection nach 3—6tägigem Bestande zurück, die Membranen stossen sich ab, die Kranken genesen. In mittelschweren Fällen breitet sich die Exsudation von dem ursprünglichen Herde auf die nächste Umgebung aus oder die Membranen erneuern sich unter wiederholter Temperatursteigerung und vermehrter Lymphdrüsenschwellung, es tritt Fötor aus dem Munde auf, das Allgemeinbefinden gibt zu ernsten Befürchtungen Anlass; trotzdem kann Heilung eintreten, wenn nach Abstossung der dicken Schwarten keine weitere Exsudation oder Complication auftritt; in ganz schweren Fällen erneuern sich die Membranen zum dritten, vierten, ja selbst zum fünften Male, die Krankheit zieht sich wochen- oder, wie Henoch einmal baobachtete, zwei Monate lang hin und kann so in Folge von langanhaltender Temperatursteigerung, erschwerter Nahrungsaufnahme oder Appetitmangel, durch Entkräftung oder durch Ergreifen

des Larynx das Leben gefährden; nichtsdestoweniger kann auch hier noch Genesung eintreten, wenn auch meist Nachkrankheiten aller Art nicht ausbleiben.

Auch bei den leichtesten Formen findet meist eine Ausbreitung nach der Fläche und Tiefe statt, bei den schwereren ist dies ohnehin die Regel. Die Vergrösserung erfolgt durch Apposition mehrerer benachbarter kleiner Exsudate oder durch Mitbetheiligung neuer Schleimhautpartien. Die Membranen erreichen im weiteren Verlaufe theils durch Imbibition mit Wasser, theils durch die Zersetzung eine sehr beträchtliche Dicke und bilden oft fingerdicke, sulzige Schwarten oder austernschalenartige, das Niveau der Schleimhaut beträchtlich überragende Häute, die sich schon zum Theil von ihrer Unterlage abhoben, zum Theil noch mit derselben in Verbindung stehen. Gleichzeitig ändert sich auch ihre Farbe; die anfangs weissen oder gelbweissen Membranen werden durch Zersetzung oder Beimengung von Blut braun oder braunschwarz, missfarbig und übelriechend. Auf den entzündeten exsudatfreien Rachentheilen sind grössere und kleinere Blutextravasate sichtbar.

Die croupöse Exsudation, welche, wie bisher angenommen wurde, sich nur im Rachen ausbreitete, kann sich aber auch auf andere Organe erstrecken.

Zu den häufigsten Complicationen gehört die diphtheritische Erkrankung der Nase. Dieselbe gelangt entweder von der hinteren Rachenwand oder von der Rückseite des Velum in die Choanen und ergreift zuerst die hinteren Partien der Nase, um später auch die vorderen Theile in Mitleidenschaft zu ziehen; nicht selten, namentlich bei Kindern, ist die Diphtherie der Nase die primäre Affection.

Das secundäre Befallenwerden der Nase manifestirt sich durch Steigerung des Fiebers und Erscheinungen eines acuten Schnupfens; sehr oft besteht das erste Symptom im Nasenbluten und ist Folge der der Exsudation vorausgehenden Hyperämie. Ist die Exsudation erfolgt, dann ist das Schneuzen sowie die Respiration durch die Nase sehr erschwert oder ganz unmöglich, aus den Nasenöffnungen ergiesst sich ein wässerig-schleimiges, gelbes oder fleischwasserähnliches Secret, in welchem sich nach einiger Zeit deutliche pseudomembranöse Beimengungen vorfinden und das die Nasenlöcher und Lippen excoriirt. Bei Mitbetheiligung der Tuben tritt Ohrensausen, stechender Ohrschmerz, Schwerhörigkeit auf, in den schwersten Fällen eitrige, selbst diphtheritische Entzündung der Trommelhöhle mit Perforation; dringt die diphtheritische Entzündung in den Thränennasengang ein, dann kann es zu Diphtherie der Conjunctiva und Cornea kommen.

Bei fortschreitender Zersetzung der Membranen wird das Secret fötid, jauchig, blutig, die Haut der Nase, der Augenlider, Lippen schwillt an, röthet sich, die Blutungen werden immer häufiger und heftiger.

Die objeetive Untersuchung ergibt Verstopfung eines oder sämmtlicher Nasengänge durch pseudomembranöse Auflagerungen auf Muscheln und Septum; die Membranen sind bald diffus, bald circumscript und stossen sich in zusammenhängenden Fetzen als Ausgüsse des Naseninnern oder auch als detritusartige Massen ab; eine Erneuerung findet in derselben Weise statt wie im Rachen. Die Nasendiphtherie kann heilen, aber auch zu septischer Infection Anlass geben; auch kann es zu Gesichtserysipel, malignem Oedem, Gangrän der Haut und Meningitis mit letalem Ausgang kommen.

Weit schlimmer als die Ausbreitung auf der Nase ist die Diphtherie des Kehlkopfes, der Trachea und Bronchien. Nicht gerade die hochgradigsten Fälle von Rachendiphtherie haben diese gefährliehste Combination zur Folge, im Gegentheile, dieselbe kommt fast ebenso oft bei dünnen, reifähnliehen und eircumseripten Exsudationen zur Beobachtung, wie überhaupt die Möglichkeit der Ausbreitung auf den Larynx bei allen Formen zu fürchten ist. Die Mitbetheiligung des Larynx tritt meist am 3. bis 8. Tage auf, doch kann dieselbe auch gleich anfangs oder später erfolgen. Wenn auch die Fortpflanzung vom Rachen nach unten (absteigende Diphtherie) die häufigere ist, so kann doch aueh umgekehrt der diphtheritische Process zuerst in Trachea und Larynx, nicht selten unter dem Bilde einer gewöhnlichen Laryngotracheitis, beginnen und in aufsteigender Riehtung weiter schreiten. Die Erkrankung des Kehlkopfes kündigt sich manchmal dureh Erbrechen, erhöhtes Fieber, constant aber durch Heiserkeit an (katarrhalisches Stadium). Sie ist anfangs oft so unbedeutend, dass sie nur dem geübten Ohre des Arztes erkenntlieh ist, und nimmt in wenigen Stunden oder auch erst nach Tagen mehr und mehr den Charakter der Aphonie an. Gleichzeitig stellt sich troekener, bellender Husten (Crouphusten) mit spärlichem Auswurf und vermehrten Sehlingbesehwerden ein. Die laryngoskopische Untersuchung, die leider bei jüngeren Kindern meist unausführbar ist, ergibt bei älteren Kindern oder Erwaehsenen ausser diffuser Röthung und ödematöser Sehwellung der Sehleimhaut namentlieh der subchordalen Partie zerstreute erbsenbis bohnengrosse Auflagerungen oder zusammenhängende, die Stimmbänder, Epiglottis und Tasehenbänder, zuweilen den ganzen Kehlkopf auskleidende Membranen. Relativ häufig sieht man in der Regio interarytaen., an den Lig. aryepigl., Epiglottis, Tasehen- und Stimmbändern Auflagerungen, ohne dass dieselben im weiteren Verlaufe sich ausbreiteten oder Dyspnoe zur Folge hätten. Die Störung der Respiration hängt sowohl von der Dieke und Ausbreitung des Exsudates und des entzündliehen Oedems als aueh ganz besonders von dem Alter des Patienten ab. Bei Kindern treten die Respirationsbesehwerden durehweg sehon sehr bald, je jünger um so früher, in den Vordergrund. Die Athmung ist geräusehvoll, pfeifend, stridulös, der Husten troeken und tonlos, die unteren Thoraxpartien sinken ein, der Larynx wird bei jeder sämmtliche Hilfsmuskeln in Thätigkeit versetzenden Inspiration tief gegen das Jugulum herabgezogen, während die Kinder unruhig sich von einer Seite zur anderen wälzen, sich im Bette auf-

richten, den Kopf zurückwerfen, nach dem Halse greifen, auf den Arm der Mutter verlangen und von diesem wieder in's Bett (stenotisches Stadium).

Wie bei genuinem Croup, so tritt auch bei Diphtherie die Dyspnoe anfangs in Anfällen auf; sie wiederholen sich in längeren oder kürzeren Zeiträumen, bis schliesslich die Athemnoth continuirlich wird und die Krankheit in ihr letztes (das asphyktische) Stadium tritt. Die namenlose Angst und Unruhe macht allmälig einem ruhigeren Verhalten Platz, das vorher geröthete Antlitz wird bleich, die Lippen, Finger, Ohrmuscheln und unteren Extremitäten werden cyanotisch, der Körper bedeckt sich mit kaltem klebrigen Schweiss, die Temperatur sinkt, Husten tritt seltener auf oder verliert sich ganz, die Kohlensäure-Intoxication nimmt mehr und mehr zu, aus der Apathie entwickelt sich Somnolenz und Sopor; meist nach 1—2 Tagen, öfters aber schon nach wenigen Stunden gehen die Kranken zu Grunde.

Bei der Weite des erwachsenen Kehlkopfes kommt es bei circumscripter Exsudation selten zu hochgradiger Dyspnoe, wenn dieselbe auch selbstverständlich bei diffuser Erkrankung und beträchtlicher Dicke der Pseudomembranen nicht ausbleibt.

Die Luftröhre wird nicht selten gleichzeitig mit dem Kehlkopf, häufiger jedoch erst dann ergriffen, wenn es wegen Larynxdiphtherie zur Operation gekommen ist. Wird die Trachea früher oder intensiver als der Larynx befallen, so sind die Excursionen des Kehlkopfes und der Luftröhre nach unten zu weit geringer, als wenn das Hinderniss im Larynx allein seinen Sitz hat. Die Diphtherie der Trachea nach vollzogenem Luftröhrenschnitt kündigt sich meist durch erneuerte Temperatursteigerung an. Die Secretion durch die Canüle wird spärlich, hört schliesslich ganz auf und ist oft mit croupösen Fetzen untermischt. Bei Mitbetheiligung der Bronchien werden öfters dendritisch verzweigte Ausgüsse, bei Tracheitis diphtheritica dicke, röhrenförmige Schläuche expectorirt. Nach Monti gibt die Lunge vor dem Manubr. sterni und den ersten Intercostalräumen einen matteren und zugleich tympanitischen Schall, die Respirationsgeräusche fehlen stellenweise oder sind durch Rasselgeräusche ersetzt.

Unter den subjectiven Erscheinungen ist das Auftreten neuer Respirationsbeschwerden trotz Tracheotomie und sorgfältiger Reinigung der Canüle charakteristisch. Dieselben werden meist am 2. bis 4. Tage, doch auch später beobachtet; die nach der Operation normale Respiration wird frequent, oberflächlich und mühevoll; es treten von Neuem Einziehungen an Rippen und Zwerchfell auf, die Athemnoth steigt, Jactation und Unruhe erreichen den höchsten Grad; allmälig macht sich eine leichenartige Blässe bemerkbar, die Kinder verfallen, nachdem zuweilen wiederholte Suffocationsanfälle sich eingestellt hatten, in Somnolenz und Sopor und gehen an Kohlsäure-Intoxication zu Grunde.

Die diphtheritische Exsudation occupirt zuweilen auch die Sexualorgane und äussere Haut.

In manchen, namentlich septischen Fällen bildet sie zuweilen die erste Localisation. Das weibliche Geschlecht wird häufiger befallen: die Schamlippen schwellen an, die Schleimhaut röthet sich und secernirt eitriges Secret. Unter brennenden und spannenden Schmerzen, Beschwerden beim Uriniren, Harndrang und Blasenkrämpfen, bilden sich auf der Innenfläche der Labien grössere und kleinere flächenartige oder zerstreut liegende weissgelbe Auflagerungen, welche sich nach einiger Zeit abstossen, wieder erneuern und heilen oder Sepsis und Gangrän zur Folge haben können. Nicht selten kriecht der diphtheritische Process auf die Analöffnung und die benachbarte Haut fort und erzeugt dort Erosionen und Auflagerungen; fast niemals wird die Schwellung der Leistendrüsen vermisst.

Beim männlichen Geschlecht etablirt sich die Diphtherie besonders auf Einrissen und Verletzungen des Präputium; die Vorhaut sowie die Haut des Gliedes schwillt ödematös an, lässt sich nicht zurückziehen, zwischen Vorhaut und Eichel erscheint eitrige Flüssigkeit; das innere Blatt der Vorhaut bedeckt sich mit einer Pseudomembran, die Inguinaldrüsen schwellen an, es ist heftiger Schmerz beim Uriniren vorhanden. Durch Zerfall der Membranen und der unterliegenden Schleimhaut können beträchtliche Substanzverluste erzeugt werden.

Als eine sehr seltene Localisation muss die Diphtherie der Haut bezeichnet werden.

Es ist durch mehrere Autoren, namentlich durch Fr. Seitz, sichergestellt, dass sich die Diphtherie auf vollkommen gesunder Haut entwickeln kann. Nach Seitz treten rothe, runde oder elliptische, unregelmässig geformte Flecken auf, in deren Centrum eine gelbweisse Erhabenheit, ähnlich einer Uticariaquaddel, aufschiesst. An dieser Stelle bildet sich ein gelbbraunes, fibrinöses Exsudat, das nach seiner Eintrocknung sich abstösst und ein Geschwür hinterlässt, nach dessen Heilung noch lange Zeit ein brauner Pigmentfleck sichtbar bleibt. Häufiger als die intacte wird die excoriirte, epithelberaubte Haut sowohl primär als secundär ergriffen. Beliebte Localisationen sind eczematöse Stellen hinter dem Ohre oder an den Ohrmuscheln, am Mundwinkel, Naseneingange, fratte Stellen in der Inguinal-, Crural- und Perinealgegend; auch auf Blutegelstichen, Operationswunden oder da, wo Blasenpflaster sassen, entfaltet die Infection zuweilen ihre erste Wirkung.

Wir wenden uns nun zu der zweiten Form der Diphtherie, der septischen.

Sie entwickelt sich in der Regel aus der croupösen mit oder ohne gleichzeitige Gangränescenz der betroffenen Theile, oder sie tritt gleich anfangs als primäre septische Diphtherie auf.

Die Entwicklung der septischen Form aus der croupösen tritt manchmal schon in den allerersten Tagen, häufiger am 2. oder 3. Tage oder erst am Ende der ersten Woche, doch auch später auf und ist bedingt theils durch Aufnahme des specifisch-diphtheritischen Giftes in die Säfte, theils durch Resorption septischer Stoffe, welche in den

sich zersetzenden grauschwarzen, fötiden Pseudomembranen oder in den nekrotischen Schleimhautstellen enthalten sind. Nach A. Fränkel werden die nekrotischen Zerstörungen durch das Eindringen des Streptococcus in die Spaltöffnungen der Mandeln, aus denen beständig Leukocyten auswandern, hervorgerufen; gelangen sie von da aus in das Blut, dann entsteht Allgemeininfection. Die Infection kann sowohl von der Nase, dem Rachen, Kehlkopfe, Trachea und Bronchien als auch von der Haut oder den Genitalien ausgehen.

Sie äussert sich zunächst nicht selten durch eine Steigerung oder ein Wiederaufflackern des Fiebers, das jedoch nur ausnahmsweise, wie bei den anderen Formen der Sepsis, in Schüttelfrösten auftritt und meist den intermittirenden Charakter trägt. In seltenen Fällen kann nach Henoch bei ausgesprochener Sepsis das Fieber völlig fehlen. Die früher aufgeregten und widerspenstigen Kinder werden ruhiger und gleichgiltiger, die Haut wird blass, fahl oder mit Ecchymosen, Urticaria oder Purpuraflecken bedeckt, die Augen hohl und matt, die Klagen über Schling- und sonstige Beschwerden verstummen, die früher so schwierige Untersuchung des Rachens wird widerstandslos gestattet; der Appetit bleibt zuweilen auffallenderweise normal, wird aber in der Regel geringer, um schliesslich ganz zu verschwinden. Das anfangs freie Sensorium wird allmälig benommen, es tritt Somnolenz ein, die manchmal durch Blutungen aus dem Munde, dem Rachen oder der Nase, oder durch Erbrechen und Diarrhoen unterbrochen wird. Der Tod erfolgt entweder unter schweren Gehirnsymptomen oder durch Herzlähmung oder durch Lungenödem, Infarcte mit oder ohne Icterus, unter stetigem Nachlass des äusserst frequenten kleinen Pulses und Ausbruch von Schweiss. Die Schleimhaut der ergriffenen Theile ist mit Ecchymosen besetzt, im Uebrigen aber wenig verändert, an einzelnen Stellen des Epithels beraubt, leicht blutend oder mit oberflächlichen oder tief in das Gewebe eindringenden Substanzverlusten versehen. Hatte sich bislang die Lymphadenitis in bescheidenen Grenzen gehalten, so schwellen jetzt die Halslymphdrüsen, die Submaxillaris, Sublingualis, zu unförmigen grossen, die Bewegungen des Kopfes und des Halses sowie das Oeffnen des Mundes in hohem Grade behindernden schmerzhaften Tumoren an, die nicht selten zu Infiltration des Halszellgewebes führen.

Anders gestaltet sich der Befund, wenn die croupöse Form erst in die gangränöse übergeht und auf diese Weise zur septischen wird. Wenn auch die Gefahr der Gangränescens bei sehr diffuser Exsudation und Infiltration des Parenchyms eine grössere ist als bei localisirter, so gibt es doch vielfache Ausnahmen; auch der Zeitpunkt, in welchem die Gangrän auftritt, ist sehr verschieden; in der Regel besteht die Diphtherie schon mehrere Tage oder 1 bis 2 Wochen, in selteneren Fällen tritt die Gangrän schon sehr frühzeitig auf; so sah Verf. einmal am zweiten Tage bei einem 12jährigen Knaben mit zerstreuten Pseudomembranen auf den Tonsillen den ganzen weichen Gaumen gangränös werden; gerade in solchen Fällen tritt die Verquickung der Nekrose mit der Entzündung besonders deutlich hervor.

Der Eintritt der Gangrän kündigt sich vorerst durch objective Erscheinungen an; die bisher mässig geschwellten und mit Pseudomembranen überzogenen Mandeln vergrössern sich in excessivster Weise, schliessen den Isthmus ab und klemmen die ödematöse oder gleichfalls exsudatbedeckte Uvula zwischen sich ein. Befällt die Gangrän den weichen Gaumen, dann entsteht an irgend einer Stelle ein blauschwarzer, livider, sich deutlich von der Umgebung abgrenzender Fleck, über welchen sich die Schleimhaut in Form einer mit trübem, missfärbigem Inhalt gefüllte Blase emporwölbt. Bald verfärbt sich auch die Umgebung der Blase, nach deren Entleerung die ergriffene Partie sich in eine grauschwarze, von Blutextravasaten durchsetzte, weiche, pulpaartige Masse umwandelt, welche spontan oder bei Berührung blutet. Erliegt der Kranke, wie dies zuweilen vorkommt, der Krankheit jetzt noch nicht, dann entstehen durch Abstossung der mortificirten Massen tiefe Substanzverluste und Perforationen; in äusserst seltenen Fällen stösst sich durch demarkirende Eiterung das Brandige ab und der Kranke kommt mit mehr oder weniger hochgradiger Zerstörung davon. Nach Eintritt des Brandes wird der Fötor aus dem Munde unerträglich, die Salivation äusserst profus und jauchig, das Allgemeinbefinden nimmt den bereits geschilderten adynamischen Charakter an. Die Gangrän schreitet auf die Nase weiter, deren Ausfluss blutig-jauchig wird und die Haut excoriirt; auf der Haut, namentlich an Stellen, wo der Kranke aufliegt, entstehen Blutextravasate und Petechien, die Blutungen aus Rachen und Nase wiederholen sich und die Patienten gehen meist im Verlaufe von 3 bis 8 Tagen, zuweilen an gleichzeitigen Metastasen in Lunge und Milz zu Grunde.

Wenn auch in manchen Punkten verschieden, so ist der Verlauf der primär septischen Diphtherie doch ein sehr ähnlicher.

Warum in manchen Epidemien diese Form besonders häufig, in manchen gar nicht beobachtet wird, wissen wir nicht. Die Krankheit beginnt unter heftigem Fieber und Erbrechen, das sich mehrmals wiederholt und mit Uebelkeit verbunden ist. Die Temperatur erreicht 40·0, selbst 41·5, der Puls ist sehr frequent und von Anfang an klein und leicht unterdrückbar, die Respiration beschleunigt; das Allgemeinbefinden liegt von der ersten Stunde an schwer darnieder, die Patienten sind ruhig, apathisch, somnolent. Schmerzen beim Schlucken werden wenig geklagt.

Die objective Untersuchung ergibt livide blaugraue Verfärbung und Ecchymosirung der ergriffenen Theile, welche mit fibrinösen, schmierigen, übelaussehenden Exsudaten von geringerer oder grösserer Ausdehnung bedeckt sind. Die Schwellung der Lymphdrüsen ist auch bei dieser Form sehr ausgeprägt. Der weitere Verlauf ist derselbe wie bei den bereits geschilderten anderen septischen Formen, nur tritt das letale Ende in der Regel noch früher, meist schon nach 2—3 Tagen ein.

Mit den bisher besprochenen Erscheinungen ist aber das Krankheitsbild der Diphtherie noch nicht erschöpft. Die Diphtherie ist eine

äusserst maligne Erkrankung, welche nicht nur während ihres Verlaufes mannigfache Complicationen setzt, sondern auch viele Wochen nach scheinbar vollkommener Genesung eine Reihe von Nachkrankheiten zur Folge hat.

Eine der häufigsten Complicationen ist die Affection der Nieren.

Dieselbe äussert sich zunächst durch Albuminurie. Der Eiweissgehalt des Harns der ersten Tage ist wohl als Fiebererscheinung aufzufassen und auf Hyperämie der Nieren zurückzuführen; die Anhänger der Pilztheorie lassen denselben durch Einwanderung von Mikrokokken resp. durch eine von ihnen erzeugte parenchymatöse Entzündung entstehen; die Albuminurie tritt um so sicherer und um so frühzeitiger auf, je intensiver die Exsudation ist; in septischen Fällen fehlt sie niemals, so dass Unruh behauptet, die Albuminurie sei das erste und einzige absolut sichere Kennzeichen der stattgehabten Allgemeininfection, welche sich ausschliessen lasse, wenn Albuminurie fehle. Doch können ganz leichte und sehr schwere croupöse Formen mit Albuminurie verlaufen, ohne dass es zu Allgemeininfection kommt. Die Eiweissmenge ist sehr verschieden und schwankt mit den localen und allgemeinen Erscheinungen.

Die schweren Formen der Albuminurie sind, wie jetzt allgemein angenommen wird, durch parenchymatöse Nephritis, Schwellung und fettige Degeneration der Nierenepithelien bedingt; auch Fischl fand durchwegs parenchymatöse und interstitielle Nephritis, aber keine Mikrokokken. Die Harnsecretion ist vermindert, selbst vollständig sistirt, die Eiweissmenge ist sehr beträchtlich, der Harn enthält Blutkörperchen, fettig degenerirte Nierenepithelien und die verschiedenen Formen von Cylindern.

Wenn von manchen Autoren der Nierenerkrankung eine ziemlich untergeordnete Bedeutung zugewiesen wird, so muss Verf. umsomehr zur Vorsicht mahnen, als derselbe wiederholt die Kranken an Urämie zu Grunde gehen sah. Der Verlauf war stets der gleiche. Nachdem sich mehrere Tage nach Beginn der diphtheritischen Exsudation Albuminurie eingestellt hatte, verminderte sich die Harnmenge stetig, während der Eiweissgehalt progressiv zunahm; das erste Symptom der Urämie war stets Uebelkeit und Erbrechen, sowie vollständige Appetitlosigkeit; der Puls war theils hart und gespannt, theils weich, klein und frequent, dann stellte sich unter wiederholtem Erbrechen Somnolenz und Sopor, in einem Falle Eclampsie ein; der Tod erfolgte unter Abnahme der Herzkraft bei völliger Bewusstlosigkeit: die Thatsache, dass es im Verlaufe der Diphtherienephritis sehr sehr zu Oedem oder Hydrops kommt, kann Verf. bestätigen.

Sehr häufig sind Complicationen von Seite des Herzens.

Sowohl während des Verlaufes als auch in der Reconvalescenz können die Kranken plötzlich oder nach einigen Stunden unter den Erscheinungen der acuten Herzparalyse zu Grunde gehen. Zuweilen gehen dieser Katastrophe keine oder keine auffallenden Erscheinungen sowie beschleunigter Puls voraus. In anderen Fällen jedoch klagen

die Kranken über Herzklopfen, Athemnoth, Beengung, äusserste Prostration der Kräfte, sie werden blass, cyanotisch, kühl, der Puls äusserst frequent, kaum zählbar, das Sensorium benommen. In den weniger rapid verlaufenden Fällen stellen sich die Symptome der Herzparalyse allmälig ein und führen erst nach einigen Tagen zum letalen Ende. Man erklärt diese plötzlichen Todesfälle theils aus der Verfettung des Herzmuskels oder Thrombose der Ventrikel, theils aus einer Lähmung des Vagus und der Herzganglien oder aus Blutungen in die lebenswichtigen Centren der Medulla oblongata.

Weit häufiger als die acuten Herzaffectionen sind die chronischen. Nach Leyden beginnt die Myocarditis selten vor Ablauf der ersten, öfters erst nach 4—6 Wochen gleichzeitig mit anderen Lähmungserscheinungen und äussert sich durch Kleiner- und Frequenterwerden des Pulses, der die Zahl von 120—180 Schlägen in der Minute erreicht oder intermittirt, welche Erscheinungen namentlich bei Körperbewegung deutlicher hervortreten. Der Herzstoss ist schwächer, mit der Zeit stellen sich Verbreiterung der Herzdämpfung nach rechts, Unreinheit der Töne und blasende Geräusche ein Subjective Beschwerden fehlen oder sind gering, stets ist grosse Muskelschwäche, Apathie und Abneigung gegen körperliche Anstrengungen, nach Unruh zuweilen Albuminurie vorhanden. Die Affection kann nach mehrwöchentlichem, selbst mehrmonatlichem Bestande heilen oder durch Oedem und Hydrops allmälig oder durch Herzparalyse plötzlich letal enden. Nach des Verf. Ansicht liegen vielen Fällen von angeblicher Myocarditis nicht Degeneration des Herzmuskels, sondern paretische Zustände der Herznerven, speciell Neuritis des Herzvagus zu Grunde.

Unter den Complicationen von Seite der Respirationsorgane ist Pneumonie relativ die häufigste. Man sieht dieselbe hauptsächlich bei Larynx- und Trachealdiphtherie sowie einige Tage nach der Tracheotomie in Folge der Aspiration von Blut oder Membranen, oder erst nach Wochen in Folge von Fehlschlucken resp. mangelhaftem Verschluss des Kehlkopfes. In der Regel ist sie lobulär, einseitig oder doppelseitig und hat meist in den untersten Partien ihren Sitz. Mehrmals sah Verf. letale Fremdkörperpneumonie in Folge von doppelseitiger Recurrenslähmung und Kehlkopfanästhesie. Bei sehr langer Dauer des stenotischen Stadiums kommt es zu Emphysem der oberen, Hypostase der unteren Lungenabschnitte oder zu putrider Bronchitis oder circumscripter Gangrän.

Als häufige Complicationen müssen die Veränderungen der Trachealwunde erwähnt werden.

Am häufigsten ist Diphtherie der Wundränder, die nicht selten gangränös zerfallen und zu grossen Substanzverlusten und Trachealfisteln Anlass geben. Auch kann durch unpassende Canülen oberflächliche Verschorfung und Decubitus des Wundcanals sowie der tieferen Theile der Trachea entstehen. Phlegmonöse und erysipelatöse Entzündung der Wundränder sowie ihrer näheren und entfernteren Umgebung, Blutungen aus Decubitusgeschwüren der vorderen

oder hinteren Trachealwand gehören gleichfalls zu den ungünstigen Complicationen.

Als locale Nachkrankheiten müssen Stenosen des Kehlkopfes und der Trachea sowie Heiserkeit und Aphonie erwähnt werden. Die ersteren sind in der Regel durch Granulationen oberhalb oder unterhalb der Trachealwunde oder durch Narbenretraction geheilter Ulcerationen oder durch membranöse Verwachsungen und chronische Verdickung und Infiltration der Stimmbänder bedingt; auch Lähmung der Glottiserweiterer wurde beobachtet. Die Veränderungen der Stimme beruhen theils auf Entzündungsvorgängen, so namentlich auf Chorditis vocalis, oder auf Substanzverlusten, oder auf Lähmung der Muskeln oder Nerven des Kehlkopfes.

Zu den häufigsten Nachkrankheiten gehören ohne Zweifel die Lähmungen.

Im Allgemeinen kann es als Regel gelten, dass, je schwerer der Fall, um so wahrscheinlicher dieselben auftreten werden; doch gibt es zahlreiche Ausnahmen und können selbst ganz leichte Fälle dieselben nach sich ziehen. Die diphtheritischen Lähmungen treten selten vor der zweiten, häufiger erst in der dritten, vierten, ja selbst sechsten Woche auf. Während man früher über ihre Ursache und ihr Wesen getheilter Ansicht war, weiss man jetzt durch zahlreiche anatomische Untersuchungen, dass die diphtheritische Lähmung als infectiöse Polyneuritis aufgefasst werden muss, deren Ausgangspunkt der diphtheritische Process im Rachen ist. Von diesen werden, wie namentlich v. Ziemssen betont, zunächst die Endausbreitungen des N. glossopharyngeus und Laryngeus superior und inferior betroffen; von diesen letzteren Nerven aus schreitet dann die Infection auf den Stamm des Vagus, um theils centrifugal auf die Herzfasern des Vagus, theils centripetal auf Gehirn und Rückenmark sich auszubreiten.

Ziemlich häufig sind Störungen des Sehvermögens durch Lähmung des Accommodationsmuskels. Sie äussert sich durch das Unvermögen, kleine Gegenstände in der Nähe deutlich zu sehen: sie erscheinen trübe und verschwommen. Lesen ist unmöglich, auch ermüden die Augen schnell; die Pupille ist in der Rsgel weit. Ergreift die Lähmung die Augenmuskeln, dann tritt Strabismus und Doppeltsehen auf.

Unstreitig am häufigsten ist die Lähmung der Muskeln des weichen Gaumens und des Schlundes. Die Symptome derselben sind in dem Capitel „Nervenkrankheiten“ nachzusehen. In schweren Fällen kommt es zu Lähmung der Gesichtsmuskeln und der Zunge.

Theils in Verbindung mit den Muskeln des Rachens, theils mit jener der Extremitäten werden die Nerven und Muskeln des Kehlkopfes gelähmt.

Die Lähmung des sensiblen Nerv. laryng. sup. ist bald einseitig, bald doppelseitig. Sie gehört, namentlich in Combination mit motorischer Lähmung, insoferne zu den gefährlicheren, als die damit Behafteten ziemlich oft an Fremdkörperpneumonie zu Grunde gehen;

objectiv äussert sich dieselbe durch Aufhebung der directen und Reflexerregbarkeit. Die motorische Kehlkopflähmung ist gleichfalls ein- oder doppelseitig; sie betrifft einzelne Muskeln und ganze Muskelgruppen, sehr oft sämmtliche vom N. recurrens versorgten Muskeln; in letzterem Falle liegt die Gefahr einer Fremdkörperpneumonie sehr nahe.

Auch die Extremitätenmuskeln werden nicht selten paralytisch. Die beginnende Lähmung derselben kündigt sich durch perverse Sensationen in den Fingerspitzen und Zehen, Pelzigsein, Ameisenlaufen, Kribbeln, sowie durch ziehende Schmerzen an. Allmälig tritt Schwäche und mangelhafte Bewegung, unsicherer, taumelnder Gang (Ataxie), zuletzt völlige Lähmung ein.

Werden auch die Muskeln des Halses, Nackens und Stammes ergriffen, dann liegen die Kranken unbehilflich im Bette, müssen gehoben und gefüttert werden; der Kopf kann nicht gerade gehalten werden, er fällt nach vorne oder hinten. Bei Lähmung der Rumpfmuskeln ist das Aufsetzen im Bette unmöglich. Zuweilen schreitet die Lähmung auch auf die Respirationsmuskeln fort, das Athmen wird oberflächlich, es tritt Dyspnoe ein und die Kranken gehen asphyktisch zu Grunde, nachdem auch noch zuweilen die Muskeln der Blase und des Darmes gelähmt worden waren.

Zu den theilweise selteneren Complicationen und Nachkrankheiten, welche der Vollständigkeit wegen hier Erwähnung finden mögen, gehören: Anämie, Neuralgien, Empfindlichkeit gegen lautes Sprechen, gegen Kälte und Wärme, Otorrhoe und Gehörstörungen, Angina pectoris, Chorea, Krämpfe der Extremitäten, Singultus, Lähmung des Oesophagus, Niese- und Gähnkrämpfe, psychische Störungen, allgemeine Paralyse, Idiotie, Exaltation sowie Nachtwandeln (Seitz). Auch acuter Gelenksrheumatismus, Bronchoblennorrhoe, gestörte Assimilation, diphtheritische Verschorfung der Magenschleimhaut, letztere von Seitz und Wertheimber, wurden beobachtet.

Die Diagnose der Diphtherie kann in den einigermassen entwickelten Fällen keinen Schwierigkeiten unterliegen. Dass namentlich bei Kindern im Beginne Verwechslungen mit anderen Affectionen möglich sind, ist richtig. Am häufigsten findet eine solche mit Lacunärangina statt, deren Differentialdiagnose bereits früher besprochen wurde. Am schwierigsten sind jene Fälle, bei denen die Diphtherie lacunär beginnt, einige Tage so bleibt und erst dann zu confluirender Membranbildung führt. In solchen Fällen kann nur die bacteriologische Untersuchung entscheiden, ob es sich um echte oder um Pseudodiphtherie handelt. Wenn es auch unrichtig ist, dass, wie Jacobi sagt, viele, vielleicht die meisten lacunären oder folliculären Anginen der Erwachsenen nichts sind als Diphtherie, so ist doch nicht zu leugnen, dass in der That manche scheinbare Lacunärangina eine lacunäre Diphtherie ist und dieselbe Infectionsfähigkeit besitzt, wie die ausgebildeten Formen. Weniger leicht, aber doch möglich, ist eine Verwechslung mit Pharyngomykosis benigna oder Herpes sowie mit künstlich erzeugten Aetzschorfen. Der Anfänger möge es sich zum

Principe machen, bei jedem Kinde, das unbestimmte Krankheitssymptome, Fieber, schnellen Puls etc. zeigt, genau den Rachen zu untersuchen und in verdächtigen oder zweifelhaften Fällen die Isolirung des Erkrankten anzuordnen.

Die Prognose der Diphtherie ist stets eine dubiöse; mag die Affection noch so harmlos beginnen, niemals lasse man sich zu einer günstigen Voraussage verleiten, denn zu oft folgt die Enttäuschung auf dem Fusse nach. Keine Krankheit ist in Bezug auf den weiteren Verlauf und unvorhergesehene Zwischenfälle und Complicationen so unberechenbar wie die Diphtherie; eine besonders schlechte Prognose geben die Mischinfectionen.

Relativ günstig ist die Prognose bei localisirtem Auftreten auf einer oder beiden Mandeln, am Velum oder Zäpfchen; die Erkrankung der Hinterwand trübt schon die Prognose wegen der Gefahr der Infection der Nase und des Kehlkopfes. Ein günstiger Ausgang darf auch erwartet werden bei gutem Kräftezustand und bei genügender Ernährung; von grösster Wichtigkeit ist das Alter der Erkrankten; Erwachsene, junge Leute und ältere Kinder bis herab zu 6 Jahren geben im Allgemeinen eine bessere Prognose; Kinder unter 6 Jahren geben eine mittlere, solche unter 3 Jahren eine sehr schlechte Prognose. Dass nur schlecht genährte, dyskrasische, scrophulöse oder tuberculöse Kinder der Diphtherie zum Opfer fallen, ist eine arge Täuschung; sicher ist, dass die Prognose grossentheils auch von dem Charakter der Epidemie abhängt. Diphtherie der Nase kann nicht als eine unbedingt lebensgefährliche Complication gelten; dagegen gehört die Diphtherie des Kehlkopfes, der Trachea und Bronchien zu den gefährlichsten aller Complicationen. Bei den septischen Formen ist die Prognose fast absolut infaust, namentlich bei der septisch-gangränösen Diphtherie, die nur ganz ausnahmsweise in Genesung endet. Einen ungünstigen Ausgang lassen ferner alle jene Fälle erwarten, bei denen die Herzthätigkeit schon anfangs in namhafter Weise alterirt ist oder bei denen die Aufnahme der Nahrung verweigert wird. Sehr trübe wird auch die Prognose bei schwerer Nephritis sowie bei Pneumonie; unter den Nachkrankheiten gelten die Lähmungen mit Recht im Allgemeinen für günstig, wenn auch durch Kehlkopflähmung sowie durch Weiterschreiten der Paralyse auf die Respirationsmuskeln zuweilen der Tod herbeigeführt wird.

Die Mortalität ist bei Kindern unter einem Jahre am grössten und beträgt nach Monti und Herz circa 80%, bei Kindern von 1—3 Jahren 45%, von 3—5 Jahren 40%, von 5—10 Jahren 17%; vom 10. Jahre nimmt die Mortalität allmälig ab und ist jenseits der Zwanziger nur noch eine geringe (5—10%).

Mit diesen statistisch begründeten Zahlen und den Veröffentlichungen des Reichsgesundheitsamtes stehen freilich die von den allerorten sich wichtigmachenden Diphtheriespecialisten angegebenen Todesfälle im grellsten Widerspruche. Verf. kann hier nur die Worte Henoch's citiren, der sagt, er fordere alle jene Herren, welche nur minimale Bruchtheile ihrer Kranken verloren haben, und jene Aerzte,

welche so leichtgläubig derartigen Angaben Vertrauen schenken, auf, zunächst einmal in die Klinik zu gehen und dort zu lernen, was man eigentlich unter Diphtherie zu verstehen hat.

Die Therapie der Diphtherie ist nicht zum geringsten Theil eine prophylaktische, insoferne als sie bestrebt sein muss, die Verbreitung der Krankheit zu verhindern. Das einzige und beste Schutzmittel ist die Isolirung der Kranken von den Gesunden. Wenn auch zugegeben werden muss, dass dieselbe sehr oft illusorisch ist, da bereits die übrigen Kinder inficirt sein können, ehe dieselbe angeordnet wird, so sollen doch die gesunden Kinder das inficirte Haus sofort verlassen, jeden Verkehr mit demselben und den dort befindlichen Personen vermeiden und dann erst zurückkehren, wenn die inficirte Wohnung genügend desinficirt ist. Die Isolirung hat nach Löffler so lange zu dauern, bis in den Excreten der Kranken und Reconvalescenten keine Diphtheriebacillen mehr sich vorfinden, mindestens aber 4 Wochen. Alle Gegenstände, welche mit den Excreten Diphtheriekranker in Berührung gekommen sein können, wie Wäsche, Bettzeug, Trink- und Essgeräthe, Kleider, sind durch Kochen in Wasser zu behandeln oder mit Wasserdämpfen von 100° Celsius zu desinficiren; ebenso sind die Zimmer sorgfältig zu desinficiren, die Fussböden wiederholt mit warmer Sublimatlösung 1 : 1000 zu waschen, die Wände und Möbel mit Brod abzureiben. Der Milchhandel ist sorgfältig zu controliren, die Mund-, Rachen- und Nasenhöhle durch aromatische Wässer oder Sublimat 1 : 15000 fleissig zu reinigen.

Um die epidemische Ausbreitung unter den Kindern zu verhüten, schlug man auch sanitätspolizeiliche Massregeln vor, so z. B. die Anzeigepflicht der Aerzte oder Angehörigen, ebenso das Fernhalten der gesunden Kinder aus einer bereits inficirten Familie vom Schulbesuche, Isolirung der Kranken in eigenen Spitälern und Pflegeanstalten. Dass durch die die Schule besuchenden gesunden Kinder einer inficirten Familie, sowie durch Aerzte, Wartepersonale etc., das diphtheritische Gift verschleppt werden kann, ist unzweifelhaft; gegen die namentlich von Henoch empfohlene Ausschliessung der Gesunden vom Schulbesuche sprachen bisher ausser socialen hauptsächlich pädagogische Gründe, zumal in grossen Städten die Schulen das ganze Jahr hindurch geschlossen werden müssen.

Die prophylaktische Injection des Behring'schen Heilserum hat bis jetzt noch keine unanfechtbaren Resultate aufzuweisen, auch scheint seine Schutzkraft nur eine sehr kurze, bis zu 10 Tagen dauernde zu sein.

Ist die Krankheit einmal ausgebrochen, dann ist auf ausgiebige Ventilation des Krankenzimmers auch bei Nacht Rücksicht zu nehmen. Es empfiehlt sich daher, wenn irgendwie möglich, das grösste und geräumigste Zimmer zum Krankenzimmer zu wählen, oder noch besser zwei nebeneinander befindliche Räume abwechselnd, das eine bei Tag, das andere bei Nacht, zu benützen; die Temperatur derselben soll 14° R. nicht übersteigen.

Ein überaus wichtiger Punkt ist die Ernährung sowohl in qualitativer als quantitativer Hinsicht. Wenn es auch richtig ist, dass wegen mangelnden Appetits und Schlingbeschwerden die Nahrungsaufnahme eine geringe ist, so soll doch das Wenige, was genommen wird, nahrhaft und zweckentsprechend sein. Besondere Schwierigkeiten bereiten die Kinder; da es bei diesen ohne Zwang überhaupt nicht geht, so ist die Nachgiebigkeit der Eltern gerade hier an unrichtiger Stelle. Natürlich darf die Nahrung anfangs nur flüssig sein und aus Milch, kräftigen Suppen, Bouillon mit Ei, Fluid meat, oder Leube's Fleischsolution, Thee, Kaffee mit etwas Weissbrod, Kinderzwieback, Biscuits bestehen.

Alcoholica und andere Reizmittel erst bei Herzschwäche anzuwenden, ist sicher unrichtig; ein vorsichtiger Arzt wird bei Zeiten so viel als möglich dafür sorgen, dass dieselbe überhaupt nicht eintrete. Man gestatte deshalb von Anfang an kleine Quantitäten Wein mit Wasser, Milch mit Cognac (sogenannten Milchpunsch), Weinsuppen, eventuell Bier; bei der septischen Form oder bei drohendem Collaps gehe man zu den kräftigeren Weinen: Marsala, Sherry, Portwein, Champagner, Stokes'scher Mixtur über; in der poliklinischen Praxis empfiehlt sich verdünnter und mit Zucker versetzter Rum oder Cognac. Nach Abstossung der Membranen und Rückgang der entzündlichen Erscheinungen kann festere Nahrung, weiche Eier, weiches Fleisch, Hachée, Geflügel und Wildpret gestattet werden.

Die eigentliche Behandlung muss eine allgemeine und locale sein. Zweck der ersteren ist, die Wirkung der bereits in den Körper eingedrungenen Bacteriengifte unschädlich zu machen oder wenigstens abzuschwächen und die Weiterausbreitung des diphtheritischen Processes zu verhindern. Durch die locale Behandlung sollen die bereits gesetzten Membranen rascher zur Abstossung gebracht, ihrer Zersetzung vorgebeugt und das Wachsthum und die Weiterverschleppung der in denselben angesiedelten Mikroorganismen verhütet werden.

Unter den allgemeinen Heilmitteln nimmt das Behring'sche Heilserum unstreitig die erste Stelle ein. Dasselbe kommt in drei verschiedenen Concentrationen zur Anwendung, je nach der Zahl von Antitoxineinheiten, welche in je 10·0 der Flüssigkeit enthalten sind. Die Wahl der Concentration und der Dosis (im Anfang gewöhnlich 500 Antitoxineinheiten) hängt von dem Einzelfalle ab, ebenso die Wiederholung der Injection, welche stets mit einer aseptischen Spritze zu machen ist, und zwar am besten an der vorderen Brustwand oder an der Innenfläche der Oberschenkel. Dass ausser leichten urticariaartigen Exanthemen an der Injectionsstelle das Serum keine schädlichen Nebenwirkungen hat, wurde bisher sicher constatirt. Wenn die Serumtherapie sobald als möglich in den ersten drei Tagen eingeleitet wird, so kann, wie Escherich nachwies, in reinen, uncomplicirten Fällen die Sterblichkeit bis auf Null herabgedrückt werden; auch bei den sogenannten Mischformen sieht man noch gute Erfolge, während die septischen Formen unbeeinflusst bleiben. Die nächste Wirkung der Serumtherapie ist, dass das Blut antitoxische Eigenschaften aufweist.

und dass der diphtherische Process in seiner Weiterverbreitung gehemmt und zum Schwinden gebracht wird. Man sieht dies am deutlichsten an den Membranen, deren Ausbreitung aufhört und deren Abstossung beschleunigt wird. Weniger in die Augen fallend ist die Wirkung auf die toxischen Erscheinungen. Durch die Injection kann zwar eine vollständige Entgiftung des Organismus herbeigeführt werden, allein die schon gesetzten Schädigungen des Nervensystems können nicht mehr rückgängig gemacht werden; man sieht deshalb postdiphtheritische Lähmungen zwar vielleicht weniger schwer und dann verzögert sich einstellen, aber nicht minder häufig wie früher (Escherich). Dagegen hat man wiederholt schwere Kehlkopfstenosen nach Injection des Serum verschwinden gesehen.

Die locale Behandlung, welche durch die allgemeine nicht überflüssig geworden ist, besteht in Gurgelungen oder Inhalationen desinficirender Stoffe (4% Borsäure, 4—5% Lysol, Creolin, 2 bis 5% Carbolsäure), welche auch während der Nacht zur Anwendung kommen müssen. Von Escherich und Ganghofner, Löffler und Strübing wird das Auftragen stark desinficirender Flüssigkeiten mit dem Pinsel oder dem Wattebausch oder mit dem Schwämmchen als das sicherste Verfahren zur Vernichtung der in den Membranen enthaltenen Giftstoffe empfohlen. Escherich hat daher auch die mechanische Entfernung der Membranen im Auge, was von anderen Autoren strengstens verpönt wird. Ganghofner empfiehlt mit Rehm die Einpinselung von verdünntem Liq. ferri sesquichl. 1:1—1:3, Escherich von Sublimat 1:1000; Löffler-Strübing von Acid. carbol. 3·0, Ol. terebinth. rectif. 40·0, Alcoh. absol. 60·0 oder auch von Menthol 10·0, Toluol 36·0, Alcoh. absol. 60·0, Liq. ferri sesquichl. 4·0; statt des letzteren kann auch Creolin oder Cresol 2—3·0 verwendet werden.

Die chemische Lösung der Membranen mittelst Einpinselungen von Papayotin, Pepsin, Kalkwasser etc. ist jetzt immer mehr in den Hintergrund getreten. Dagegen wird von Manchen die Insufflation pulverförmiger Substanzen vorgezogen.

Man benützt dazu die reine pulverisirte Borsäure, das Jodoform rein oder mit Borsäure, das Jodol, Tannin, Alaun, Flor. sulfuris, Resorcin, Kali chloricum, Natr. benzoic., pulverisirten Zucker und das Calomel, letzteres, nachdem der Rachen mit 5—10% Kochsalzlösung gereinigt wurde.

Auch bei Diphtherie der Nase ist die sorgfältigste Reinigung die Hauptsache. Sie geschieht entweder durch Eingiessen mit dem Löffel, dem sogenannten Nasenbad, oder mittelst eigens construirter Spritzen oder, wie bei Kindern, mit einem Gummiballon, dessen wohl abgerundete Spitze aus Bein oder gleichfalls aus Gummi besteht. Der Arzt muss stets das Pflegepersonal in dem Gebrauche der Nasenspritze unterrichten. Die Injectionsflüssigkeit muss lauwarm sein und bei völliger Verstopfung der Nase unter starkem Drucke ein- bis dreistündlich eingetrieben werden. Besonders geeignet erscheinen Kalk-

wasser mit Carbolsäure oder Spiritus vini, 4% Borsäure, 2—3% Kali chloricum, Milchsäure, Natr. carb., bei fötidem Ausfluss $^1/_{10}$% Kali hypermang. Lösung, Creolin, Sublimat. Bei Blutungen verdienen Injectionen mit Tannocarbollösung, Alaun oder Liq. ferri sesquichl. den Vorzug. Nach der Reinigung wird Borsäurepulver, Jodoform, Jodol mit Magnes. carbon. āā insufflirt. Zum Schutze der umliegenden Haut gegen die excoriirende Wirkung des Secretes empfiehlt sich Bestreichung mit Borvaselin.

Die Behandlung der Larynxdiphtherie mit Eis hat sich nicht bewährt. Auch von den früher vielfach empfohlenen forcirten Einreibungen mit Ung. ciner. ist nichts zu erwarten. Wenn auch der Nutzen der warmen erregenden Halsumschläge sowie der Inhalationen heisser medicamentöser Dämpfe in der Regel kein auffallender ist, so ist doch von denselben Gebrauch zu machen. Die bei Larynxcroup sehr beliebten Brechmittel sind bei Diphtherie nicht nur völlig nutzlos, sondern sogar schädlich, dagegen verdient das Apomorphin als Exspectorans Beachtung.

Nimmt die Athemnoth zu, so ist, falls auf eine erneute Injection von Heilserum keine Erleichterung erfolgt, die mechanische Entfernung der Membranen angezeigt. Bei älteren Kindern und Erwachsenen kann man versuchen, unter Leitung des Kehlkopfspiegels mittelst eines Pinsels oder eines an einem Neusilberdraht befestigsten trockenen oder mit Kalkwasser, Carbolsäure, Papayotin oder Pepsin imprägnirten Schwämmchens unter rotirenden Bewegungen die den Larynx und die Trachea auskleidenden Membranen mechanisch zu entfernen. Dass diese Versuche nicht ganz aussichtslos sind, hat Verf. einige Male erfahren; es gelang demselben so unter Anderem auch einmal, einen förmlichen Ausguss des Kehlkopfes und der Trachea zu entfernen und so die Tracheotomie zu vermeiden. Sind auch diese Proceduren erfolglos, so bleiben als letzte Mittel nur noch die Intubation oder Tracheotomie übrig. Sie sind dann indicirt, wenn continuirliche Dyspnoe mit inspiratorischem Herabsteigen des Kehlkopfes, sowie Einziehungen am Thorax und Zwerchfell auftreten. Nach der Zusammenstellung von Ranke sind die Resultate der Intubation jetzt nahezu gleich gut, wie jene der Tracheotomie. Was letztere anlangt, so sei hier erwähnt, dass, wenn die Erfolge der Operation auch nicht so glänzende sind wie beim genuinen Larynxcroup, doch in manchen Epidemien ein Drittel, selbst die Hälfte der Operirten gerettet wird, und dass es Pflicht jedes gewissenhaften Arztes ist, die Angehörigen auf diese beiden einzigen Rettungsmittel aufmerksam zu machen und dieselben in Anwendung zu bringen. Wegen der verschiedenen Wechselfälle eignet sich die Intubation mehr für die Anstaltsbehandlung, während die Tracheotomie überall ausgeführt werden kann. Nutzlos und zu unterlassen ist die Tracheotomie bei Diphtherie der Trachea und Bronchien; das Fehlen des inspiratorischen Herabtretens des Kehlkopfes trotz Dyspnoe und Cyanose, die Abschwächung oder das Fehlen des Athmungsgeräusches sprechen für das Vorhandensein dieser trostlosen Combination.

Die Nachbehandlung der Tracheotomirten ist fast ebenso wichtig, wie die Operation selbst. Dass die Schnittwunde mit Carbol- oder Jodoformgaze oder Borlint bedeckt und streng antiseptisch behandelt werden muss, ist natürlich; die Zimmerluft werde durch Aufstellen von offenen Wassergefässen beständig feucht erhalten, auch müssen stündlich Inhalationen mit 1% Natr. bicarb. und Carbolsäurelösung durch die Canüle gemacht und die letztere fleissig von den antrocknenden Secreten und Pseudomembranen gereinigt werden; die Entfernung der Canüle hat sobald als möglich zu geschehen.

Antifebrilia sind nach Ganghofner zu unterlassen, ebenso energische Bäder oder Abkühlungen. Dagegen empfiehlt sich bei Herzschwäche Ol. camphor. subcutan, bei Collaps ein warmes Bad von 27—30° R. oder eine Einpackung mit warmen Tüchern. In verzweifelten Fällen kann man nach Erb den galvanischen Strom anwenden, und zwar soll die eine grosse Elektrode auf die Herzgegend, die andere auf die Brustwirbelsäule aufgesetzt werden.

Drohende Urämie behandle man je nach der Beschaffenheit des Pulses mit Digitalis oder Reizmitteln; die Nephritis erfordert Anregung der Diurese und Diaphorese, das Trinken alkalischer Wässer sowie lauwarme Bäder, Milchdiät. Pneumonische Infiltrate oder Bronchitiden erfordern Expectorantia und warme Brustumschläge, Diarrhoen Opium. Bei zurückbleibender Herzschwäche und Myocarditis ist jede Körperbewegung strengstens zu verbieten und Bettruhe, ferner wie bei Anämie Eisen, Alcoholica, nahrhafte Kost und Landaufenthalt zu verordnen.

Gegen Diphtherie der Trachea und der Bronchien ist in der Regel jede Therapie machtlos. Immerhin versuche man in solchen Fällen, wo wegen Larynxdiphtherie tracheotomirt wurde, durch Aspiration der Pseudomembranen mittelst Katheter und Saugspritze, sowie durch Einträufelungen und Inhalationen von Papayotin, Pepsin oder Kalkwasser die Membranen zu lösen und ihre Ausstossung durch Expectorantia (Apomorphin, Infus. Senegae mit Liq. ammon. anis.) sowie durch kalte Uebergiessungen im warmen Bade zu beschleunigen.

Die Affectionen der Sexualorgane sowie der Haut und die Diphtherie der Trachealwände müssen mit den bereits anfangs angegebenen desinficirenden Mitteln oder Jodoformsalbe nach chirurgischen Regeln behandelt werden. Bei Diphtherie des Auges applicire man Eisbeutel und träufle Borlösung mit Atropin ein.

Wenn auch die leichteren Grade von diphtheritischer Lähmung in der Regel von selbst zurückgehen, so erscheint es doch bei den schwereren und gefährlicheren Formen, wie bei der Kehlkopflähmung, Herzvagusparese, Lähmung der Extremitäten, nöthig, durch therapeutische Eingriffe die Heilung zu unterstützen. Das souveräne Mittel ist die Elektricität, sowohl der constante als inducirte Strom. Durch wechselweise endolaryngeale und spinale Faradisation und Galvanisation erzielt man bei Schlundkehlkopflähmungen die schnellsten Erfolge. Selbstverständlich müssen die Kranken mit der Schlundsonde ernährt werden. Für die hartnäckigeren Formen passen die von

Ziemssen empfohlenen subcutanen Strychnininjectionen (0·001 bis 0·002 bei Kindern), bei Erwachsenen bis zu 0·005 pro dosi. Bei Herzschwäche verweise man die Patienten, selbst wenn sie keine subjectiven Beschwerden haben, unerbittlich in's Bett und verbiete ihnen jede Muskelanstrengung, so das Sichaufrichten, Umdrehen etc., da erfahrungsgemäss durch körperliche Anstrengungen sofortiger Tod eintreten kann. Zur Nachcur empfehlen sich namentlich bei Ataxie und Extremitätenlähmung die Thermen von Wildbad, Gastein, Wiesbaden, Baden-Baden, Ragaz, Teplitz; ferner die Moorbäder von Aibling, Franzensbad, zur Winterszeit die Riviera.

Granulome der Trachea müssen entfernt, membranöse Verwachsungen vom Larynx oder der Trachealwunde aus mit Messer oder Galvanokauter getrennt, narbige Stenosen mittelst der Sehrötter'schen Röhren beseitigt, Kehlkopfkatarrhe local behandelt werden.

Die Behandlung der Scharlachdiphtherie ist durch Heubner in neue Bahnen gelenkt worden. Heubner empfiehlt nach dem Vorgange von Taube und Götz methodische Einspritzungen von 3—5% Carbolsäurelösung in das Gewebe der erkrankten Tonsillen und des weichen Gaumens. Zweck dieser Injectionen ist, die Desinfectionsflüssigkeit mit dem Gewebe und dem Lymphstrom derart in Contact zu bringen, dass die pathogenen Mikroorganismen vernichtet oder in ihrer weiteren Entwicklung und Verbreitung gehindert und so die Lymphdrüsen und der Organismus vor Allgemeininfection geschützt werden. Die Nadel der Spritze soll nicht tiefer als $^1/_4$—$^1/_2$ cm eindringen; die Einspritzungen sind mindestens zweimal täglich, in schlimmeren Fällen öfters vorzunehmen und beträgt die Quantität $^1/_2$ Spritze, also bei 3% Lösung pro die 0·03, bei 5% Lösung 0·05. Man kann mit den Injectionen beginnen, wenn die Lymphdrüsen stark geschwellt sind, wenn am 3. bis 5. Tage des Scharlachs das Fieber noch steigt, auch wenn noch keine Schwellung und Exsudatbildung auf den Rachenorganen vorhanden ist. Ferner soll injicirt werden, wenn die Diphtherie die Nase befallen hat; auszusetzen sind die Injectionen erst dann, wenn die Lymphdrüsen abgeschwollen sind und die Temperatur am Morgen zur Norm zurückgekehrt ist. Heubner betont ausdrücklich, dass auch bei dieser Behandlung nicht alle Fälle genesen, namentlich nicht die pestartig verlaufenden Fälle von Scharlachdiphtherie und die gewöhnliche genuine Diphtherie. Andere, wie z. B. O. Vierordt, halten es für einen Nachtheil dieser immerhin belästigenden Methode, dass man schon so frühzeitig mit ihr beginnen muss.

Pharyngitis gangraenosa.

Wie in der Mundhöhle, so kommt auch im Rachen die Gangrän als Modification resp. Ausgang der verschiedenen Formen der Entzündung zur Beobachtung.

Wenn auch der Brand in Folge von Diphtherie der häufigste ist, so tritt er doch auch unabhängig von derselben als primäre Erkrankung auf. Er ist bald circumscript, bald diffus, nicht gar selten befällt er heruntergekommene, schlecht genährte, kachektische Kinder und Erwachsene, oder er gesellt sich zu phlegmonösen Anginen, retropharyngealen Abscessen oder zu den secundären Anginen des Scorbuts, Scharlachs, der Masern, des Typhus und der Variola, oder er entwickelt sich nach Verletzungen und operativen Eingriffen, oder auch nach Blutungen in der Schleimhaut. Pitha beobachtete ein epidemisches Auftreten von Angina nosocomialis phagedaenica bei Hospitalbrand, ebenso Browne. Nach Barthez und Rilliet soll Pharynxgangrän auch in Folge von Keuchhusten und Pharynxtuberculose auftreten können. Semon sah auf den Tonsillen localisirte Gangrän.

Die Krankheit beginnt in primären Fällen mit Vorliebe am weichen Gaumen und den Tonsillen, seltener auf der Hinterwand, unter den Erscheinungen einer katarrhalischen oder phlegmonösen Entzündung mit Fieber und heftigen Localerscheinungen. Nach kürzerer oder längerer Zeit, meist schon nach 2—3 Tagen, treten die ersten Symptome der Nekrose in Form von grauen oder bräunlichen, schwärzlichen Flecken auf, über welchen sich zuweilen die Schleimhaut in Gestalt von Brandblasen emporwölbt. Der Inhalt der letzteren ist anfangs serös, später missfarbig, sanguinolent, jauchig. Gleichzeitig schwellen die Lymphdrüsen an und die Affection verläuft von nun an meist unter dem Bilde der Adynamie. Das bisherige Fieber macht einer normalen, öfters subnormalen Temperatur Platz, der Puls sinkt zuweilen sogar bis auf 15 Schläge in der Minute, die Welle ist klein, die Haut blass, kalt, cyanotisch, mit Schweiss bedeckt. An Stelle der ursprünglichen Flecken und Brandblasen tritt eine schmutzige, zunderartige, leicht blutende, schwarzgraue Masse, nach deren Abstossung übelaussehende Geschwüre und tiefe Substanzverluste und Perforationen, oft völlige Abrasion des Velum zurückbleiben. In Folge der localen Beschwerden, des Appetitmangels, der oft sehr profusen Blutungen oder in Folge von Pyämie gehen die meisten Kranken nach 8 Tagen oder auch schon früher oder erst später zu Grunde. Das Sensorium kann erhalten sein, ist aber öfters getrübt und Coma und Sopor vorhanden, der Geruch aus dem Munde ist äusserst penetrant, die Secretion reichlich, blutig, mit Jauche vermischt: manchmal treten Petechien der Haut und Blutungen innerer Organe auf. Auch Gangrän entfernter Körpertheile, der Lunge, des Kehlkopfes, der Geschlechtsorgane, besonders beim weiblichen Geschlechte, sowie Brand in der Umgebung des Afters wurden beobachtet.

Die Prognose der Rachengangrän, sowohl der primären als secundären, ist eine äusserst infauste, fast stets letale; doch wurden auch Heilungen, so besonders von Musset, Trousseau und Mackenzie, mitgetheilt.

Die Therapie ist zwar ziemlich machtlos, doch darf der Versuch, den Brand zu localisiren und die Local- und Allgemeinerscheinungen zu lindern, nicht unterlassen werden. Die in Betracht kommenden Mittel sind dieselben wie bei Mundgangrän oder Rachendiphtherie.

Syphilis.

Unter den secundären Rachenaffectionen ist keine von grösserer praktischer Bedeutung, wie die Syphilis.

Abgesehen von den selteneren Fällen von Primärinfection durch sexuelle Verirrungen oder den Gebrauch inficirter Gegenstände, erkrankt der Rachen erst dann, wenn das syphilitische Gift in der Lymph- und Blutbahn Aufnahme gefunden hat.

Die erste Aeusserung desselben ist das Erythem, die syphilitische Angina. Meist gleichzeitig mit Roseola der Haut, nicht selten unter Fieber, tritt auf der Schleimhaut des weichen Gaumens, der Tonsillen und der Hinterwand eine fleckige oder verwaschene, gleichmässige mehr oder weniger ausgesprochene Röthung und Schwellung auf, die zuweilen einen acuten, meist aber chronischen Verlauf nimmt und letzteren Falles mit sehr geringen Beschwerden einhergeht. Die Unterscheidungsmerkmale der syphilitischen Angina, als da sein sollen: mehr bläulich-rothe Farbe der Schleimhaut, gleichmässige Röthung und scharfes Begrenztsein auf den weichen Gaumen, sind nicht ganz stichhaltig; eine sichere Diagnose kann nur bei Anwesenheit anderer syphilitischer Erscheinungen gestellt werden. Trübungen des Epithels sind, weil hauptsächlich bei syphilitischen Schleimhautentzündungen vorkommend, immerhin verdächtig, aber nicht beweiskräftig, denn sie werden auch bei einfacher chronischer Entzündung besonders häufig an der Spitze der Uvula beobachtet.

Eine fast täglich vorkommende Erscheinung sind die Schleimhautplaques oder Papeln und die aus ihnen hervorgehenden oberflächlichen Geschwüre des Rachens.

Wenn sich auch dieselben meist gleichzeitig mit jenen der Mundhöhle vorfinden, so kann doch der Rachen allein und zuerst befallen werden. Ihre Lieblingsstandorte sind der weiche Gaumen, besonders die Gaumenbögen, die Uvula, die Tonsillen; auf der Hinterwand hat Verf. dieselben bisher nur zweimal gesehen; in einem Falle setzten sie sich auf Epiglottis und Lig. aryepigl. fort.

Die objective Untersuchung ergibt auf normaler, meist aber mehr oder weniger hyperämisirter und geschwellter, selbst ödematöser Schleimhaut kleinere und grössere rundliche oder längliche, milchige, bläulich-weisse Flecken und Streifen, welche wenig über die Schleimhaut erhaben und von einer gelockerten, macerirten Epitheldecke überzogen sind. Stösst sich die letztere ab, dann entstehen oberflächliche linsen- bis mehrere Centimeter grosse, öfters unregelmässig gestaltete Substanzverluste, welche die freien Ränder der Gaumenbögen gezackt und eingekerbt erscheinen lassen. Besonders deutlich treten diese Einkerbungen an der Basis der Uvula und den Gaumenbögen in die Augen. Auf den Mandeln stehen die Plaques bald isolirt, bald gleichmässig über die meist vergrösserte Tonsille vertheilt, bald bilden sie ringförmige Excoriationen oder confluirende Flecke und Flächengeschwüre, selbst tiefe Risse und Spalten, deren Grund und Ränder zuweilen mit spitzigen, papillären Wucherungen besetzt sind. In seltenen Fällen bildet das Epithel dicke, pseudomembranenähnliche Schwarten.

Die Beschwerden sind sehr oft gering oder mit denen der acuten Angina identisch; sehr heftiges Schluckweh, besonders beim Genusse gewürzter oder saurer Speisen, tritt ein, wenn die Papeln ulceriren oder in grösserer Anzahl und Ausbreitung vorhanden sind.

In den späteren Stadien der Syphilis verdienen die gummösen Infiltrate, auch Knoten, Syphilome genannt, und die aus ihnen hervorgegangenen tiefen Geschwüre wegen ihrer ausserordentlichen Häufigkeit besonderes Interesse.

Die gummöse Neubildung tritt bald diffus als Infiltrat, bald circumscript als Knoten auf. Im Nasenrachenraum sitzt dasselbe mit Vorliebe in der Plica salpingopharyngea, dem Tubenwulste, und repräsentirt sich in Gestalt einer glatten, rundlichen, gelbrothen Einlagerung oder Geschwulst von der Grösse einer Erbse bis zu der einer Haselnuss. Nach kürzerem oder längerem Bestande erweicht dieselbe und gibt zu einem kraterförmigen, mit wallartigen Rändern umgebenen, sich mehr und mehr vergrössernden Geschwür Anlass, nach dessen Heilung Verengerung oder völliger Verschluss der Tuben, zuweilen mit Zerstörung des Tubenknorpels oder membranöser Verwachsung der Choanen zurückbleibt. Auch am Rachendache, auf der Rachentonsille oder über den Choanen kommen syphilitische Infiltrate und ausgebreitete tiefgehende Ulcerationen vor. Nicht selten besteht gleichzeitig Syphilis des Naseninnern, besonders des Vomer und der Muscheln.

Weniger charakteristisch verlaufen die syphilitischen Infiltrate auf der Hinterwand der Pars oralis und laryngea. Bald mehr in der Mitte, bald auf der Seite hinter den hinteren Gaumenbögen entwickeln sich schmerzlos oder nahezu symptomlos länglich-runde Leisten und Erhöhungen, oft von beträchtlicher Dicke, welche conglomerirte Granulationen und hypertrophische Seitenstränge vortäuschen können. Ihr wahrer Charakter entpuppt sich oft erst dann, wenn sie an irgend einer Stelle erweichen und sich in Ulcerationen umwandeln, was bei

wirklicher Hypertrophie der Seitenstränge niemals der Fall ist. In schweren oder vernachlässigten Fällen überschreiten die Geschwüre die Grenzen der Schleimhaut und geben zu Caries und Nekrose der Halswirbel, unter Umständen sogar zu Entblössung der vorderen Fläche des Rückenmarkes Anlass. Ja, es sind sogar von L. Fischer und Mackenzie Fälle beobachtet, bei denen es zu Ausstossung nekrotischer Theile des Atlas und Epistropheus kam.

In nicht zu verkennender Weise tritt das Gumma am weichen Gaumen auf.

Die ersten Anfänge entziehen sich zwar öfters deshalb der Beobachtung, weil die Syphilome mit besonderer Vorliebe die Rückfläche des Velum einnehmen; vergrössern sie sich jedoch und erreichen, das Velum durchsetzend, die Vorderfläche desselben, oder entwickeln sie sich gleich von vorneherein auf der letzteren, namentlich auf der Grenze zwischen hartem und weichem Gaumen oder in den Gaumenbögen, so stellen sie circumscripte, dunkelblau-rothe, die Schleimhaut leicht emporwölbende Einlagerungen vor; die nächste Umgebung des Infiltrates ist stark hyperämisch, oft das ganze Velum und Uvula ödematös. Bei sehr diffuser Infiltration erscheinen Velum, Uvula und Gaumenbögen verdickt, blauroth wie bei Phlegmone. Nach kürzerem oder längerem Bestande treten im Centrum der Infiltrate weisse oder gelbliche Streifen und Punkte auf, die sicheren Zeichen der beginnenden Erweichung, welche sich immer mehr vergrössern, in Geschwüre umwandeln und oft unerwartet schnell Perforation zur Folge haben. Die Oeffnung entspricht anfangs so ziemlich dem Umfange des Erweichungsherdes, vergrössert sich jedoch immer mehr, besonders wenn die Kranken ihrem Schicksal überlassen bleiben. Durch die Oeffnung im Velum sieht man öfter gleichzeitige Geschwüre der Hinterwand, namentlich der Tubenknorpel und Plicae salpingopharyngeae. Nicht selten sind mehrere Knoten im Velum vorhanden, welche gleichzeitig oder nacheinander perforiren und zu ausgedehnten Geschwüren Anlass geben. Vollständige Abrasion des Velum ist nicht gar selten, meist wird jedoch nur ein Theil desselben zerstört; entwickelten sich die Knoten in der Nähe der Basis der Uvula, so kann dieselbe ganz abgetrennt oder bis auf eine dünne, fadenförmige Brücke abgeschnürt werden. Häufig kommt es zu Verlöthungen der Uvula mit der Hinterwand oder der Rückfläche des Velum, zu Verwachsungen des weichen Gaumens mit der Hinterwand, zu ringförmigen Stenosen und membranösen Verwachsungen des unteren Pharynxschnittes, die bereits früher besprochen wurden. Nach der Heilung tiefergehender Geschwüre bleiben weisse, glänzende, strahlige Narben zurück, die je nach ihrer Mächtigkeit die benachbarten Theile heranziehen und zu den gleichfalls schon besprochenen Formveränderungen Anlass geben. Durch Narbenbildung am Velum sowie durch interstitielle Myositis der Gaumenmuskeln wird die Schwingungsfähigkeit und Contractilität desselben verringert, ja ganz aufgehoben, durch abnorme Kürze der Verschluss des Nasenrachenraumes unmöglich; kleinere Perforationen, die besonders oft auch an den Gaumenbögen vorkommen, verengern

sich mit der Zeit durch Narbenbildung und können sogar völlig schwinden, grössere verkleinern sich zwar ebenfalls, lassen aber fast immer Störungen der Sprache zurück; doch hängen die letzteren nicht ausschliesslich von der Perforation, sondern von der Verödung der contractilen Substanz des Velum ab.

Schlagen die Gummata auf den Mandeln ihren Sitz auf, dann erscheinen die letzteren geschwellt, zuweilen bis zur gegenseitigen Berührung und Abplattung hypertrophisch. Bei oberflächlichem Sitze der Knoten erscheint die Mandel uneben und höckerig: bei längerem Bestande erweichen die Höcker und lassen tiefe, kraterförmige Geschwüre zurück, welche mit einander confluiren und die Tonsille in eine zerfetzte, ausgefressene, stellenweise granulirende Masse umwandeln. Nicht selten entwickeln sich in den Vertiefungen und Lacunen weisse sich kreuzende Streifen, welche theils aus Narbengewebe, theils aus wucherndem jungen Bindegewebe bestehen (interstitielle schrumpfende Tonsillitis).

Zu den seltensten Vorkommnissen gehören syphilitische Granulationsgeschwülste; sie sind von graugelber Farbe, glatter Oberfläche und ausserordentlicher Härte und können, wie in dem von Krecke mitgetheilten Falle, die Grösse eines Taubeneies erreichen und durch antisyphilitische Curen beeinflusst werden.

Die subjectiven Beschwerden der syphilitischen Infiltrate und Geschwüre beziehen sich meist auf die Deglutition. Im Beginne, ja sogar bis zur Perforation können die Beschwerden ganz fehlen: mit der weiteren Entwicklung entsteht das Gefühl eines Fremdkörpers im Halse, Trockenheit oder vermehrte Secretion. Der Schluckact ist, besonders wenn Zerfall eingetreten ist, nicht nur schmerzhaft, sondern auch insoferne behindert, als gröbere Bissen nicht oder nur mit Mühe geschluckt werden. Meist ist das Timbre der Stimme nasal oder anginös, bei grösseren Infiltraten des Velum sowie bei Perforation oder beträchtlicheren Substanzverlusten wird das Genossene in die Nase geschleudert. Verlust der Uvula hat ebensowenig wie Perforation eines Gaumenbogens weder auf die Sprache noch das Schlingen nachtheiligen Einfluss.

Die Diagnose der ausgebildeten Rachensyphilis, speciell der Geschwüre, ist namentlich bei sorgfältiger Untersuchung aller Theile in der Regel leicht und gründet sich auf die beschriebenen Veränderungen und gleichzeitige anderweitige Erscheinungen oder Ueberreste von Lues. Gewöhnlich finden sich neben den Papeln noch ein maculöspapulöses Exanthem der Haut des Stammes oder der Kopfhaut oder Psoriasis palmaris und plantaris, Schwellung der Lymphdrüsen, Indurationen oder Narben an den Genitalien. Auf das Velum und die Gaumenbögen localisirte Katarrhe mit Volumzunahme und Cyanose der Schleimhaut müssen stets den Verdacht auf Syphilis erwecken, zumal wenn sie der Localtherapie hartnäckig trotzen. Anfängern kann man nur rathen, beim Anblicke eines Geschwürs im Rachen an ein dyskrasisches Leiden, in erster Linie an Syphilis, dann an Tuberculose, Lupus oder Carcinom zu denken. Herpes wird oft mit syphiliti-

schen Papeln verwechselt. Der acute, meist fieberhafte Verlauf, das plötzliche Entstehen der Veränderungen, die grosse Schmerzhaftigkeit, die rasche Heilung spricht für Herpes; der allmälige Beginn, die lange Dauer, der Wechsel in Form und Sitz, die Fieberlosigkeit und geringere Schmerzhaftigkeit spricht für syphilitische Plaques.

Die Prognose ist günstig, vorausgesetzt, dass die Kranken nicht zu spät oder mit irreparablen Zerstörungen in Behandlung kommen. Dass selbst noch in verzweifelten Fällen nach Ausstossung nekrotischer Halswirbel Heilung erfolgen kann, beweist ein bereits oben citirter Fall von L. Fischer; doch vergesse man nicht, dass Rachensyphilis eine grosse Neigung zu Recidiven zeigt.

Die Behandlung zerfällt in eine allgemeine und eine locale. Es wäre gewissenlos, die eine Methode auf Kosten der anderen bevorzugen zu wollen; die besten und schnellsten Erfolge erzielt man durch Vereinigung beider. Für frühsyphilitische Erscheinungen — Angina, Plaques, Condylome — eignet sich am besten das Quecksilber, sei es in Form von Inunctionen oder Injectionen oder intern. Für die gummösen Formen und Zerstörungen gibt es kein besseres Mittel als das Jodkali und gelingt es oft, bereits total erweichte Gummata durch energische Dosen zurückzubilden und die Perforation zu vermeiden. Ist diese einmal erfolgt, dann gilt es, zu retten, was noch möglich ist.

Die locale Behandlung besteht in Gurgelungen, Inhalationen, Bepinselungen und Cauterisationen. Der wohlthätige Einfluss des Sublimats und des Kali chloricum als Gargarisma tritt auch hier zu Tage. Zu Pinselungen eignen sich für Plaques Sublimat oder Höllensteinlösungen; am schnellsten werden sie durch Ueberstreichen mit Lapis in Substanz oder schwacher Chromsäurelösung beeinflusst.

Zur Touchirung gummöser Geschwüre kann Verf. die Mandl'sche Jodsolution mit Carbolsäurezusatz empfehlen; tiefer gehende Ulcera sowie die Ränder perforirter Gaumengeschwüre müssen mit Lapis in Substanz oder Chlorzink leicht cauterisirt werden; oft gelingt es, die Löcher bis auf ein Minimum zu verengern oder zu verkleinern, dass die Stimme keinen Schaden leidet. Grössere, besonders knöcherne Perforationen sowie Abrasionen des Velum können durch Obturatoren und Gaumenplatten verdeckt oder durch chirurgische Eingriffe beseitigt werden; die Wiederherstellung einer normalen Sprache wird aber in den seltensten Fällen erzielt. Die Behandlung der Verwachsungen und Stenosen des Pharynx wurde bereits in dem Capitel über Missbildungen etc. besprochen.

Tuberculose.

Eine relativ seltene Localisation der Tuberculose ist die des Rachens. Bedenkt man die ausserordentliche Häufigkeit derselben im Kehlkopf, so muss die geringe Betheiligung des Pharynx sehr auffallen. Die Seltenheit der Rachentuberculose erklärt sich aus dem schweren Haften der Tuberkelbacillen in den Rachengebilden, aus welchen sie bei der Nahrungsaufnahme sowie durch das beständige Speichelschlucken und Räuspern entfernt und unschädlich gemacht werden.

Wie beim Larynx, so erhebt sich auch beim Pharynx die Frage, ob es eine primäre Rachentuberculose gibt; dass sich das tuberculöse Virus zuerst im Rachen localisirt, ist wiederholt beobachtet worden; dass der Rachen früher als die Lunge und der Kehlkopf erkranken kann, hat Verf. mehrmals gesehen, doch zwingen ihn seine Beobachtungen zu der Annahme, dass der Rachen nur scheinbar primär erkrankt, d. h. dass schon vor dem Ausbruche der Rachentuberculose käsige Herde oder Tuberkeldepôts in anderen Organen bestehen, wenn sich dieselben auch nicht immer objectiv nachweisen lassen oder Erscheinungen machen. Das tuberculöse Virus kann ebenso wie das syphilitische jahrelang schlummern und dann plötzlich seine deletären Wirkungen entfalten.

Beispielsweise will Verf. erwähnen, dass einer seiner Kranken, der in seinem 28. Lebensjahre an linksseitigem Spitzenkatarrh mit Hämoptoë gelitten hatte, nach 15jähriger vollkommener Gesundheit plötzlich an Otitis media und Tuberculose des Velum und der Wangen erkrankte, während ein anderer Patient, dem in seinem 63. Lebensjahre der rechte tuberculös entartete Hoden exstirpirt worden war, zwei Jahre später von Tuberculose der hinteren Rachenwand befallen wurde und durch Weiterverbreitung des Processes auf den Kehlkopf und schliesslich auf die Lunge zu Grunde ging.

Meist gesellt sich jedoch die Tuberculose des Rachens zu bereits bestehender nachweisbarer Lungentuberculose. Die Jahre von 20—50 sind besonders bevorzugt, wie es scheint, auch das männliche Geschlecht; bei Kindern ist Rachentuberculose sehr selten.

Die Veränderungen, welche sich bei Pharynxtuberculose finden, sind sämmtlich auf tuberculöse Infiltration der Schleimhaut zurückzuführen. In der Regel sitzen die Tuberkel wie jene des Kehlkopfes unter dem Epithel, sind also dem blossen Auge unsichtbar. Oefters jedoch entwickeln sie sich auf der Schleimhaut in der Umgebung der Geschwüre und stellen dann kleine, hirsekorngrosse, graue, graugelbe Knötchen vor; ihr Lieblingssitz ist der weiche Gaumen, die Gaumenbögen, die hintere Rachenwand, die Tonsillen und der Nasenrachenraum, in welchem besonders die Rachentonsille, die Umgebung der Rosenmüller'schen Grube und der Fornix ergriffen werden. Nach Strassmann ist die Tuberculose der Gaumenmandeln eine sehr

häufige, jedoch klinisch symptomlos verlaufende Begleiterscheinung der Lungentuberculose; nach Dmochowsky erkranken fast ebenso häufig auch die Zungenbalgdrüsen.

Im Stadium der Infiltration oder Knötchenbildung kommt die Rachentuberculose selten zur Beobachtung, meist erst im Stadium der Ulceration, d. h. nach Erweichung und Abstossung der Tuberkel. Nach der ausgezeichneten Schilderung B. Fränkel's sind die tuberculösen Rachengeschwüre Lenticulärgeschwüre; sie gehen mehr in die Fläche als in die Tiefe, haben einen speckigen, mit blassrothen, stecknadelkopfgrossen Granulationen besetzten und mit dünnem, schlechtem Eiter bedeckten Grund, ausgefressene, unregelmässige Ränder; in der Nachbarschaft oder an den Rändern der Geschwüre finden sich oft miliare Knötchen, manchmal umfangreiche papilläre Excrescenzen und warzenartige Auswüchse; die Lymphdrüsen des Halses sind in der Regel geschwellt. Bald ist die Hinterwand allein befallen, bald nur die Tonsillen oder die Gaumenbögen, bald sind sämmtliche Gebilde des Rachens mit Geschwüren besetzt.

Ausser der miliaren und geschwürigen Form der Rachentuberculose kommt in seltenen Fällen auch noch die tumorartige zur Beobachtung. Die Tuberkeltumoren sitzen auf der Rückseite des Velum oder im Nasenrachenraum und können eine beträchtliche Grösse erreichen (Avellis).

Unter den subjectiven Beschwerden nimmt der Schmerz die erste Stelle ein. Derselbe ist äusserst heftig, zumal bei der Deglutition, und strahlt meist in das eine oder in beide Ohren aus, durch Uebersprungen der schmerzhaften Sensationen auf den N. Jacobs., N. glossopharyngeus und N. auricularis vagi. Das Schluckweh ist meist so intensiv, dass die Kranken lieber hungern und dürsten, besonders wenn in Folge der Infiltration des Velum die genossenen Speisen durch die Nase wieder herausgeschleudert werden. Die Schleimsecretion ist vermehrt, beständiger Reiz zum Räuspern und Schlucken oder das Gefühl von Kratzen und Trockenheit vorhanden, der Athem übelriechend. Neben diesen localen Beschwerden, die längere Zeit die einzigen sein können, stellen sich Appetitlosigkeit, Abmagerung, Kräfteverfall, abendliches Fieber mit meist sehr unregelmässigem Typus, Pulsbeschleunigung, Schweisse sowie Husten und Heiserkeit ein.

Nach kürzerem oder längerem Bestande verbreitet sich die Rachentuberculose längs des Zungengrundes und der Lig. glosso- und aryepiglottica auf den Kehlkopf, die Mundhöhle oder die Lunge, oder es entsteht Darm- oder Gehirntuberculose, um meist nach 3- bis 10monatlicher Dauer zum Tode zu führen. In seltenen Fällen kann Heilung eintreten, wie Verf. selbst einmal sah. Die Ansicht Volkmann's, dass Verwachsungen des weichen Gaumens, Perforationen, Narben etc. ebenso häufig oder noch häufiger tuberculösen Ursprungs seien als syphilitische, ist absolut unrichtig.

Die Diagnose bietet nicht nur dem Anfänger, sondern auch dem Geübteren zuweilen grosse Schwierigkeiten; in der Regel wird die Rachentuberculose mit Syphilis verwechselt, zumal wenn noch

keine oder geringe Lungenerscheinungen vorhanden sind. Ein solcher Irrthum lässt sich jedoch vermeiden, wenn man im Auge behält, dass die tuberculösen Rachengeschwüre nur äusserst selten so in die Tiefe greifen wie die syphilitischen, dass die tuberculösen Geschwüre auf blasser anämischer Basis sitzen, einen atonischen Charakter und so gut wie keine Neigung zur Heilung haben und dass meist noch andere Erscheinungen, Hodentuberculose, Mastdarmfisteln, schlechtes Aussehen, Dämpfungen der Lungenspitzen, vorhanden sind. Absolut sicheren Entscheid gibt die mikroskopische Untersuchung auf Tuberkelbacillen, die allerdings zuweilen in recht spärlicher Menge oder nach langem Suchen gefunden werden Im Uebrigen kann man B. Fränkel nur beistimmen, wenn er sagt, dass, wer nur einmal eine Rachentuberculose sah, das Bild derselben niemals vergessen wird.

Die Prognose ist eine sehr ungünstige, wenn auch zuweilen temporäre Heilungen, Stillstände, ja sogar dauernde Heilungen vorkommen.

Die Therapie ist in der Regel ziemlich machtlos und muss man sich ausser auf Verbesserung der Constitution hauptsächlich auf Reinigung der Geschwüre und Beseitigung der Schmerzen beschränken. Am meisten Aussicht auf Heilung der Geschwüre gibt das Curettement mit nachfolgender Bepinselung mit 20—80% Milchsäure; auch versuche man die Galvanokaustik sowie das Carbol oder Creolin, Cresol, Pyoctanin, Creosotglycerin 0·5 : 50·0, sowie das Jodoform, Jodol, ferner desinficirende Inhalationen und Gurgelwässer von Borsäure, Carbolsäure, Sublimat, Kali chloricum, eventuell Einspritzungen von Tuberculin. Zur Linderung der oft unerträglichen Schmerzen empfiehlt sich das Touchiren mit 20—25% Mentholöl oder 10—20% Cocaïnlösung oder das Aufblasen von Morphiumpulver 0·02 : 0·2 Amylum pro dosi. Dass grösste Vorsicht in Bezug auf die Consistenz, Form und Temperatur der Speisen beobachtet werden muss, ist selbstverständlich.

Scrophulose, Lupus, Lepra, Rotz.

Bei der Durchsicht der Literatur begegnet man namentlich bei französischen Schriftstellern auch der Scrophulose des Rachens.

Homolle und Isambert unterscheiden eine leichte und eine schwere Form der Rachenscrophulose. Unter ersterer verstehen sie die superficielle scrophulöse Angina, ein Analogon der chronischen Rhinitis lymphatischer Personen. Auf der Schleimhaut des Nasenrachenraumes zeigen sich zahlreiche Follikel und Granula, die sich nach Abstossung ihres Epithels allmälig in unregelmässige Geschwüre mit gelbem Grund, sinuösen Rändern und blaurothem Saum umwandeln, so dass die ganze Schleimhaut wie marmorirt erscheint. Die Geschwüre sind mit fest antrocknendem, blutigem, fötidem Secret

bedeckt und zum Unterschiede von den syphilitischen absolut schmerzlos. Bei der schweren Form hingegen ergreift die Erkrankung, welche Isambert mit Lupus identificirt, einestheils die Epiglottis und die Aryknorpel, es entsteht Athemnoth und durch Verwachsung der Ränder der Epiglottis mit den benachbarten Rachengebilden Dislocation des Kehlkopfes; anderntheils gehen die Geschwüre auf die Gaumenbögen und das Velum über, durchlöchern das letztere und trennen die ersteren ab, so dass Verwachsungen mit der Hinterwand zu Stande kommen.

Der Verlauf solcher scrophulöser Rachengeschwüre ist nach Isambert ein sehr hartnäckiger; sie können das ganze Leben über bestehen oder auch nach Monaten und Jahren mit Hinterlassung sternförmiger Narben heilen und zu starken, selbst tödtlichen Blutungen Anlass geben.

Wenden wir uns zur deutschen Literatur, so erwähnt Wendt, offenbar im Einklange mit Isambert, dass man auf der Hinterwand des Nasenrachenraumes sowie auf der Rachentonsille bei Scrophulösen und Tuberculösen, ebenso auch bei allem Anschein nach Gesunden, eine tuberculisirende, verkäsende, scrophulöse Entzündung der Follikel, die Pharyngitis scrophulosa, finde. Die Follikel seien meist in grosser Anzahl vorhanden, von graugelblicher bis gelblicher Farbe, von trockener, käsiger Beschaffenheit oder in einer Auflösung von fettigem Detritus begriffen. Bei dem Zerfalle der Oberfläche bilden sich kleine Geschwürchen, beim Untergange der tiefer eingebetteten Follikel bleiben zahlreiche runde Lücken im Parenchym zurück, durch Confluenz mehrerer benachbarter Geschwüre kann es zu tiefen Zerstörungen und Verwachsungen des weichen Gaumens kommen. Auch B. Fränkel, Lewin, Michel, Hajek und Löri erwähnen das Vorkommen scrophulöser Rachengeschwüre. Nach Letzterem sieht man dieselben selten vor dem zweiten Lebensjahre, um so häufiger bis zur Pubertät; sie gehen theils von der hypertrophischen Plica salpingopharyngea, theils von der hinteren Rachenwand und dem Velum aus und haben bald glatte anämische, bald unebene, gewulstete und geröthete Ränder und einen mit schlecht aussehenden Granulationen bedeckten Grund; auch können sie zu Perforationen führen.

In Bezug auf die Diagnose sind alle zur Unterscheidung scrophulöser Rachengeschwüre von anderen angegebenen Kriterien zu unsicher und zu wechselnd, als dass sich dieselben mit Erfolg verwerthen liessen. Man wird deshalb sehr vorsichtig sein müssen, zumal, wie E. Wagner treffend bemerkt, ein guter Theil der scrophulösen Geschwüre einen syphilitischen, tuberculösen, lupösen oder leprösen Ursprung hat. Namentlich die Syphilis hereditaria tarda, von der noch bei der Scrophulose der Nase die Rede sein wird, localisirt sich mit besonderer Vorliebe im Rachen und im Nasenrachenraum. Nach Hajek ist der Verlauf scrophulöser Rachengeschwüre im Vergleiche zu den syphilitischen ein ausgesprochen langsamer. Jodkali bleibt wirkungslos, Quecksilberpräparate haben stets einen rapiden Zerfall der Granulationen und Fortschreiten der Geschwüre zur Folge.

Die Behandlung hat zuerst die Verbesserung der Constitution durch Eisen, Jodeisen, Leberthran, Tonica, Chinin, Kochsalz- oder Schwefelbäder in's Auge zu fassen; bei Verdacht auf Syphilis leite man vorsichtig eine antisyphilitische Behandlung ein. Local empfehlen sich Bepinselungen der Geschwüre mit Mandl's Solution, Reinigung des Nasenrachenraumes; bei Ulcerationen, die mit Vegetationen besetzt sind: Aetzmittel, besonders Chromsäure, Chlorzink, Milchsäure.

Dass Lupus mit besonderer Vorliebe bei Scrophulösen auftritt, ist sicher. Er kommt primär und secundär, d. h. in Gesellschaft mit Lupus der äusseren Haut, besonders der Wangen, der Nase und des Kehlkopfes, vor. Er befällt hauptsächlich jüngere Individuen weiblichen Geschlechtes und localisirt sich gerne auf den Mandeln und dem weichen Gaumen. Die Tonsillen erscheinen vergrössert, ihre Oberfläche uneben, mit Knoten und Excrescenzen bedeckt, zwischen denen sich Ulcerationen bemerkbar machen. Wird das Velum ergriffen, dann entwickeln sich auf normaler oder infiltrirter Schleimhaut kleinere und grössere confluirende Knötchen, welche entweder schrumpfen oder zerfallen und tiefe Geschwüre bilden, die theils vernarben, theils zu Defecten und Perforationen sowie zu Verwachsungen und sonstigen Formanomalien Anlass geben.

Die Diagnose des Lupus ist zuweilen schwer, da er mit Syphilis grosse Aehnlichkeit hat. Für Lupus sprechen das papillärknotige Aussehen, der sehr langsame und schmerzlose Verlauf, die Gegenwart von Lupus der Haut und anderen scrophulösen Erscheinungen sowie die Jugend der Kranken; doch vergesse man nicht, dass die hereditäre Syphilis zuweilen erst sehr spät, selbst zur Zeit der Pubertät, in Erscheinung tritt.

Die Behandlung des Lupus muss eine allgemeine und eine locale sein. Da derselbe zuweilen theilweise auf syphilitischer Basis beruht, so ist jedenfalls ein Versuch mit Jodkali indicirt. In der Regel ist jedoch der Lupus eine selbstständige Erkrankung oder vielmehr eine besondere Form der Tuberculose. Deshalb empfehlen sich Verbesserung der Ernährung und Blutmischung durch passende Diät, Land- und Seeluft, China, Eisen, Leberthran, Creosot, subcutan Tuberculin. Local suche man durch Aetzungen mit Milchsäure oder Liq. ferri sesquichl. 1:4 oder durch Einbohren von Lapisstiften oder mittelst Galvanokauter und Auskratzen mit Curetten und scharfen Löffeln alles Krankhafte zu zerstören.

Ueber die Lepra des Rachens liegen bei der grossen Seltenheit dieser Affection in Europa nur spärliche Mittheilungen vor.

Dieselbe scheint im Rachen nur secundär, d. h. erst dann aufzutreten, wenn die äussere Bedeckung bereits befallen ist. Mit Vorliebe werden der weiche Gaumen und die Tonsillen befallen. Auf dem ersteren entstehen, wie ein von F. Müller mitgetheilter Fall beweist, verschieden grosse, zum Theil confluirende, unregelmässig begrenzte,

leicht prominente Infiltrate von glänzender gelbweisser Farbe, wodurch das Velum in eine starre, unbewegliche Masse umgewandelt wird; dieselben Veränderungen finden sich auch an Gaumenbögen und Uvula. Nach längerem oder kürzerem Bestande kommt es an den knotigen Infiltraten zu Geschwüren, Substanzverlusten, Perforationen und Verwachsungen. Wird auch die Nase mitergriffen, so findet sich ausser Trockenheit im Rachen näselnde Stimme, Störung des Geschmackes und Geruches, mehr oder weniger hochgradige Verlegung einer oder beider Nasenhöhlen.

Die Diagnose stützt sich auf die Anwesenheit von Zerstörungen und Lepraknoten auf der äusseren Haut, die fast nie fehlende Anästhesie und den Nachweis der charakteristischen Leprabacillen.

Die Prognose ist absolut infaust.

Die Therapie besteht in Ortswechsel, nährender Diät, Kaltwassercuren; innerlich Creosot (1·5:50 Pillen) oder Natr. salicyl. 2 bis 5·0 pro die; die locale Behandlung ist dieselbe wie bei Lupus.

Grosse Aehnlichkeit mit den bisher besprochenen Affectionen hat ferner das Rhinosclerom, das relativ häufig auch den Rachen befällt. Die ausführlichere Beschreibung desselben ist bei den Krankheiten der Nase nachzulesen.

Endlich localisiren sich auch die Maul- und Klauenseuche sowie der Rotz im Rachen. Die Formen, unter welchen sie auftreten, sind dieselben, wie sie bei den Krankheiten der Mundhöhle geschildert wurden.

Mykosen.

Wie die Mundhöhle, so ist auch der Rachen der Tummelplatz zahlreicher niedriger Organismen. Der Pharynx erkrankt selten allein, häufiger gemeinsam mit der Mundhöhle, weshalb wir auch meistens dieselben Parasiten wiederfinden.

Dass der Soor bei Kindern sehr oft auf weichen Gaumen und hintere Rachenwand fortschreitet, wurde früher betont; bei Erwachsenen findet sich Rachensoor hauptsächlich bei schweren Krankheiten und marantischen Zuständen, so z. B. bei Pneumonie, Carcinom, Tuberculose, Diabetes mell., Morb. Brighti. Relativ am häufigsten kommt er im Verlaufe schwerer Typhen vor; so beschrieb unter Anderen Damaschino eine Soorepidemie in Paris; das Mycelium des Soorpilzes dringt nicht nur in das Epithel, sondern auch in die Muskelschichte ein. Nach Duguet, der gleichfalls seine Beobachtungen an Pariser Typhuskranken machte, verbreitet sich der Soor der Typhösen

vom Rachen aus nach der Mundhöhle, während bei Kindern das umgekehrte Verhältniss stattfindet. Aber nicht nur bei Schwerkranken, sondern auch bei völlig Gesunden kann primärer Rachensoor vorkommen. So sah Verf. ausgebreiteten Soor einmal bei einem kräftigen 36jährigen Manne und viermal bei älteren, aber noch völlig rüstigen Männern am weichen Gaumen und im untersten Theile des Pharynx sowie auf den Ligam aryepigl.; auch Freudenberg publicirte zwei hiehergehörige Fälle; der eine betraf einen stimmlich sehr überangestrengten Gymnasiallehrer, der andere einen Mann, dessen carcinomatöse Frau an ausgebreitetem Mundsoor gelitten hatte. Thorner sah im Anschluss an eine schwere Influenza Soor im Rachen, Nasenhöhle und Nase auftreten.

Die Klagen der Kranken beschränken sich, insoferne sie nicht soporös oder sonstig geistig gestört sind, auf Schluckbeschwerden, mehr oder weniger heftige, brennende, stechende Schmerzen im Halse, das Gefühl der Anwesenheit eines Fremdkörpers, Brech- und Würgebewegungen; bei Kindern besteht bei massenhafter Entwicklung des Pilzes hochgradige Dysphagie mit Regurgitiren der Ingesta.

Die Prognose richtet sich nach der Grundkrankheit: sehr häufig erstreckt sich der Verlauf der Affection auch bei gründlichster Säuberung der afficirten Theile über Wochen, da von den weniger leicht zugänglichen Stellen aus immer wieder Recidiven eintreten können.

Die Diagnose kann sicher nur mit dem Mikroskope gestellt werden.

Die Behandlung ist dieselbe wie bei Mundsoor; französische Beobachter empfehlen ausser Borax besonders Vichywasser. In den unteren Partien des Rachens muss der Soor mit Pinsel und Schwamm entfernt und die befallene Stelle mit dem desinficirenden Spray — Carbol-, Bor-, Salicylwasser — 1 pro mille Sublimatlösung oder 1—3% Lysol- oder Creolinwasser berieselt werden.

Eine andere theilweise durch Pilze bedingte Affection ist die zuerst von B. Fränkel beschriebene Mykosis tonsillaris benigna, die mit der Pharyngomykosis leptothricia von Hering und der Algosis oder Phykosis leptothrica faucium von Jacobson identisch ist.

Man versteht darunter eine Erkrankung des Rachens und des Zungengrundes, welche sich durch weissliche oder gelbweise, theils weiche, theils harte hornartige, gestielte Knötchen, oder stachelige Excrescenzen, Flecken, Pfröpfe oder quarkige Klumpen äussert. Sie haben ihren Sitz auf der Oberfläche und in den Lacunen der Gaumenmandeln oder auf den Gaumenbögen und der hinteren Rachenwand, deren Seitentheile zuweilen tief herab mit ihnen besetzt sind. Auf der Zunge sitzen sie stets in den Mündungen der Follikel der Zungenbasis und bilden dort 2—8 mm lange und bis zu 2 mm dicke Fäden und Bündel. Die Affection kommt in jedem Alter, besonders häufig aber bei Erwachsenen theils mit acutem, theils mit chronischem Verlaufe vor.

Die subjectiven Erscheinungen bestehen meist in Kitzel, Trockenheit, Brennen, geringem Schluckweh oder in dem Gefühle der Anwesenheit eines Fremdkörpers, mit dem Reiz zum Räuspern und Husten; in einzelnen Fällen geht dem Erscheinen der Flecken allgemeines Unbehagen, Fieber, Appetitlosigkeit und Müdigkeit voraus. Jacobson hält diese Fälle zwar für Complicationen mit Angina oder sonstigen katarrhalischen Reizungen und sagt, gerade die Abwesenheit jeder allgemeinen oder localen Reaction sei eine Eigenthümlichkeit der Algosis faucium, doch wird das Vorkommen von Allgemeinerscheinungen neuerdings auch von Seifert bestätigt. Zuweilen fehlt jede Beschwerde und die Kranken werden zufällig durch die Inspection ihres Rachens auf die Affection aufmerksam. Zieht sich dieselbe sehr in die Länge, dann kann in Folge ungeeigneter Eingriffe oder durch hypochondrische Gemüthsstimmung der Appetit leiden, Dyspepsie und Abmagerung eintreten.

Die mikroskopische Untersuchung der Flecken ergibt die Anwesenheit zahlreicher Mikroorganismen, deren Hauptmasse jedoch immer aus Leptothrix buccalis besteht Jacobson gelang es, Reinculturen dieser Alge zu machen. Mit Jod werden die theils gerade verlaufenden, theils umgebogenen Fäden blau gefärbt. Auch hat der Leptothrix die Eigenschaft, zu Kalkablagerungen aus dem Speichel und zu Concrementbildung in der Tiefe der Speichelgänge Anlass zu geben resp. die Ablagerung des Kalkes aus seinen Lösungen zu begünstigen. Impfungen auf Gesunde und rachenafficirte Kranke wurden von Seifert und Decker mit Erfolg vorgenommen. In einem neuen Lichte erscheint die Affection durch die Untersuchungen von Siebenmann. Derselbe erklärt die Anwesenheit von Leptothrix für nebensächlich; für die Hauptsache hält er einen ungewöhnlich intensiven Verhornungsprocess des lacunären Epithels, eine wirkliche Stachelbildung, und schlägt vor, die Affection künftig Hyperkeratosis lacunaris zu benennen.

Der Verlauf ist meist sehr hartnäckig, indem die künstlich entfernten Massen sich wieder ersetzen; doch können sich dieselben auch ohne Kunsthilfe dauernd abstossen.

Die Diagnose ist für den Ungeübten nicht leicht, namentlich liegt die Verwechslung mit Diphtherie äusserst nahe. Das Fehlen von höherem Fieber sowie das längere Gleichbleiben der Flecken in ihrer Grösse sprechen jedoch gegen Diphtherie, bei der sich sehr bald grosse, zusammenhängende Membranen bilden. Einer Verwechslung mit Angina lacunaris wird durch den stets fieberhaften und acuten Verlauf der letzteren, die starke Röthung und Schwellung der Mandeln sowie durch die eitrige Consistenz der Flecken vorgebeugt; Concremente in den Tonsillen unterscheiden sich von mykotischen Herden theils durch ihre steinige, kalkige Härte, theils durch ihre Zusammensetzung aus verfetteten Epithelien, Kalkbestandtheilen, Cholestearinkrystallen und die weitaus geringere Anzahl der Bacterien.

Die Behandlung muss, wenn überhaupt eine solche angezeigt erscheint, eine sehr energische sein, da alle Beobachter darin übereinstimmen

stimmen, dass die definitive Beseitigung der Massen mittelst der gewöhnlichen antibacteriellen Gurgelungen oder Bepinselungen selten möglich ist. Immerhin ist, bevor man energischer eingreift, das Bestreichen der Herde mit 10% alkoholischer Salicylsäure oder starker Sublimatlösung oder, wie Jacobson vorschlägt, mit absolutem Alkohol oder nach Jurasz mit Nicotinlösung 0·2 : 100·0 räthlich. Hilft dies nichts, dann empfiehlt sich die mechanische Entfernung und Zerstörung mittelst scharfer Löffel oder Galvanokauter; die Tonsillotomie ist indicirt, wenn die Mandeln stark hypertrophisch und zerklüftet sind.

Auch die Sarcine kann massenhaft im Rachen auftreten und von da in die Lunge oder umgekehrt von der Lunge in den Rachen gerathen. Lieblingsaufenthalt derselben scheint der Raum zwischen Zungengrund und Epiglottis sowie der Sinus pyriformis zu sein. Beschwerden macht die Sarcine keine, auch ist sie nach Fischer nicht im Stande, noch vorhandene andere Krankheitsprocesse zu beeinflussen.

Nach den Beobachtungen von Schubert und Siebenmann kann sich ferner der Aspergilluspilz aus der Nase in den Rachen fortsetzen oder auch primär dort mit anderen Schimmelpilzen auftreten.

Eine eigenthümliche Mykose beobachtete endlich Klamann. Auf der gerötheten und geschwellten Schleimhaut des rechten hinteren Gaumenbogens und der Uvula fand sich eine graugelbe, aus Mycelien und Kokkenhaufen bestehende Auflagerung; die gekörnten Pilzfäden hatten ein keulenförmiges Ende und waren in das Epithel hineingewuchert.

Dass nach E. Fränkel ein Theil der bei Typhösen vorkommenden Geschwüre im Rachen und Kehlkopf der mykotischen Epithelnekrose der massenhaft wuchernden normalen Mundhöhlen-Mikroorganismen seine Entstehung verdankt, wurde bereits erwähnt.

Blutungen.

Blutungen auf die Oberfläche und in das Gewebe der Rachenschleimhaut gehören zu den selteneren Vorkommnissen.

Freie Blutungen kommen am häufigsten nach Verletzungen, so besonders bei Kindern nach Zerreissungen des Gaumensegels durch in den Mund gehaltene Gegenstände oder Fremdkörper vor, ebenso nach chirurgischen Eingriffen, besonders bei der Tonsillotomie, der Operation der Rachenmandel oder bei Eröffnung eines peritonsillitischen Abscesses. Kleinere capilläre Blutungen treten häufig in Folge heftigen

Hustens und Räusperns auf, zumal wenn sich die Schleimhaut im Zustande activer oder passiver Hyperämie befindet, wie bei Emphysem, Herzfehlern, Granulationen oder bei adenoiden Wucherungen, Ulcerationen und Gangrän; doch sind wiederholt auch tödtliche Blutungen durch Arrosion der Carotis bei ulcerirender Pharynxsyphilis beobachtet worden. Blutauswurf kommt ferner in Folge von Blutung aus dem hinteren Theile der Nase sowie bei Venenerweiterung am Zungengrunde oder bei Venectasien am Velum oder der hinteren Rachenwand vor.

Ecchymosen und Sugillationen, Hämatome, sind nicht selten Begleiter acuter Anginen sowie der Diphtherie oder Variola; zu den selteneren Ursachen gehören Gicht und Lebercirrhose, Scorbut, Purpura rheumatica, Morb. macul. Werlhofii. Bei Bluterguss in die Uvula (Staphylhämatom), der durch Quetschungen, ungeschicktes Handhaben von Instrumenten oder durch Schlucken grosser, fester Gegenstände entsteht, senkt sich das Blut nach unten und gibt so der Uvula eine keulenförmige Gestalt.

Die Prognose der Rachenblutung richtet sich nach Ursache und Heftigkeit; die Blutungen bei der Tonsillotomie wurden bereits besprochen. Durch submucöse Blutungen können Verengerungen des Rachens mit Schling- und Athembeschwerden, sogar mit dem Ausgange in Gangrän zu Stande kommen.

Die Behandlung besteht bei geringfügigeren Hämorrhagien in Gurgelungen oder Inhalationen, Zerstäubungen von Eiswasser, 2—3% Alaun-, Tannin- oder Ferripyrin- oder Liq. ferri-Lösungen. Cauterisation mit Lapis zeigt sich besonders bei blutenden Ulcerationen wirksam; bei profuseren Blutungen ist die Digitalcompression angezeigt oder das Aufdrücken von mit styptischen Flüssigkeiten imprägnirten Wattetampons, die, unbekümmert um Schluck- und Würgebewegungen, möglichst lange auf der blutenden Stelle fixirt werden müssen. Dass bei Carotidenverletzung die Blutung nur durch Unterbindung gestillt werden kann, wurde bereits erwähnt. Hämatome bedürfen in der Regel keiner besonderen Behandlung; verursachen sie durch ihre Grösse Beschwerden, dann muss der Inhalt derselben entleert werden.

Blutergüsse in das retropharyngeale Bindegewebe, Haematoma retropharyngeale, wurden namentlich von B. Fränkel und Störk beobachtet.

Als Ursache liess sich Druck auf einen schon länger bestehenden Kropf nachweisen; durch zu enge Halsbinden wird nicht nur in der Schilddrüse selbst, sondern auch in den mit der Thyreoidea anastomosirenden Gefässen der Rachenwand eine Stauungshyperämie hervorgerufen, die zu Blutaustritt in das submucöse Gewebe führt. In anderen Fällen entsteht die Krankheit ohne nachweisbare Ursache ganz plötzlich, öfters in wenigen Minuten; sie kann sich aber auch allmälig entwickeln.

Objectiv äussert sich das Haematoma retropharyngeale durch das Vorhandensein einer mehr oder weniger grossen, teigigen, fluctuirenden Geschwulst, welche die Schleimhaut der hinteren Rachenwand

emporwölbt. Die subjectiven Beschwerden bestehen in Behinderung des Schluckens, dumpfer, undeutlicher, klangloser Stimme, bei stärkeren Ergüssen in Respirationsbeschwerden.

Die Therapie kann nur eine operative sein: Störk öffnet mittelst Bistouri die Höhle, aus der manchmal helles, rothes Blut im Strahle hervorspritzt, so dass man glauben könnte, ein Aneurysma oder einen Varix eröffnet zu haben; nach der Eröffnung empfehlen sich antiseptische Gargarismen und Inhalationen. B. Fränkel gibt den Rath, fluctuirende Geschwülste des Rachens mit einem schmalen Bistouri und kleiner Wunde zu eröffnen.

Fremdkörper und Concretionen.

Die Fremdkörper des Rachens sind wegen ihrer Häufigkeit von grossem praktischen Interesse. Am öftesten bleiben Fischgräten, scharfkantige Knochenstücke, Hühnerbeine, Borsten von Zahnbürsten, Strohhalme, Kornähren, Münzen, Nadeln, falsche Zähne und ganze Gebisse, Knöpfe, Obstkerne etc. im Rachen stecken.

Am seltensten gelangen sie in den Nasenrachenraum, wie in einem von Urbantschitsch mitgetheilten Falle, wo ein Haferrispenast durch die Tuba in's Mittelohr und von da in den äusseren Gehörgang gelangte.

Am häufigsten werden spitzige Gegenstände im Isthmus faucium und da wieder mit Vorliebe von den Mandeln oder der Zungenbasis aufgefangen. Fischgräten oder spitzige Knochenstücke, Borsten von Zahnbürsten spiessen sich oft so tief ein, dass ein kaum sichtbares Stück hervorragt; sind dieselben sehr gross, so können sie sich quer über den Pharynx legen; ausser den Mandeln und der Zungenbasis sind die seitlichen Rachenwände, besonders die Sinus pyriformes sowie der Eingang in den Oesophagus die Orte, wo Fremdkörper zurückgehalten werden. Grössere rundliche Gegenstände bleiben meist hinter den Aryknorpeln oder zwischen Zunge und Epiglottis stecken.

Die Erscheinungen, welche Fremdkörper des Rachens hervorrufen, sind bedingt durch ihre Beschaffenheit, ihre Grösse und ihren Sitz. Spitzige Gegenstände verursachen durchweg das Gefühl stechender Schmerzen beim Schlucken und Sprechen; sie haben Verletzung der Schleimhaut zur Folge oft mit reactiver Entzündung. Blutung, Oedem, Ulceration, Abscedirung und Fieber und können durch Eröffnung eines Blutgefässes selbst tödtliche Blutungen verursachen. Grössere Fremdkörper, welche in der Pars laryngea stecken bleiben, erzeugen ausser Beschwerden beim Schlucken durch Oedem der Lig. aryepigl. auch noch Athemnoth oder können durch Aufdrücken des Kehldeckels auf den Aditus laryngis Suffocation erzeugen.

Fremdkörper können unglaublich lange Zeit im Rachen und Kehlkopf zurückgehalten werden, ohne besonders schwere Erscheinungen zu machen. In der Regel treibt die Angst den Kranken sofort zum Arzte, mit der Bitte, denselben baldmöglichst zu entfernen, was selbstverständlich nach Constatirung desselben das Rationellste ist.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig, doch darf man nicht vergessen, dass unter Umständen Fremdkörper, namentlich solche in den unteren Abschnitten des Pharynx, grosse Gefahren, ja selbst den Tod zur Folge haben können.

Da bei der Diagnose und Behandlung der Fremdkörper sehr viele Kopflosigkeiten vorkommen, so soll das Wichtigste in Kürze erwähnt werden.

Kommt ein Kranker mit einem Fremdkörper im Halse zum Arzte, so lasse man sich kurz über die Beschaffenheit, Grösse und den muthmasslichen Sitz desselben unterrichten. Wenn auch das Localisationsgefühl im Rachen ein geringes ist, so wird in der Regel doch die Seite, auf der der Fremdkörper steckt, richtig angegeben. Dann unterziehe man den Kranken, eventuell nach Cocaïnisirung, einer sorgfältigen Inspection der Rachenhöhle sowie der laryngoskopischen und rhinoskopischen Untersuchung. Gelingt es auf diese Weise nicht, den Fremdkörper sich zu Gesicht zu bringen, so kann derselbe, wie dies sehr oft der Fall ist, bereits den Rachen wieder verlassen haben, verschluckt oder ausgeräuspert worden sein; der Kranke empfindet eben wohl auch aus psychischen Gründen die Folgen der Verletzung unter Umständen noch sehr lange Zeit (traumatische Parästhesie). Bevor man aber dieses Urtheil abgibt, wobei man niemals vergessen soll, dass zwei Fremdkörper hineingelangt sein können, von denen nur der eine bereits wieder entfernt, der andere aber noch gegenwärtig ist, versäume man auf keinen Fall, mit dem Finger alle Theile des Rachens auf das Genaueste zu palpiren und die Sinus pyriformes und den Oesophagus mit Steinsonden zu sondiren. Sehr oft gelingt es so, tief in die Mandeln und Schlundwände eingespiesste Fremdkörper zu entdecken und zu entfernen; das Gefühl gibt, namentlich bei kleinen Fremdkörpern, sicherere Anhaltspunkte als das Auge.

Die Entfernung spitziger, kantiger Gegenstände geschieht am einfachsten mittelst gekrümmter Kehlkopfzangen oder Pincetten; für Fremdkörper der Pars oralis genügt eine einfache längere Pincette oder Kornzange.

Rundliche Gegenstände, wie Glasperlen, Münzen, Knöpfe, müssen, wenn sie im Sinus pyrif. liegen, zuweilen erst mit hakenförmig gekrümmten Sonden gelockert und in andere Lage gebracht werden, ehe sie mit Zangen etc. extrahirt werden können. Aeusserst schwierig, ja oft unmöglich ist die Entfernung von Fischgräten, Nähnadeln und anderer spitzer kleiner Gegenstände in der Tiefe des Sinus pyriformis oder im Niveau des Ringknorpels und im Anfangstheile des Oesophagus, d. h. an allen jenen Theilen, an welche das Auge nicht hinzudringen

vermag. Man hüte sich hier vor allzu energischen oder allzu lange fortgesetzten Extractionsversuchen.

Weiche Körper, besonders Speisetheile — Brod, Gemüse, Fleisch —, welche im Anfangstheile des Oesophagus stecken blieben, werden am besten mit der Schlundsonde in den Magen befördert; harte, kantige Gegenstände ohneweiters in den Schlund hinabzustossen, ist unverantwortlich; hier müssen unter allen Umständen zuerst biegbare Zangen oder Münzenfänger oder der Schirmprobang oder die Schwammsonde in Anwendung gebraeht werden.

Zeigen sich bedrohliche Erstickungserscheinungen, dann versäume man nieht lange Zeit mit Extractionsversuchen, sondern schreite zur Tracheotomie. Nach Beseitigung der Lebensgefahr kann die Aufsuehung und Extraction des Fremdkörpers mit mehr Ruhe vorgenommen werden. Liegen keine bedrohlichen Erscheinungen vor, dann kann man mit der Extraction zuwarten, zumal sich ein Fremdkörper sehr oft ohne Kunsthilfe lockern und durch Räuspern und Gurgeln eliminirt werden. Spitze Fremdkörper, so namentlich Fischgräten oder Knochenstücke, welche wegen ihrer verborgenen Lage in dem untersten Theile des Pharynx nieht extrahirt werden konnten, verursachen unter Zunahme von Schmerzen und Schluckbesehwerden Fieber und Abscedirung, durch welche sie geloekert und dann oft ohne Anstand weiter befördert werden. Expeetorationen von Blut und übelriechendem Eiter können dabei vorhanden sein, aber auch fehlen. In den sehlimmsten Fällen kommt es zu septischer Phlegmone oder dureh Arrosion grösserer arterieller oder venöser Gefässe zu tödtlicher Blutung. Aeussersten Falles müssen die Fremdkörper mittelst Pharyngotomie oder Oesophagotomie entfernt werden.

Coneremente bilden sich mit besonderer Vorliebe in den Mandeln. Sie sind das Product eines chroniseh verlaufenden desquamativen Processes der Laeunen (M. Sehmidt, Sokolowski) und werden sowohl in atrophischen als aueh in hypertrophisehen Tonsillen angetroffen. Sie stellen gelbgrüne oder weissliche, rundliehe oder längliche Gebilde vor, welehe beim Zerreiben einen äusserst üblen Geruch verbreiten und oft als ausgehustete Tuberkel dem Arzte übergeben werden. Sie ballen sich unter Mitwirkung ausgewanderter Leukoeyten, abgestossener Epithelien und versehiedener Bacterien, so namentlich des Leptothrix bueealis, zu weieheren oder festeren Stüeken zusammen (M. Sehmidt). Sie werden einestheils dadurch, dass sie sich in der Tiefe der erweiterten Lacunen bilden, anderntheils weil sie dureh Sehwellung der Follikel oder dureh strangartige Brücken an der Mündung der Laeunen zurüekgehalten werden, oft erst dann siehtbar, wenn die Kranken würgen oder wenn man auf die Mandeln drüekt, wobei sie nicht selten als wurstartige, Mitessern ähnliche Körper zu Tage treten.

Die Bedeutung der Mandelpfröpfe hat man früher sehr untersehätzt; jetzt weiss man, dass sie ausser üblem Gesehmaek und Geruch

im Munde Parästhesien, so namentlich Drücken, Stechen, Kratzen im Halse, ja sogar, wie Verf. sah, quälende Hustenparoxysmen zur Folge haben. Es ist ferner sicher, dass recidivirende lacunäre und phlegmonöse Anginen der Anwesenheit solcher Pfröpfe in den Lacunen, den Brutstätten der verschiedensten Bacillen, wie sie M. Schmidt nennt, ihre Entstehung verdanken. Bei Sängern und Berufsrednern leidet nicht selten die Stimme sowohl in der Höhe als auch in der Ausdauer.

Wenn auf den Pfröpfen sich Kalk niederschlägt, wozu nach Jacobson und Klebs der Leptothrix buccalis wesentlich beiträgt, dann entstehen die sogenannten Mandelsteine, welche, wenn sie scharf und eckig sind, noch mehr reizen. Sie können eine beträchtliche Grösse erreichen und jahrelang Beschwerden erzeugen, auch führen sie zu Abscess- und Fistelbildung. Die grössten Mandelsteine wurden von Rosenberg und von Lange beobachtet.

Die Diagnose ist dann leicht, wenn die Pfröpfe an der Mündung der Lacunen sitzen oder wenn zeitweise solche abgehen. Ist dies nicht der Fall, dann drücke man auf die Mandel oder führe eine Löffelsonde in die Lacunen ein, wobei man besonders auf den Lieblingssitz der Pfröpfe am oberen Ende der Mandeln achten muss. Verkalkte Concremente können zuweilen mit dem Finger gefühlt werden; einer Verwechslung mit einem abnorm langen Proc. styloid. kann man dadurch vorbeugen, dass man den letzteren nach aussen und oben über die Mandel hinaus verfolgen kann.

Die Behandlung der Concremente ist eine verschiedene, je nach der Beschaffenheit der Mandel. Finden sich in einer grossen Mandel sehr zahlreiche mit Pfröpfen erfüllte Lacunen oder Zerklüftungen, dann ist die Amputation mit galvanokaustischer Schlinge oder Tonsillotom angezeigt; bei normal grossen oder atrophischen Mandeln ist das Beste die zuerst von v. Hoffmann und M. Schmidt geübte Schlitzung. Zweck derselben ist, die Lacunen in offene Halbcanäle umzuwandeln, um den Concrementen das Liegenbleiben unmöglich zu machen. Man geht mit einem scharfen Schielhaken in die Oeffnungen ein, reisst die mediale Wand derselben ein, drückt nach unten durch und zerreisst mit einem Rucke die gebildete Brücke oder die sonst vorhandenen Spangen; derbe Mandeln müssen dabei mit dem Spatel fixirt werden. In einer Sitzung mehr als 3—5mal einzugehen, ist nicht rathsam; oft braucht es mehrerer Sitzungen, bis die Tonsille in Narbengewebe umgewandelt ist. Nicht selten ist es nöthig, vorspringende oder überhängende Theile der Mandel mit scharfer Zange oder Scheere abzuschneiden oder einen Theil des vorderen Gaumenbogens zu reseciren, wenn er eine grosse Lacune verdeckt (Schmidt). Die Verödung der Lacunen durch Galvanokaustik hat sich dem Verf. nicht bewährt.

Die Nachbehandlung besteht in desinficirenden Gurgelungen, bei Schluckweh in Vermeidung von harten oder chemisch reizenden Speisen und Getränken, Genuss von Eis.

Grössere Mandelsteine müssen nach Spaltung der Mandel mit dem Messer, mit der Zange oder löffelartigen Instrumenten herausgeschält werden; ist die Mandel hypertrophisch, dann empfiehlt sich die Amputation, welche hier sicherer mit dem Bistourie vorgenommen wird, da man mit demselben die Steine umgehen kann, was bei dem Tonsillotom nicht ohne Gefahr der Zertrümmerung des Ringmessers möglich ist.

Neubildungen und Geschwülste.

Neubildungen im Rachen nehmen in Bezug auf Häufigkeit eine ziemlich untergeordnete Stelle ein.

Zu den Neubildungen des Nasenrachenraumes werden von Manchen die adenoiden Wucherungen gerechnet; wir haben dieselben als Hypertrophien eines normalen Gewebes betrachtet und früher besprochen. Zu erwähnen sind hier noch die Cysten der Bursa pharyngea, die sowohl klinisch als pathologisch-anatomisch, namentlich von Zahn, Mégevand, Lehmann, Zwirn und Anderen beobachtet sind und die durch Verschluss eines Recessus oder einer Spalte der Rachenmandel entstehen. Die Polypen des Nasenrachenraumes werden gemeinsam mit den Neubildungen der Nase abgehandelt werden.

Relativ häufig ist bei jugendlichen Personen, namentlich im Alter von 10—20 Jahren, aber auch noch später, das Sarkom. Es geht meistens vom Fornix aus und stellt theils eine rundliche, birnförmige, grosse Geschwulst vor, theils eine aus mehreren gelappten, leicht blutenden, hahnenkammartigen Wucherungen bestehende Masse. Dieselbe dringt mit Vorliebe durch die Choanen in die Nase ein und führt zu mehr oder weniger hochgradiger Verlegung, in anderen Fällen wuchert sie gegen den Mundtheil des Rachens zu.

Eine glücklicherweise seltene Geschwulstform, welche sich auch im Mundtheile des Rachens findet, ist das Lymphosarkom. Es geht nach Chiari und Störk immer von einer Gruppe von Lymphdrüsen oder Follikeln aus, verbreitet sich rasch auf die Nachbarschaft und andere Gewebe und macht Metastasen in Orbita, Kieferhöhle, Nase, Gehirn, Kehlkopf und Darm. Die Erkrankung trifft beide Geschlechter im mittleren Lebensalter und beginnt, wie Verf. zweimal sah, theils in der Luschka'schen Tonsille in Form rundlicher, harter Tumoren, bald in der Substanz der Gaumenmandeln oder des weichen Gaumens als hartes Infiltrat, bald in den Halslymphdrüsen als indolente harte Schwellung. Wächst der Tumor im Nasenrachenraum weiter, dann entstehen Verstopfung einer oder beider Nasen, Ohrensausen und Schwerhörigkeit; im Mundtheile des Rachens wirkt er störend auf die Sprache und den Schluckact, der gleichzeitig schmerz-

haft wird. Der Zerfall resp. die Umwandlung der Tumoren in Geschwüre erfolgt bald sehr früh, bald sehr spät und kann zu Verwechslungen mit Syphilis führen, namentlich wenn die Geschwüre theilweise heilen und zu Narbenbildung führen. Der Tod erfolgt entweder durch Weiterwachsen in lebenswichtige Organe oder durch Blutung oder Erschöpfung, zuweilen unter Fieber. Nach Chiari beträgt die Dauer einige Monate bis ein Jahr, doch kann sie, wie in den vom Verf. beobachteten Fällen, auch mehrere Jahre betragen.

Die Diagnose ist nicht schwer, wenn man Sitz, Aussehen und Consistenz der Geschwülste und den klinischen Verlauf in Betracht zieht, zumal da adenoide Wucherungen und Hypertrophien der Mandeln niemals eine solche Härte erreichen; bei der Anwesenheit von Geschwüren sind allerdings Verwechslungen mit Lupus, Syphilis, Tuberculose möglich; absoluten Entscheid gibt die mikroskopische Untersuchung der Geschwulsttheile. Da maligne Lymphome auch als Begleiterscheinung der Leukämie oder der Pseudoleukämie vorkommen, so untersuche man das Blut, die Milz und die übrigen Lymphdrüsen.

Sehr selten sind Neubildungen auf der Hinterwand der Pars oralis, besonders Teratome oder behaarte Polypen, wie solche von Arnold, Conitzer, Schuchardt, Lambl, Fort, Clérault und Anderen beschrieben wurden.

Ein Lieblingssitz der Neubildungen ist der weiche Gaumen; Schleimcysten, Fibrome, Lipome, Papillome, Angiome, besonders an der Uvula und den Gaumenbögen, gehören zu den relativ häufigsten Geschwülsten; zu den Seltenheiten hingegen gehören die Myxome und Adenome. Die letzteren, auch als abgekapselte Drüsenepitheliome bekannt, sitzen constant seitlich von der Mittellinie der Vorderfläche des Gaumensegels; sie entwickeln sich aus submucösen Drüsen und gehen mit den benachbarten Geweben keine Verwachsungen ein. Ihre Oberfläche ist glatt oder leicht höckerig, ihre Consistenz derb-elastisch, ihre Grösse schwankt zwischen der einer Haselnuss und eines Hühnereies; sie stecken in einer fibrösen Kapsel, welche ihre Ausschälung sehr erleichtert.

Zu den Seltenheiten gehören primäre Carcinome, sowie Medullarsarkome des weichen Gaumens; sie stellen theils flache oder leicht höckerige Infiltrate, theils unebene, knotige Verdickungen dar, welche zuweilen auf der Hinterfläche des Velum entspringen und so einige Zeit der Diagnose entgehen können. Im weiteren Verlaufe bilden sich auf den Infiltraten und Knoten Ulcerationen und Zerstörungen, während in der Nachbarschaft neue Knoten entstehen, durch deren Zerfall der weiche Gaumen durchlöchert oder zerstört wird; sehr häufig setzt sich die Neubildung auf die seitliche Rachenwand und die Mundhöhle fort. Einmal sah Verf. ein Carcinom aus einem leukoplakischen Flecke der Velumschleimhaut sich entwickeln. Von Adolf Schmidt wurde ein Alveolarsarkom des weichen Gaumens bei einem 12jährigen Knaben beobachtet und mit Erfolg operirt. Hajek sah ein Sarkom des weichen Gaumens central erweichen und zu Verwachsung mit peritonsillärem Abscess führen.

Nicht selten werden auch die Gaumenmandeln befallen, wie es scheint, mehr von bösartigen Neubildungen, Sarkomen, Cancroiden, Epithelialcarcinomen, doch kommen auch alle gutartigen Neoplasmen, breitaufsitzende oder gestielte Fibrome, Cysten, Echinococcus, Fibroenchondrome, Atherome vor.

Relativ selten sind die tieferen Abschnitte des Rachens Sitz von Geschwülsten. Noch jetzt gelten die Mittheilungen von Luschka und Sommerbrodt über Papillargeschwülste und die von Ehrendorfer, Schäffer und v. Felix über Sarkome als Raritäten. Dagegen befällt der Krebs mit Vorliebe die Pars laryngea. Die Form, in der er auftritt, ist sehr verschieden, bald als flaches Infiltrat der Seitenwand, bald als höckerige Geschwulst der Hinterwand, bald als Geschwür. Nicht gar selten entwickelt sich das Carcinom in dem tiefsten Abschnitte des Schlundes, hinter dem Ringknorpel oder mehr seitlich in dem Sinus pyriformis.

Sehr seltene Geschwülste sind Aneurysmen der Art. palatina und varicöse Erweiterungen der Rachenvenen. So sah Verf. einmal eine kolossale Vergrösserung der Uvula in Folge von bleistiftdicken Veneetasien, die sich durch Pressen und Husten noch mehr vergrösserten.

Die Erscheinungen, welche Neubildungen des Rachens verursachen, sind bedingt durch ihren Sitz, ihre Grösse und Form. Geschwülste im Nasenrachenraum können, so lange sie klein sind, symptomlos verlaufen; wachsen sie, dann machen sie die Erscheinungen der nasalen Obstruction oder auch Hörstörungen, bei noch weiterer Ausbreitung wölben sie das Gaumensegel nach vorne und kommen in der Pars oralis zum Vorschein. Grössere Neubildungen an dem Velum, den Tonsillen verursachen ausser Schluckbeschwerden Störungen der Sprache, eventuell sogar Athemnoth. Bösartige Neubildungen der Tonsillen, des Velum und der seitlichen Schlundwand erzeugen nach Krönlein stets, meistens schon sehr frühzeitig, heftige lancinirende Ohrenschmerzen. Das Carcinom der tieferen Rachenabschnitte kann ohne eigentlichen Sehmerz, nie aber ohne Schluckbeschwerden verlaufen. Schon sehr frühzeitig haben die Kranken das Gefühl eines Hindernisses, des Steckenbleibens der Speisen. Sie suchen das Genossene durch Trinken weiter zu befördern, neben vermehrtem Bedürfniss zum Schlucken und Ausräuspern des sich massenhaft ansammelnden Schleimes.

Bei Zerfall der Neubildung treten Foetor ex ore, seeundäre Lymphdrüsenschwellung und Abmagerung, zuweilen auch Blutungen auf. Gar nicht selten wuchern Carcinome des untersten Pharynxabschnittes auf den Larynx weiter oder sie verdrängen denselben oder geben durch Druck auf den Ringknorpel resp. durch Lähmung der Glottisöffner zu Dyspnoe oder bei Druck auf den Recurrens zu Heiserkeit Anlass. Bei vollständiger Verlegung des Oesophaguseinganges tritt, wenn nicht operativ eingegriffen wird, der Hungertod ein.

Die Diagnose ist, zumal für den im Rhinoskopiren und Laryngoskopiren Geübten, in der Regel nicht besonders sehwer,

doch können Carcinome in den tiefsten Abschnitten des Schlundes nicht gesehen werden; man achte deshalb sorgfältigst auf allenfallsige Lymphdrüsenschwellungen und versäume in verdächtigen Fällen niemals, mit der Schlundsonde zu untersuchen. Schwierig ist zuweilen die Bestimmung der Geschwulst in Bezug auf ihren histologischen Bau.

Zerfallende bösartige Neubildungen können ferner zu Verwechslungen mit syphilitischen, tuberculösen und anderen Geschwüren Anlass geben, besonders wenn der für Krebsgeschwüre charakteristische Befund: das Besetztsein der Ränder und des Grundes mit Geschwulsttheilen in Form von Knoten oder papillären Wucherungen, fehlt. In zweifelhaften Fällen kann nur der therapeutisehe Versuch oder die mikroskopische Untersuchung exstirpirter Geschwulsttheile oder des Geschwürsgrundes Sicherheit geben (Eugen Fränkel).

Die Prognose richtet sich nach dem Sitze, der Grösse und histologisehen Beschaffenheit. Dass Sarkome und Careinome eine schlechte Prognose geben, ist natürlich. Eine Ausnahme bildet das juvenile Sarkom, da dasselbe sieh erfahrungsgemäss spontan zurückbilden kann.

Die Behandlung kann nur eine operative sein. Kleine, gestielte Neubildungen entfernt man mit der kalten Schlinge, der Scheere oder dem Kehlkopfringmesser, grössere und breit aufsitzende mit der galvanokaustisehen Schlinge, flaeh aufsitzende mit dem scharfen Löffel mit nachträglieher Cauterisation, sehr grosse Angiome oder Sarkome mit der Elektrolyse (Keimer). Dass der mit der laryngoskopischen Teehnik Vertraute beträchtlich im Vortheile ist, ist selbstverständlich.

Bei bösartigen Neubildungen sind je nach Umfang und Sitz schwere chirurgische Eingriffe, Exstirpation der Mandel und des weichen Gaumens, Resection des Unterkiefers, seitliche Eröffnung des Pharynx nothwendig, doch sind Recidiven äusserst häufig; in Fällen, bei denen die Operation unmöglich ist, beschränke man sich auf eventuelle Auskratzung oder galvanokaustische oder elektrolytische Verkleinerung, auf passende Ernährung, Anwendung der Schlundsonde, Nährelystiere; im äussersten Falle schreite man zur Oesophagotomie. M. Sehmidt hält bei inoperablen Fällen parenchymatöse Einspritzungen von Methylenblau oder 2% Lösung von Sublimat in Oel für wünsehenswerth, zumal manehmal daranf doch Besserung oder längerer Stillstand beobachtet wird. Bei Sarkomen, namentlich Lymphosarkomen, sieht man zuweilen Besserung oder längeren Stillstand dureh innerliehen Gebrauch von Arsenik.

Zu den Gesehwülsten des Rachens gehört auch das Emphysem und die retropharyngeale Struma.

Das Emphysem entsteht am häufigsten durch Verletzungen der Schleimhaut, namentlich nach ungeschiekter Katheterisirung der Tuba. Es hat demgemäss auch seinen Hauptsitz im Nasenraehenraum

und dessen nächster Umgebung. Es kann sich von den Seitenwänden auf das Gaumensegel, die Uvula und Hinterwand der Pars oralis, ja selbst bis zum Kehlkopfe herab erstrecken, nicht selten auch auf die äussere Haut des Halses, des Gesichtes und Oberkörpers.

Die Erscheinungen bestehen in Schlingbeschwerden, Gefühl eines Fremdkörpers, Schwerathmigkeit. Objectiv äussert sich dasselbe durch die Anwesenheit durchsichtiger weissgelber Blasen, welche comprimirt ein knisterndes Geräusch geben. Meist bilden sich dieselben nach einigen Tagen spontan zurück; doch erscheint es bei besonderer Hochgradigkeit der Beschwerden angezeigt, die Blasen zu eröffnen, narkotische Gurgelwässer zu verordnen oder mit Cocaïn zu pinseln und dem Kranken das Schneuzen und Räuspern zu verbieten, da durch diese Manipulationen neue Blasen entstehen und die schon vorhandenen sich vergrössern.

Die Struma retropharyngea, auch accessoria, retro-oesophagea genannt, entwickelt sich aus einem präformirten Hinterhorn der Schilddrüse, welches vom oberen, manchmal auch unteren Pol der Seitenlappen nach hinten und innen in den retrovisceralen Spaltraum in der Höhe des Kehlkopfeinganges vordringt.

Da sich die Krankheit allmälig entwickelt, so können längere Zeit alle Erscheinungen fehlen. Nach und nach stellen sich nun Hindernisse beim Schlingen ein, indem festere Speisen und grössere Bissen schwer geschluckt oder wieder ausgewürgt werden, während kleinere sowie flüssige noch gut passiren, bis auch diese nicht mehr geschluckt werden können. Meist ist das Gefühl eines Fremdkörpers im Halse, starke Verschleimung und häufiges Bedürfniss zum Räuspern sowie weit hörbares Schnarchen und Rasseln im Schlafe, selten Schmerz vorhanden. Bei sehr blutreichen oder ulcerirten bösartigen Strumen können zeitweise heftige Blutungen auftreten, welche den Verdacht einer Lungenaffection erwecken. Mit dem weiteren Wachsthum der Geschwulst stellen sich Respirationsbeschwerden ein, die sich bei Körperbewegung oder gewissen Stellungen des Kopfes steigern. Nach Kaufmann treten zuweilen plötzliche Erstickungsanfälle auf, welche wahrscheinlich durch interstitielle Blutung und momentane Volumzunahme der Geschwulst bedingt sind. Durch Compression der V. jugulares entstehen Kopfschmerz, Schwindel, Ohrensausen, Funkensehen und Cyanose des Gesichts; durch Druck auf die Kehlkopfnerven kann Heiserkeit, durch Druck auf die Ringknorpelplatte Lähmung der Glottisöffner entstehen. Sehr selten ist die retropharyngeale Struma maligner Natur. So beobachtete Verf. einmal eine carcinomatöse Degeneration des retropharyngealen Theiles eines Kropfes, dessen mittlerer und linker Lappen völlig normal waren; die Kranke starb an ausgebreiteten Krebsmetastasen in beiden Lungen.

Die objective Untersuchung lässt im Spiegelbilde eine mehr oder weniger beträchtliche Hervorwölbung der hinteren und seitlichen Wand, zuweilen eine fast völlige Ausfüllung des unteren Rachenabschnittes erkennen, die Geschwulst ist rund, zuweilen sehr

gefässreich, von glatter, kugeliger Oberfläche, der Larynx mehr oder weniger zur Seite gedrängt, die Lig. aryepigl. gegen das Larynxinnere vorgewölbt, die Glottis verengt, ebenso der Eingang zur Trachea und dem Oesophagus. Die Palpation ergibt, dass die Geschwulst auf Druck unempfindlich und von der Consistenz der gewöhnlichen Struma ist und sich beim Schlucken mit der aussen am Halse befindlichen Geschwulst hebt.

Nach Kaufmann ist das sicherste Zeichen, dass der Tumor durch den palpirenden Finger nur nach einer Seite verschiebbar oder vollständig aus dem Rachen verdrängbar ist und aussen am Halse in der Höhe der Schildknorpelplatte zum Vorschein kommt.

Die Diagnose stützt sich auf den erwähnten Befund und auf den Umstand, dass die vom Periost der Wirbel oder dem prävertebralen Bindegewebe ausgehenden Geschwülste und Abscesse beim Schlucken nicht oder nur andeutungsweise in die Höhe steigen und sich nach beiden Seiten verschieben lassen. Ausserhalb jeglichen Zweifels liegt die Diagnose dann, wenn sich das Verbindungsstück des retropharyngealen Tumors mit der seitlichen Schilddrüsengeschwulst palpatorisch nachweisen lässt.

Die Prognose ist eine ungünstige; denn wenn auch die Beschwerden lange Zeit fehlen oder geringfügig sind, so treten doch meist im späteren Verlauf lebensbedrohliche Erscheinungen auf.

Die Behandlung ist eine palliative und eine radicale. Jedenfalls ist, vorausgesetzt, dass die Beschwerden nicht schon sehr hochgradig sind, eine energische innerliche Jodcur zu versuchen; man kann mit derselben die von M. Schmidt vorgeschlagene Eisbehandlung mittelst des Leiter'schen Kühlapparates oder der bequemeren Eiscravatte combiniren. Bei hochgradigen Schlingbeschwerden muss die Ernährung mit der Schlundsonde geschehen, bei Dyspnoe die Tracheotomie ausgeführt werden. Um das Uebel radical zu heilen, schlug man parenchymatöse Jodinjectionen vom Munde aus vor; bei der niemals ausbleibenden reactiven Schwellung muss jedoch namentlich bei schon bestehenden Respirationsbeschwerden dringend vor denselben gewarnt werden; es könnte in wenigen Stunden Asphyxie auftreten. Dass selbst durch eine einfache Probepunction Athembeschwerden und durch Abscedirung Tod durch Pyämie eintreten können, beweist ein von Chiari mitgetheilter Fall. Da auch die Exstirpation der Geschwulst vom Rachen aus unthunlich und ungenügend erscheint, so bleibt nur die Exstirpation von aussen übrig. Nach Kaufmann wird dieselbe folgendermassen ausgeführt:

Durch einen Schnitt, welcher vom vorderen Rand des Kopfnickers die Haut, das Platysma und die Fascie durchtrennt, kommt man auf den M. omohyoideus, der entweder nur am Rande oder ganz getrennt wird; sodann wird die Art. thyreoid. sup. doppelt unterbunden und durchschnitten. Jetzt wird der Tumor vom Rachen aus vorgedrängt, die ihn noch überdeckende Fascie wird sammt seiner Kapsel so weit als möglich gespalten und die Ausschälung mit dem Finger vorgenommen, der noch übrig bleibende Stiel wird unterbunden und der seitliche Schilddrüsenlappen exstirpirt.

Nervenkrankheiten.

Bei dem ausserordentlichen Reichthum des Rachens an Nerven ist es nicht auffallend, dass Krankheiten derselben ganz gewöhnlich sind.

Wir beginnen, der Eintheilung der Nerven in sensible und motorische treu bleibend, mit den Sensibilitätsneurosen des Rachens.

Anästhesie der Rachenschleimhaut kann centralen und peripheren Ursprungs sein. Unter den centralen Störungen spielen Blutungen, den Vagus und Glossopharyngeus comprimirende Tumoren des Gehirns, encephalitische Herde, Sclerosen und Atrophien, Bulbärparalyse, Lateralsclerose die Hauptrolle. Nebstdem kommt Anästhesie des Rachens auch vor nach epileptischen Anfällen, im asphyktischen Stadium der Cholera, namentlich aber bei Hysterie; Jurasz sah dieselbe einmal in Verbindung mit motorischer Lähmung nach croupöser Pneumonie. Unstreitig am häufigsten ist sie Nachkrankheit der Diphtherie. Ferner können gewisse Medicamente, besonders Cocaïn, Morphium, Chloral, Bromkali, Carbolsäure, Menthol, bei localer und interner Application die Empfindlichkeit der Schleimhaut herabsetzen. Nach Fr. Seitz bleibt Anästhesie des Rachens manchmal nach Influenza zurück.

Die subjectiven Erscheinungen bestehen zuweilen in einem Gefühle von Pelzigsein im Halse, öfters in Verbindung mit Schmerzgefühlen (Anaesthesia dolorosa). Meist fehlen jedoch alle Beschwerden.

Die Diagnose lässt sich nur durch die objective Untersuchung stellen. Bei halbseitiger Anästhesie ist die betreffende Rachenhälfte gegen mechanische, thermische oder chemische Reize unempfindlich, in der Regel sind auch die Reflexe aufgehoben oder herabgesetzt; bei Doppelseitigkeit der Erkrankung ist die Schleimhaut überall und vollständig empfindungslos. Sehr oft combinirt sich die diphtheritische Anästhesie mit halb- oder doppelseitiger Anästhesie und motorischer Lähmung des Kehlkopfes.

Die Behandlung richtet sich nach der Ursache; bei diphtheritischer Grundlage ist, wenn auch der Larynx sensibel oder motorisch mitgelähmt ist, die künstliche Ernährung mittelst der Schlundsonde eventuell durch subcutane Nährinjectionen und ernährende Clystiere zur Verhütung der Speisepneumonie unerlässlich; leider scheitert dieselbe nicht nur zu oft an der Widerspenstigkeit und Unvernunft kleiner und grosser Patienten, sondern schützt auch nicht absolut vor der Gefahr. Ausserdem empfiehlt sich die locale Application der Elektricität, sowohl des constanten als inducirten Stromes mittelst der Ziemssen'schen Doppelelektrode. Die von Ziemssen in die Praxis eingeführten subcutanen Injectionen von Strychnin, 0·001 bis 0·005 pro dosi, wirken oft noch dann, wenn alle anderen Mittel im Stiche lassen.

Unter Hyperästhesie versteht man eine gesteigerte Reizbarkeit des Rachens, welche durch einen centralen oder peripheren Reiz zu Stande kommt; durch einen solchen Reiz wird eine gesteigerte Empfindung hervorgerufen, die entweder als Schmerz wahrgenommen oder von Reflexerscheinungen, so namentlich von Husten, Würgen, Erbrechen, explosivem Aufsteigen von Magengasen, begleitet wird. Die Hyperästhesie des Rachens ist eine ganz gewöhnliche Erscheinung, wie man sich täglich bei der laryngoskopischen oder rhinoskopischen Untersuchung überzeugen kann; sie ist oft so hochgradig, dass nicht nur die Berührung, sondern schon die Annäherung eines Gegenstandes an den Rachen, ja schon das Oeffnen des Mundes und Herausstrecken der Zunge die heftigsten Reflexe hervorruft. Sie ist sehr häufig bei völlig Gesunden, ferner bei Fettleibigen, Trinkern, Rauchern, Bonvivants, nervösen Personen; ausserdem müssen örtliche Erkrankungen des Rachens, acute und chronische Katarrhe, allgemeine Hyperästhesie und psychische Erregungen, ganz besonders aber die Lungenphthise als ätiologische Momente erwähnt werden.

Die Affection ist einer radicalen Therapie sehr schwer zugänglich; palliativ empfiehlt sich am meisten das Cocaïn in 5—20% Lösung zur Pinselung, ferner das Menthol, Chloralhydrat, Bromkali, letzteres innerlich und als Spray, ferner Gurgelungen mit kaltem Wasser, Tannin, Alaun.

Neuralgie des Rachens ist in ihrer reinen Form selten, doch hat Verf. eine ziemliche Anzahl solcher Fälle gesehen; sie betrafen einige Male ganz gesunde Männer, hauptsächlich aber hysterische Frauen, welche bei völliger Intactheit der Schleimhaut über blitzartig durchschiessende, von der hinteren oder seitlichen Rachenwand in die Gaumenbögen, Zunge, Nasenrachenraum und Kehlkopf ausstrahlende, in Anfällen auftretende Schmerzen klagen. Fast immer liessen sich Schmerzpunkte an den Seitentheilen der Zunge, an den Mandeln oder aussen am Zungenbein oder am Kehlkopfe, dem Eintritt des N. laryngeus superior entsprechend, nachweisen.

Die häufigste aller Sensibilitätsstörungen ist die Parästhesie.

Man versteht darunter abnorme Empfindungen, welche sich meist als Brennen, Drücken, Kitzeln, Kratzen, Trockenheit, Wundsein, namentlich aber als Gefühl der Anwesenheit eines Fremdkörpers im Rachen äussern. Hinsichtlich des letzteren begegnet man je nach dem Bildungsgrade und der Beschäftigung der Kranken den mannigfaltigsten Verschiedenheiten; bald ist es Schleim, ein Knochenstück oder eine Gräte, ein Haar, eine Borste, eine Haut, eine Glasscherbe, bald eine Nadel, ein Stückchen hartes Brod oder Watte oder eine Federspule oder ein Sandkorn oder Staubtheile, die im Halse stecken sollen. Am häufigsten ist bei Hysterischen oder Nervösen beiderlei Geschlechtes das Gefühl eines auf- und absteigenden Gegenstandes (Globus

hystericus) oder Klagen über brennende Schmerzen oder über ein Gefühl eisiger Kälte während des Einathmens. Wieder andere Kranke haben das Gefühl, als würden sie am Halse gedrosselt oder als ob der Schlund sich zusammenziehe und ihnen der Athem ausgehe; wieder andere klagen über Schmerzen beim Sprechen, die sich schon nach kurzer Zeit ohne Ueberanstrengung der Stimme einstellen und das Weitersprechen unmöglich machen. Die meisten Kranken glauben, die Halsschwindsucht oder sonst eine unheilbare Krankheit zu haben und quälen unaufhörlich den Arzt, sie ja recht genau zu untersuchen, da er sicherlich etwas im Rachen finden würde, was er bisher übersehen; sie inspiciren tagtäglich, ja stündlich ihren Rachen, betasten den Kehlkopf und werden durch das bei der Verschiebung desselben beim Schlucken auftretende Geräusch zur Verzweiflung gebracht, oder sie führen den Finger in den Rachen und halten die Epiglottis für einen steckengebliebenen Fremdkörper oder die Papillae circumvallatae für Krebswucherungen. Die erwähnten Sensationen sind entweder beständig vorhanden oder nur zeitweise, so namentlich während des Sprechens; in heiterer Gesellschaft und bei Zerstreuung vergessen hingegen die meisten Kranken ihr Leid.

Parästhesie des Rachens kommt sowohl bei pathologischen Veränderungen als auch ohne dieselben vor.

So ist Parästhesie die constante Begleiterin des chronischen Rachenkatarrhs, namentlich der Pharyngitis sicca, granulosa und lateralis hypertrophica, des Bursitis, Pharyngomycosis leptothricia, Fremdkörper, der Geschwüre und sich retrahirenden Narben, ebenso trifft man sie häufig bei Concrementbildung in den Mandeln oder nach spontaner oder künstlicher Entfernung von Fremdkörpern oder im Gefolge von äusserst geringfügigen Veränderungen der Schleimhaut. Man darf ferner nicht vergessen, dass auch pathologische Veränderungen der Nase, des Nasenrachenraumes und der Zähne auf reflectorischem Wege abnorme Sensationen im Rachen zur Folge haben können. Nach Swain soll die häufigste Ursache des Globus hystericus die Hypertrophie der Zungenbalgdrüsen sein, was aber nur zuweilen zutrifft. Dagegen können Veränderungen des Kehlkopfes speciell Entzündung der Regio interaryt., des Kehldeckels, Affectionen der Cricoarytaenoidalgelenke, Neuralgie des N. lar. super. Rachenparästhesie vortäuschen. Reine, von Schleimhauterkrankungen unabhängige Parästhesie kommt vor bei Anämie, Chlorose, Hysterie, Uterin- und Ovarialerkrankungen, beginnender Phthise, Neurasthenie, Hypochondrie, in letzterem Falle, wie Verf. mit Jurasz bestätigen kann, oft in Folge der Lectüre medicinischer Bücher oder der Furcht vor Diphtherie, Krebs oder Wiederausbruch geheilter alter Syphilis, Halsschwindsucht. Am stärksten werden jene Stände befallen, deren Beruf den ausgiebigen Gebrauch der Stimmorgane erfordert, ebenso uterinleidende Frauen oder alte Jungfern, leicht erregbare Personen beiderlei Geschlechtes. Selten ist Parästhesie durch entzündliche Veränderungen der Nerven oder durch Gehirnkrankheiten, so namentlich Bulbärparalyse, oder durch Erkrankungen der Medulla oblongata bedingt.

Möglich ist jedoch, dass trophische Störungen der Nerven, welche dem Auge nicht sichtbar sind, die Ursache der Parästhesie abgeben. Endlich können nach Sinogew auch Erkrankungen des Gehörganges Parästhesie des Rachens im Gefolge haben.

Die Diagnose stützt sich auf den objectiven Befund, d. h. auf die An- oder Abwesenheit materieller Veränderungen. In letzterem Falle ist es nöthig, die Schleimhaut mit der Sonde methodisch abzutasten, um den Sitz der krankhaften Sensation festzustellen. Man beginne mit der Untersuchung der Gaumenmandeln, wobei man in erster Linie auf Mandelpfröpfe zu fahnden hat, dann untersuche man die seitliche Halsgegend von den Tuben bis hinab zum Kehlkopf, auch besichtige man genau die Nase und den Kehlkopf. Manchmal gelingt es erst nach wiederholten Untersuchungen, die Ursache der Parästhesie zu entdecken, manchmal auch gar nicht. Gewöhnlich können die Kranken die schmerzhafte Stelle bezeichnen, wenn sie mit der Sonde berührt wird; zuweilen sind mehrere schmerzhafte Stellen vorhanden Verwechslungen mit Rheumatismus oder Halsmuskelschwellungen von Lymphdrüsen oder der Schilddrüse können bei aufmerksamer Untersuchung vermieden werden.

Der Verlauf ist ein sehr chronischer; es gibt keine Affection, welche die Geduld des Patienten und Arztes härter auf die Probe stellte als diese, namentlich wenn sich keine materiellen Veränderungen vorfinden.

Die Behandlung der Parästhesie und Neuralgie soll zuerst eine causale sein; Rachenkatarrhe, Hypertrophien der Zungenbalgdrüsen, Geschwüre und Concremente in den Mandeln. Pilzwucherungen und anderweitige, selbst unscheinbare Localerkrankungen, sowie Anämie, Chlorose müssen beseitigt werden. Freilich besteht nicht selten auch nach der sorgfältigsten Beseitigung pathologischer Veränderungen die Parästhesie weiter. Oefters gelingt es, Hypochonder und Furchtsame durch vernünftige Belehrung oder Wegnahme der jetzt massenhaft circulirenden populär-medicinischen Schundliteratur gründlich und dauernd zu heilen. Bei allgemeiner Nervosität oder bei Hysterie empfiehlt sich der innerliche Gebrauch der Nervina, wenn dieselben auch meist nur vorübergehende Erleichterung gewähren, so besonders des Bromkali 3·0 bis 5·0 pro die, ferner des Zinc. valer., des Antipyrin, Phenacetin und des Arseniks; Roth empfiehlt gegen Globus hyster. viermal täglich 20 Tropfen von Tinct. rad. Pyrethri. Gute Erfolge sieht man zuweilen von leichten hydropathischen Curen, Abreibungen, Waschungen, lauwarmen Bädern mit kalten Uebergiessungen, Douche-, Salz- oder Seebädern. Jedenfalls ist auch ein Versuch mit der Galvanisation angezeigt; man legt den positiven Pol an den weichen Gaumen oder die Hinterwand, den negativen an die Haut des Halses in die Gegend des Zungenbeines, des Laryngeus superior oder auf den Schmerzpunkt; Andere empfehlen das Anlegen der Elektroden in umgekehrter Weise. Vor der inneren oder subcutanen Anwendung der Narcotica muss dringend gewarnt werden, zumal dieselben fast immer im Stiche lassen und man obendrein noch Gefahr läuft, die Kranken zu Morphi-

nisten zu machen. Dagegen ist ein Versuch mit Menthol- oder Cocaïnbepinselungen gerechtfertigt; wenn auch durch Cocaïn selbst wieder eine künstliche Parästhesie erzeugt wird, welche den Kranken zuweilen weit unangenehmer erscheint als die originäre, so können doch nicht selten durch das Cocaïn die abnormen Sensationen definitiv beseitigt werden. Auch Brunnen- und Badecuren, so namentlich solche in Ems, Gleichenberg, Karlsbad, Vichy, Kissingen, Marienbad, Schwalbach, der Aufenthalt in einem Seebade oder an einem Höhencurort, z. B. St. Moritz, Engelberg etc., sind zuweilen von gutem Erfolge. Nach Réthi soll auch bei den centralen Formen von Parästhesien, wenn keine Veränderungen der Schleimhaut vorhanden sind, die locale Behandlung der empfindlichen Stellen mit Lapis mitigatus von Nutzen sein.

Als secretorische Neurose — Hypersecretio pharyngis nervosa — ist ein Zustand zu bezeichnen, der äusserst häufig vorkommt und der darin besteht, dass Individuen mit völlig normalen Schleimhäuten über vermehrte Schleimsecretion und Schleimansammlung im Rachen, Nasenrachenraum oder Kehlkopf klagen; sie müssen häufig schlucken und ausspucken oder am Morgen das geschluckte Secret erbrechen. Objectiv lässt sich, wenn auch nicht constant, eine geringere oder grössere Menge gewöhnlichen schaumigen Schleimspeichels constatiren oder man sieht bei längerer Beobachtung das Velum mit grossen Tropfen von Schleim sich bedecken. Nicht selten beruht die Verschleimung auf Einbildung oder ist Folge psychischer Erregungen.

Die Therapie ist in der Regel erfolglos und verschwindet die Affection zuweilen spontan nach verschieden langem Bestande oder nach der Ermahnung an die Kranken, sich aus dieser Erscheinung nichts zu machen, da sie völlig ungefährlich sei. B. Fränkel empfiehlt innerlich Belladonna.

Als vasomotorische Neurose ist die bei einzelnen weiblichen Personen regelmässig zur Zeit der Menses auftretende und mit allen subjectiven und objectiven Erscheinungen der katarrhalischen Angina verlaufende Entzündung der Tonsillen und deren Umgebung aufzufassen (Angina vasomotoria, sympathetica). Verf. sah dieselbe auch alterniren mit Bronchialasthma, Hemicranie und Cardialgie. Steigert sich die Fluxion noch mehr, dann kann es zu Oedem kommen.

Zu den vasomotorischen Neurosen gehört ferner die von Rossbach beobachtete plötzlich auftretende, einige Minuten bis eine halbe Stunde dauernde und dann einer normalen Färbung Platz machende Röthung und Injection der Rachenschleimhaut. Die betreffenden Personen litten an ausgesprochener Hyperästhesie des Schlundes; wenn auch ein unmittelbarer Zusammenhang der letzteren

mit der stärkeren Injection der Schleimhaut nicht nachgewiesen werden konnte, so glaubt Rossbach doch, dass zwischen beiden Zuständen insoferne ein Zusammenhang besteht, als die sensiblen wie die vasomotorischen Halsnerven und deren Centren in gleicher Weise ausserordentlich leicht erregbar waren.

Fast ebenso häufig wie die Störungen der Sensibilität sind die der Motilität.

Krämpfe der Constrictoren gehören zu den selteneren Erkrankungen. Manchmal kommen sie im Verlaufe des chronischen Rachenkatarrhs, relativ am häufigsten bei Granulationen oder Hypertrophie der Seitenstränge oder bei Mandelpfröpfen und entzündlichen Processen am Zungengrund oder Helminthiasis vor, ferner bei Kranken, welche an Dyspepsie oder Magendarmaffectionen leiden, ferner bei Hysterischen, Hypochondern, Onanisten oder Solchen, welche glauben, von einem wüthenden Hunde gebissen worden zu sein. Bei den verschiedenen Formen des Tetanus sind sie ziemlich häufig, bei Hundswuth fehlen sie niemals und werden hier die Anfälle schon durch den blossen Anblick des zu Geniessenden oder den Gedanken an eine Schluckbewegung hervorgerufen. Selten sind Schluckkrämpfe Folgen von Gehirnkrankheiten, so besonders von Reizzuständen, Hyperämien und Tumoren des Gehirns und seiner Häute. Am häufigsten sind sie tonische, namentlich bei Hysterischen (Dysphagia hysterica), auch wird in der Regel die Musculatur des Oesophagus mitergriffen (Oesophagismus).

Durch jeden Krampf der Schlingmuskeln wird das Schlucken resp die Weiterbeförderung der Speisen mehr oder weniger behindert. Bei der Dysphagia hysterica wird das Geschluckte entweder plötzlich unter schmerzhaften, drückenden Gefühlen im Halse oder hinter dem Brustbein festgehalten und dann ohne weitere Behinderung hinabgeschluckt oder unter dem Gefühle der Erstickung mit Würgen, Erbrechen, Explosion von Magengasen wieder herausgeschleudert; sehr oft ist das Schlucken fester Substanzen tage-, ja wochenlang absolut unmöglich.

Sehr selten sind Krämpfe der Muskeln des weichen Gaumens.

Bei dem tonischen Krampf wird das Velum fest an die hintere Rachenwand angepresst, wobei die Gaumenbögen entweder senkrecht in die Höhe gezogen werden oder gegen die Mittellinie vorspringen; zuweilen wird auch der Kehlkopf und der Zungenrücken für einige Minuten höhergestellt und das Gesicht von Zuckungen befallen; durch die Abhebung der Tubenwände von einander entsteht Verstärkung der eigenen Stimme, Autophonie. Bei dem klonischen Krampfe betheiligen sich entweder alle oder nur einzelne Muskeln des Velum, wie es scheint mit Vorliebe der Levator und Tensor veli palatini oder der Azygos uvulae. Der weiche Gaumen wird ruckweise, je nach der Stärke der Anfälle 20—140mal in der Minute, nach oben gezogen und an die hintere Rachenwand angestossen, wobei ein eigenthüm-

liches, knackendes oder knisterndes Geräusch entsteht, das dem wechselweisen Oeffnen und Verschliessen der schleimbedeckten Tubenwände seine Entstehung verdankt. Nicht selten lässt sich ein mit dem Heben des Velum isochrones und rhythmisches Vorwölben und Einsinken des Trommelfelles constatiren (Krampf des Tensor tympani).

Aetiologisch kommen Neuralgien des Trigeminus in Folge von Erkrankung seiner Wurzeln (Neurome, Neurogliome des Ganglion Gasseri) oder periphere Reizung seiner Aeste durch Tumoren oder Caries des Siebbeins (Schech), Rhinitis hypertrophica (Seifert), ferner Reizzustände im Bereiche des Accessorius, Glossopharyngeus und Facialis, sowie neuropathische Disposition, Herderkrankungen des Gehirns etc., in Betracht. In einem von Schadewaldt beobachteten Falle traten rhythmische Krämpfe der Gaumen- und Zungenmuskeln bei einer Sängerin ein, die abwechselnd hohe und tiefe Töne geübt hatte.

Die Diagnose der verschiedenen Krampfformen ist nicht immer leicht, namentlich kann die Dysphagia hysterica zu mannigfaltigen Verwechslungen Anlass geben. Von der Lähmung der Rachenmuskeln und des Oesophagus unterscheidet sie sich hauptsächlich durch die Intermittens; die Kranken schlingen manchmal ganz gut, während sie an anderen Tagen nichts hinunterbringen. Die Schlingbeschwerden sind bei Lähmungszuständen meist geringer; während ferner bei Lähmungen die Sondirung sehr leicht von statten geht, indem man gewissermassen mit der Sonde in die Speiseröhre hineinfällt, gelingt sie während eines Krampfes sehr schwer oder gar nicht. Von materiellen Verengerungen des Pharynx oder Oesophagus, namentlich vom Carcinom, unterscheidet sich der Krampf dadurch, dass das Carcinom dem Eindringen der Sonde jedesmal, und zwar mit Zunahme der Krankheit, ein stärkeres Hinderniss bereitet — bei eingetretenem Zerfall wird das Sondiren hingegen öfters wieder leichter —, während beim Krampf in der anfallfreien Zeit die Passage stets frei befunden wird. Auch die Anwesenheit anderer nervöser resp. hysterischer Erscheinungen, wie Aphonie, Parästhesie der Haut und des Schlundes, sowie die ausserordentliche Seltenheit des Oesophaguscarcinoms bei Frauen können zur Diagnose verwerthet werden.

Die Prognose der Krämpfe richtet sich nach ihrer Aetiologie; absolut infaust ist sie bei Lyssa, nahezu infaust bei Tetanus sowie bei den organischen Gehirnerkrankungen; günstig ist sie bei Hypochondrie, Hysterie, Neurasthenie, bei Erkrankungen der Nase oder des Rachens, bei manchen Formen von Trigeminusneuralgie.

Die Behandlung muss sich zuerst nach der Ursache richten. Sehr wichtig ist die Herabsetzung der Reflexerregbarkeit durch warme Bäder, Morphiuminjectionen, Chloral, Bromkali, Valeriana, Asa foetida; die Verbesserung der Constitution durch Eisen, mit oder ohne Arsenik, Kaltwasser- und Lufteuren, die Behandlung localer Veränderungen, Uterinkrankheiten etc. Gegen Dysphagia hysterica erweist sich meist die methodische Einführung der Schlundsonde am wirksamsten: auch ist der galvanische Strom zu versuchen. Wertheimber empfiehlt die methodische Anwendung feingestossenen Eises, anfänglich jede

Viertelstunde; durch mehrwöchentliche Anwendung desselben konnte er einen Fall heilen, der allen anderen Mitteln hartnäckig getrotzt hatte. Bei grosser Intensität der Krämpfe soll nur breiige oder dickflüssige sowie lauwarme Nahrung genossen, eventuell mit der Schlundsonde oder per anum applicirt werden. Auch sind bei anämischer Grundlage Eisen und Arsen und palliativ unmittelbar vor der beabsichtigten Mahlzeit Pastillen aus 0·01 Cocaïn zu versuchen.

Klinisch am wichtigsten sind die Lähmungen der Rachenmuskeln.

Sie sind meist centralen Ursprunges; acute und chronische Krankheiten des Gehirns, Tumoren, Blutergüsse, welche zu Compression des N. vagus. accessorius, glossopharyngeus führen, sowie degenerativ-atrophische Processe des Gehirns und der Medulla, besonders Bulbärparalyse, mag sie doppelseitig oder halbseitig sein, Tabes, progressive Muskelatrophie, sind die häufigsten Ursachen; ebenso haben auch Facialparalyse, was übrigens von Réthi in Abrede gestellt wird, sowie Blei-Intoxication, Influenza, Druck carcinomatöser Lymphdrüsen auf den Vagus und seine Aeste öfters Motilitätsstörungen im Rachen zur Folge. Unter den peripheren Ursachen nehmen Diphtherie und Scharlach die erste Stelle ein, dann schliessen sich örtliche Erkrankungen an, welche durch seröse Durchtränkung und Entzündung sowie Schwielenbildung oder Degeneration der Muskeln (Myositis syphilitica) oder Neuritis Schlingstörungen hervorrufen.

Aeusserst selten geben rheumatisch-traumatische Affectionen, welche die Halsmuskeln treffen, zu Schlundlähmung Anlass. Massei sah Constrictorenlähmung nach Retropharyngealabscessen und starker Pharyngitis granulosa, Réthi betont die nicht seltene Parese des Gaumensegels bei Tonsillarhypertrophie und geschwellten Halslymphdrüsen. Sehr oft sind sensible und motorische Lähmungen gleichzeitig vorhanden.

Die Lähmung des weichen Gaumens ist die häufigste; sie ist einseitig und doppelseitig, unvollständig oder vollständig.

Bei einseitiger Erkrankung steht das Zäpfchen bald nach der gesunden, bald nach der kranken Seite hin, der Gaumenbogen der gelähmten Seite steht meist tiefer und ist die Arcade abnorm gross und breit, jener der gesunden steht höher und ist deren Arcade eng und klein; bei der Phonation tritt deutliche Verziehung des Velum nach der gesunden Seite hin ein. Bei Lähmung der Uvula, einer häufigen Begleiterscheinung acuter Rachen- und Kehlkopfkatarrhe und Stimmbandlähmungen, weicht dieselbe nach der gesunden Seite hin ab. Nach Réthi kann die Richtung, nach welcher das Zäpfchen sieht, nicht zur Bestimmung der kranken Seite verwerthet werden, zumal nicht selten Degeneration einer Hälfte der M. azygos uvulae auch bei ungestörter Nervenleitung stattfinden kann. Bei doppelseitiger Lähmung des Velum hängt die Uvula schlaff herab und zeigt keine Spur von activer Bewegung, während sie von dem Respirationsstrom wie ein

schlaffer Vorhang vor- und rückwärts getrieben wird. Während der Phonation macht sich bei incompleter oder partieller Lähmung ein langsameres und trägeres Hinaufsteigen des Velum sowie eine mangelhafte Annäherung desselben an die Hinterwand bemerkbar; bei completer Paralyse besteht absolute Unbeweglichkeit

Die Beschwerden bei unvollständiger Lähmung des Velum beschränken sich nur auf die Stimme, welche nasal klingt; zuweilen ist nur die Bildung der Nasenlaute unmöglich oder erschwert.

Auffallend sind die Störungen bei completer doppelseitiger Gaumensegellähmung. Die Sprache ist in höchstem Grade nasal (Rhinolalia aperta), bei gewissen Worten nahezu unverständlich; am ausgesprochensten ist die Unverständlichkeit dann, wenn gleichzeitig, wie bei Bulbärparalyse, auch Zungen- und Lippen- oder Kehlkopflähmung besteht. Dass bei der Unmöglichkeit, den Nasenrachenraum von der Mundhöhle abzuschliessen, flüssige Ingesta durch die Nase herausgeschleudert werden, ist leicht zu begreifen.

Lähmung der Constrictoren mit oder ohne Betheiligung des Velum und des Oesophagus wird meist in Folge von Diphtherie, Scharlach, anderen Infectionskrankheiten sowie bei Bulbärparalyse beobachtet; auch kann die progressive Muskelatrophie zuerst die Schlundmuskeln ergreifen. Beschränkt sich die Lähmung auf die Constrictoren, so äussert sich dieselbe erst im Moment des Schluckens. Festere Bissen passiren zwar den Zungenrücken, bleiben aber auf der Zungenwurzel und in den Zungenkehldeckelgruben liegen und müssen, wenn ihre Weiterbeförderung nicht gelingt, der entstehenden Respirationsbeschwerden wegen mit dem Finger entfernt werden. Flüssigkeiten gerathen leicht in den Kehlkopf und erzeugen dort Husten und Erstickungsanfälle. Bei halbseitiger Lähmung sind die Kranken nicht im Stande, auf der gelähmten Seite herabrückende Ingesta zu schlucken; ist der Constrictor pharyng. superior allein gelähmt, so kann, da derselbe mit dem Gaumensegel den Abschluss des Nasenrachenraumes bewirkt, das Genossene durch die Nase heraustreten. Nach Schreiber finden sich bei halbseitiger Lähmung in Folge von Bulbärparalyse ausser den obenerwähnten Veränderungen am Velum noch folgende Anomalien: Auf der gelähmten Seite ist der Rachen glatt und erweitert, auf der gesunden eng und in Längsfalten gelegt; die gelähmte äussere Seite des Halses ist abgeflacht und seicht, die gesunde voll und vorspringend; das grosse Zungenbeinhorn steht auf der gelähmten Seite tiefer und ist schwer durchzufühlen, auf der gesunden Seite steht es höher und ist leicht zu finden; auch das grosse Horn des Schildknorpels steht auf der gelähmten Seite tiefer als auf der gesunden und springt weniger vor. Diese Lageveränderung des Zungenbeines und Kehlkopfes erklärt sich aus dem überwiegenden Zuge des Stylopharyngeus und Constrictor medius und inferior der gesunden Seite.

Die Diagnose der Lähmungen der Rachenmuskeln ist zwar im Hinblick auf die beschriebenen subjectiven und objectiven Erscheinungen eine sehr leichte, wird aber sehr häufig selbst von Geübteren

übersehen; namentlich geben die incompleten Lähmungen wegen der Veränderung der Stimme häufig zu Verdacht auf adenoide Wucherungen, Nasenpolypen oder sonstige Nasenrachenaffectionen Anlass. Bei den durch Entzündungen oder mechanische Verhältnisse erzeugten myopathischen Lähmungen finden sich meist Röthung, Schwellung, Oedem, Geschwürs- und Narbenbildung. Sehr schwer ist oft die Ursache der Lähmung aufzufinden. Ueber den Sitz kann eventuell das elektrische Verhalten der gelähmten Muskeln und Nerven Aufschluss geben, wenn nach Réthi die Untersuchung nicht vor der zweiten Woche nach Beginn der Lähmungserscheinungen vorgenommen wird. Bei centralen Lähmungen ist die elektromotorische Erregbarkeit normal und kann Jahre lang normal bleiben. Bei completer peripherer Lähmung aber nimmt die elektromotorische Erregbarkeit rasch ab und erlischt in der zweiten bis dritten Woche. Für die hysterische Natur der Lähmungen spricht der plötzliche Beginn und das ebenso häufig plötzliche Verschwinden und Wiederauftreten derselben. Die Diagnose der Lähmung der einzelnen Muskeln des Velum, wie sie Duchenne zuerst versuchte, ist zur Zeit noch nicht mit Sicherheit möglich.

Die Prognose richtet sich nach der Ursache. Ungünstig ist sie bei den meisten centralen Erkrankungen, günstig bei Diphtherie, Blei-Intoxication, Myositis rheumatica sowie bei localen Entzündungsprocessen.

Die Behandlung der Schlinglähmung muss sich zuerst nach der Ursache richten. Das Hauptmittel bleibt stets die Elektricität. Am besten wird die eine Elektrode auf die Halswirbelsäule oder auf die vordere Fläche des Halses, zur Seite des Zungenbeines oder Kehlkopfes, aufgesetzt, die andere innen im Rachen auf die gelähmten Muskeln. Am besten bedient man sich dabei einer Kehlkopfelektrode mit Schliessungsvorrichtung; der positive Pol tritt durch eine an einem Halsbande befestigte, mit Leder oder Wolle überzogene, gut befeuchtete Pelotte ein. Bei Myositis rheumatica empfiehlt sich innerlich die Salicylsäure, äusserlich Cataplasmen, die Massage sowie spirituöse Einreibungen auf die ergriffenen äusseren Muskeln und die endopharyngeale Faradisation. Bei syphilitischen Hirntumoren oder Myositis erzielt man oft noch Erfolge durch Quecksilber und Jod, bei Hysterie durch psychische Behandlung und Suggestion. Lymphdrüsen und andere Tumoren, hypertrophische Rachen- und Gaumenmandeln müssen entfernt werden, zuweilen erreicht man sogar bei Tabes und progressiver Bulbärparalyse zeitweise Besserung oder Stillstand durch Galvanisation des Rückenmarks. Es versteht sich von selbst, dass bei completer Lähmung die Ernährung mit der Schlundsonde geschehen muss, und zwar applicirt man am besten am Morgen Milch mit feinzerriebenem Zwieback und Malzextract, Mittags Suppe mit Ei oder Leube'scher Fleischsolution oder Fleischpepton, Abends Milch mit Cognac oder einem starken Wein, wie Tokayer, Sherry, Marsala. Auf diese Weise gelingt es auch am besten, die Schluckpneumonie zu verhindern, allerdings nicht immer, so namentlich nicht bei Bulbärparalyse und anderen centralen Lähmungen. Auch

subcutane Strychnin-Injectionen haben, namentlich bei diphtheritischen Lähmungen, zuweilen auffallend rasche Besserung zur Folge. Bei Kindern stösst die künstliche Ernährung oft auf unüberwindlichen Widerstand und wird dann die Prognose ungünstig. Zur Nachcur empfehlen sich, besonders wenn auch andere Körpermuskeln gelähmt sind, die Thermen von Wiesbaden, Baden-Baden, Gastein, Ragaz, Wildbad, sowie ein Aufenthalt im Süden.

III. Abtheilung.

Die Krankheiten der Nase.

Anatomisch-klinische Vorbemerkungen.

Die Nasenhöhle stellt eine durch die Stellung der beiden Oberkiefer zu einander bedingte, vorne und hinten weit geöffnete Aushöhlung dar, welche durch eine dünne Scheidewand in zwei Hälften getrennt wird. Der hintere Abschnitt ist allseitig von Knochen umgeben, während der vordere Theil, die äussere Nase, aus Knochen und gefässlosen Knorpelstücken besteht.

Die äussere Nase hat zur Grundlage mehrere hyaline Knorpel, welche unter sich und mit der Apertura pyriformis durch starkes Bindegewebe vereinigt und so gestellt sind, dass bei Einwirkung der Muskeln auf dieselben die Nasenlöcher verengert und erweitert werden können. Mit dem Knorpel der Scheidewand, welcher die viereckige Lücke zwischen dem Pflugscharbein und der Lamina perpendicularis des Siebbeines ausfüllt, hängen die dreieckigen Knorpel zusammen. Dieselben stellen nach Rüdinger vordere umgebogene Lamellen des Scheidewandknorpels dar und verhalten sich zu den unten liegenden Knorpeln des Nasenflügels derart, dass letztere einen weiten Bogen bilden und über die oberen geschoben werden können. Die beiden Knorpel der Nasenflügel sind vorne und innen stark umgerollt, so dass man in der Furche zwischen beiden das untere Ende des Scheidewandknorpels fühlen kann. In dem Winkel zwischen Cartil. alar. inf. und Cartil. triangul. liegen die Cartil. sesamoideae, einige kleine Knorpel, welche in dichte Fasermassen eingebettet sind.

Die äussere Nase erhält ihre Stütze durch die Nasenbeine, zwei länglich-viereckige, in der Mitte aneinanderstossende Knochen, welche den convexen Rücken und die Wurzel der Nase bilden. An ihrer Vereinigungsstelle legt sich rückwärts oben die senkrechte Siebbeinplatte und abwärts der Knorpel der Scheidewand an; auch die Proc. frontal. der Oberkiefer haben Antheil an der Bildung der Nase. Ihre inneren Flächen sowohl wie auch jene der Nasenbeine und deren Knorpel stellen die von Schleimhaut überkleidete vordere obere Wand der Nasenhöhle dar.

Die Haut der Nase zeichnet sich durch ihren grossen Reichthum an Talgdrüsen aus, deren zurückgehaltener Inhalt die bekannten Comedonen bildet; sie setzt sich in das innere der Nase noch eine Strecke weit fort, meist bis zu dem vorderen Ende der unteren Muschel; der

Aditus narium ist ringsum, namentlich bei Männern, mit äusserst zahlreichen, kurzen, dicken Haaren, Vibices oder Vibrissae genannt, besetzt.

Die Muskeln, welche die Nasenlöcher erweitern und verengern, sind der Muse. levator alae nasi, depressor alae nasi und Levat. alae nasi propr. und der M. apicis.

Die Arterien der äusseren Nase stammen aus den Aesten der Art. facialis; die Art. dorsal. nasi, die Maxillar. externa und Zweige aus der Ophthalmica versorgen die äussere Nase. Zahlreicher sind die Venen. Sie vereinigen sich mit der Vena facial. ant.; nach Rüdinger liegt symmetrisch am Eingang in die Nasenhöhle tief unter der Haut ein Venenplexus, in welchen das Blut der vorderen Abtheilung der Nasenhöhle seinen Abfluss hat. Die Muskeln der Nase werden vom Facialis innervirt, die Sensibilität der Haut wird durch den Nerv. infraorbit., die der Haut der Nasenspitze durch den Nasenast des ersten Astes des Trigeminus vermittelt.

An der Bildung der Nasenhöhlen nehmen verschiedene Knochen Antheil.

Die obere Wand, das Nasendach, wird vorne gebildet von den beiden Nasenbeinen, in der Mitte von der Siebbeinplatte, hinten von der vorderen Wand der Keilbeinhöhle. Die untere Wand, der Nasenboden, wird gebildet vom Gaumenfortsatz des Oberkiefers und der horizontalen Platte des Gaumenbeines. Der Boden der Nase ist glatt und etwas nach hinten abschüssig. Die innere Wand stellt das Septum vor; sein knöcherner Theil wird vom Pflugscharbein gebildet, von der verticalen Platte des Siebbeins, von der Crista palatina und Crista nasalis anter.; der knorpelige Theil von der Cartilago septi, welcher am häufigsten Formveränderungen, besonders Verbiegungen und Auswüchse, zeigt. Die äussere Wand ist die complicirteste. Sie wird gebildet vom Oberkieferknochen, der Pars perpendicularis des Gaumenbeines und den flügelförmigen Fortsätzen des Keilbeines. Zuckerkandl unterscheidet eine obere, bis zum Ansatz der unteren Muschel herabreichende, und eine untere, von der unteren Muschel bis zum Nasenboden sich erstreckende Partie. Die obere Partie ist hinter dem Proc. frontalis des Oberkiefers mit einer grossen, unregelmässigen Lücke versehen, deren theilweise Deckung das Gaumenbein, der Proc. pterygoid. und der Proc. ethmoid., die untere Muschel sowie der Proc. uncinatus des Siebbeines übernehmen. Von da bis an die Schädelbasis bilden die Lamina papyracea ossis ethmoid. und das Os lacrymale die äussere Wand. In der äusseren Wand liegen mehrere an Zahl, Form und Grösse verschiedene Lücken, welche von Schleimhaut überzogen sind; die grösste, eine 2 cm lange, halbmondförmige Oeffnung, heisst Hiatus semilunaris und führt in eine trichterförmige Höhle, das Infundibulum, welches in seinem vorderen und oberen Theile mit dem Sin. frontal. und in seinem unteren und hinteren Theile mittelst des Ostium maxillare mit dem Sin. maxill. in Verbindung steht.

Die wichtigsten Gebilde der seitlichen Nasenwand sind die Nasenmuscheln.

Die grösste, die untere Muschel (Fig. 15 UM), stellt einen selbstständigen, dünnen, an der Innenfläche des Oberkiefers angehängten Gesichtsknochen vor, dessen unterer Rand frei in die Nasenhöhle hineinragt. Ihr vorderes Ende ist weniger gewölbt als ihre mittlere Partie, während ihr hinteres Ende spitz zuläuft; sie ist sehr verschieden gekrümmt, zuweilen mit einer Schleimhautfurche oder mit Einsenkungen und Einschnitten versehen. Der zwischen unterer Muschel



Fig. 15. Ansicht der rechten Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes.

S.	Stirnbein mit Stirnhöhle.	ON.	Oberer Nasengang.
NB.	Nasenbein.	MN.	Mittlerer Nasengang.
K.	Keilbeinhöhle.	UN.	Unterer Nasengang.
HG.	Harter Gaumen.	AG.	Adenoides Gewebe.
WG.	Weicher Gaumen.	RGr.	Rosenmüller'sche Grube.
HWS.	Halswirbelsäule.	Tm.	Tubenmündung.
OM.	Obere Muschel.	Tw.	Tubenwulst.
MM.	Mittlere Muschel.	Psph.	Plica salpingopharyngea.
UM.	Untere Muschel.		

und Septum einerseits und dem Nasenboden andererseits freibleibende Raum ist der untere Nasengang (Fig. 15 UN), dessen Grösse hauptsächlich von der Configuration der unteren Muschel abhängt; durch denselben werden alle in der Nase und im Nasenrachenraum zur Verwendung kommende Instrumente eingeführt. Unter dem Dache der unteren Muschel befindet sich nach auswärts vorne eine kleine ovale Oeffnung, der Ausführungsgang des Thränennasencanals. Die mittlere Muschel (Fig. 15 MM) ist ein Theil des Siebbeines und liegt nicht nur höher, sondern auch weiter nach hinten als die untere; sie ragt mit ihrem vorderen Ende 10—12 mm meist frei in die Nasenhöhle herein.

Ihr unterer abgerundeter Rand bildet mit dem vorderen Rand einen mehr oder weniger stumpfen Winkel, im mittleren Theile ist sie häufig stark eingerollt und endet nach rückwärts gleichfalls mehr zugespitzt. Der von ihrem unteren Rande bis zur unteren Muschel herabreichende freie Raum ist der mittlere Nasengang (MN); die zwischen ihr und Septum liegende enge Spalte wird Rima olfactoria genannt, welche in ihrer Schleimhaut die Endigungen des Nerv. olfactorius enthält Die Riechspalte wird zuweilen durch blasige Auftreibungen oder Verkrümmungen der mittleren Muschel oder durch Deviationen des Septum ganz verschlossen Im mittleren Nasengange liegen die Communicationsöffnungen für den Sinus maxillaris und frontalis. Die kleinste der Nasenmuscheln ist die obere (OM); sie gehört gleichfalls dem Siebbein an, ist noch viel kürzer und schwächer eingerollt als die mittlere und differenzirt sich von der letzteren nur im mittleren und hinteren Drittel, vorne fliessen beide Muscheln zusammen; theilt sich die obere Muschel, dann kommt noch eine oberste oder vierte Nasenmuschel zu Stande, die nach Zuckerkandl bei Neugeborenen constant und nach Heymann auch bei Erwachsenen ziemlich häufig ist. Der zwischen mittlerer und oberer Muschel übrig bleibende Raum ist der obere Nasengang (ON); in ihm münden die Siebbeinzellen mit mehreren Oeffnungen, zwischen dem hinteren Ende der mittleren und oberen Muschel befindet sich das Foramen sphenopalatinum, über dem hinteren Ende der oberen Muschel die Eingangsöffnung in die Keilbeinhöhle.

Ueber die etwas complicirten Verhältnisse des Naseninnern geben die ausgezeichneten Abbildungen von B. Fränkel nach seinen Gefrierdurchschnitten die besten Aufschlüsse.

Klinischerseits nimmt die Schleimhaut der Nasenhöhle, speciell der zum Riechen bestimmte obere Theil derselben, die Riechhaut oder Schneider'sche Membran, unser Hauptinteresse in Anspruch. Die vorne mit der Gesichtshaut und nach hinten mit der Schleimhaut des Rachens zusammenhängende Schleimhaut der Nase überzieht das Septum und die Muscheln sowie alle Buchten gleichmässig und liegt namentlich an den Muscheln ihrer Unterlage sehr straff an; sie steht mit dem Periost in so innigem Zusammenhange, dass beide nicht an allen Stellen scharf von einander abgegrenzt werden können. Die Schleimhaut trägt in ihrem oberen Theile, der Regio olfactoria, flimmerndes Cylinderepithel; der untere Theil, die Regio respiratoria, ist mit Pflasterepithel bekleidet. Besonders reich ist die Nasenschleimhaut an Nerven, Blutgefässen und Drüsen.

Die Nerven der Nasenhöhle dienen theils der Sensibilität, theils der Secretion, theils dem Geruche. Die sensiblen Nerven stammen grösstentheils aus dem ersten und zweiten Aste des Trigeminus (N. ethmoidalis, N. sphenopalatinus, N. Vidianus, N. nasopalatinus, N. palat. ant.) und besitzen in hohem Grade die Fähigkeit, die verschiedensten physiologischen und pathologischen Reflexe auszulösen und auf andere Nervengebiete zu übertragen.

Die secretorischen Nerven stammen nach Aschenbrandt aus dem N. sphenopalatinus; die trophischen Fasern für die Schleimhaut liegen in den meisten Aesten des Trigeminus. Nach Sandmann ist der Niesnerv der N. ethmoidalis, seine Durchschneidung hebt das Niesen auf. Reizung der N. infraorbitalis bringt Stillstand der Athmung in der In- und Exspiration hervor, dabei tritt Lidschluss ein. In der Nasenschleimhaut existiren gewisse Reizzonen, beim Menschen am vorderen und hinteren Ende der Muscheln und den entsprechenden Partien der Scheidewand, von denen aus allein Athmungsreflexe ausgelöst werden können, bei schwachen Reizen Verlangsamung der Athmungsphasen, bei starken Reizen Stillstand in der Exspiration.

Ausschliesslich dem Geruche dient der Nerv. olfactorius. Er verläuft in einer Furche der unteren Fläche des Vorderlappens mit dem der anderen Seite etwas convergirend nach vorne und schwillt auf der Lamina cribrosa des Siebbeines zu einem länglich-runden Kolben, dem Bulbus olfactorius, an, von dessen unterer Fläche zwei Reihen dünner Fäden abgehen, welche durch die Löcher der Lamina cribrosa in die Nasenhöhle treten. Hier bilden sie Netze, welche an dem Septum und der inneren Fläche der beiden Siebbeinmuscheln sich nach abwärts erstrecken und pinselartig gruppirte Fäden in die Schleimhaut schicken. Diese Fäden gehen in die Riechzellen über, welche aus länglich-runden Zellkörpern mit deutlichen Kernen bestehen und in feine, stabförmige Fortsätze enden. Nach F. Krause kommt dem Trigeminus eine gewisse unterstützende Wirkung dem Olfactorius gegenüber zu; denn der Geruchsinn zeigt sich nach Durchschreitung des Trigeminus auf der operirten Seite vermindert.

Wie an Nerven, so ist die Nasenschleimhaut auch an Blutgefässen sehr reich. Je blutreicher eine Partie ist, um so dicker erscheint sie auch. Während die Schleimhaut der Regio olfactoria dünn und blutarm ist, erreicht jene der Pars respiratoria namentlich an der unteren und mittleren Muschel, so besonders an den vorderen und hinteren Enden der unteren Muschel, ein sehr beträchtliches Volumen Hier liegt über dem Knochen das cavernöse Schwellgewebe, dessen Balkengerüste aus parallelen, scharf contourirten Bindegewebsfasern mit Bindegewebskörperchen und zahlreichen elastischen und organischen Muskelfasern besteht. Zwischen dem Balkengerüste liegen äusserst zahlreiche Gefässräume, Lacunae, und venöse Blutgefässe, welche durch unzählige kleine Oeffnungen in den Knochen eindringen. Nach Zuckerkandl hat das Schwellgewebe die Function, die Nasenspalte regulationsfähig zu erhalten und jede abnorme Erweiterung derselben zu verhindern; der grosse Reichthum des Schwellnetzes an Blutgefässen und die Dichtigkeit ihrer Anlage kommt ferner auch der Wärmeabgabe an die durchstreichende Luft sowie der Feuchterhaltung der Schleimhaut zugute. Das Blut der Schwellorgane fliesst an der periostalen Seite der Schleimhaut durch zahlreiche Abzugscanäle nach verschiedenen Richtungen gegen das Gesicht, den Gaumen, die Flügelgaumengrube und den Thränennasengang. Von grosser klinischer Bedeutung ist die Thatsache, dass das Schwellgewebe durch die ver-

schiedensten, selbst in entfernten Organen ausgelösten Reize plötzlich an Volumen zu- und abnehmen kann; es entstehen so oft momentan rothe, kugelige, die Nase obstruirende Anschwellungen, die nach einiger Zeit wieder spurlos verschwinden (vergl. das Capitel Reflexneurosen). Das An- und Abschwellen des cavernösen Gewebes wird durch den Trigeminus, namentlich das Ganglion sphenopalatinum, vermittelt.

Die Venen der Nasenhöhle begleiten die Arterien, sind aber zahlreicher und grösser und communiciren mit der V. facialis, V. ophthalmica; ein Theil derselben geht durch die Siebbeinplatte und das Foramen coecum in den Sin. longitudin. und coronarius über.

Die Arterien gelangen von mehreren Seiten zur Nasenschleimhaut. Das Hauptgefäss, die Art. sphenopalatina mit der aus ihr hervorgehenden Art. nasal. post. und septi nar. post., stammt aus der A. pterygopalatina, die A. ethmoidalis ant. und post. aus der A. ophthalm. und die A. septi nar. ant. und post. aus der A. maxillaris ext. Sie bilden zahlreiche Anastomosen und gehen an der unteren Muschel in das cavernöse Gewebe über, in welchem jedoch die venösen Gefässe überwiegen.

Die Lymphgefässe der Nase vereinigen sich nach E. Simon in einem Hauptstamme, welcher zwischen dem vorderen Ende der Tuben und dem hinteren Ende der Muscheln verläuft. Hier bilden sie ein Netz, aus welchem zwei bis drei Stämme entspringen; diese verlaufen nach hinten und aussen zwischen dem Musc. levator und tensor veli palatini, nach deren Durchbohrung der eine Zweig an der äusseren Rachenwand zwischen Carotis int. und Musc. stylopharyngeus in eine vor der Wirbelsäule gelegene Lymphdrüse übergeht; der zweite Zweig durchbohrt den Biventer, geht nach aussen vom Nerv. lingualis und theilt sich dann in zwei Aeste, welche in zwei unter dem Kopfnicker gelegene Lymphdrüsen münden.

Nach Axel Key, Rezius und Flatau communiciren die Lymphbahnen der Nase mit dem Subduralraum und die des Nasenrachenraumes mit den von der Dura mater und Arachnoidea gebildeten Scheiden des N. olfactorius.

Die Zahl der über die Nasenschleimhaut zerstreuten Drüsen ist eine ungeheure. Nach Heidenhain besitzt die Nase keine eigentlichen Schleimdrüsen, sondern nur Drüsen, welche ein wässeriges Secret erzeugen, sogenannte Glandulae serosae, während die Schleimbereitung durch eine schleimige Metamorphose des Epithels vor sich gehen soll. Die Drüsen der Regio olfactoria, die Bowman'schen Drüsen, werden von Dogiel zu den Eiweissdrüsen gerechnet; nach Paulsen zeigt ihr Epithel theils den Charakter von Schleimdrüsen, theils jenen von Eiweissdrüsen, theils von beiden zugleich.

Zum Schlusse mögen noch einige Worte über die Bedeutung der Nase als Respirations-, Riech- und Sprachorgan Platz finden.

Die grosse Rolle, welche die Nase bei der Respiration spielt, ist erst in den letzten Jahren gebührend gewürdigt worden. Der normale Mensch athmet, wie man schon am Neugeborenen beobachten kann, sowohl im wachen Zustande als auch im Schlafe durch die Nase. Die Inspirationsluft wird während ihres Weges durch die Nase zuerst durch die rings um den Naseneingang gestellten kurzen Haare, Vibrissae, von gröberen, dann durch Niederschlag auf die befeuchtete, vielfach gewundene und Vorsprünge bildende Schleimhaut von feineren staubförmigen Beimengungen gereinigt, während ein letzter Theil im Nasenraehenraum zurückgehalten wird. Mit dem Staube werden auch Mikroorganismen abgehalten, wie die Untersuchung des normalen Nasensecretes beweist, das relativ arm an solchen ist. Anders ist dies in dem Secrete kranker Nasen, so namentlich bei Ozaena, das förmlich von Bacterien wimmelt. Durch Strauss wurde ferner constatirt, dass auch pathogene Mikroorganismen in der Nase zurückgehalten werden; so fand derselbe zahlreiche Tuberkelbacillen in den Nasen solcher Personen, welche mit der Pflege von Phthisikern beschäftigt waren, ohne dass diese Personen selbst an Tuberculose erkrankt wären. Es ist ferner zweifellos, dass trotz der besprochenen Schutzvorrichtungen doch die Nase und der Nasenraehenraum die Eingangspforten für die Träger verschiedener Infectionskrankheiten sind; Ziem und Heller glauben deshalb auch, durch methodische Ausspülungen alle möglichen Infectionskrankheiten verhüten oder deren Verlauf mildern zu können, wofür freilich der Beweis noch aussteht.

Die Einathmungsluft wird ferner auf ihrem Wege durch die Nase sehr beträchtlich erwärmt. Die Grösse der Erwärmung der Einathmungsluft wächst mit der Temperaturdifferenz gegenüber der Körperwärme, d. h. die Wärmeaufnahme der eingeathmeten Luft ist um so grösser, je niedriger die Temperatur vor dem Eintritte in die Nase war. Bei einer Aussentemperatur von — 8° wird die Luft in der Nase um 25° erwärmt, bei einer Aussentemperatur von + 2 um 19°, bei + 18 um 10° etc. (Aschenbrandt, Bloch, Kayser).

Die Luft wird ferner auch in der Nase in hohem Grade mit Wasser imprägnirt. Nach Aschenbrandt und Kayser ist die Sättigung mit Wasser eine vollständige, während Bloch nur zwei Drittel des Wassergehaltes in der Nase sich beimischen und ein Drittel in den tieferen Theilen des Respirationsapparates entstehen lässt. Die Beimengung des Wassers geschieht durch die Verdunstung des continuirlich producirten und auf den Nasengängen niedergeschlagenen Nasensecretes.

Unsere Kenntnisse über die Nase als Riechorgan sind immer noch lückenhaft.

Nicht Alles, was wir für Geruchswahrnehmung halten, ist auch eine solche. Der stechende Geruch des Ammoniaks, des Essigs, verschiedener Säuren, verdankt vielmehr einer meist gleichzeitigen Tastempfindung, der Reizung von Trigeminusfasern seine Entstehung. Umgekehrt ist aber wieder sehr Vieles Geruchsempfindung, was man fälschlich als Geschmacksempfindung bezeichnet. Die Perception aro-

matischer Speisen, das Bouquet der Weine, Früchte etc. ist eine Geruchsempfindung, die dadurch zu Stande kommt, dass wir die in den genannten Genussmitteln enthaltenen Riechstoffe von hinten, d. h. durch die Choanen auf die Riechschleimhaut einwirken lassen. Verschliesst man z. B. beim Genusse aromatischer Substanzen die vorderen oder hinteren Nasenöffnungen, so fehlt jede Geruchsempfindung.

Damit ein Stoff Geruchsempfindung hervorrufe, ist nöthig, dass er flüchtig und bis zu einem gewissen Grade in Wasser löslich sei. Warum wir auch manche Stoffe, wie z. B. Metall, riechen, die die genannten Eigenschaften nicht besitzen, ist noch unbekannt. Ferner ist zur Entstehung einer Geruchsempfindung nöthig, dass ein Luftstrom durch die Nase hindurchzieht und die riechenden Substanzen an die Regio olfactoria hinbringe. Es müssen ferner dem Riechorgan immer neue riechende Substanzen zugeführt werden, wenn die Geruchsempfindung fortdauern soll. Wie Aronsohn nachwies, wird der Geruchsnerv durch ununterbrochene Einwirkung eines adäquaten Reizes schon nach wenigen Minuten völlig abgestumpft, erlangt aber nach einer bis einigen Minuten Ruhe wieder seine Empfindlichkeit; die Riechperioden werden aber nach jeder neuen Ermüdung kürzer.

Der Mensch besitzt im Gegensatz zum Thiere einen relativ schlecht entwickelten Geruchssinn. Immerhin genügt derselbe, um bei Einwirkung angenehmer Gerüche Freude und Wohlbehagen, bei Einwirkung übelriechender Substanzen Missbehagen und Ekel zu erregen. Im Uebrigen scheint die Feinheit des Geruchsorgans von dem stärkeren Pigmentgehalt der Riechschleimhaut abzuhängen, da einestheils sehr scharfriechende Thiere eine sehr dunkle Pigmentirung besitzen, anderntheils auch dunkler pigmentirte Menschenrassen ein entwickelteres Geruchsorgan haben (M. Schmidt).

Die Bedeutung der Nase und des Nasenrachenraumes als Sprachorgan liegt in erster Linie in ihrer Eigenschaft als Resonanzböden. Der im Kehlkopf erzeugte Ton wird in die Mund-, Rachen- und Nasenhöhle geworfen und erlangt durch Mittönen der in derselben enthaltenen Luftsäule nicht nur eine Verstärkung, sondern auch eine charakteristische Färbung. Ausserdem besteht die Einrichtung, dass die Mundhöhle von der Nasenrachenhöhle bei der Production gewisser Vocale und Consonanten abgeschlossen werden kann, während sie bei anderen offen bleibt; das erstere findet jedoch nur bei der Bildung der Nasenlaute statt.

Untersuchungsmethode.

Die Untersuchung der Nase zerfällt in zwei Theile, in die Inspection von vorne — Rhinoscopia anterior — und die Inspection von hinten — Rhinoscopia posterior. Wenn auch die letztere wichtige Aufschlüsse über das Cavum pharyngonasale und das hintere Ende der Nasenhöhle zu geben vermag, so ist doch der Inspection von vorne

die grössere Bedeutung beizumessen. Immerhin müssen, wenn die Untersuchung der Nase eine erschöpfende sein soll, beide Methoden in Anwendung kommen.

Zur Untersuchung der Nase von vorne benützt man eigene Instrumente, Nasenspiegel (Fig. 16), welche, so verschieden auch ihre Form und Construction ist, doch alle den Zweck haben, durch Dilatation des Naseneinganges dem Lichte in möglichst aus-



Fig. 16. Verschiedene Nasenspiegel.

a) nach B. Fränkel. b) nach Duplay-Charière. c) nach Jurasz. d) nach Kramer. e) Zaufal's Nasenrachentrichter.

giebiger Weise Eingang zu verschaffen. Welcher Nasenspiegel den Vorzug verdient, ob der von Jurasz oder B. Fränkel oder jener von Creswell Baber, Duplay, Bresgen, Jelenffy, Roth, Tröltsch, Schnitzler, Voltolini oder Zaufal, ist um so schwerer zu entscheiden, als Uebung und Gewohnheit die Wahl desselben beeinflussen. Verf. benützt ein zweiblätteriges Speculum (Fig. 16d), dessen Branchen durch Druck auf den federnden Handgriff auseinanderweichen. Es ist ein grosser Vorzug desselben, dass man die Stellung der Branchen jeden Augenblick durch Verminderung oder Verstärkung

des Druckes ohne Zuhilfenahme der anderen Hand modificiren kann, welche Annehmlichkeit auch von den Kranken, namentlich bei länger dauernden operativen Eingriffen, empfunden wird. Bei Operationen, bei denen es nothwendig oder wünschenswerth ist, beide Hände frei zu haben, empfiehlt sich das von Zarniko angegebene „fixirbare Speculum", das mittelst einer Leitstange an einer vom Kranken getragenen Stirnbinde befestigt wird.

Die Beleuchtung muss bei der Enge und Vielgestaltigkeit der Nase eine möglichst intensive sein; wenn auch das einfache, mit der Stirnbinde reflectirte Licht für viele Fälle zur Untersuchung genügt, so ist doch, namentlich bei operativen Eingriffen in der Tiefe der Nase, das intensivere Auer'sche oder elektrische Licht oder das Licht eines Linsenapparates vorzuziehen. Nachdem man sich in derselben



Fig. 17. Nasenspiegelbild, perspectivisch verkürzt. r. rechte, l. linke Nase.

a) senkrecht verlaufende Scheidewand; b) vorderes Ende der unteren Muschel; c) der mittleren Muschel; d) unterer; e) mittlerer Nasengang: f) Rima olfactoria.



Fig. 18. Nasenspiegelbild, perspectivisch verlängert. r. rechte. l. linke Nase.

a) vorderes Ende der unteren Muschel: b) mittlerer und hinterer Theil der unteren Muschel; c) vorderes Ende der mittleren Muschel: d) unterer, nach hinten ziehender Rand der mittleren Muschel.

Weise wie bei der Laryngoskopie das Licht concentrirt hat, umfasst man den Griff des Speculums so mit der linken Hohlhand, dass die Dorsalfläche der Finger dem Gesichte des Kranken zugekehrt ist. Der in der kälteren Zeit über der Lampe erwärmte Spiegel wird nun geschlossen in die zu untersuchende Nasenhöhle 1—1½ cm tief eingeführt, worauf man die Branchen des Spiegels auseinandertreten lässt Die den Einblick oft störenden Haare werden durch die Blätter des Spiegels, wenn nöthig durch geringe Rotation desselben, auf die Seite geschoben. Es empfiehlt sich, die Spitze des Instrumentes nur bis an das vordere Ende der unteren Muschel vorzuschieben, damit krankhafte Veränderungen derselben nicht verdeckt werden. Mit der nunmehr auf den Scheitel des zu Untersuchenden gelegten rechten Hand neige man behufs der Untersuchung der gewissermassen die Führung übernehmenden unteren Muschel sowie des unteren Nasenganges, des Nasenbodens und des unteren Theiles des Septum den Kopf des Patienten etwas nach vorne und unten oder möglichst horizontal, behufs Untersuchung der mittleren Muschel, des mittleren Nasenganges und des oberen Theiles des Septum sowie des Nasen-

daches nach hinten und oben, wobei selbstverständlich die Axe des Spiegels den Bewegungen des Kopfes zu folgen hat. Dem Patienten die jeweilige Stellung des Kopfes selbst zu überlassen, ist unzweckmässig und zeitraubend; angesammelte Secrete oder Blut müssen zuerst durch Schneuzen oder Ausspritzen entfernt werden. Etwas Blutung ist oft bei der schonendsten Untersuchung nicht zu vermeiden. Das Nasenspiegelbild ist ein directes, d. h. man sieht die Theile in ihrer natürlichen Lage, allerdings mehr oder weniger perspectivisch verkürzt (Fig. 17 und 18).

Medianwärts liegt stets die Nasenscheidewand, die sich als eine senkrecht aufsteigende, sehr häufig verbogene Fläche oder vielmehr Linie kennzeichnet (Fig. 17a). Ihr gegenüber nach aussen liegt die kugel- oder birnförmige, zuweilen spiralig gewundene untere Muschel (Fig. 17b), von der man meist nur das vordere Ende oder noch ein kleines, rückwärts davon gelegenes Stück sieht; zwischen Nasenscheidewand, unterer und mittlerer Muschel liegt der untere Nasengang (Fig. 17d). Lässt man den Kopf des zu Untersuchenden nach rückwärts neigen und bringt den Spiegel gleichfalls in die Axe nach oben, dann kommt das vordere Ende der mittleren Muschel (Fig. 17c) und zwischen dieser und der Scheidewand die Rima olfactoria (Fig. 17f) in Sicht. Lässt man den Kopf des zu Untersuchenden seitlich wenden oder dreht man den Spiegel seitlich, so gelingt es meistens, bei manchen Individuen auch ohne diese Manipulationen sowohl die untere Muschel als auch die Scheidewand nach rückwärts, ja bis zu ihrem hinteren Ende zu übersehen, wie Fig. 18 zeigt. Einen vollständigen Ueberblick über die mittlere Muschel zu erhalten, ist schwer, einestheils, weil sehr oft zwischen mittlerer und unterer Muschel oder äusserer Nasenwand nur eine spaltförmige Oeffnung besteht, anderntheils, weil Deviationen oder Spinen des Septum den Einblick in die Rima olfactoria verwehren; hingegen lässt sich häufig der untere Rand der mittleren Muschel (Fig. 18c, d) mehr oder weniger weit nach hinten verfolgen, besonders wenn der hintere Theil der mittleren Muschel (d) tiefer steht als der vordere. Der untere Nasengang ist normalerweise der weiteste, der mittlere enger, die obere Muschel und der obere Nasengang sind von vorne niemals zu sehen.

Ueber die äusserst zahlreichen Varianten des Naseninnern wird bei den Missbildungen und Anomalien das Nähere mitgetheilt werden; für den Anfänger ist es oft sehr schwierig, das Gesehene richtig zu deuten. Wie weit man in die Nase hineinsehen kann, hängt einestheils von der Intensität des Lichtes, anderntheils von dem jeweiligen Falle ab; gerade und weite Nasen gestatten den Durchblick durch die ganze Höhle, während bei beschränkten Raumverhältnissen es oft nur gelingt, das vordere Ende der mittleren Muschel, ja nicht einmal diese zu sehen.

Dass auch die Untersuchung mittelst des bereits früher beschriebenen Zaufal'schen Trichters (Fig. 16 e) werthvolle Aufschlüsse zu geben vermag, braucht nicht besonders betont zu werden.

Unumgänglich nothwendig zu einer genauen Untersuchung der Nase ist die Palpation mittelst der Sonde; dieselbe kann uns nicht nur Rechenschaft geben, ob die inspicirten Gebilde normale oder pathologische sind, sondern sie dient auch zur Eruirung der Consistenz der Schleimhaut, der Anheftungsweise allenfallsiger Neubildungen, zur Diagnose der Fremdkörper, Concretionen und Affectionen der Knorpel und Knochen, zur Beiseiteschiebung geschwellter, den Einblick störender Schleimhautpartien. Zu dem letztgenannten Zwecke bediente man sich früher des von Zaufal angegebenen Nasenspatels, einer breiten, planconcaven Hohlsonde, mit welcher die hypertrophische relaxirte Schleimhaut comprimirt und bei Seite geschoben wird. Die Application dieser Hohlrinnen, deren man für jede Nasenhöhle eine eigene bedarf, ist für den Kranken weniger unbequem als die von Spiegeln mit sehr langen Blättern, welche in die Tiefe der Nase eingeführt werden.

Diese Instrumente sind durch das Cocaïn überflüssig geworden. Dasselbe hat nämlich in 1—20% Lösung ausser seiner anästhesirenden Wirkung auch noch die Eigenschaft, das Schwellgewebe zur Retraction zu bringen und so die Untersuchung der tiefer gelegenen Theile ausserordentlich zu erleichtern. Man applicirt das Cocaïn entweder mit dem Spray oder mit einem kleinen Wattebausch.

Zur Diagnose der Nasenaffectionen wird ferner auch der Geruch und das Gehör verwendet Der erstere gibt uns bei der Exspiration durch die Nase Aufschluss, ob die Nase Zersetzungsproducte beherbergt oder nicht; das letztere belehrt uns über das Verhalten der Stimme, nasales Timbre etc. sowie die Durchgängigkeit der Nase, indem es bei Veränderungen kein oder ein verändertes (Stenosen-) Geräusch erkennen lässt.

Die früher geübte Percussion der Nase ist durch die modernen Untersuchungsmethoden völlig verdrängt worden.

Zur Eruirung der Durchgängigkeit der Nase für Luft bedient man sich der vorgehaltenen Hand, gegen welche man abwechselnd bei geschlossener einer Nasenöffnung durch die andere kräftig exspiriren lässt. Zwaardemaker übt die Spiegelmethode; hält man einen kalten Spiegel vor die Nase, so beschlägt sich derselbe bei der Exspiration mit Wasserdampf, es bildet sich der sogenannte Athmungsbeschlag; normalerweise ist er symmetrisch; bei Nasenstenose ergeben sich verschiedene Differenzen in Grösse und Form des Niederschlages.

Zur Prüfung des Geruchsinnes bedient man sich verschiedener bekannter riechender Substanzen, so namentlich des Pfefferminz- oder des Lavendelspiritus, des kölnischen Wassers, des peruvianischen Balsams, ferner der Carbolsäure, des Creosots, Thymols, der Tinct. Valerianae, welche abwechselnd vor die eine und dann die andere Nase des zu Prüfenden gehalten und von einander unterschieden werden müssen. Man macht dabei die Beobachtung, dass es Menschen gibt, bei welchen gewisse Substanzen gar keine oder eine abnorme Geruchsempfindung hervorrufen.

Die quantitative Prüfung des Geruchsvermögens wird vorgenommen mit dem von Zwaardemaker angegebenen Olfactometer. Derselbe besteht aus zwei auf einem Brettchen befestigten neben einander laufenden Röhren, deren vorderes Ende rechtwinkelig nach oben gebogen ist und die aus dem Gestelle herausgenommen und auch einzeln gebraucht werden können. Der hintere Theil der Röhren ist gerade und in Centimeter eingetheilt. Ueber diese Röhren wird nun eine zweite mit der riechenden Substanz versehene oder daraus selbst bestehende Röhre geschoben, und zwar so weit, bis der zu Prüfende angibt, eine Geruchsempfindung zu haben. Dann wird abgelesen, wie weit der äussere Cylinder vorgeschoben wurde. Einen für einen gewissen Geruch und aus gewisser Entfernung von einem normal riechenden Menschen gefundenen Werth nennt Zwaardemaker eine Olfactie. Der äussere Riechcylinder besteht entweder aus Kautschuk oder Juchtenleder oder aus einer Röhre von Glas, die mit der zu riechenden Substanz, 3% Benzoetinctur, Aq. amygd. amar etc., imprägnirt wird; selbstverständlich müssen nach jeder Geruchsprobe der benützte Cylinder und die Hände des Untersuchenden sorgfältigst gereinigt werden.

Reutter verbesserte Zwaardemaker's Olfactometer, indem er den Röhren eine weniger rechtwinkelige Krümmung gab. In der Beurtheilung der Resultate muss man äusserste Vorsicht walten lassen, einmal weil bei allzu häufigen oder rasch aufeinanderfolgenden Versuchen der Geruchssinn ermüdet, und zweitens weil viele Individuen nicht im Stande sind, genau zu bestimmen, wann und ob sie eine Geruchsempfindung gehabt haben. Reutter benützt zur Prüfung den Kautschuk (Siegellackgeruch), dann die Ammoniak-Guttapercha (Mischung aus gleichen Theilen Gummiammoniak und Guttapercha — Lakritzengeruch), Resin. Benzoes (Vanille) und Radix Sumbul (Moschusgeruch).

Allgemeine Symptomatologie.

Die durch Krankheiten der Nase und des Nasenrachenraumes hervorgerufenen Erscheinungen und Störungen sind sehr mannigfaltig.

Am häufigsten und wichtigsten sind die Störungen der Nasenathmung, welche zur Folge haben, dass der Kranke durch den Mund athmen muss. Wenn es auch Menschen gibt, welche ohne Schaden für ihre Gesundheit Jahre, ja das ganze Leben lang durch den Mund athmen, so ist doch die Zahl Derjenigen viel grösser, welche durch die Mundathmung belästigt werden und die nichts sehnlicher wünschen, als wieder durch die Nase athmen zu können. Wenn also Kayser der Nasenathmung keine vitale Bedeutung beimisst, so ist dies nur theilweise richtig.

Die Störungen und Schädlichkeiten, welche die Mundathmung erzeugt, sind im Allgemeinen um so folgenschwerer, je

jünger das Individuum und je hochgradiger und langdauernder die Nasenstenose ist. Da bei der Mundathmung die Erwärmung der Einathmungsluft eine geringere ist — nach Aschenbrandt und Kayser beträgt die Differenz ½—3°, nach Bloch aber viel mehr —, so wird die Mund-, Rachen- und Kehlkopfschleimhaut von einer kälteren Luft getroffen, was eine grössere Disposition zu katarrhalischen Erkrankungen des Rachens, Kehlkopfes, der Luftröhre und der Bronchien zur Folge hat. Da ferner die die Mundhöhle passirende Luft wasserärmer und staubhaltiger ist, so kommt es in Folge der Vertrocknung der Schleimhaut zu Rhagadenbildung an Lippen und Zunge, zu Abschwächung des Tastgefühles und Geschmackes und zu frühzeitiger Zahncaries. Dass Diphtherie, Keuchhusten, Scharlach und andere Infectionskrankheiten bei Mundathmern häufiger vorkommen, ist möglich, aber noch nicht statistisch bewiesen.

Durch das Offenstehen des Mundes erleiden nicht nur die Weichtheile, sondern auch die Knochen des Gesichtes gewisse Veränderungen, die wieder um so deutlicher sind, je jünger das mundathmende Individuum ist. Die Gesichtszüge bekommen durch Herabhängen der Unterlippen einen schlaffen, trägen, oft geradezu blöden Ausdruck, die Kaumuskeln und, wie neuerdings Ott wahrscheinlich gemacht hat, auch der Orbicularis oris werden gedehnt und atrophisch, die Herabzieher des Unterkiefers hypertrophisch und ein Theil der Gesichtsmuskeln wird abnorm erschlafft, ein anderer dauernd überanstrengt (Bloch). Da in Folge der Verstopfung der Nase der dort producirte Schleim nur schwer entfernt werden kann, so machen die Mundathmer die sonderbarsten Anstrengungen, durch Schnuppern, Schnauben, Heben und Senken, Erweitern und Verengern der Nasenflügel den Naseninhalt zu beseitigen, wobei wiederum die mimischen Gesichtsmuskeln in Mitleidenschaft gezogen werden. Nicht selten kommt es zu förmlicher Chorea des Gesichtes, ja sogar zu allgemeiner Chorea; die Dehnung der Kaumuskeln führt zu Schmerzen am Jochbogen und in der Schläfengegend.

Durch den Druck der gezerrten Wangenweichtheile einerseits, durch das beständige Anprallen des Luftstromes an den harten Gaumen andererseits kommt es bei jugendlichen Personen auch ohne Rhachitis zu einer Wachsthumsanomalie der Knochen, welche sich durch eine stärkere spitzbogenartige Wölbung des harten Gaumens documentirt. Nach Körner muss man unterscheiden zwischen den Veränderungen am Oberkiefer bei Kindern, welche vor dem Zahnwechsel an Nasenstenose gelitten haben, und zwischen jenen Veränderungen am Oberkiefer, welche entstehen, wenn die Nasenstenose während des Zahnwechsels eingetreten ist.

Wenn die Nasenstenose vor dem Zahnwechsel bestanden hat, so fällt am meisten der kuppelartige Hochstand des Gaumens auf; der Alveolarrand, der normalerweise einen Halbkreis bilden soll, nimmt die Gestalt einer Ellipse an; seine Seitentheile erscheinen einander nähergerückt, als beim normalen Kiefer; der ganze Oberkiefer er-

scheint im Wachsthum zurückgeblieben, die Stellung der Milchzähne aber ist eine normale.

Besteht die Nasenverstopfung noch zur Zeit des Zahnwechsels fort, so stellen sich noch andere auffallende Veränderungen ein. Die seitlichen Theile der Alveolarfortsätze nähern sich mehr und mehr, der Kiefer wird länger und schmäler; das bereits hohe, kuppelartige Gaumengewölbe rückt höher hinauf und wird seitlich verschmälert, der vordere Theil des Alveolarrandes richtet sich mehr nach vorne, ebenso die bleibenden Schneidezähne; die beiden mittleren Schneidezähne schieben sich dachziegelartig übereinander, wie auch oft andere Zähne eine unregelmässige Stellung einnehmen. Der Unterkiefer bleibt im Gegensatze zu der Rhachitis unverändert.

Durch die starke, spitzbogenartige Wölbung des harten Gaumens kommt es ferner auch zu Missbildungen in der Nase, zu Schiefstand der Scheidewand und zu allgemeiner Verengerung der Nasengänge.

Die Folgen der Mundathmung machen sich ferner auch am Thorax bemerkbar, der meist zu flach und zu schmal oder hühnerbrustartig am Sternum zugespitzt erscheint.

Die Ursache dieser Veränderung liegt darin, dass bei der Mundathmung trotz der scheinbar grösseren Zuflussöffnung doch der Gaswechsel in der Lunge ein geringerer ist, weil, wie Bloch nachgewiesen, bei der Ausathmung durch den Mund die eingeathmete Luft weniger lange, aber auch weniger vollkommen verwerthet wird. Auch wissen wir durch Ludwig, dass der Gaswechsel bei der Mundathmung keinesfalls intensiver ist, und durch Voltolini, dass bei der Nasenathmung sowohl der In- als auch Exspirationsdruck grösser ausfällt, als bei der Mundathmung.

Eine der auffallendsten, häufigsten und frühesten Erscheinungen bei Mundathmern ist das Schnarchen, jene bekannte geräuschvolle Bewegung des Gaumensegels während des Schlafes, die oft so stark ist, dass sie durch mehrere Zimmer gehört wird und die Ruhe der Mitschläfer stört. Bei Säuglingen leidet die Nahrungsaufnahme, auch wird die Zunge verschluckt und so an den harten Gaumen angepresst, dass nächtliches Aufschrecken (Pavor nocturnus) und Athembeschwerden sich einstellen. Auch Erwachsene klagen meist über schlechten, unruhigen Schlaf, schreckhafte Träume und Alpdruck. Es ist nicht zu verwundern, dass durch anhaltende Störung des Schlafes bei Kindern und Schwächlichen das Allgemeinbefinden leidet, dass Mattigkeit, Schlaffheit, Unlust zu körperlicher Bewegung, Appetitlosigkeit und Anämie sich einstellen.

Von nervösen Erscheinungen begegnet man am häufigsten dem Kopfschmerz und gewissen Veränderungen der Psyche und des Intellectes.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, dass beide Symptome der durch die Nasenverstopfung erzeugten Veränderung der Circulation der Lymphe im Gehirn und dessen Häuten, vielleicht auch gewissen

vasomotorischen Störungen ihre Entstehung verdanken. Haben doch Axel Key, Rezius und Flatau den Zusammenhang der nasalen Lymphbahnen mit dem Subracheoidealraum nachgewiesen.

Die Formen, unter denen der Kopfschmerz auftritt, sind sehr verschieden, wie namentlich Bresgen und Scheinmann dargethan haben; bald ist er mehr ein dumpfer, den ganzen Kopf umspannender Druck, bald eine grosse Benommenheit, bald ein regelmässig zu gewissen Zeiten auftretender Schmerz von neuralgischem Charakter an der Stirne, den Schläfen oder am Hinterkopf. Die ausserordentliche Häufigkeit des Kopfschmerzes bei Hyperplasie der Rachen- und Gaumenmandeln, bei Krankheiten der Nase und ihrer Nebenhöhlen macht es dem Arzt zur Pflicht, in jedem speciellen Falle die Nase und den Nasenrachenraum zu untersuchen und sich nicht gleich mit dem rein nervösen Charakter des Kopfschmerzes zu begnügen.

Die Veränderungen der Psyche bestehen theils in gereizter, leicht erregbarer, weinerlicher Stimmung, theils in Apathie, trägem, schläfrigem Wesen und Widerwillen gegen geistige Beschäftigung. Aeusserst häufig sind namentlich bei Kindern mit Hyperplasie der Rachen- und Gaumenmandeln die Abnahme des Gedächtnisses bis zu völliger Amnesie, die Unfähigkeit zu geistiger Arbeit, die Unmöglichkeit, die Gedanken auf einen Punkt zu concentriren; diese letztere Erscheinung hat man nach Guye als „Aprosexie“ bezeichnet. Dieselbe ist aufzufassen als eine Erschöpfungserscheinung des Gehirns, hervorgerufen durch mangelhafte Abfuhr der Stoffwechselproducte oder auch als besondere Erscheinungsform der Neurasthenie (Zarniko); Kinder, die an Aprosexie leiden, sind trotz allem Aufwand von Zeit und Fleiss nicht im Stande, Neues in sich aufzunehmen, ja, sie vergessen bereits Gelerntes, was zur Folge hat, dass sie in der Schule zurückbleiben oder gar als schwachsinnig betrachtet werden. Wie relativ häufig dies vorkommt, ersieht man aus den Schuluntersuchungen von Kafemann, dessen Beobachtungen durch Andere bestätigt wurden.

Noch eine Reihe anderer nervöser Erscheinungen, die als „Reflexneurosen“ später besprochen werden, hat man mit der Behinderung der Nasenathmung in Verbindung gebracht. Speciell kann hier nur der Enuresis nocturna gedacht werden, deren häufiges Vorkommen (bis circa 13%) bei Hyperplasie der Rachenmandel von Körner, Schmaltz, Halbeis, Grönbech und Anderen bestätigt wird. Ob es sich dabei um eine Folge der Kohlensäureüberladung des Blutes handelt oder, wie Bloch meint, um eine auf nervöser Disposition beruhende reizbare Schwäche, mag dahingestellt bleiben; sicher ist, dass sie häufig nach Operation der Rachentonsille verschwindet und bei Recidiven resp. Wiederverstopfung der Nase wiederkehrt.

Die Klagen über völlige Undurchgängigkeit oder über behinderten Luftdurchgang betreffen bald nur eine, bald beide Nasenhöhlen; die Athmung durch die Nase kann ferner dauernd aufgehoben oder nur zeitweise behindert sein. Das letztere ebenso wie der häufig geklagte

Wechsel in der Durchgängigkeit der Nase ist bedingt durch Schwellung des erectilen Gewebes, wie z. B. bei acuter und chronischer Rhinitis oder wie bei der Anwesenheit von Schleimpolypen durch Veränderung ihrer Lage und ihre Fähigkeit, bei feuchtem Wetter aufzuquellen, bei trockenem zu schrumpfen, und endlich durch die Ansammlung grösserer Mengen von Secret, namentlich von Krusten- und Borken.

Die mit Verengerung einhergehenden Nasen- und Nasenrachenaffectionen haben ferner Veränderungen der Sprache zur Folge.

Am häufigsten ist das sogenannte „Näseln" die Rhinolalia aperta, wobei nicht nur alle Vocale nasal gesprochen, sondern auch die Consonanten undeutlich producirt werden. Es findet sich überall da, wo die Mundhöhle nicht gegen den Nasenrachenraum abgesperrt werden kann oder auch wo abnorme Communicationen mit der Nase vorhanden sind; ersteres ist der Fall bei Lähmung des Gaumensegels, letzteres bei Perforationen im harten und weichen Gaumen.

Noch häufiger ist bei theilweisem oder gänzlichem Verschluss der Nase die „Rhinolalia clausa" oder das „Stopfensprechen", das am besten durch Zudrücken beider Nasenflügel nachgeahmt wird. Eine andere Sprachstörung, wie sie namentlich bei Hyperplasie der Rachenmandel oder anderen den Nasenrachenraum ausfüllenden Tumoren vorkommt, ist die sogenannte „todte" Sprache (Meyer). Relativ häufig findet sich nach Kafemann ungefähr in 9% der Fälle bei Mundathmern das Stottern oder Stammeln oder unrichtige Aussprache des G (Gammacismus), L (Lambdacismus), R (Rhotocismus), S (Sigmatismus).

Störungen des Geruches von einfacher Abschwächung des Riechvermögens bis zu völliger Anosmie sind die Begleiter der meisten Nasenaffectionen. Letztere findet sich dann, wenn die riechenden Stoffe nicht auf die Endausbreitungen des N. olfactorius hingelangen können, wie z. B. bei Nasenpolypen, Verwachsungen an dem Naseneingange etc. Können die Riechstoffe nicht von hinten in die Nase gelangen, wie z. B. bei Hypertrophie der hinteren Muschelenden oder bei Geschwülsten des Nasenrachenraumes, dann ist auch das Geschmacksvermögen oder vielmehr die Perception aromatischer Substanzen alterirt. Sehr häufig besteht auch Parosmie, die unrichtige Perception vorhandener oder auch nicht vorhandener Gerüche, oder Kakosmie, die Perception unangenehmer und widerlicher Gerüche, wo solche nicht existiren.

Aeusserst häufig finden sich bei Erkrankungen der Nase Anomalien der Secretion.

Am häufigsten ist die Secretion vermehrt, seltener ist sie vermindert, und auch dann ist die Verminderung nur eine scheinbare. Das Secret ist bei allen entzündlichen Affectionen acuter und subacuter Rhinitis, Diphtherie, Rhinitis fibrinosa, aber auch bei chronischer Rhinitis, Schleimpolypen, sehr dünn und wässerig, äusserst profus, reich an Kochsalz und Ammoniak, so dass die Kranken eine grosse Anzahl von Taschentüchern verbrauchen und die Umgebung der Nasenlöcher entzündet und excoriirt erscheint.

Bei anderen Affectionen oder in einem späteren Stadium derselben Affection ist das Secret dickschleimig, äusserst reich an Mucin und sehr zähe; in anderen Fällen wieder ist es schleimig-eitrig, von graugrüner Beschaffenheit. Eitriges Secret von rahmartiger Consistenz findet sich sowohl bei Entzündungen, wie z. B. bei Rhinitis atrophica, als ganz besonders bei Ulcerationen, Syphilis, Fremdkörpern, Concretionen und Eiterungen der Nebenhöhlen. Das eitrige Secret zeigt wegen seines geringen Wassergehaltes grosse Neigung, einzutrocknen und höchst übelriechende und schwer zu entfernende Krusten und Borken zu erzeugen. Charakteristisch ist die Borkenbildung bei atrophischer Rhinitis, der genuinen Ozaena, doch kommt dieselbe auch bei Syphilis, Tuberculose und Nebenhöhleneiterungen etc. vor. Der Nasenausfluss ist entweder einseitig oder doppelseitig; einseitiger eitriger Nasenfluss kommt hauptsächlich vor bei Anwesenheit eines Fremdkörpers, einer Concretion oder einer Herderkrankung, Syphilis, Tuberculose, ganz besonders aber bei Empyem der Nebenhöhlen. Blutbeimengung zu dem Secret ist wegen der grossen Vulnerabilität der Schleimhaut äusserst häufig und kommt sowohl bei Entzündungen als bei Ulcerationsprocessen vor.

Begleiterscheinungen vieler Nasenaffectionen sind ferner abnorme Sensationen, Schmerzgefühle sowie Störungen des Allgemeinbefindens. Sehr häufig beklagen sich Nasenkranke über unangenehme nagende, ziehende, bohrende und kriebelnde Gefühle in der Nase, sowie über das Gefühl von Kälte oder Wärme bei dem Luftdurchzug; nicht minder häufig besteht heftiger Niesreiz und Niesen. Eigentlicher Schmerz findet sich, abgesehen von Verletzungen, galvanokaustischen Eingriffen etc., bei phlegmonösen Entzündungen des Naseneingangs, Abscessen der Scheidewand, Eiterungen und Geschwülsten der Nebenhöhlen, bösartigen Neubildungen der Nase, hauptsächlich aber bei syphilitischer Knochenerkrankung. Der Schmerz hat meistens seinen Sitz in der Gegend der Nasenwurzel oder hinter den Augenbrauen, an den Jochbeinen, in der Wangengegend, in der Tiefe des Auges, in den Zähnen des Oberkiefers; oft ist der Schmerz neuralgischer Natur und verbreitet sich im Gebiete des Trigeminus, besonders des Supra- und Infraorbitalis. Nicht selten strahlen die abnormen Sensationen nach dem Rachen aus und haben dort Parästhesien zur Folge.

Unter den Allgemeinstörungen ist Fieber die seltenste; es findet sich bei acuter Rhinitis in Folge von Influenza, Masern und anderen Infectionskrankheiten sowie bei Diphtherie, Erysipel und Eiterungen der Nebenhöhlen.

Unter den benachbarten Organen erkranken am häufigsten das Ohr und das Auge.

Je hochgradiger die Obstruction der Nase ist, um so mangelhafter wird die Ventilation der Ohrtrompete; es kommt zu Tubenverschluss oder in Folge Stagnation der Secrete, venöser Stase und Weiterkriechen der Entzündung zu Mittelohrkatarrhen und Mittelohreiterungen mit Perforation des Trommelfells, Caries der Gehör-

knöchelchen, Erkrankung des Felsenbeins etc. Nicht selten verschliessen adenoide Vegetationen und andere Geschwülste des Nasenrachenraumes oder die hypertrophischen Enden der unteren Muscheln direct den Tubeneingang.

Das Auge erkrankt sehr häufig durch Fortkriechen der Entzündung in den Thränennasencanal oder durch Einpressen von infectiösem Secret oder durch Verschluss des Canals. Durch die zahlreichen Anastomosen der Nasengefässe mit jenen der Orbita und des Bulbus kommt es zu Stauungshyperämie, Einengung des Gesichtsfeldes, Asthenopie, Iritis, Ciliarneuralgie, Flimmerscotom, Glaukom. Eiterungen und Geschwülste der Kiefer-, Siebbein- und Stirnhöhlen können zu Orbital- und Lidabscessen und zu Verdrängung des Bulbus, Keilbeineiterungen durch Compression des N. opticus zu Sehnervenatrophie Anlass geben.

Dass endlich auch die Rachenorgane äusserst häufig durch Nasenkrankheiten in Mitleidenschaft gezogen werden, wurde bereits in den Capiteln Pharyngitis chronica, Syphilis etc. besprochen.

Allgemeine Therapie.

Bei der Behandlung der Krankheiten der Nase ist die Reinigung derselben unentbehrlich.

In der Armenpraxis oder auch sonst unter bestimmten Umständen ist das Aufschnupfen von Flüssigkeit das einfachste, aber auch das am wenigsten wirksame Verfahren. Man lässt den Kranken entweder direct aus einem Glase durch die Nase trinken oder die mit der Hohlhand aufgefasste Flüssigkeit in die Nase einziehen, während der Kopf nach rückwärts geneigt wird. Für Ungeschickte sowie für Kinder eignet sich das Eingiessen der Flüssigkeit mittelst eines Löffels oder kleinen, schnabelförmigen Gefässes, das sogenannte Nasenbad. Politzer benützt ein etwa 30 Gramm fassendes Glasschiffchen auch zur Application differenter Stoffe; v. Tröltsch und Mosler empfehlen, das Gurgelwasser durch die Choanen zu schleudern.

Eigens zur Reinigung der Nase dienende Vorrichtungen bezeichnet man als „Nasendouchen“. Die weiteste Verbreitung hat unstreitig die Weber'sche Nasendouche gefunden, deren eines Ende, eine perforirte Metallplatte, in die zur Verwendung kommende Flüssigkeit eingetaucht, während das andere an einem 1—1½ m langen Gummischlauch befestigte Ende, ein konischer oder olivenförmiger Zapfen, in die Nasenöffnung eingeführt wird; da der Apparat auf dem Principe des Hebers beruht, muss die Flüssigkeit erst angesaugt werden. Statt der Olive kann auch die von v. Tröltsch angegebene Röhre für

den Nasenrachenraum angesteckt werden oder die Schwartze'sche Schlunddouche.

Sehr praktisch, weil auch zu anderen Zwecken (Clysopomp, Uterusdouche, Magenpumpe) verwendbar, ist der Irrigator, ein verschieden grosses, an der Wand aufzuhängendes Blechgefäss, an welchem das Ausflussrohr mit oder ohne Sperrvorrichtung befestigt ist.

Um die Flüssigkeit mit grösserer Kraft in die Nase zu treiben und die oft äusserst zähen Secrete und Borken zu entfernen, benützt man Spritzen, sowohl Stempelspritzen als auch Saug- und Druckpumpen, letztere unter dem Namen englische Spritzen oder Davidson'sche Clysopompe oder Gummipumpe bekannt. Sie besteht aus einem Ballon mit Ventilvorrichtung, welcher an jedem der konisch zulaufenden Enden einen Schlauch von $^1/_4$—$^1/_2$ m Länge hat; das mittelst Blei beschwerte Ende wird in ein Gefäss gelegt, die Hornspitze des anderen längeren Schlauches in den Naseneingang geschoben, in horizontale Richtung gebracht und sanft an die Scheidewand angelegt. Nachdem durch Compression des Ballons die Luft entfernt und das Wasser eingesogen wurde, wird in langsamem, tactmässigem Drucke die Flüssigkeit in die Nase eingetrieben. Sehr praktisch und ungefährlich für das Ohr sind Spritzen, deren Ansatzrohre in die Nase vorgeschoben werden können.

Man benützt auch zur Reinigung der Nase und des Nasenrachenraumes den Dampfinhalateur oder den kalten Spray mit gröberer Oeffnung, namentlich bei vollständiger Impermeabilität der Nase oder bei Lähmung, Defecten und Perforationen des Gaumensegels.

Bei allen Arten der Nasendouche wird durch den Reiz der einströmenden Flüssigkeit das Gaumensegel zur Contraction gebracht und so der Nasenrachenraum von der Mundhöhle abgeschlossen; die Spritzflüssigkeit fliesst durch das andere Nasenloch ab. Wird die Douche zu lange fortgesetzt oder durch Schlucken unterbrochen, dann erschlafft das Velum und ein Theil der injicirten Masse gelangt in die Mundrachenhöhle oder wird verschluckt, was bei differenten Stoffen, namentlich dem vielgebrauchten Kali chloricum, durchaus vermieden werden muss.

Hinsichtlich der Temperatur der Spritzflüssigkeit gehen die Ansichten weit auseinander. Während die Einen sehr warme, blutwarme oder lauwarme Flüssigkeiten empfehlen, verwenden die Anderen kühles, ja selbst ganz kaltes Wasser. Da zu warme Flüssigkeit die Fluxion zur Nase begünstigt und die Schleimhaut erschlafft, ganz kaltes Wasser aber ein höchst unangenehmes, brennendes und schmerzhaftes Gefühl verursacht, so wähle man den Mittelweg, d. h. man beginne mit lauwarmem Wasser von circa 25° C. und gehe allmälig zu niedrigeren Temperaturen herab. Auf diese Weise gelingt es, nicht nur die Schleimhaut zu contrahiren, sondern auch allmälig abzuhärten. Es ist natürlich, dass die höheren Temperaturen hauptsächlich im Winter, die niedrigeren im Sommer zur Verwendung kommen.

Die Quantität des Spritzwassers richtet sich nach der Beschaffenheit und Menge des Secretes und dem zur Verwendung kommenden Apparat. Flüssiges oder halbflüssiges Secret lässt sich schneller entfernen als dickes oder gar zu Borken eingetrocknetes. Man wird also im ersteren Falle mit ½—1 Liter ausreichen, während im letzteren meist mehrere Liter nöthig werden; übrigens hat man ohne Schaden, aber auch ohne Nutzen, ungeheure Quantitäten, 20 Liter, selbst einen ganzen Eimer verbrauchen lassen. In der Regel genügt ein 2—3maliges Durchspülen für den Tag.

Noch wichtiger als Temperatur und Quantität ist die Qualität der Spülflüssigkeit.

Verf. verwendet, wie auch Andere, die Nasendouche überhaupt nur zur Reinigung, nie als wirkliches Heilmittel, und verordnet deshalb fast nur die Resolventia, entweder die natürlichen alkalischen, salinischen oder schwefelhaltigen Wässer oder 1—2% Lösungen von Kali carb., Natr. bicarb., Natr. chlorat., Ammon. muriat., Natr. sulfur.; bei Diphtherie verdünntes Kalkwasser, ferner auch die Desinficientia resp. Desodorificantia. In erster Linie steht das Kali chloricum, 1 Esslöffel in 1 Liter Wasser, dann das Kali hypermang. 0·1 : 100·0, die ½—1% Carbolsäure, 2—4% Borsäure, das Natr. benzoic. und salicylicum, die Salicylsäure 1—3%, das Thymol 0·1 : 100·0, das Creolin in ½—2% Lösung.

Von den Adstringentien sind hauptsächlich in Gebrauch Tannin, 1 Messerspitze voll auf 50—100·0 Wasser, Alaun, essigsaure Thonerde, Zinksulfat, Argent nitr., Alumin. acetico-tart. (20 Tropfen bis 1 Kaffeelöffel voll einer 25% Lösung). Man sei mit der Dosirung sehr vorsichtig und beginne stets mit den allerschwächsten Lösungen; denn, abgesehen von dem mehrfach beobachteten Verlust des Geruches, verursachen einige der obengenannten Adstringentia, so namentlich das Zinksulfat, selbst noch in einer Verdünnung von 1 : 1000 Reizung der Schleimhaut, heftigen Niesreiz, Brennen und Thränen der Augen, Kopfschmerz; am ehesten werden die genannten Stoffe noch in Sprayform vertragen.

Wenn viele Personen die Reinigung der Nase mit ganz indifferenten Stoffen schmerzhaft empfinden und namentlich über Stirnweh klagen, so kann man so gut wie sicher sein, dass dieselben die Douche in ungeschickter und fehlerhafter Weise handhaben. Der Fehler besteht, abgesehen von der zu niedrigen oder zu hohen Temperatur, meist darin, dass die Spülflüssigkeit unter zu hohem Drucke in die Nase getrieben wird, wodurch die sehr sensiblen Trigeminusäste gereizt werden. Bei der Weber'schen Douche sowohl wie beim Irrigator soll im Anfang die Höhe des Wasserstrahles nicht über 5 cm betragen; ebenso soll bei dem Gebrauche von Spritzen der Druck anfänglich ein minimaler und stets gleichmässiger, erst allmälig sich steigernder sein. Ein weiterer Hauptfehler liegt darin, dass die meisten Kranken, wenn sie nicht ausdrücklich vom Arzte darüber belehrt werden, den Strahl statt in horizontaler Richtung, also durch den unteren Nasen-

gang, in verticaler Richtung, also gegen das Nasendach, richten. Wieder Andere fehlen darin, dass sie den Kopf während der Douche nicht, wie es die Regel sein soll, nach vorne neigen oder mehr horizontal stellen, sondern nach hinten überbeugen. Nach der Douche soll der Kranke nicht schneuzen, sondern bei zugehaltenem einen Nasenloche die restirende Flüssigkeit durch das andere ausblasen.

Der schwerste Vorwurf, der mit Recht der Douche gemacht werden kann, ist der Eintritt von Flüssigkeit oder infectiösem Secret in das Mittelohr. Wenn es auch wahr ist, dass durch ungeschicktes Manipuliren, so besonders auch durch Verschluss des zum Abfluss dienenden Nasenloches oder ungeschickte Schluckbewegungen, eitrige Mittelohrentzündungen erzeugt werden können, so gehören doch solche Unglücksfälle immerhin zu den Seltenheiten; wegen einzelner Nachtheile aber die Nasendouche zu verwerfen, wäre ebenso unvernünftig, als wenn man auf das Cocaïn, Morphium oder Chloroform verzichten wollte.

Am ehesten entgeht man noch der Gefahr, wenn der Ansatz für die Nase nicht das ganze Lumen des Nasenloches ausfüllt, sondern noch Raum zum Abfluss übrig lässt oder eingefeilte Rinnen oder, wie der von Berthold construirte, eine Zufluss- und Abflussöffnung besitzt, oder nach Hartmann ganz aus weichem Gummi besteht

Als weitere Methoden der Nasenreinigung kommen noch in Betracht das Ausschnauben oder Ausblasen der Nase, was entweder der Kranke selbst besorgt oder mit dem Politzer'schen Ballon geschieht, die Entfernung der Borken und Krusten mit der Sonde oder Pincette und das Auswischen mit Watte.

Als eigentliche therapeutische Methoden müssen die Bepinselungen, medicamentösen Watteeinlagen, Insufflationen und Instillationen betrachtet werden. Die ersteren werden mit einem kleinen Pinsel oder Wattetampon oder einem Stücke feinen Badeschwammes vorgenommen; man benützt hauptsächlich Lösungen von Arg nitr., Chlorzink oder die Mandl'sche Solution, doch ist bei dem beschränkten Raum denselben nur eine untergeordnete Bedeutung beizumessen. Zu den längere Zeit in der Nase zu behaltenden Watteeinlagen benützt man in der Regel Fette, Glycerin, Ol. amygdal., Vaseline, Borsalbe, ferner Lig. ferri sesquichl., Alaun, Tannin, Jodoform, Ung. hydrarg. präcip. albi.

In weit ergiebigerer Weise kann man durch Insufflation pulverförmiger Stoffe auf die Nasenschleimhaut einwirken. Am meisten hat sich der Kabierske'sche Insufflator eingebürgert; zum Selbsteinblasen für die Kranken genügt ein kurzer Gummischlauch mit einem offenen Glasrohr, in welches das zu insufflirende Pulver eingefasst wird. Ueber die Wahl der Stoffe wird bei den einschlägigen Krankheiten die Rede sein. Schnupfpulver, Coryzarien, haben theils den Zweck, die Schleimhaut zu reizen und die Secretion zu steigern, theils direct heilend einzuwirken; in elastisch flüssiger Form kommen ferner Stoffe zur Verwendung, deren Dämpfe oder Riechstoffe aus einer Flasche oder nach Aufträufeln auf ein Tuch durch

die Nase eingeathmet werden. Die Application medicamentöser Stoffe, namentlich Jodoform, Menthol, Tannin, Wismuth, Zinc. sulf., enthaltender Gelatinebougies ist für einzelne Fälle vortheilhaft, doch ziemlich kostspielig.

Als Caustica kommen in der Nase das Chlorzink, der Lapis, die Chromsäure und die Trichloressigsäure in Anwendung. Die Chromsäurekrystalle müssen an einer Sonde vorsichtig erwärmt werden, da dieselben bei allzu starker Erwärmung ihre kaustische Wirkung verlieren. Nach der Application muss die Nase mit einer 1—2% Sodalösung ausgespritzt werden. Die Trichloressigsäure kommt theils in Krystallform, theils in concentrirter Lösung zur Anwendung; in ersterem Falle muss die Sonde an der Spitze mit einer kleinen Aushöhlung zur Aufnahme des Krystalles versehen sein, in letzterem Falle befestigt man eine kleine Wattekugel an eine Sonde und imprägnirt dieselbe dann mit der Säure. Die Chromsäure gibt einen gelben, die Trichloressigsäure einen weissen Schorf; die Application der Chromsäure findet Verf. weniger schmerzhaft, dagegen stossen sich die Schorfe der Trichloressigsäure früher ab. Dass die Chromsäure und Trichloressigsäure die wirksamsten chemischen Caustica sind, ist nicht zu bestreiten, dass dieselben aber die Galvanokaustik überflüssig machen, ist unrichtig. Die Galvanokaustik ist und bleibt das unentbehrlichste, oft geradezu einzige Mittel zur erfolgreichen Behandlung der Nasenaffectionen. Ueber das Instrumentarium wurde bereits früher gesprochen; die speciellen Indicationen werden bei den einzelnen Krankheiten ihre Erledigung finden, ebenso die übrigen, bestimmten Zwecken dienenden Instrumente, wie Zangen, Pincetten, Curetten, Schlingenschnürer etc.

Die Elektricität kommt nur bei den Neurosen und auch da nur in sehr beschränkter Weise zur Anwendung.

Eingehenderer Erwähnung soll an dieser Stelle finden die innere Schleimhautmassage, auch Vibrationsmassage genannt.

M. Braun führte diese Methode nach dem Vorgange von Kellgren zuerst in die Praxis ein; Laker bildete sie weiter aus und zeigte an der Hand zahlreicher Krankengeschichten den Werth derselben. Die Vibrationsmassage besteht darin, dass eine vorne mit Watte armirte Sonde aus Kupfer oder Neusilber in das Naseninnere eingeführt wird und dass nun bei contrahirter Armmusculatur regelmässige Vibrationen des Vorderarmes ausgelöst und von dem Sondenknopfe auf die Schleimhaut der unteren und mittleren Muschel sowie des Nasenbodens übertragen werden. Um Zeit zu sparen und den Arzt vor Ermüdung zu schützen, construirten M. Schmidt-Spiess, Storch, Seligmann und Daae Apparate, die theils mit der Hand, theils durch Elektricität getrieben werden. Der an der Sondenspitze befestigte Wattebausch kann mit Pyoctaninlanolin oder Mentholöl oder Mandl'scher Lösung imprägnirt werden. Mag nun aber auch die Schleimhautmassage durch die Hand des Arztes oder durch Maschinen ausgeführt werden, schmerzlos ist sie sicher nicht, doch kann durch vorherige Cocainisirung die Reflexerregbarkeit und die

Schmerzempfindung herabgesetzt werden. Die Methode ist indicirt bei chronischen Schleimhautkatarrhen theils hypertrophischer, theils atrophischer Natur, namentlich aber bei genuiner Ozaena. Laker will sogar bei polypöser Degeneration den Mutterboden nach galvanokaustischer Abtragung der grösseren Polypen in normale Schleimhaut umgewandelt haben. Von äusserst günstiger Wirkung soll das Verfahren sein bei Reflexerscheinungen, Kopfschmerz, Migräne, Stirndruck, Thränenträufeln, Husten, Neuralgien, Asthma, Gedächtnissschwäche. Die Wirkung der Schleimhautmassage erklärt sich aus dem Zusammenhange, in welchem die Lymphgefässe der Nase mit der Cerebrospinalflüssigkeit und dem intracraniellen Drucke stehen. Die Urtheile über den Werth der Methode lauten bisher noch sehr widersprechend.

Eine eingehende Besprechung erfordern, weil in das Gebiet der allgemeinen Therapie gehörend, die

Allgemeine Operationslehre, Wundbehandlung und üble Zufälle.

1. Allgemeine Operationslehre.

Wie bei Operationen an anderen Körpertheilen, so bedient man sich auch bei Eingriffen in der Nase jetzt allgemein der Anästhetica.

Bei kurzdauernden Operationen an der Schleimhaut, bei Aetzungen, bei galvanokaustischer Entfernung von Hypertrophien und Polypen und bei nicht umfangreichen Operationen an Knorpeln und Knochen genügt in der Regel die locale Anästhesie mit Cocaïn. Dasselbe wird meist in 10—20% Lösung mit dem Pinsel oder Spray applicirt oder auf einem Wattebausch auf die zu behandelnde Stelle gebracht. Bei sehr empfindlichen nervösen Personen ist die wiederholte Cocaïnisirung angezeigt. Wenn auch Vergiftungserscheinungen von der Nase aus sehr selten beobachtet werden, so empfiehlt sich dennoch, allenfalls durch die Choanen fliessendes Cocaïn nicht verschlucken, sondern ausspucken zu lassen; manche Personen werden durch die im Rachen oder auf den Lippen auftretende Parästhesie sehr geängstigt und in Aufregung versetzt.

Zur allgemeinen Anästhesie benützt man Aether, Chloroform oder Bromäthyl, das letztere nur bei kurz dauernden Eingriffen. Die Narkose mit Chloroform ist angezeigt bei schwierigen, langdauernden Knochenoperationen und bei sehr ängstlichen, unruhigen Kranken oder auch bei widerspenstigen Kindern, bei denen ein Fremdkörper zu suchen und zu entfernen ist. Wegen der Gefahr der Aspiration von Blut und Schleim soll die Narkose nur eine halbe sein, d. h. die Reflexthätigkeit soll nicht völlig aufgehoben sein.

Selbstverständlich müssen die Hände des Operateurs sowie alle bei Operationen in der Nase in Anwendung kommenden Instrumente,

also auch Spiegel, Sonden etc., und die Nase selbst gereinigt und desinficirt werden; letzteres geschieht durch Ausschnauben, Nasendouche oder mit dem Borwasserspray. Die Desinfection der Instrumente geschieht am sichersten durch Auskochen, doch genügt auch das längere Liegenlassen der vorher auf das Sorgfältigste mechanisch gereinigten Instrumente in 5% Carbollösung. Schwieriger ist die Desinfection und Reinigung der Galvanokauteren von dem den Röhren oder Brennern anhaftenden Schleim und Blut. Erbe in Tübingen und Hirschmann in Berlin haben zwar diesem Uebelstand durch Umhüllung der Leitungsdrähte mit einer Metallhülse abgeholfen, allein in sehr engen und schiefen Nasen wird man doch zu den gewöhnlichen schlankeren Brennern seine Zuflucht nehmen müssen.

Unter den unangenehmen Ereignissen während oder nach der Operation ist die Blutung das häufigste. Das sicherste Mittel zur Stillung derselben ist und bleibt die Tamponade. Verf. verwendet dazu sterilisirte Bruns'sche Watte; Eisenchloridwatte ist nicht nur überflüssig, sondern auch schädlich. Wo der Tampon voraussichtlich länger als 12—24 Stunden liegen bleiben muss, empfiehlt sich zur Tamponade Dermatol- oder Jodoformgaze. Bei mittelstarker Blutung genügt in der Regel die partielle Tamponade, d. h. das Andrücken des Tampons auf die blutende Stelle, was viel weniger reizt und sogar das Athmen durch die operirte Nase gestattet. Bei profusen Blutungen muss die ganze Nase eventuell mit mehreren Tampons versehen werden. Der Tampon soll womöglich nach 12 Stunden entfernt und, wenn nöthig, durch einen neuen ersetzt werden. Von den grossen Gefahren, welche Zarniko selbst einer kurz dauernden Tamponade zuschreibt, hat sich Verf. bis jetzt noch nicht überzeugen können. Auswärtigen Kranken kann man für den Nothfall Liquor ferri verordnen, 20 Tropfen in $^1/_4$—$^1/_2$ Liter kalten Wassers zu lösen und aufzuschnupfen; freilich genügt dies nur für Blutungen geringen Grades. Als ein unschädliches Hämostaticum wird neuerdings das Ferropyrin empfohlen, das in 18—20% wässeriger Lösung mittelst Wattetampon auf die blutende Stelle applicirt wird. Bei parenchymatösen Blutungen, welche weniger durch ihre Heftigkeit als durch lange Dauer den Kranken schwächen, kann man die operirte Stelle mit dem Flachbrenner cauterisiren oder mit einem Tropfen reiner Eisenchloridlösung oder mit Chromsäure bestreichen.

2. Wundbehandlung.

Nach eventueller Stillung der Blutung beginnt die eigentliche Nachbehandlung. Dass die Nase nicht vollständig antiseptisch gemacht werden kann, darüber sind Alle einig, ebenso aber auch darin, dass trotzdem eine antiseptische Behandlung einzuleiten ist, so gut es eben möglich ist. Es ist selbstverständlich, dass das in der Nase befindliche Blut und Secret entfernt werden muss, sei es durch Schneuzen oder durch Irrigation oder Borspray. Sodann insufflire man auf die operirte Stelle eine Portion Jodol oder auch Aristol, Dermatol, Jodo-

formpulver und verschliesse die Nase leicht mit einem Stück Brunsscher Watte und ertheile dem Kranken den strengsten Befehl, dasselbe zu erneuern, wenn die Watte durch das ablaufende Secret nass geworden ist oder wenn die Nase mittelst des Borsprays (M. Schmidt empfiehlt Acid. bor. 2·0, Cocaïn mur. 0·2, Aq. destill. 190·0) zweimal täglich gereinigt wurde. Auf's Strengste verbiete man den Operirten das Umgehen mit staubenden Substanzen oder den Besuch menschenerfüllter Räume, Theater, Ball- und Concertsäle, Restaurants, ferner den Besuch Kranker, namentlich an Infectionskrankheiten Darniederliegender, oder grössere Spaziergänge zu Fuss, Wagen oder Pferde und den Alkohol. Die antiseptische Nachbehandlung hat, wenn möglich, unter Controle des Arztes 3—4 Wochen lang zu dauern; auswärtigen Kranken verordne man Jodolpulver zum Selbsteinblasen nach vorheriger antiseptischer Reinigung.

Um die Reaction nach galvanokaustischen Operationen weniger heftig und erträglicher zu machen, hat Bresgen die Application eines in 0·2% Pyoctaninlösung getauchten und mit Pyoctaninpulver überstreuten Wattestücken auf die operirte Stelle empfohlen. Dem Verf. hat sich dieses Verfahren nicht nützlicher erwiesen, als die Einblasung von Jodol, Aristol oder Dermatol. Die sich bildende Croupmembran stösst sich entweder von selbst nach 4—6 Tagen ab, oder sie kann, wenn sie schon theilweise abgehoben ist, mit der Pincette entfernt werden.

Bei der oft völligen Verstopfung, welche galvanokaustischen und anderen Eingriffen in der Nase folgt, gestattet Verf. den Kranken, unmittelbar vor dem Schlafengehen einige Tropfen einer 1—5% Cocaïnlösung in die Nase zu träufeln. Bei sehr profuser Secretion empfiehlt es sich, zur Verhütung von Eczem und Schrundenbildung den Naseneingang mit Goldcrême, Myrrhencrême oder Borvaselin mehrmals täglich zu bestreichen.

3. Ueble Zufälle.

Trotz aller Vorsicht und Beobachtung der Antisepsis können sich aber doch unglückliche Zufälle nach der Operation ereignen.

Zu den relativ häufigsten und ungefährlichsten Folgezuständen endonasaler, namentlich galvanokaustischer Eingriffe, gehören, abgesehen von Ohnmacht, Erbrechen, Kopfschmerz, Mattigkeit, leichtem Fieber und Schlaflosigkeit, Schwellung und Gedunsensein des Gesichtes, Herpes (Heymann), Supraorbitalneuralgie, Zahnschmerzen, vorübergehender Verlust des Geruches und Verwachsungen der Schleimhaut der Muscheln mit der Scheidewand. Ein Theil dieser Erscheinungen ist directe Folge der Galvanokaustik und ist durch nichts zu verhüten, ein anderer Theil dürfte durch die peinlichste Antiseptik vor und nach der Operation zu vermeiden sein.

Bedenklicher sind schon schwere Störungen des Nervensystems, wie epileptiforme Anfälle, Delirien, vorübergehender Irrsinn,

vorübergehende Amaurose, Verlust des Geruches und bei Schwangeren Abortus.

Die grösste Gefahr droht jedoch durch Infection der Wunde von aussen oder vom Naseninnern aus.

So kann die Wunde und deren Umgebung diphtheritisch werden oder es kann Phlegmone oder Erysipel der Haut der Nase und des Gesichtes oder der ganzen äusseren Bedeckung sich einstellen. Mediciner und Aerzte mit frischen Nasenwunden sollten keine mit infectiösen, besonders mit exanthematischen Krankheiten Behaftete besuchen und jede Berührung mit infectiösem Material in Anatomie- und Secirsälen vermeiden. Vom Naseninnern selbst droht insoferne Gefahr, als durch Ansammlung und Zersetzung von Secret Infection der Wunde und der Nachbarschaft erfolgen kann. Bresgen hat Recht, wenn er dem unzweckmässigen Schneuzen bei zugehaltener Nasenöffnung die Entstehung eitriger Mittelohrentzündungen beimisst, indem durch den hohen Druck Eiter- und Entzündungserreger durch die Tuben in das Mittelohr eingepresst werden. Eine andere Ursache der Ohraffectionen liegt, wie bereits früher erwähnt wurde, in der unzweckmässigen Anwendung der Nasendouche. Durch Weiterverbreitung infectiösen Materials in den Rachen kommt es zuweilen auch zu Entzündung und Phlegmone der Rachen- und Gaumenmandeln. Wird infectiöses Material in's Blut aufgenommen, dann entsteht hochgradiges Fieber mit Delirien und Albuminurie oder auch allgemeine septische Infection. Am allergefährlichsten aber ist das Weiterschreiten der Entzündung oder die Verschleppung infectiöser Stoffe nach oben durch die Lamina cribrosa in das Gehirn und seine Häute, das Auftreten von meningitischen Erscheinungen oder Sinusthrombose oder Gehirnabscessen. Auffallend häufig sah man diese Symptome nach Operationen an der mittleren Muschel auftreten (Wagner, Lange, Quinlan, Lublinski), und zwar in solchen Fällen, bei denen wegen starker Blutung die Nase mehrere Tage lang tamponirt bleiben musste. Bresgen glaubt deshalb dem durch die Tamponade behinderten Abfluss der Secrete die Schuld beimessen und vor längerer Tamponade warnen zu müssen. Die Forderungen Bresgen's aber, man sollte niemals den Brenner anwenden, wenn der Kranke nicht im Orte oder in dessen unmittelbarer Nähe wohne, oder man sollte nicht gleich am ersten Tage die Galvanokaustik anwenden, gehen entschieden zu weit und sind schon der Kranken wegen undurchführbar.

Missbildungen, Anomalien und Formfehler.

Betrachten wir zuerst die Formfehler der äusseren Nase, so begegnen wir, abgesehen von den äusserst zahlreichen, das Auge des Aesthetikers beleidigenden Formationen, sehr selten der Verdoppelung der Nase. Häufiger sind angeborene Defecte, als da sind: Fehlen der Nasenbeine oder der Nasenfortsätze

des Oberkiefers; vollständiges Fehlen der Nase beobachtete Maisonneuve; es befand sich an Stelle der Nase ein Hautfleck, an dessen unterem Ende zwei äusserst schmale Oeffnungen, die Andeutungen der Nasenlöcher, sich vorfanden. Mangel der Cartil. alar. und triangulares sowie Hyperplasie sämmtlicher Nasenknorpel wurde unter Anderem auch von Schäffer, abnorm schwache Entwicklung und Dünnheit einzelner Knorpel von Jurasz beobachtet. Abnorme Grösse der Nase findet sich bei Acromegalie. Ziemlich häufig sind die Spaltbildungen, welche sich meist im Gefolge von Gaumenspalten und Hasenscharten in die Nasenöffnungen fortsetzen. Die vorderen Nasenöffnungen hat man wiederholt vollständig oder theilweise bei der Geburt geschlossen gefunden; knöcherne Obliterationen sind äusserst selten. Meist sind die Verwachsungen der Nasenlöcher membranös; ihre Tiefe ist sehr verschieden und lässt sich durch Aufblasen der Nase durch Pressen bestimmen. Sehr häufig sind die erworbenen Veränderungen und Verwachsungen der Naseneingänge; so sah Verf. eine hochgradige Stenose des linken Nasenloches nach einem Säbelhiebe, eine andere nach einer Verbrennung, Böcker und Jurasz nach Cauterisation mit Lapis zurückbleiben: am häufigsten sind dieselben Folgen von Lupus und Syphilis durch Zerstörung der Nasenflügelknorpel und Retraction der Weichtheile.

Des angeborenen knöchernen und des erworbenen membranösen Verschlusses der hinteren Nasenöffnungen wurde bereits früher Erwähnung gethan, ebenso der anderen Anomalien des Nasenrachenraumes.

Im Innern der Nase begegnet man angeborenen Defecten des ganzen Septum oder des Vomer, der unteren Muschel, des Siebbeinlabyrinthes; unter den erworbenen Formfehlern sind die häufigsten Perforationen und Defecte des Septum mit Einsinken der äusseren Nase (Sattelnase, Lorgnettennase, Nez de mouton) in Folge von Syphilis und anderweitiger Ulcerationsprocesse, ebenso Verlust der Muscheln, Zerstörungen des Vomer etc. Sehr häufig sind ferner Missbildungen der Muscheln, welche bald zu gross, bald zu klein oder zu flach oder zu stark gewölbt und gerollt, eingekerbt, sogar durchlöchert erscheinen; das Vorkommen einer vierten Muschel wurde bereits erwähnt. Verdoppelung des Septum wurde von Lefferts und Verf., Verdoppelung der mittleren Muschel wiederholt vom Verf. beobachtet. Die Verdoppelung resp. Spaltung der mittleren Muschel ist häufiger in ihrem vorderen Theile als in ihrem hinteren; sie erstreckt sich selten über die ganze Länge der Muschel, meist nur bis zur Mitte derselben; Killian sah mehrmals Spaltungen der hinteren Enden beider Siebbeinmuscheln und betrachtet sie als persistirende dritte Siebbeinfurchen.

Unter allen Formanomalien des Naseninnern ist die häufigste die Verbiegung des Septum; man kann behaupten, dass kaum ein Mensch eine ganz gerade Nasenscheidewand besitzt. Dem entsprechen auch die von verschiedenen Anatomen vorgenommenen

Messungen, welche bis zu 77% Septumdeviationen ergeben. Nach Zuckerkandl ist knöcherne Septumdeviation viel häufiger bei den Europäern als bei Nichteuropäern. Sie sind ferner auch beim männlichen Geschlechte häufiger als beim weiblichen. Die Formen dieser Verbiegungen sind äusserst mannigfaltig Das Septum fällt terrassenförmig gegen den Nasenboden ab (Fig. 19) oder es ist der obere oder nur der untere Theil oder es sind beide verkrümmt; die Verkrümmung ist eine S-förmige oder es besteht oben eine Verkrümmung, unten eine Spina (Fig. 20). Nicht selten erscheint der obere Theil des Septum gegen den unteren eingeknickt — Infractionsdeviation —, besonders dann, wenn die Crista nasalis sehr hoch hinaufreicht (Fig. 21). Durch alle Deviationen der Scheidewand entsteht ein Missverhältniss in der Weite der Nasenhöhlen; die Nase, welche den convex gewölbten Theil des Septum beherbergt, wird verengt, die andere erweitert. So lange das Missverhältniss kein bedeutendes ist, fehlen meist alle Be-

Fig. 19. Terrassenförmig abfallendes Septum.

Fig. 20. Deviation des Septum im oberen Theile, Spina im unteren.

Fig. 21. Infractionsdeviation.

schwerden; bei hochgradiger Verbiegung kommt es aber zu beträchtlichen Functionsstörungen, zu Unwegsamkeit der Nase für die Respiration, Verminderung oder Aufhebung des Geruches und zur Unmöglichkeit, die angesammelten Secrete zu entfernen; die Sprache wird nasal, auch wird das Einführen des Ohrkatheters, die Untersuchung und das Operiren in der Nase ausserordentlich erschwert, ja unmöglich. Auch die verschiedensten Reflexneurosen können durch den Contact der verbogenen Scheidewand oder der gleich zu erwähnenden Leisten und Auswüchse mit den Muscheln erzeugt werden.

Ueber die Ursachen der Septumdeviationen sind die Ansichten noch sehr getheilt. Zuckerkandl theilt sie ein in traumatische, compensatorische und physiologische, d. h. durch Wachsthumsanomalien erzeugte Verbiegungen. Daran, dass durch habituelles Schlafen auf einer Seite, Schneuzen mit derselben Hand, Bohren mit dem Finger in einer Nasenseite eine Verbiegung der Scheidewand zu Stande kommt, glaubt heute Niemand mehr. Dass aber Traumen, Brüche der knöchernen und knorpeligen Scheidewand, Luxationen der Knorpel in der That Septumdeviationen zur Folge haben können, ist sicher constatirt, doch wird die Häufigkeit dieser sowie der durch Rhachitis entstandenen Formen bedeutend überschätzt. Nicht Traumen,

sondern vielmehr abnorme Wachsthumsvorgänge spielen die erste Rolle. Wächst der Scheidewandknorpel, welcher zwischen Lamin. perpendic., Vomer und Crista nasalis eingeschoben ist, im Verhältniss zu den übrigen die Nase bildenden Knochen schneller und abnorm stark, dann muss derselbe, da er weder nach oben noch nach unten ausweichen kann, seitlich ausweichen. Wächst die seitlich ausgebogene Stelle noch weiter, dann kommt es zur Bildung von Spinen oder spinösen Leisten. Diese Wachsthumsanomalien fallen durchaus nicht immer in die Kinderjahre; wenn auch Septumdifformitäten vor dem 7. Lebensjahre und zur Zeit der zweiten Dentition nicht selten angetroffen werden, was gewöhnlich Folge der Mundathmung ist, so entwickeln sie sich doch am häufigsten im Alter von 14—20 Jahren. Bildet sich die Septumanomalie sehr frühzeitig, dann muss sich die untere Muschel derselben accommodiren; regelmässig entspricht dann der Convexität des Septum eine Concavität der Muschel, wofür die Figuren 22 und 23 den Beweis geben mögen. Auch Hopmann

Fig. 22. Hochgradig missbildetes, doviirtos Septum, rechts mit Spina, links mit Infraction. Accommodation der unteren Muschel.

Fig. 23. Hochgradige Verkrümmung des Septum mit Bildung spinöser Leisten und Accommodation der unteren Muscheln.

erwähnt, dass die verschiedenen Knochen und Knorpel der Nase nicht immer gleichmässig proportional wüchsen, sondern der eine mehr als der andere, und dass daraus Faltungen, Verbiegungen und Knickungen entstehen müssen. Hartmann hält ebenfalls Entwicklungsanomalien für die Ursache der Septumdeviationen, schliesst Traumen aber nicht aus. Die Knickungsstelle bei den Verbiegungen liegt fast immer in der Verbindung des Vomer mit der Cartilago quadrang. und der Lamina perpendic.; die Knickungslinie geht von der Spina nas. ant. zum Rostrum sphenoid., die Cristae und Spinae sitzen gewöhnlich an der Verbindungsstelle zwischen Vomer und Scheidewand, oder zwischen Vomer und Lamin. perpend., oder zwischen Scheidewandknorpel und Lamina perpend. Réthi lässt die wirklichen Knickungen aus äusseren Einwirkungen, Traumen, entstehen, die blasigen Auftreibungen aus Wachsthumsanomalien. Dass frühzeitig auftretende Verstopfungen der Nase weittragende Folgen auf die Entwicklung des Schädels haben, wurde bereits im Capitel Allgemeine Symptomatologie näher ausgeführt und auch von Ziem experimentell nachgewiesen; bei jungen Thieren, welchen er eine Nasenhälfte vollkommen für längere Zeit

verschloss, zeigte sich eine Abweichung des Zwischenkiefers, der Sutura sagittalis nach der verschlossenen Seite, eine geringere Länge des Nasenbeines, Stirnbeines und der horizontalen Gaumenplatte, eine weniger steile Erhebung der Alveolarfortsätze, ein kleinerer Abstand zwischen der Vorderfläche der knöchernen Gehörkapsel und Alveolarfortsatz sowie zwischen Jochbogen und Supraorbitalrand, eine geringere Grösse und asymmetrische Lage der Gefäss- und Nervencanäle auf der verschlossenen Seite und ungleicher Abstand der Orbitae von der Medianlinie. Beim Menschen fand Schaus auf der verengten Seite ein auffallendes Weiterausgeschnittensein der Apertura piriformis, einen ungleichen Höhenstand der Orbitae, eine ganz auffallend abnorme Höhe, Schmalheit und Spitzheit des Gaumengewölbes mit spitzwinkeliger Hervorwölbung der Alveolarfortsätze des Oberkiefers auf der der verengten Nase entsprechenden Seite (vergl. S. 256). Die er-

Fig. 24. Spina am unteren Theile des Septum.

Fig. 25. Spina septi rechts in der Höhe der mittleren Muschel, Infractionsdeviation links.

Fig. 26. Von der unteren zur mittleren Muschel sich erhebende Spina septi.

wähnten Veränderungen der Orbitae führen zu Asthenopie, Astigmatismus und Strabismus; nach Ziem führt die ungleichmässige Entwicklung des Gesichtsskeletes zu ungleicher Belastung und zu Verkrümmung der Halswirbelsäule.

Ziemlich häufig ist ferner die angeborene Enge der Nasenhöhlen. Der Nasenrücken erscheint dabei oft sehr schmal, die seitliche Wand der Nase steil abfallend, die Nasenflügel zusammengedrückt, die Nasenöffnungen nach vorne und oben gerichtet, die meist sehr platten, wenig oder gar nicht gewölbten Muscheln dem Septum sehr nahe gerückt, das Lumen der Nase ausserordentlich reducirt. Die Respiration durch die Nase wird bei der geringsten Schwellung der Schleimhaut unmöglich, der Geruchsinn vermindert, die Sprache näselnd; acute Katarrhe werden leicht chronisch oder pflanzen sich auf den Rachen und das Mittelohr fort.

Abnorme Weite der Nase findet sich als Raceneigenthümlichkeit bei manchen Volksstämmen, z. B. den Czechen und Südslaven, Kirgisen, Mongolen, verschiedenen Negerstämmen etc., ferner bei angeborenen oder erworbenen Defecten der Muscheln, bei Dilatation durch sehr grosse und zahlreiche Nasenpolypen, hauptsächlich aber

bei Ozaena simplex und Syphilis in Folge des Schwundes der Schleimhaut und des erectilen Gewebes der Muscheln.

Ausser Verbiegungen kommen am Septum verschiedene Veränderungen vor. Am häufigsten sind partielle Verdickungen resp. Auswüchse, rundliche, blasige oder kegelförmige, oft ganz spitzige Fortsätze, Grate oder auch Spinen genannt. Sie haben häufiger am vorderen als am hinteren Theile der Scheidewand ihren Sitz und sind theils knorpeliger, theils knöcherner, theils gemischter Natur. Sie sind häufig von geringer Ausdehnung und stellen dann circumscripte, kegel- oder keilförmige Auswüchse dar, welche den unteren oder mittleren Nasengang verlegen oder halbiren (siehe Fig. 22 rechts, 23 rechts, 24, 25 rechts).

Nicht selten ist der obere Theil der Scheidewand deviirt, der untere spinös (Fig. 20, 22).

Nehmen die Septumauswüchse grössere Strecken ein, dann entstehen spinöse Leisten, welche nicht selten der ganzen Länge des Septum folgen (vergl. Fig. 22 links). Solche Leisten haben meist eine pyramidale Form und verlaufen, die Spitze der Pyramide der unteren Muschel zugekehrt, parallel mit dieser; seltener erheben sie sich — wie z. B. in Fig. 26 — von dem Niveau der unteren Muschel zu dem der mittleren und erzeugen so eine hochgradige Stenose. Am häufigsten finden sich Septumleisten am oberen Rande des Vomer oder an der Vereinigung der Crista nasalis mit dem Scheidewandknorpel, entstanden durch Knochen- und Knorpelwucherung gegeneinander waehsenden Theile. Ferner findet sich, worauf schon Miehel aufmerksam machte, nicht selten ein beweglicher blasser Vorsprung nahe dem Nasenboden oder an der Scheidewand, der unterste Theil der knorpeligen Scheidewand, welcher aus der Verbindung mit der knöchernen luxirt ist. Gar nicht selten sind ferner Verwachsungen, Synechien des Septum mit den Muscheln oder dieser unter sich; sie sind theils angeboren oder spontan entstanden, theils verdanken sie galvanokaustischen oder chemischen Aetzungen und Operationen namentlich in engen Nasen ihre Entstehung; begünstigend wirken auch Spinen und Deviationen; sie betreffen bald die untere, bald die mittlere Muschel und sind theils membranöser, theils knöcherner Natur. Nicht selten steht auch die untere Muschel mit dem Nasenboden durch eine Knochenleiste in Verbindung. Zuweilen finden sich ferner Knochenblasen und Knochencysten; sie gehen vom Siebbein resp. dem vorderen Ende der mittleren Muschel oder der Bulla ethmoidalis aus und machen, wenn sie klein sind, keine Erscheinungen; bei grösserem Umfange führen sie zu Verstopfung, Verbiegung des Septum, Wachsthumstörung der mittleren Muschel der anderen Seite, Dislocation der Orbita mit Exophthalmus, Anosmie, Trigeminusneuralgien und anderen Neurosen. Sie sind theils mit Luft, theils mit Schleim oder Eiter gefüllt und werden bei den Krankheiten der Nebenhöhlen noehmals Erwähnung finden.

Die Beschwerden bei denjenigen Anomalien, bei welchen das Lumen des Naseninnern verkleinert wird, bestehen in Behinderung

der Nasenathmung, in Gehörstörungen, nicht selten in Veränderungen der Stimme und dem Auftreten der verschiedensten Reflexneurosen, so Kopfschmerz, Niesanfälle, Asthma etc. (siehe Reflexneurosen).

Die Therapie der angeborenen oder erworbenen Formfehler der Nase kann natürlich nur eine operative sein. Bei der oft ausserordentlichen Schwierigkeit dieser Operationen empfiehlt sich zur Freihaltung beider Hände das fixirbare Speculum von Zarniko. Selbstverständlich darf nur dann operirt werden, wenn entweder Respirationsbeschwerden von Seite der Nase bestehen oder wenn Ohraffectionen vorhanden sind, die durch die Nasenerkrankung verursacht oder unterhalten, oder ohne Beseitigung des Hindernisses in der Nase nicht behandelt werden können, und endlich wenn Reflexneurosen auftreten, deren Auslösung durch Verbiegungen oder Spinen des Septum wahrscheinlich ist (Moure). Bei membranösem, narbigem Verschluss der Nasenlöcher muss die Trennung mit Messer oder Galvanokauter vorgenommen und die Wiederverwachsung durch Einlegen perforirter, mit einem Federkiel versehener Kork-, Watte- oder Gummistöpsel oder auch Metallbougies verhindert werden; bei geringgradigeren Stenosen nützt zuweilen die allmälige Dilatation mittelst Pressschwamm oder Laminaria. Die Methoden zur Beseitigung des knöchernen oder membranösen Choanenverschlusses wurden bereits bei den Krankheiten des Rachens erwähnt. Defecte der äusseren Nase können durch künstliche, aus Celluloid, Kautschuk oder Silberblech gefertigte und mit Federn versehene Pièçen gedeckt werden. Plastische Operationen zum Ersatz der Nasenspitze, der Nasenflügel, zur Beseitigung der Spaltbildungen gehören in das Gebiet der Chirurgie. Knochenblasen von nicht zu bedeutender Grösse können mit der kalten oder heissen Schlinge oder der Knochenzange, dem Conchotom oder mit dem Meissel abgetragen werden; bei sehr grosser Härte und Ausdehnung muss man entweder zuerst ein Loch bohren und von da aus stückweise die Geschwulst abtragen, oder den Nasenflügel spalten und den Tumor wegmeisseln. Bei störender angeborener Enge der Nasenhöhlen lässt sich nur durch Entfernung irgend einer Muschel Abhilfe schaffen.

Die orthopädische Behandlung der Septumdeviationen, bestehend in der 50—100mal im Tage vorzunehmenden Verschiebung der Nasenspitze nach der entgegengesetzten Seite, sowie die allmälige Geradestellung durch Einführen von Tampons, Gummiröhren, Laminaria- oder Tupelostifte etc., sind auch nach des Verf. Erfahrung völlig nutzlos, da selbst nach der vollkommensten Geradestellung das Septum wieder in seine alte abnorme Stellung zurückkehrt. Bessere Resultate erzielt man mit der unblutigen Geradestellung nach Jurasz.

Jurasz empfiehlt bei gleichmässiger Verkrümmung und Unnachgiebigkeit des Septum nach dem Vorgange von Adams, dasselbe zwischen zwei Platten gerade zu pressen; er construirte zu diesem Zwecke ein Instrument, das aus zwei gesondert einzuführenden Theilen besteht; man führt nach vorheriger Cocaïnisirung zuerst jede einzelne Hälfte der Zange in eine Nasenöffnung ein, legt sie um die verbogene knorpelige Scheidewand und schliesst das Instrument;

hierauf drückt man die beiden Branchen so stark zusammen, dass die Verkrümmung ausgeglichen und die Scheidewand in die Medianlinie gedrängt wird. Sodann werden die beiden Platten in loco aufeinandergeschraubt, der Compressor liegen gelassen und die Zange abgenommen. Der Compressor, welcher so gebaut ist, dass er den Kranken beim Essen nicht stört, soll womöglich 3 Tage liegen bleiben und wird entfernt, indem zuerst die Schraube und dann jede einzelne Platte besonders herausgenommen wird. Leider wird der Erfolg auch dieser Operation durch die Schmerzhaftigkeit des Verfahrens, die lange Nachbehandlung und das Zurückgehen des Septum in die frühere fehlerhafte Lage recht oft vereitelt.

Eine andere Methode üben Steele und Daly. Sie zerbrechen zuerst die hervorgewölbte Stelle des Septum mittelst einer mit vier sternförmigen scharfen Leisten versehenen Zange und legen dann Elfenbeinbolzen ein, welche 4 Tage in der richtigen Stellung erhalten werden müssen. Réthi macht mit einem Kehlkopfmesser über der höchsten Wölbung durch die ganze Dicke des Septum einen Kreuzschnitt, drückt mit dem Spatel die vier Knorpellappen von der verengten Stelle her ein und legt einige Tage lang mit Jodoformgaze umwickelte Hartgummiröhren ein, um das Septum in seiner neuen Lage zu erhalten.

Man hat ferner versucht, durch galvanokaustische Verkleinerung der der Deviation gegenüberliegenden Schleimhautpartie Raum zu schaffen; die Resultate sind aber meist ungenügend. Mehr Raum wird geschaffen durch die Entfernung der unteren oder mittleren Muschel, doch ist diese Operation nicht nur eine sehr blutige, sondern unter Umständen sogar sehr gefährliche.

Die früher zur Beseitigung der seitlichen Ausbauchungen der Scheidewandplatte allein geübte blutige Methode, ein Stück der Scheidewand mit einer Locheisenzange, ähnlich den Instrumenten zum Coupiren der Eisenbahnbillete, herauszunehmen, leidet an dem Missstande, dass es bei den bestehenden Raumverhältnissen meist nicht gelingt, das Instrument auf die Höhe der Vorwölbung zu bringen. Da also meist nur ein Stück aus dem vor der stärksten Verkrümmung liegenden Theile herausgeschnitten wird, so beruht die Operation auf einer Täuschung, da zwar durch das Nasenloch der verkrümmten Seite Luft einströmt, die Verkrümmung selbst aber bestehen und der hinter der Verbiegung liegende Theil der Nase ausser Function bleibt.

Hartmann und Petersen schlugen deshalb die partielle Resection der Nasenscheidewand vor; in der Narkose wird die Schleimhaut gespalten, mit einem Raspatorium von dem unterliegenden Knochen abgehoben und zurückgeschoben, das vorgewölbte Stück des Septum mit einer kleinen Knochenscheere in der Grösse eines Zehnpfennigstückes ausgeschnitten; durch Einlegen eines dicken Gummischlauches wird das Septum in die rechte Lage gebracht und darin erhalten.

Krieg reseeirt die Cartilago quadrang. septi nach vorhergegangener Cocaïnisirung. Die schwierige und durch Blutungen lang-

wierige Operation beginnt mit der galvanokaustischen Durchschneidung der Schleimhaut der verengten Seite und der Abhebelung des Knorpels vom Involucrum der weiten Seite; dann wird der zungenförmige, mit seiner Spitze nach vorne schauende Schleimhaut- und Knorpellappen möglichst weit nach hinten zu ausgeschnitten; geht noch immer nicht genügend Luft durch, dann muss vom Septum noch mehr mit einer Hohlmeisselzange entfernt werden. Das Involucrum der verengten Seite ist wegzunehmen und eine antiseptische Nachbehandlung einzuleiten. Aehnlich ist die Methode von Cholewa.

Sehr viel einfacher ist die Resection des vorgewölbten Septum in ganzer Dicke, d. h. mit Perforation; selbstverständlich muss durch dieselbe auch der hinter der Stenose gelegene Theil der Nase für die Luft passirbar werden. Die durch die Perforation gesetzte „Verstümmelung" ist völlig nebensächlich, da sie weder Nachtheile noch Formveränderung der Nase mit sich bringt. Verf. durchschneidet nach vorheriger Cocaïnisirung mittelst eines eigens construirten langen, geknöpften Messers den hervorstehenden Theil des Septum in einem Zuge; zuweilen ist eine Nachhilfe mit der Scheere und Stillung der Blutung durch die Tamponade nothwendig. Knorpelige Auswüchse können ebenfalls mittelst geeigneter Messer abgetragen werden.

Wegen der Schwierigkeit der Resection des Septum suchen sich Andere, wie z. B. Moldenhauer, nach dem Vorgange von Demarquay durch Spaltung der äusseren Nase nach unten und in der Nasolabialfurche und Umklappen des Nasenflügels besseren Zugang zum Septum zu verschaffen.

Die Behandlung der übrigen Anomalien, welche gleichfalls mehr oder weniger ausgesprochene Functionsstörungen zur Folge haben, ist eine sehr verschiedene. Am einfachsten ist die membranöse Verwachsung der Muscheln mit dem Septum mittelst Scheere, Messer oder Galvanokauter zu beseitigen; die Wiedervereinigung kann durch Einblasen von Jodol oder Dermatol oder durch Einlegen von Tampons, Hartkautschukplatten, Stanniolstücken oder Dilatationssonden (Winekler) verhindert werden. Knöcherne Spinen werden am besten mit der Nasensäge beseitigt oder mit einem scharfen Meissel weggestemmt. Von ausserordentlich exacter und rascher Wirkung ist die von M. Schmidt und Spiess in die Praxis eingeführte Methode der Entfernung knorpeliger und knöcherner Auswüchse mittelst durch einen elektrischen Motor getriebener Instrumente. Die Operation ist, wie sich Verf. überzeugen konnte, bei vorheriger Cocaïnisirung fast absolut schmerzlos und dauert nur einige Secunden. Der Motor, welcher den Ansätzen die nöthige Drehung verleiht, kann schon durch einen sechszelligen Accumulator in Bewegung gesetzt werden. Die Uebertragung auf den Ansatz findet durch eine in einem beweglichen Schlauche befindliche Spirale statt, wie sie die Zahnärzte schon längst in Gebrauch haben. Entsprechend den beiden Bewegungsarten, welche sich mit dem Motor ausführen lassen, der Drehung um die Längsaxe und durch Uebertragung der Vor- und Rückwärtsbewegung können verschiedene Ansätze verwendet werden, so namentlich Trephinen,

Fraisen und Sägen. Derselbe Motor dient ferner zur Ausführung der Schleimhautmassage und als Concussor zur Erschütterungsmassage des Kehlkopfs bei nervöser Aphonie. Man hat ferner zur Beseitigung knorpeliger und knöchener Auswüchse der Scheidewand die Elektrolyse empfohlen (Capart, Moure, M. Schmidt, Bresgen). So schmerzlos und wirksam auch diese Methode ist, so ist sie doch andererseits eine so langsam wirkende, dass wenige Kranke sich zu derselben entschliessen können. Man sticht die Nadeln (unipolar oder bipolar) in die zu entfernende Partie ein und lässt den Strom 10 bis 15 Minuten lang einwirken; natürlich muss dieses Verfahren so lange wiederholt werden, bis der Auswuchs geschwunden ist. Knorpelige und dünne knöcherne Auswüchse und Synechien können auch mit Scheeren oder Knochenzangen weggeschnitten oder mittelst Galvanokauters zerstört oder wenigstens verkleinert werden.

Rhinitis catarrhalis acuta und purulenta.

Unter allen Schleimhäuten zeigt die der Nase die ausgeprägteste Disposition zu katarrhalischer Entzündung; stammt doch das Wort Katarrh von dem hervorstechendsten Symptom, dem Herabfliessen des Secretes, und wird dasselbe in vielen Gegenden, so namentlich auch in Süddeutschland, nur in Bezug auf den acuten Katarrh der Nase gebraucht.

Die Aetiologie der acuten Coryza ist sehr mannigfaltig. Die Hauptrolle spielen unstreitig atmosphärische Einflüsse, rascher Wechsel der Temperatur, Erkältungen, Durchnässung der Haut des Kopfes, Halses, Rumpfes und der Füsse, Zugluft, ebenso abnorm hohe Temperatur. Massenhaft tritt die acute Rhinitis beim Uebergange der wärmeren Jahreszeit in die kältere und umgekehrt, also im Frühjahre und Herbste, sowie der die echte Influenza begleitende Nasenkatarrh auf. Dass diese letztere Form contagiös ist, kann keinem Zweifel unterliegen, ob aber die von Seifert und Anderen in den Secreten der Influenzakranken entdeckten Mikroorganismen oder der von Hajek und Klebs im Anfangsstadium des acuten Schnupfens aufgefundene Diplococcus sowie der ebenfalls im Verlaufe des Schnupfens auftretende Pneumoniecoccus die Ursachen der Krankheit sind, bedarf noch der Bestätigung. Acute Rhinitis ist ferner die constante Begleiterin der Masern, öfters auch der Blattern, des Scharlachs und exanthematischen Typhus. Sehr häufig ist sie fortgeleitet vom Rachen oder Kehlkopf oder in Folge von Reizen, welche die Nasenschleimhaut direct treffen; unter diesen sind heisse Dämpfe, sehr kalte Luft, staubende organische und anorganische Substanzen besonders zu erwähnen. Von den Chemikalien wirken in hohem Grade reizend: Ammoniak-, Chlor-, Salzsäuredämpfe, Jod, Quecksilber, Arsenik, doppeltchromsaures Kali, Osmiumsäure, Digitalin; die durch längere

Einwirkung dieser Substanzen entstandene Rhinitis bezeichnet man auch als „professionelle Coryza“ (vergleiche auch das Capitel Rhinitis ulcerosa).

Auch der sporadisch auftretende Schnupfen gilt als ansteckend, wenn es auch bisher nicht gelang, denselben experimentell zu erzeugen. Immerhin spricht das Erkranken mehrerer Familienglieder nacheinander sowie solcher Personen, welche niemals an Schnupfen gelitten hatten, nach Benützung des Taschentuches oder dem intimeren Umgang mit mit Schnupfen Behafteten sowie die von Friedreich beobachtete gleichzeitige Milzvergrösserung für die Contagiosität mancher Schnupfenformen.

Bei vielen Personen ist die Disposition zu acuten Nasenentzündungen eine ausserordentliche; wie es Personen gibt, welche nach jeder Erkältung einen Muskel- oder Gelenkrheumatismus bekommen, so gibt es auch solche, welche regelmässig eine acute Rhinitis acquiriren; von ihnen gilt meistens dasselbe, was gelegentlich der acuten Pharyngitis über mangelhafte Hauthygiene gesagt wurde.

Dem Ausbruche der Krankheit gehen oft mehrere Stunden oder Tage Eingenommenheit des Kopfes, Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unlust zur Arbeit, Kratzen im Nasenrachenraum, Frieren und Frösteln voraus. Bald gesellen sich zu diesen Prodromalerscheinungen brennendes, prickelndes Gefühl in der Nase, heftiger, klopfender Stirnkopfschmerz, Niesreiz, vermehrte Secretion. Dieselbe steigert sich rapid und erreicht oft eine solche Intensität, dass die Kranken Tag und Nacht Taschentücher vorzuhalten gezwungen sind. Das Secret ist im Anfang und auf der Höhe des Leidens dünn, wasserhell, scharf, ätzend in Folge seines Gehaltes an Kochsalz und Ammoniak; der Geruch ist verringert oder vollständig zu Verlust gegangen, ebenso der Geschmack; die Respiration durch die Nase ist erschwert oder aufgehoben, die Stimme nasal. Die Obturation ist meist eine vorübergehende, oft plötzlich, wie nach dem Schneuzen auftretende; bei dem Niederlegen im Bette verstopft sich in Folge behinderter Circulation in den Schwellkörpern meist das Nasenloch derjenigen Seite, auf welcher man ruht. Setzt sich der Katarrh durch den Thränencanal auf die Conjunctiva fort, so entsteht unter Röthung derselben Thränenträufeln, Lichtscheu, Lidkrampf. bei Fortpflanzung in den Nasenrachenraum resp. die Tuben Ohrensausen, Schwerhörigkeit, Jucken im Ohre, bei acuter Mittelohrentzündung heftigster, namentlich während der Nacht sich verstärkender Ohrschmerz.

Beunruhigender sind die Erscheinungen bei Säuglingen. Da dieselben nur durch die Nase athmen, so ist ihr Schlaf gestört, von Schreien und Erstickungsanfällen unterbrochen; das Saugen ist im höchsten Grade erschwert, da die Athmung zum Oeffnen des Mundes und Loslassen der kaum erfassten Brust nöthigt; durch Mangel an Schlaf und ungenügende Ernährung wird die Entwicklung des Kindes gestört, bei längerer Dauer kann Erschöpfung sowie durch Fortleitung des Katarrhs auf Kehlkopf und Bronchien der Tod durch Bronchopneumonie eintreten.

Nachdem die Beschwerden und die Secretion den höchsten Grad erreicht haben, vermindert sich die letztere in der Regel nach 2 bis 4 Tagen, das Secret wird dicker, zäher, äusserst mucinreich und bildet Krusten und Borken oder zusammenhängende gelatineartige Klumpen von schleimig-eitriger, seltener rein-eitriger Beschaffenheit; allmälig verändert sich dasselbe in qualitativer und quantitativer Hinsicht, um schliesslich der normalen Secretion Platz zu machen. Auch die Verstopfung der Nase verliert sich allmälig und Geschmack und Geruch kehren, wenn auch manchmal erst nach Monaten, zurück; gar nicht selten geht der acute Katarrh in den chronischen über.

Die objectiven Veränderungen bestehen in mehr oder weniger intensiver Röthung der Schleimhaut beider, seltener einer Nasenhöhle; die Schwellung ist meist eine diffuse und gleichmässig sammtartige, besonders stark ist sie namentlich an dem vorderen und hinteren Ende der unteren Muschel. Nicht selten finden sich Erosionen und stark erweiterte leicht blutende Venen.

Die Haut der Nase erscheint geröthet, geschwellt, glänzend, erysipelatös, die Haut der Oberlippe und Nasenlöcher erodirt, öfters mit Eczem- und Herpesbläschen besetzt. Bei vollständiger Nasenobstruction ist die Zunge trocken, rissig, in Folge von capillären Blutaustritten bräunlich oder schwarz belegt. Das Secret enthält anfangs zahlreiche desquamirte Cylinder- und Flimmerepithelien, weisse Blutkörperchen und Schleimzellen; die Zahl der letzteren nimmt im weiteren Verlaufe immer mehr zu, ebenso der Mucingehalt; nicht selten finden sich Beimengungen von rothen Blutkörperchen und verschiedene Pilzarten.

Der Verlauf der acuten Rhinitis erstreckt sich in der Regel auf 3—8 Tage, doch können bei besonderer Intensität auch 14 Tage, ja selbst 4—6 Wochen bis zur völligen Heilung vergehen. Zu den häufigeren Complicationen gehört die Entzündung der Nebenhöhlen, so namentlich des Sinus frontalis, deren Symptome im letzten Capitel nachzusehen sind; seltener sind Empyeme der Nebenhöhlen oder der Orbita, wie solche von Schäfer und A. Hartmann beobachtet wurden; die im Verlaufe acuter und chronischer Rhinitis fast nie fehlenden Excoriationen geben durch Infection nicht selten zu Gesichtserysipel Anlass.

Die Diagnose unterliegt, wenn die Affection sich einmal entwickelt hat, keinen Schwierigkeiten, höchstens in Bezug auf ihre Aetiologie. Im Prodromalstadium sind die Allgemeinerscheinungen, namentlich auch das Fieber, zuweilen so heftig, dass der Ausbruch einer schweren Krankheit, eines acuten Exanthems oder einer Gehirnaffection befürchtet werden kann. Bei Neugeborenen denke man an die Möglichkeit hereditärer Syphilis.

Die Prognose ist günstig, doch kann Schwerhörigkeit und Ohrenfluss zurückbleiben oder die Affection chronisch werden oder zu dauernder Schädigung des Geruches und Geschmackes führen. Tödtlicher Ausgang kommt nur bei Kindern oder decrepiden alten

Leuten oder wie in dem Schäfer'schen Falle von Orbitalabscess durch Meningitis vor.

Die Behandlung besteht zum Theile in der Prophylaxe. Hinsichtlich der Beseitigung der katarrhalischen Disposition muss auf das bei der Pharyngitis acuta Gesagte verwiesen werden. Arbeiter, welche mit staubenden Substanzen, namentlich mit den oben erwähnten Chemikalien zu thun haben, müssen ihre Nasenschleimhaut durch Wattetampons schützen; Syphilitische oder Kropfkranke müssen sofort nach den ersten Erscheinungen des Jodschnupfens das Medicament aussetzen. Zahllos und sehr beliebt sind die Abortivmittel, die aber meistens nichts helfen; so namentlich Senfteige im Nacken, heisse Fussbäder, Schwitzcuren, Dampfbäder und das Hager-Brand'sche Olfactorium (Acid. carbol., Liq. ammon. caust. āā 5·0, Spir. vini 15·0, Aq. dest. 10·0). 5—10 Tropfen desselben werden auf ein Taschentuch oder einen Schwamm oder Trichter von Fliesspapier gegossen und zweistündlich mehrere Minuten lang eingeathmet. Auch Inhalationen von Chloroform, Ol. terebinth., Kampher, Insufflationen von Arg. nitr., Salicylsäure, Morphium, sowie innerlich Apomorphin oder Atropin wurden empfohlen. Das beste Mittel ist unstreitig das Cocaïn; in 1—3% Lösung instillirt, beseitigt es nicht nur das lästigste Symptom, die Verstopfung, innerhalb weniger Minuten für viele Stunden, sondern kürzt den Verlauf auch merklich ab. Moure empfiehlt ein Schnupfpulver aus Cocaïn 0·2, Morph. 0·05, Res. Benz. pulv. 0·25, Magist. Bism. 10·0. Aehnlich wirkt Mentholpulver mit Kaffee oder 3—5% Mentholöl, oder Einstreichen des Nasenrückens mit Fett und die Massage. Wunder darf man freilich auch von ihnen keine erwarten. Nasendouchen, namentlich solche mit Salz, werden meist schlecht vertragen oder verschlimmern das Uebel. Bei Mitbetheiligung der Nebenhöhlen sind Einathmungen warmer Dämpfe, eventuell warme oder kalte Umschläge auf Stirne und Nasenrücken, Blutegel, Bettruhe, Diät, Ableitung auf den Darm und die Haut indicirt, eventuell die Luftdouche; bei heftiger Conjunctivitis Schutzverband und Einträufelungen von Zinc. sulf. etc., bei Ohrerscheinungen Luftdouche, wenn nöthig Paracentese des Trommelfells. Säuglingen muss die Muttermilch mit dem Löffel gereicht, eventuell mit dem Schlundrohre beigebracht werden; auch ist es angezeigt, die oben erwähnten Mittel, namentlich das Mentholöl, in Anwendung zu bringen. Das Antrocknen der Secrete und das Wundwerden des Naseneingangs verhütet man durch Einträufeln und Bestreichen der Nasenlöcher mit Mandel- oder Olivenöl oder Borvaselin.

Eine Modification der acuten und subacuten Rhinitis ist der purulente, eitrige Nasenkatarrh, die acute Nasenblennorrhoe oder Gonorrhoe.

Man versteht darunter nicht jede mit Eitersecretion einhergehende Nasenaffection, sondern den acut beginnenden und von Anfang an mit eitriger Secretion verlaufenden und durch pyogene Bacterien hervorgerufenen Nasenkatarrh.

Als Ursaehen desselben müssen in erster Linie specifische Infectionsstoffe betrachtet werden, welche direct auf die Nasenschleimhaut einwirken. Moldenhauer's Ausspruch, diese Ansicht sei mehr theoretisch construirt, als durch die Erfahrung bewiesen, wird durch mehrfache Literaturangaben, so neuerdings besonders von Störk, widerlegt. So ist z. B. bei Erwachsenen die Infection der Nase mit Trippergift sicher constatirt; dasselbe gelangt entweder durch die mit Trippersecret verunreinigten Finger oder Taschentücher, an denen das Secret haftet, oder durch widernatürliche Verirrungen auf die Nasenschleimhaut, um dort dieselben Veränderungen wie auf der Schleimhaut der Urethra oder der Conjunctiva hervorzubringen. Nicht gar so selten ist ferner der purulente Nasenkatarrh bei Neugeborenen; er beruht, wie auch Ziem hervorhebt, auf Infection mit dem leukorrhoischen Secret der mütterlichen Scheide. M. Mackenzie hält es nicht für unmöglich, dass auch der irritirende Einfluss der Atmosphäre sowie das Eindringen von Seifenwasser bei unvorsichtiger Waschung die Affection hervorrufen könne. Auch im Verlaufe acuter Infectionskrankheiten, so namentlich der Masern, des Scharlachs, der Diphtherie, des Erysipels, der Variola oder in Folge der Fortpflanzung eitriger Conjunctivalkatarrhe und endlich auch durch unbekannte Einflüsse kommt es zu acuter Nasenblennorrhoe.

Die Symptome sind bis auf die schon von Beginn an eitrige Beschaffenheit des Secretes dieselben wie beim gewöhnlichen Schnupfen: das Secret ist fötid, dünnflüssig, schmierig, käsig und blutig tingirt; nicht selten werden Augen und Ohren inficirt, Nasenlöcher und Oberlippe excoriirt. Die Schleimhaut ist hochgradig geschwellt und geröthet, erodirt und mit oberflächlichen Geschwüren versehen.

Die Diagnose stützt sich hauptsächlich auf den Nachweis der erwähnten Schädlichkeiten; Verwechslungen mit Diphtherie, hauptsächlich aber mit syphilitischem Katarrh, Nebenhöhleneiterungen, Reizung durch Fremdkörper, sind zuweilen erst nach genauerer Beobachtung zu vermeiden.

Der Verlauf ist meist ein sehr langwieriger, die Prognose nur bei Säuglingen ernst; auch können mancherlei Complicationen, eitrige Entzündungen der Nebenhöhlen, Gesichtserysipel, Meningitis etc., auftreten.

Eine erfolgreiche Behandlung ist ohne Reinigung mittelst Nasendouche kaum möglich; es empfehlen sich ausser den Resolventien besonders die Desinficientia, namentlich Borsäure, Carbol, Resorcin, bei Erwachsenen Kali chloricum; auch Insufflationen dieser Stoffe sowie mit Argent nitr., Alaun 0·3 : 30·0 Amylum, Zinc. sulfur. 0·1 : 30·0 sind zu versuchen. Da die Nasendouche bei Säuglingen und sehr kleinen Kindern gefährlich ist, so empfiehlt M. Mackenzie vor Reinigung der Nase die temporäre Tamponade der Choanen mittelst eines kleinen Stückes Schwamm, welche Manipulation aber leichter anzurathen als auszuführen ist.

Rhinitis chronica.

Als Ursachen des chronischen Nasenkatarrhs müssen in erster Linie recidivirende acute Katarrhe, besonders jene, welche nach acuten Infectionskrankheiten zurückbleiben, angeschuldigt werden. Ein grosses Contingent stellt ferner die Scrophulose, insoferne als Scrophulöse nicht nur in besonderem Maasse zu Nasenkatarrhen disponirt sind, sondern auch, weil acute Schnupfen bei ihnen leichter als bei Gesunden die Tendenz haben, chronisch zu werden. Dass auch Personen, welche der Einathmung organischen und anorganischen Staubes oder Rauches ausgesetzt sind, ebenso Chemiker nicht selten an chronischem Schnupfen leiden, lehrt die Erfahrung, ebenso dass sich derselbe mit besonderer Vorliebe in missbildeten oder durch Septumdeviation verengten Nasen etablirt. Von Manchen wird auf die Heredität und auf eine besondere Vulnerabilität der Schleimhaut hingewiesen, ebenso auf die Entstehung der chronischen Rhinitis in Folge adenoider Wucherungen und Tonsillarhypertrophie; Manche wollen geistige und sexuelle Erregungen, Menstruation und Schwangerschaft, gichtische und rheumatische Diathese sowie allgemeine Plethora und Alkoholismus verantwortlich machen. Auch Deviationen des Septum sowie gewisse Berufsarten und Angehörige solcher Gewerbe, welche in gebückter Kopfhaltung in staubüberladener Atmosphäre oder in der Nähe von Gasflammen arbeiten, sollen zu chronischen Nasenkatarrhen disponiren. So fand z. B. Cholewa Hypertrophien der hinteren Muschelenden besonders häufig bei Buchdruckern, was jedoch Réthi nicht bestätigen konnte. Endlich führen auch Eiterungen der Nebenhöhlen zu diffusen oder circumscripten Hypertrophien und warzigen Excrescenzen. Das männliche Geschlecht wird viel mehr befallen als das weibliche.

Das anatomische Substrat der chronischen Rhinitis ist die Hypertrophie der Schleimhaut, welche entweder die ganze Mucosa oder nur einzelne Theile treffen kann; an derselben nehmen in hochgradigeren Fällen besonders das submucöse Bindegewebe und die Drüsen Theil; äusserst häufig kommt es zu tumorartigen Auswüchsen und warzigen, polypoiden Wucherungen (Rhinitis chronica hypertrophica). Die Hypertrophie der Schleimhaut kann unbegrenzte Zeit dauern, aber auch mit der Atrophie enden (Rhinitis chronica atrophica).

Der geringste Grad der Rhinitis chronica hypertrophica äussert sich als diffuse Röthung und sammtartige Schwellung der Schleimhaut (Rhinitis chronica diffusa simplex). Sie betrifft theils das Septum, theils die Muscheln, meist beide; nirgends ist eine auffallende Verdickung der Mucosa vorhanden. Nicht selten ist mit diesen geringfügigen objectiven Veränderungen eine äusserst lästige, häufig und plötzlich eintretende und besonders Nachts oft stundenlang anhaltende Verstopfung einer oder beider Nasenhöhlen verbunden. Dieselbe beruht, wie man sich durch Inspection überzeugen kann, auf einer prallen Füllung des cavernösen Gewebes, welche so-

wohl spontan als auch nach Cocaïnisirung wieder zurückgeht. Wenn auch die Schwellbarkeit der Schleimhaut im Allgemeinen und bis zu einem gewissen Grade als eine nützliche Einrichtung und eine Schutzmauer der Natur gegen eindringende Schädlichkeiten betrachtet werden kann, so muss dieselbe doch, wenn sie schon auf die geringste Veranlassung hin und in excessiver Weise auftritt, als ein pathologischer Zustand bezeichnet werden, dessen Beseitigung von den damit Behafteten dringend verlangt wird. (Das Nähere siehe im Capitel Reflexneurosen.)

Bei sehr langer Dauer, zuweilen erst nach vielen Jahren, kommt es zu beträchtlicherer Hypertrophie der Schleimhaut. Dieselbe wird in jedem Lebensalter beobachtet; wenn auch die Mehrzahl der Fälle das reifere Alter betrifft, so wird doch auch das jugendliche Alter, namentlich die Zeit von 10—15 Jahren, ziemlich häufig, und zwar häufiger als von Schleimhautpolypen ergriffen.



Fig. 27. Rechts: kolbige, gleichmässige Verdickung der mittleren und Hypertrophie der ganzen unteren Muschel; links: lappige Hypertrophie der mittleren Muschel und himbeerartige Verdickung des vorderen unteren Muschelendes.

Weitaus am häufigsten wird die untere Muschel befallen; ihr vorderes Ende ist in eine bald normal gefärbte, bald grauweisse oder anämische, bald lividrothe, halbkugelige oder birnförmige, nicht selten gekerbte oder lappige Geschwulst umgewandelt, welche den unteren Nasengang mehr oder weniger verlegt, das Septum berührt oder aus der Nasenöffnung heraustritt (Fig. 27). In ähnlicher Weise ist meistens auch das hintere Ende der Muschel verändert; es stellt eine blassgraue oder grauröthliche, blasenartige, sehr oft zottige, warzige oder auch himbeer- oder froschlaichartige, nicht selten die ganze Choane ausfüllende und noch weit in den Nasenrachenraum hineinragende Geschwulst vor, deren Basis den ganzen Umfang der unteren Muschel einnimmt (Fig. 28). Derartige Anschwellungen der vorderen und hinteren Muschelenden zeigen zahlreiche Uebergangsformen von der einfachen Hypertrophie zu den später zu beschreibenden Papillomen oder Himbeerpolypen (Hopmann). Die einfachen Hypertrophien unterscheiden sich von den letzteren durch ihre grössere Flächenausbreitung, durch ihre weniger scharfe Abgrenzung von dem gesunden Gewebe, durch ihren meist weniger ausgesprochenen und auf die Oberfläche beschränkten papillären Bau. Mikroskopisch bildet den Hauptbestandtheil bald ein kleinzelliges Infiltrat, das sich über die ganze Geschwulst erstreckt, am dichtesten aber unmittelbar unter der Schleimhaut und um die Gefässe herum ist, bald ein Bindegewebe; nebstdem fällt der ausserordentliche Reichthum an Gefässen auf; neben zahlreichen erweiterten venösen Gefässen zeigen sich die arteriellen vielfach verändert, die Gefässhäute verdickt, namentlich die Intima gewuchert, das Lumen verengt, verzerrt oder fast ganz aufgehoben (Endarteritis obliterans). Zarniko protestirt gegen die Ausdrücke Hypertrophie

und Hyperplasie und bezeichnet die genannten Gebilde als Fibrome, wie Heymann vorgeschlagen, da in denselben constant nur die Vermehrung des Bindegewebes sei.

Nicht selten wird ausser dem vorderen und hinteren Muschelende, doch auch öfters allein, die ganze untere Muschel, namentlich ihr unterer Rand ergriffen; seine Schleimhaut hängt dann entweder als glatter, blaurother oder auch blasser Sack auf den Nasenboden herab oder erscheint gekerbt, mit Einschnitten versehen und deutlich papillomatös. Die hypertrophischen Partien heben sich nach der Cocaïnisirung deutlich von ihrer Umgebung und dem retrahirten Schwellgewebe ab. Fast ebenso oft wie die untere wird die mittlere Muschel ergriffen; namentlich die Schleimhaut des vorderen Endes ist bald gleichmässig verdickt, glatt und kugelig oder plattlappig, bald uneben,



Fig. 28. Einfache und papilläre Hypertrophie der hinteren Muschelenden.

höckerig, gekörnt und warzig. Nicht selten zeigt auch das Septum circumscripte oder diffuse Schleimhauthypertrophien, bald an dem unteren in den Nasenboden übergehenden Theile, bald in der Mitte gegenüber dem vorderen Ende der mittleren Muschel, bald an seinem hintersten unteren Ende. Relativ am seltensten zeigt sich der Nasenboden verändert; zuweilen berührt seine hypertrophische Schleimhaut die untere Muschel, sehr selten zeigt sie warzige oder körnige Beschaffenheit. Combinationen mit Schleimpolypen sind äusserst häufig.

Es scheint, dass zuweilen auch die Nasenknochen und Knorpel an der Hypertrophie theilnehmen. Nach Bryson Delavan gehört die Hypertrophie der knöchernen Muscheln, besonders bei Deviation des Septum, zu den häufigen Vorkommnissen. Hypertrophie des knorpeligen Septum sah Verf. mehrmals unter seinen Augen sich entwickeln; nach Gottstein ist das Septum häufig der Sitz einer chronischen, äusserst schleichend verlaufenden, zu Hypertrophie führenden Perichondritis.

Das Secret zeigt mannigfache Variationen. In den mit sammtartiger Schwellung der Schleimhaut einhergehenden frischeren Fällen

ist dasselbe dünnflüssig, wässerig, oft äusserst copiös, wie bei acuter Coryza. In anderen Fällen ist dasselbe weniger reichlich, schleimig, zähe, äusserst mucinreich, von gelber bis grünlicher Farbe und mehr schleimig-eitrig; oft vertrocknet es am Naseneingang, dem Septum und den vorderen Enden der Muscheln zu gelben Krusten und Borken, welche, gewaltsam entfernt, bluten und zu eczematösen oder herpetischen Excoriationen und entzündlichen Infiltraten der Nasenflügel Anlass geben. Rein-eitriges Secret kommt nach des Verf. Beobachtung bei der idiopathisch-hypertrophischen Form äusserst selten, eitrig-fötides nur bei gleichzeitiger Erkrankung der Nebenhöhlen vor.

Eine häufige Begleiterin der chronischen Rhinitis ist der chronische Nasenrachenkatarrh mit oder ohne Hypertrophie der Rachenmandel, ferner die Pharyngitis granulosa, die Hypertrophie der Gaumenmandeln und der Seitenstränge; auch die Nebenhöhlen der Nase, so namentlich die Kiefer- und die Stirnbeinhöhlen sowie die Tuben und das Mittelohr nehmen zuweilen an der Entzündung Antheil.

Die Symptome der hyperplastischen Rhinitis beziehen sich hauptsächlich auf die Behinderung der nasalen Respiration. Der Verschluss der Nase ist ein dauernder oder zeitweiser; das letztere ist häufiger und theils durch Ansammlung von Secret, theils durch pralle Füllung des erectilen Gewebes bedingt; sehr oft fehlen bei Tag die Beschwerden und treten Nachts in heftigster Weise auf. Je hochgradiger die Nase obstruirt ist, um so stärker sind die Störungen des Geruches und des Geschmackes, doch kann auch bei partieller Schwellung, namentlich der Regio olfactoria, völlige Anosmie vorhanden sein. Nasales Timbre der Stimme, Offenhalten des Mundes, Trockenheit der Zunge mit fadem, pappigem Geschmacke, unruhiger, durch wilde Träume gestörter Schlaf (Alpdrücken) sind weitere Folgen der nasalen Obstruction. Sehr häufig sind Gehörstörungen vom einfachen Ohrensausen bis zu den schwersten Entzündungen des Mittelohres. Bei Mitbetheiligung des Rachens ist Würgen und Erbrechen, besonders am Morgen, zuweilen auch Husten vorhanden. Grosse Beschwerden verursacht die Entfernung des reichlich secernirten zähen Schleimes, auch wird bei Excoriationen und Infiltraten am Nasenflügel das Schneuzen schmerzhaft. Sowohl in Folge des heftigen Schneuzens, Schnüffelns und Bohrens in der Nase als auch spontan in Folge der Congestionirung der Schleimhaut stellt sich Nasenbluten ein, das namentlich von Bresgen als ein häufiges Symptom der chronischen Rhinitis betrachtet wird. Die Röthung und Schwellung der Nasenspritze, auf die wir im Capitel Reflexneurosen zurückkommen werden, ist gleichfalls eine ziemlich häufige Begleiterin der chronischen Rhinitis; sie ist wohl meist die Folge von Reizen oder Stauungsvorgängen, welche durch den Druck der intumescirten Schleimhaut und der Schwellkörper hervorgerufen werden und den normalen Rückfluss des Blutes verhindern.

Zu den fast constanten Erscheinungen gehören ferner Druck auf die Augen, Eingenommenheit des Kopfes, Unlust und Unfähigkeit zu geistiger Arbeit, Abnahme des Gedächtnisses, Niesreiz, ein Gefühl

von Jucken, Kriebeln und Brennen in der Nase. Heftiger Kopfschmerz ist ganz gewöhnlich bei Hypertrophien der unteren Muschel (nach Jurasz circa 25%), fehlt aber auch nicht bei Hypertrophien der mittleren Muschel (circa 13%). Auch Erkrankungen des Thränennasenganges haben nicht selten ihren Grund in Entzündung und Verlegung des Ausführungsganges durch Schleimhauthypertrophie. Sehr häufige Begleiterscheinungen der chronischen Rhinitis sind endlich chronische Pharyngitis, Laryngitis, Stirnhöhlenkatarrh und zahlreiche Reflexneurosen, deren detaillirte Schilderung sich am Schlusse des Buches findet.

Die Diagnose der chronischen Rhinitis unterliegt bei sorgfältiger Untersuchung keinen Schwierigkeiten; absolut nöthig ist die Sondirung und Cocaïnisirung; nicht jede Schleimhautpartie, namentlich nicht an den unteren Muscheln, welche eine teigige Beschaffenheit hat oder sich mit der Sonde eindrücken oder verschieben lässt, ist ohne Weiteres als hypertrophisch zu betrachten; nur wenn sich die betreffende Stelle durch Cocaïn wenig oder gar nicht verkleinert, sondern sich von dem retrahirten Schwellgewebe deutlich abhebt, eine gekerbte unebene Oberfläche hat und sich resistent anfühlt, hat man das Recht, von wirklicher Hypertrophie zu sprechen; damit ist aber nicht gesagt, dass jede Schleimhaut, welche durch Cocaïn zur Retraction gebracht werden kann, völlig normal oder an den Erscheinungen der Obturation unbetheiligt ist. Von diagnostischem Werthe ist das Verhalten der Schwellkörper insoferne, als ihr An- und Abschwellen bei geringfügigen Reizen ebenso als ein Symptom gesteigerter Reflexerregbarkeit betrachtet werden muss, wie das Auftreten von Niesanfällen, Thränenträufeln oder Husten bei Sondenberührung anderer Schleimhautstellen.

Die Diagnose der Hypertrophie der hinteren Muschelenden kann sowohl von vorne als auch durch die Rhinoscopia posterior gestellt werden. Bei der Untersuchung von vorne, die jedoch nur in geraden und nicht zu engen Nasen gelingt, sieht man die hinteren Muschelenden als convexe, blassrothe, gekerbte Geschwülste den unteren Nasengang beträchtlich oder so vollständig ausfüllen, dass weder die hintere Rachenwand noch die Bewegungen des Levatorwulstes beim Schlucken oder Sprechen gesehen werden können.

Die Prognose der chronischen hypertrophischen Rhinitis ist im Allgemeinen eine gute, da bei genügender Ausdauer die Kranken grösstentheils von ihren Beschwerden, so besonders den durch die Obstruction hervorgerufenen, befreit werden können. In Bezug auf die Beseitigung der Reflexneurosen, namentlich des Asthma, ist die Prognose zweifelhaft zu stellen. Recidiven kommen nach gründlicher Entfernung alles Krankhaften nicht vor, doch kann, wie auch Réthi beobachtete, eine früher normale Partie Schleimhaut hypertrophisch werden.

Behandlung. Für die mildesten Formen der chronischen Rhinitis empfehlen sich nach vorheriger Reinigung der Nase mit resolvirenden Mitteln — Natr. bicarb., Kochsalz — Insufflationen von

Arg. nitr.; man beginne mit Arg. nitr. 0·05 : 10·0 Amylum und steige allmälig auf 0·1—0·5 : 10·0; eine Portion dieser Mischung, etwa 0·2, wird abwechselnd in die eine und in die andere Nasenhöhle insufflirt, da die Reaction bei doppelseitiger Insufflation eine zu heftige sein würde; auch andere Adstringentia, wie Borax oder das von Schäffer in die Praxis eingeführte Aluminium acetico-tartaricum, Bismuth 5 : 10, Tannin 1 : 5 Talc. oder Milchzucker, sind zu versuchen. Das vielfach empfohlene Sozojodolzink hat Verf. noch im Verhältniss von 1 : 25 oft als zu reizend verlassen müssen. Porter will von der Insufflation eines aus Kampher, Salicylsäure und Tannin bestehenden Pulvers günstige Erfolge gesehen haben, Gottstein von Salicylsäure 1 : 10 Theilen Magnesia usta. M. Mackenzie empfiehlt die Nasendouche mit dem alkalinischen Nasenwasser, das in Pulverform verschrieben wird, aus Natr. bicarb., Borax, Natr. chlorat. āā 0·4, Sacch. alb. 1·0 besteht und jedesmal in einem halben Glase lauwarmen Wassers aufgelöst wird. Die Wirkung adstringirender Nasenwässer ist nach des Verf. Erfahrung eine geringe; viel besser wirkt der auch von M. Schmidt empfohlene Nasenspray mit 1% Lösung von Kochsalz, Salmiak, Bromkali oder Sozojodolzink mit Zusatz von 1‰ Cocaïn; zu warnen ist vor der Anwendung des Alaun, der Anosmie erzeugt.

In einzelnen Fällen erweisen sich nützlich medicamentöse Bougies, die aus Cupr. sulf. 0·1—0·3 oder Zinc. sulf. 0·2 oder Bismuth. nitric. 0·3 und Gelatoglycerin 2·5 bestehen. Die Behandlung des Eczems des Naseneinganges ist in dem Capitel Rhinitis exsudativa nachzusehen.

Mittelgradige Schleimhauthypertrophien werden am einfachsten mittelst der Trichloressigsäure oder Chromsäure beseitigt; hochgradige, namentlich schon länger bestehende oder sehr resistente, weichen nur der Galvanokaustik; diese passt auch für alle jene Fälle, bei welchen die Krankheitssymptome durch abnorme Schwellbarkeit des cavernösen Gewebes hervorgerufen werden.

Hypertrophische Schleimhautpartien und polypoide Wucherungen, die einigermassen gestielt aufsitzen, werden mit der kalten oder heissen Schlinge entfernt; recht schwierig und zeitraubend ist meist die Entfernung flacher und breit aufsitzender Wucherungen und diffuser Schleimhauthypertrophien; beträchtlichere Hypertrophie der vorderen Muschelenden operirt Verf. nur mittelst der Glühschlinge, ebenso die auf den Nasenboden herabhängenden schlaffen Schleimhautpartien; die der Amputation der vorderen Muschelenden meist folgende heftige Blutung oder Nachblutung stillt man am sichersten durch die vordere Tamponade. Hack empfahl zur Vermeidung der Blutung die galvanokaustische Stichelung und das Furchenziehen; bei ersterer wird ein spitzer Galvanokauter tief und wiederholt möglichst nahe nebeneinander in die zu zerstörende Partie eingestochen, während bei letzterer derselbe nur an einer Stelle eingesenkt und von da durch die ganze erkrankte Partie in glühendem Zustande durchgezogen wird. Das Furchenziehen passt daher nur bei diffuser Erkrankung und da, wo das Anlegen der Schlinge unmöglich ist.

M. Schmidt reibt, um die Wirkung des Furchenziehens zu erhöhen, in die Schnitte Chromsäure oder Trichloressigsäure ein. Noch wirksamer ist die submucöse Cauterisation, bei der ein spitziger Brenner eingestochen und unter der Schleimhaut, also im cavernösen Gewebe selbst, vorgeschoben wird. Dieses Verfahren empfiehlt sich ganz besonders zur Erzeugung constringirender Narben bei abnormer Schwellbarkeit des erectilen Gewebes.

Die Amputation der hypertrophischen hinteren Muschelenden ist bei weiter und gerader Nase nicht schwierig, um so schwieriger aber bei enger, krummer Nase. Bei der Cocaïnisirung achte man sorgfältigst darauf, dass das Cocaïn nicht direct mit dem hinteren Muschelende in Berührung kommt, da sich dasselbe oft so verkleinert, dass es nicht mehr gesehen oder gefasst werden kann. Zuweilen müssen zuerst Schleimhauthypertrophien, Spinen oder Exostosen oder Deviationen der Scheidewand beseitigt werden, ehe es gelingt, an das hintere Muschelende heranzukommen. Die der Grösse der zu entfernenden Geschwulst entsprechende Schlinge wird von vorne über den Tumor hinübergeführt, was am besten durch eine Drehung des Griffes nach innen oder durch passende Biegung des Schlingenträgers bewerkstelligt wird. Ist die Geschwulst sehr gross und ragt sie so weit in den Nasenrachenraum hinein, dass sie von der Nase aus nicht ganz gefasst werden kann, dann empfiehlt sich die bimanuelle Operation; die durch die Nase vorgeschobene Schlinge wird mit dem in den Nasenrachenraum eingeführten Zeigefinger der linken Hand über die Geschwulst geführt und dann zugeschnürt. Die Einen benützen dazu die kalte, mit federndem Stahldraht armirte Schlinge oder Jarvis' Ecraseur; Verf. gibt wegen der grossen Dicke und Zähigkeit der zu entfernenden Massen der galvanokaustischen Schlinge der Sicherheit wegen den Vorzug. Gelingt das Fassen der Geschwulst in der angegebenen Weise nicht, dann applicire man Flach- oder Spitzbrenner und verschorfe so die Geschwulst. Die mehrfach empfohlenen Schutzvorrichtungen, Nasenschilde, sowie das Einlegen von Kautschuk- oder Elfenbeinplatten zur Verhütung von Verwachsungen gegenüberliegender Theile sind unnöthig. Nur bei sehr enger Nase legt Verf. zwischen die cauterisirten Stellen einen antiseptischen Wattetampon; auch möchte Verf. rathen, der Amputation der Muschelenden oder grösserer Schleimhauthypertrophien jedesmal sofort die Tamponade der Nase folgen zu lassen, da Nachblutungen ganz gewöhnlich sind und einen bedrohlichen Charakter annehmen können. Am besten verhütet man die Blutung dadurch, dass man, wie auch M. Schmidt angibt, die zu entfernende Geschwulst mit der Schlinge fasst und die letztere 1—3 Minuten fest zusammengeschnürt liegen lässt; dann erst schneidet man mit dem rothglühenden Draht und mit Unterbrechungen durch.

In Bezug auf die Nachbehandlung und die Behandlung der Reflexneurosen wird auf die Capitel „Allgemeine Therapie" und „Reflexneurosen" verwiesen. Eine absolute Contra-Indication der galvanokaustischen Behandlung ist die Schwangerschaft, da sehr leicht Abortus herbeigeführt wird. Es ist natürlich, dass Gehörstörungen, Blutungen,

Rachenkatarrhe, adenoide Wucherungen, Scrophulose, Anämie, Neurasthenie nach den allgemein giltigen Principien behandelt werden müssen.

Wie die chronische Entzündung der Rachenschleimhaut, so kann auch die der Nase mit Atrophie enden (Rhinitis chronica atrophica).

Ob die Atrophie immer das Endstadium der Hypertrophie ist, wie Zuckerkandl meint, oder ob sie nicht von Anfang an die gesunde Schleimhaut befallen kann, ist noch nicht endgiltig entschieden; doch sprechen zahlreiche anatomische und klinische Beobachtungen dafür, dass der Atrophie meist ein hyperplastisches Stadium der Schleimhaut vorausgeht. Dafür spricht namentlich das von Gottstein, Demme, M. Schmidt und auch vom Verf. beobachtete gleichzeitige Vorkommen hypertrophischer Partien neben atrophischen. Die Hypertrophie der Schleimhaut braucht durchaus keine auffallende zu sein, im Gegentheil geben Katarrhe mit geringer diffuser, sammtartiger Auflockerung der Schleimhaut, namentlich bei bestehenden Constitutionsanomalien, am häufigsten zu Ozaena simplex Anlass. Dass eine mit beträchtlicher Hypertrophie der Schleimhaut oder gar mit polypoiden Wucherungen der Muscheln einhergehende Rhinitis mit Atrophie endet, hat noch Niemand behauptet. Man kann nach Seifert zwei Formen von Rhinitis atrophica unterscheiden, eine leichte und eine schwere, die Rhinitis atrophica simplex und die Rhinitis atrophica foetida. In ersterem Falle ist das Epithel normal oder zeigt nur geringe Veränderungen, wie Uebergangsformen vom Cylinder- zum Plattenepithel; bei der schweren Form geht das Cylinderepithel in Plattenepithel mit Verhornung über (Seifert, Schuchhardt). Die Atrophie betrifft sämmtliche die Schleimhaut constituirende Elemente, das Epithel, die Drüsen, welche fettig degeneriren, das Schwellgewebe, ja selbst die Knochen; die Drüsen schwinden an Zahl und Grösse, die Schleimhaut wird in faseriges Bindegewebe umgewandelt. Die Atrophie betrifft meist beide Nasen, doch kommt einseitige Erkrankung durchaus nicht selten vor.

Das constanteste und sicherste objective Symptom der atrophischen Rhinitis ist die abnorme Weite der Nasenhöhle. Die Muscheln, namentlich die unteren, erscheinen ausserordentlich klein, in schmale, ovale oder abgeplattete Leisten umgewandelt, die unteren Nasengänge abnorm geräumig; bei Atrophie der mittleren Muschel wird zuweilen der halbmondförmige Raum, ja sogar die Oeffnung der Keilbeinhöhle sichtbar. Der Einblick in den Nasenrachenraum ist sehr erleichtert und erblickt man in der Regel nicht nur die Tubenwülste, sondern auch die Tubenmündungen und ein grosses zwischen denselben liegendes Stück der Hinterwand. Die atrophische, vom Secret gereinigte Schleimhaut ist zuweilen leicht geröthet, öfters blass oder von pergamentartigem Aussehen. Ulcerationen oder Zerstörungen der Knorpel oder Knochen kommen nicht vor, höchstens oberflächliche, durch Kratzen, Bohren etc. erzeugte Excoriationen am Naseneingang

oder Septum. Die constante Begleiterin des atrophischen Nasenkatarrhs ist die Pharyngitis sicca, welche sich zwar meist auf den Nasenrachenraum localisirt, doch auch auf die Pars oralis fortsetzen kann.

Eine eigenthümliche Modification der chronischen atrophischen Rhinitis ist die in Bessarabien, Galizien, Polen und Südrussland endemisch herrschende, von Störk beschriebene Blennorrhoe der Respirationsschleimhaut, welche, in der Nase beginnend, allmälig oft erst nach Jahren, auf Rachen, Kehlkopf, Luftröhre, ja selbst Bronchien weiterschreitet und durch Bindegewebswucherung und -Schrumpfung, Ossification der Knorpel, Verwachsung der Stimmbänder lebensgefährliche Stenose erzeugt.

Einige Beobachter, wie Bournonville, Cozzolino etc., erwähnen noch eine weitere Modification der atrophischen Rhinitis, nämlich die Coryza caseosa; sie soll sich durch Anhäufung einer weichen, weissröthlichen, schmierigen Masse charakterisiren, welche sich meist nur in einer Nasenhöhle zeigt und einen äusserst ekelhaften Gestank verbreitet; nach Entfernung der Massen soll die Schleimhaut das Aussehen einer pyogenen Membran haben und sollen die käsigen Massen zuweilen in die Nebenhöhlen eindringen und dort Eiterung erzeugen. Nach Verf. Erfahrung, die Klingel bestätigt, ist die Coryza caseosa keine selbstständige Erkrankung, sondern nur ein Symptom von Retention und Eindickung von Secret, wie dies bei Nebenhöhleneiterungen, Neubildungen, Fremdkörpern, stärkeren Deviationen und Rhinolithen vorkommt.

Das Secret der atrophischen Rhinitis ist entweder sulzig, wie Kleister oder Sago, oder eitrig, in frischem Zustande gelb, grün, rahmartig, weshalb die Krankheit auch als chronische Nasenblennorrhoe bezeichnet wird. Es besitzt, wie M. Schmidt meint, durch das Hinzutreten eines bisher noch nicht näher bekannten Stoffes, des „Siccativs", in hohem Grade die Eigenschaft, in kurzer Zeit zu festen, gelbgrünen, schmutzig-grünen oder bei Beimengung von Blut zu braunen, die ganze Nasenschleimhaut wie eine Tapete überziehenden Borken und fingerlangen Krusten einzutrocknen und unter Umständen einen charakteristischen, äusserst penetranten Fötor anzunehmen (Kakosmia objectiva). Diese Form ist es, welche früher „Ozaena" genannt wurde, jetzt als „genuine Ozaena" oder als Ozaena simplex, Rhinitis chronica atrophica foetida bezeichnet wird.

Symptomatologie. Die Krankheit beginnt fast immer in früher Jugend und allmälig unter den Erscheinungen eines chronischen Schnupfens mit mehr oder weniger reichlicher Secretion. Meist erst nach Jahren bemerken die Angehörigen üblen Geruch aus der Nase und Abgang übelriechender, oft fingerlanger Krusten und Borken. Jetzt oder erst dann, wenn noch andere Erscheinungen sich eingestellt haben, wird ärztliche Hilfe in Anspruch genommen.

Die subjectiven Erscheinungen bestehen in Störungen des Geruches, Kopfschmerz, Druck auf die Augen, nasalem Timbre der Stimme, Schwerhörigkeit, Ohrensausen; ganz gewöhnlich sind Schlingbeschwerden und Räuspern in Folge des nie fehlenden trockenen

Rachenkatarrhs. Hinsichtlich der Verstopfung der Nase begegnet man mannigfachen Verschiedenheiten und grossem Wechsel; meist ist die Nase nur dann impermeabel, wenn die angetrockneten Secrete und Krusten sehr mächtig sind; mit der Entfernung derselben wird die Nase sofort frei. Durch forcirte Versuche, die Secrete durch Schneuzen und Bohren mit den Fingern zu entfernen, kommt es zu Blutungen, welche den Borken eine bräunliche, schwarze Färbung verleihen. Kein Symptom ist aber charakteristischer und auffallender, als der Fötor; ein Vergleich mit anderen Gerüchen, wie z. B. mit Häringslake, faulem Käse oder zerquetschten Wanzen (daher der Name Punaisie wahrscheinlich nicht von punaise, die Wanze, sondern von Puz nez = Eiternase), ist nicht zutreffend; es ist ebenso charakteristisch, dass, wer denselben einmal gerochen, ihn stets wieder erkennen wird. Verf. muss mit Réthi, M. Schmidt, Zarniko und Anderen auf das Bestimmteste behaupten, dass der Geruch bei Ozaena ein specifischer und von jenem bei Nebenhöhleneiterungen vollkommen verschiedener ist. Während der Gestank dem Patienten wegen der meist beträchtlichen Abnahme des Geruchsinnes meist unbemerkt bleibt, wird er um so empfindlicher von dessen Umgebung wahrgenommen, weshalb die bedauernswerthen Kranken gemieden, nicht selten aus ihrer socialen Stellung verdrängt, in ihrer Existenz geschädigt werden und so dem Trübsinn verfallen; von einer Verheiratung junger Mädchen kann unter solchen Umständen ohnehin kaum die Rede sein. Nach Jurasz wird der Gestank nicht selten stärker bei der Menstruation, schwächer während der Schwangerschaft, um mit der Geburt wieder stärker hervorzutreten. Dass Ozaenakranke fast nie eine acute Rhinitis bekommen, kann Verf. mit Jurasz bestätigen. Nach Gruhn finden sich nicht selten auch Erkrankungen des Thränennasencanals, Dacryocystitis und Dacryoblennorrhoe; die Entzündung gelangt von der Nase aus in die Thränenwege, erzeugt dort Eiterung, Ulceration, Stenosen- und Narbenbildung.

Bei der objectiven Untersuchung fallen zuerst die oft ungeheuren Massen angetrockneter Secrete in die Augen; sie sitzen überall in der Nase und sind so zäh, dass sie, förmliche Ausgüsse des Naseninnern darstellend, mit der Pincette entfernt werden müssen; daneben findet sich dann constant auch dicker, rahmiger, übelriechender Eiter. In der weitaus grössten Anzahl der Fälle zeigt sich die Nase in Folge der Atrophie der Schleimhaut, der Knorpel und Knochen abnorm weit, wie dies bereits näher beschrieben wurde. In sehr seltenen Fällen — Verf. hat nur einen solchen Fall gesehen — erscheint die Nase eng und die Schleimhaut hypertrophisch, weshalb der Verdacht auf anderweitige Erkrankungen, wie Nasensyphilis, Fremdkörper, Concretionen, Nebenhöhleneiterungen, nur allzu sehr berechtigt erscheint.

Entsprechend der abnormen Weite der Nase, finden sich auch mikroskopisch die deutlichen Zeichen der Atrophie, die ebenfalls bereits geschildert wurden. Dass die Atrophie, wie Walb meint, durch den Druck der Borken und Krusten entsteht, ist sehr unwahrscheinlich.

Ausser der Verhornung des Epithels finden sich aber ferner noch, wie Krause, Habermann und Réthi constatirten, an den Drüsen körnige und fettige Degeneration sowie Zerfall der Infiltratszellen in der Schleimhaut zu fettigem Detritus und Bildung von Fettkugeln. Die Atrophie der Drüsen kann so hochgradig werden, dass die Secretbildung an einzelnen Stellen ganz versiegt.

Auch die äussere Nase zeigt bei vielen Ozaenakranken, nach Gerber in 43·3% der Fälle, eigenthümliche Formveränderungen. Am häufigsten ist der Nasenrücken durch mehr stumpfwinklige Vereinigung der Nasenbeine abnorm breit und flach, nicht selten geradezu eingesunken; die Nasenlöcher sind mehr oder weniger nach vorne und oben gerichtet (Stumpf- und Sattelnase). Auf die Ursache dieser Veränderung werden wir später zurückkommen. Ferner zeigen viele Ozaenakranke ein schlechtes, fahles, anämisches Aussehen sowie scrophulöse Erscheinungen, Schwellungen der Lippen, Lymphdrüsen, welche von den Einen als die Ursachen, von den Anderen als die Folgen der Krankheit betrachtet werden.

In Betreff des Vorkommens und der Häufigkeit der Ozaena sind alle Autoren einig, dass das weibliche Geschlecht stärker belastet ist als das männliche, ebenso dass schlechtgenährte, scrofulöse und in ärmlichen Verhältnissen lebende Individuen häufiger erkranken als gesunde und wohlhabende. Beim weiblichen Geschlecht — aber auch beim männlichen — entwickelt sich die Krankheit mit besonderer Vorliebe in der Pubertätsperiode zwischen dem 14. bis 17. Lebensjahre. Relativ selten entwickelt sich Ozaena nach schweren Infectionskrankheiten, so besonders nach Masern, Scharlach, Typhus, Diphtherie, Influenza, und es scheint fast, als ob auch die Heredität eine Rolle spiele, da man nicht selten mehrere oder alle Mitglieder einer Familie an Ozaena erkrankt findet. Sehr häufig sieht man ferner atrophische fötide oder auch nicht fötide Rhinitis zurückbleiben nach Heilung schwerer und ausgebreiteter Nasensyphilis. Die Ursache liegt in der Schrumpfung der gummös und entzündlich infiltrirt gewesenen Schleimhaut sowie in der Umwandlung der ulcerirten Stellen in narbiges Bindegewebe und einer gleichzeitig auftretenden entzündlichen Osteoporose. Verf. muss auf Grund seiner Erfahrungen Gerber Recht geben, dass die congenitale und erworbene Syphilis häufiger, als wie man bisher glaubte und nachzuweisen im Stande war, Ozaena zur Folge hat, wofür die erwähnten, auffallend häufigen Veränderungen der äusseren Nase und die auch vom Verf. nicht selten constatirten Perforationen und Defecte an solchen Stellen sprechen, wo der bohrende Finger nicht hingelangt. Auch Störk führt die Ozaena auf Lues zurück und constatirte, dass die Väter der Erkrankten unmittelbar vor ihrer Verheiratung an constitutioneller Syphilis gelitten hatten. Demme meint, die Verbreiterung der Nase könne vielleicht die Folge der Erkrankung und durch unmerkbare Gewebsschrumpfungen bedingt sein, wie diese bei Syphilis auch ohne Caries und Ulceration vorkommen. Seifert macht ferner darauf aufmerksam, dass auch bei in den ersten Lebensjahren sich entwickelnder Rhinitis atrophica foetida durch narbige Schrumpfung des

Bindegewebes, welches die häutige und knorpelige Nase an die Nasenbeine ansetzt, eine Einsenkung des Nasenrückens beobachtet wird, welche bei Erhaltensein des Septum einer syphilitischen Sattelnase täuschend ähnlich sieht.

Ueber das Wesen der Ozaena sind die Ansichten noch heute getheilt, obwohl die Zahl der aufgestellten Theorien eine sehr grosse ist.

Eine der ältesten Theorien ist die, dass die Ozaena nicht eine Erkrankung der Nase, sondern der Nebenhöhlen darstelle. So machte speciell Michel die Keilbeinhöhlen verantwortlich. In letzter Zeit war es namentlich Grünwald, der, auf einzelne eigene und mehrere Beobachtungen von Schäffer, Guye, Luc und Robertson gestützt, die Ansicht verfocht, dass es keine genuine atrophische Rhinitis gebe, sondern dass es sich nur um die Folgen von Herderkrankungen resp. Nebenhöhleneiterungen handle. Wie zahlreiche pathologisch-anatomische Untersuchungen beweisen, finden sich in der weitaus grössten Anzahl von Fällen bei Ozaena die Nebenhöhlen gesund und nur in einem kleinen Bruchtheil miterkrankt. Richtig ist aber, dass, wie namentlich Bresgen constatirt hat, Nebenhöhleneiterungen eine Ozaena vortäuschen können und dass diese letztere Art von „Ozaena“ durch die Behandlung der erkrankten Nebenhöhlen geheilt werden kann. Jede Ozaena aber als Nebenhöhleneiterung aufzufassen und von den Nebenhöhlen aus behandeln zu wollen, muss als eine Verirrung bezeichnet werden, zumal wenn man sieht, dass Gestank und Eiterabsonderung mit Krustenbildung auch nach Eröffnung und Behandlung einer, mehrerer oder aller Nebenhöhlen ruhig weitergehen.

Dass das bei der Ozaena auftretende Secret wirklich in der Nase selbst entsteht, wissen wir übrigens durch die Beobachtungen von Jurasz, Réthi und Gottstein, welche die sorgfältigst gereinigte Schleimhaut nach kurzer Zeit in eigenthümlicher Weise sich wieder mit Secret bedecken sahen, indem die zuerst einzeln erschienenen zerstreuten grauweissen Pünktchen sich vermehrten und oft erst nach vielen Stunden eine die ganze Schleimhaut bedeckende Schicht bildeten. Der Einwurf von Moldenhauer, dass atrophische Schleimhäute nicht secernirten, ist unrichtig; nur da, wo alle Drüsen verschwunden sind, hört die Secretion auf.

Nach Zaufal und Rosenfeld ist die Ursache der Ozaena in der rudimentären Entwicklung der Muscheln zu suchen; durch die damit verbundene abnorme Weite der Nase könne das Secret nur schwer entfernt werden, es stagnire und werde durch Einwirkung von Bacterien fötid; auch Rosenfeld schliesst sich dieser Ansicht an.

Aehnlicher Anschauung ist ferner auch Hopmann. Nach ihm wäre die von ihm constant bei Ozaena gefundene Verkürzung des Septum in der Richtung von vorne nach hinten sowie die angeborene Kleinheit der Muscheln und Nasengänge, vielleicht auch die Schwäche und dürftige Entwicklung der Schleimhaut in Verbindung mit entzündlichen Vorgängen die hereditäre Folge der Ozaena. Nach Zuckerkandl soll freilich ein angeborener Mangel von

Muscheln nicht vorkommen, doch wäre immerhin möglich, dass die Ozaena mit Entwicklungsstörungen im Zusammenhang steht.

Auf einen specifischen Mikroorganismus — den Ozaenacoccus — stützt Löwenberg seine Theorie. Derselbe soll auf die atrophische Schleimhaut resp. in das von ihr producirte Secret gelangen und dann erst den specifischen Gestank erzeugen. Eine scheinbare Stütze erhielt diese Theorie durch die Untersuchungen von Hajek, welcher aus dem Secret einen Bacillus züchtete, der den specifischen Gestank verbreitete und den er deshalb Baeillus foetidus nannte; ferner auch durch Paulsen, welcher einen schleimbildenden Kapselbacillus als Ursache chronischer zu Muschelatrophie führender Schleimhautentzündung entdeckte. Wie reich übrigens an Mikroorganismen das Secret der fötiden Rhinitis ist, geht daraus hervor, dass Rohrer darin 30 Kokken- und 26 Bacillenarten fand.

Am wenigsten Anerkennung fand die Theorie von Berliner, der die Ozaena von abnormer Enge der Nase in der Höhe der mittleren Muschel resp. von der dadurch bedingten Druckatrophie herleitet; gegen diese Ansicht spricht die täglich zu machende Erfahrung, dass trotz Vergrösserung der mittleren Muschel und Polypenbildung keine Ozaena beobachtet wird und dass die Atrophie durchweg an der unteren Muschel am stärksten ausgeprägt ist, also da, wo kein Druck stattfindet.

B. Fränkel erblickt in der durch die Atrophie hervorgerufenen abnormen Weite der Nase nur ein begünstigendes Moment zur Entstehung der Krankheit; nöthig sei dazu noch das Hineingerathen eines Fermentes, welches den Gestank erzeugt.

Sowohl Krause als neuerdings auch Réthi halten die Veränderungen der Drüsen und die fettige Degeneration derselben für das Entscheidende und erklären die Ozaena für eine eigenthümliche Schleimhautentzündung, bei der es zur Bildung eines specifischen, eigenthümlich chemisch veränderten Secretes kommt, das, wie schon Krause hervorhebt, die Bedingungen für den charakteristischen Gestank schon hat, ehe es auf die Oberfläche tritt. Diese Theorie erscheint auch dem Verf. die annehmbarste, der glaubt, dass Atrophie und Drüsendegeneration zusammen gehören. Im Uebrigen scheinen nach den Untersuchungen von Réthi die erwähnten Veränderungen in den Drüsen sich zurückbilden zu können, da sie in den gebesserten Fällen sich verringerten und in den geheilten Fällen ganz verschwanden.

Die Diagnose der Rhinitis atrophica foetida und non foetida stützt sich einestheils auf die erwähnten objectiven und subjectiven Erscheinungen, anderntheils auf die Abwesenheit von Nebenhöhleneiterungen und tiefer oder ausgebreiteter Ulcerationen, namentlich aber auf die Nichtbetheiligung der Knorpel und der Knochen. Sind letztere affieirt, dann kann von genuiner Ozaena keine Rede mehr sein, wohl aber von Syphilis oder anderweitigen schweren, früher als „symptomatische Ozaena“ bezeichneten Affectionen.

Die Prognose der atrophischen Rhinitis, namentlich der fötiden, ist im Allgemeinen eine ungünstige, da wir keine sicheren Mittel

besitzen, die atrophische Schleimhaut zur Norm zurückzuführen und den Fötor radical und für immer zu beseitigen.

Wenn es auch nicht bezweifelt werden kann, dass bei geringgradiger Erkrankung noch eine Heilung mit Rückbildung der Schleimhaut zur Norm, ja sogar mit Hypertrophie erzielt werden kann, so steht doch fest, dass in hochgradigen und veralteten Fällen jede Behandlung fruchtlos und nur eine palliative Hilfe möglich ist. Verf. zieht es deshalb vor, den Angehörigen solcher Kranken die Unheilbarkeit der Ozaena von vornherein mitzutheilen, sie aber aufmerksam zu machen, dass bei einer genügenden Geduld möglicherweise doch nach Jahren eine Besserung eintreten, dass man das lästigste Symptom, den entsetzlichen Geruch, völlig verdecken und zeitweise beseitigen könne und dass das Leiden sonst keinen schädlichen Einfluss auf das Leben oder Zerstörung der Knochen zur Folge habe.

Die Prognose der Störk'schen Blennorrhoe ist eine sehr trübe, da häufig Larynx- und Trachealstenose eintreten und die Tracheotomie nöthig wird.

Die Behandlung muss bestrebt sein, das übelriechende Secret zu entfernen und die atrophische Schleimhaut zur Norm zurückzuführen, um dadurch die Bildung neuer Borken und Krusten zu verhindern.

Die Entfernung der Secrete geschieht am besten mit der Nasendouche oder der Saug- und Druckpumpe, wobei grössere Wassermengen (pro die 2—4 Liter) und höherer Druck angewendet werden müssen. Zur Lockerung der oft unglaublich harten Krusten empfiehlt es sich, die Wassermenge nicht auf einmal, sondern in Pausen von $^1/_4$ Stunde zu appliciren. Das Wasser muss lauwarm sein, wobei es aber gleichgiltig ist, ob man demselben Desinficientia (Carbol, Lysol, Kalichloricum, Kali hypermang. etc.) beisetzt oder einfach Kochsalz, Seesalz, Emsersalz, Natr. bicarb., Borax in 1—2% Lösung. Borken am Nasendache oder der Umgebung der mittleren Muschel, welche der Douche oder dem Spray trotzen, müssen mit der Pincette oder der Hartmann'schen Nasenbürste entfernt werden. In leichteren Fällen genügt eine ein- bis zweimalige tägliche Reinigung, während in schweren Fällen eine dreimalige Application der Douche nöthig ist.

Um die Schleimhaut zur Norm zurückzuführen, bedient man sich der verschiedensten Reize, die theils eine mechanische, theils eine chemische Wirkung entfalten. Zu den leichtesten mechanisch wirkenden Reizen gehört die Gottstein'sche Tamponade, welche den Zweck hat, eine reichlichere flüssige Secretion zu erzielen. Wenn dieselbe antihygienisch, fötorconservirend und verwerflich genannt wird, so beweist dies nur, dass man den Zweck derselben völlig verkennt. Die Technik ist folgende: Ein circa fingerlanger, $^1/_2$—1 cm dicker Bruns'scher Wattetampon wird nach vorheriger gründlicher Entfernung der Secrete an eine kleine Schraube oder Spirale gewickelt und unter rotirenden, von links nach rechts gerichteten Bewegungen in die zu tamponirende Nasenhöhle eingeführt: sodann wird durch Rotiren der Schraube von rechts nach links die letztere

entfernt und der Tampon mittelst einer Sonde möglichst hoch in die Nase hinaufgeschoben, um dortselbst einige Stunden liegen zu bleiben, oder es kann bei Tag die eine, bei Nacht die andere Nasenhälfte tamponirt werden. Besonders geeignet ist diese Methode zur Selbstbehandlung für Kranke, welche nicht zum Specialisten gehen können. Man hat auch bei sehr starkem Fötor den Tampon mit medicamentösen Stoffen, wie z. B. mit Perubalsam, Carbolöl, mit Mandl'scher Jodlösung, Jodoformöl, Mentholöl in 10—100% oder 1—2% wässeriger Carbollösung oder mit Sozojodolzinklanolin imprägnirt. Die Application reizender oder desinficirender Pulver, wie z. B. Argent. nitr., Sozojodolzink oder von Jodol, Jodoform, Aristol etc., hat sich nicht bewährt, da die Krustenbildung dadurch beschleunigt und begünstigt wird (Demme, Jurasz).

Von grösstem therapeutischen Werthe sind die Massage und die Application reizender, die Schleimhaut in Entzündung versetzender Medicamente. Es kann jetzt keinem Zweifel mehr unterliegen, dass die Vibrationsmassage im Stande ist, die Schleimhaut zur Norm zurückzuführen oder gar in hypertrophischen Zustand zu versetzen, wobei es gleichgiltig ist, ob die massirende Sonde mit Jodglycerinlösung oder mit 20% Pyoctanin-Lanolinsalbe (Demme) bestrichen wird. Mit Vortheil bedient man sich der bereits erwähnten Apparate von Daae, Schmidt-Spiess oder Storch.

Unter den die Schleimhaut reizenden Stoffen nehmen, wie ich mit Réthi bestätigen kann, die Trichloressig- und Chromsäure den ersten Rang ein; Verf. sah ferner auch von Einreibungen mit Spir. sinap., Spir. sapon. gute Erfolge; diese wie die Aetzungen müssen zweimal wöchentlich vorgenommen werden. Weniger gut eignet sich die Galvanokaustik, weil man zu leicht Narben erzeugt, was immerhin in vorgeschrittenen Fällen zur Zerstörung krankhaft secernirender Theile angezeigt erscheint (Réthi).

Da die abnorme Weite der Nase unstreitig eine raschere Zersetzung und schwierigere Entfernung der Secrete zur Folge hat, so haben Sänger und Kafemann Nasenobturatoren construirt, welche den Luftzutritt zur Nase reguliren. Der Apparat von Sänger besteht aus zwei miteinander durch einen Bügel verbundenen Metallplatten, welche je nach Bedürfniss zugeschnitten werden können. Der Kafemann'sche Obturator besitzt einen verstellbaren Schieber und ist so construirt, dass gleichzeitig Menthol oder andere ätherische Stoffe inhalirt werden können.

Eine antiluetische Behandlung ist auch in den auf syphilitischer Basis beruhenden Fällen erfolglos (Störk).

Die Behandlung der Coryza caseosa besteht nach der Entfernung der angesammelten Massen in der Behandlung des Grundleidens, also der Heilung von Nebenhöhleneiterungen, Operation von Polypen, Nasensteinen, Deviationen und Spinen.

Bei der Störk'schen Blennorrhoe hat die Behandlung ausser in den eben erwähnten nasalen Methoden in Douchirungen des Kehlkopfes mit Lapis und Durchtrennung der verwachsenen Stimmbänder,

in Excision stenosirender Narbenstränge, Einlegen der Schrötter'schen Bougies zu bestehen. Bei der oft in kürzester Zeit erfolgenden Wiederverwachsung bleibt nur noch die Tracheotomie übrig, die aber keinen Nutzen bringt, wenn auch die tieferen Partien der Trachea stenosirt sind.

Rhinitis phlegmonosa, Septumabscess, primäre Perichondritis.

Wenn auch die Nase in Folge der straffen Anheftung der Schleimhaut an ihre knorpelige und knöcherne Unterlage wenig zu phlegmonösen Entzündungen disponirt ist, so werden solche doch zuweilen beobachtet.

Die Ursache liegt entweder in einer Steigerung des acuten Katarrhs oder in einer Infection mit putriden Stoffen und pyogenen Kokken oder in Verletzungen der Schleimhaut in Folge von Fremdkörpern, Traumen der äusseren Nase und operativen Eingriffen. Bekanntlich nimmt das Gesichtserysipel mit besonderer Vorliebe von der Nase aus, so hauptsächlich von Schrunden des Naseneinganges oder kleinen Excoriationen der Scheidewand, seinen Ursprung, auch gesellt sich Phlegmone gerne zu anderweitigen, namentlich ulcerösen Erkrankungen und Affectionen der Knochen und Knorpel: zuweilen pflanzt sich die phlegmonöse Entzündung der Nebenhöhlen, so namentlich das Empyem des Sinus maxillaris, auf die Nasenhöhle fort.

Mit besonderer Vorliebe wird das Septum ergriffen. So sieht man im Beginne des Gesichtserysipels die Nasenscheidewand intensiv geröthet, glänzend, gesehwellt, zuweilen sogar mit Blasen bedeckt.

Noch häufiger sind die Septumabscesse, welche fast stets Traumen, Schlag, Stoss, Fall auf die Nase mit oder ohne Bruch des Knorpels ihre Entstehung verdanken. In der Regel geht dem Abscess als Vorstufe das Hämatom voraus, dessen Inhalt sich nach einiger Zeit in Eiter umwandelt. Der Abscess kann einseitig oder doppelseitig auftreten und mit Einsinken des Nasenrückens und Perforation des Knorpels einhergehen, doch gehört der letztere Ausgang zu den Ausnahmen. Die Septumabscesse manifestiren sich als einseitige oder doppelseitige, prall gespannte, elastische, tiefrothe Geschwülste, welche zu völliger Verstopfung einer oder beider Nasen Anlass geben und oft genug Entzündung der Haut der Nase, Oedem der Lippen, Augenlider und Wangen zur Folge haben.

Es gibt ferner Abscesse im Septum, welche einer Eitersenkung ihre Entstehung verdanken, wie Verf. einmal bei einer luetischen Caries der Lamina perpendic. des Siebbeines sah. Kalte Abscesse am Nasenboden oder den Muscheln sind, wie Verf. mehrmals beobachtete, die Folgen schlechter Zähne, so namentlich von Periostitis der Augenzähne.

Die primäre oder idiopathische Perichondritis der Nasenscheidewand ist ein sehr seltenes Leiden; dasselbe kann sowohl mit der Bildung eines serösen als auch eines eitrigen Exsudates verlaufen. Fälle der ersteren Art sind von Velpeau, Jurasz und Fischenich beobachtet worden; Fälle mit eitrigem Exsudat von Suchanek, Schröder, Lublinski, Herzfeld und Kuttner. Traumen spielen auch hier eine Rolle, doch lässt sich oft keine bestimmte Ursache nachweisen. In einem Falle von seröser Perichondritis konnte von Fischenich die Affection auf Zahncaries zurückgeführt werden, in dem Jurasz'schen Falle war Erysipel vorausgegangen.

Die eitrige Form beginnt meistens mit lebhaftem Fieber, welches im weiteren Verlauf jedoch allmälig zurückgeht, ferner mit entzündlicher Schwellung und Röthung des Nasenrückens und seiner Umgebung. Bei der serösen Form kann es ebensogut wie bei der eitrigen zur Schmelzung des Knorpels, Perforation, Einsinken des Nasenrückens oder zur Abstossung von Knochensequestern kommen.

Der Verlauf der phlegmonösen und abscedirenden Rhinitis ist meist ein guter; sehr selten ist der tödtliche Ausgang durch Erysipel, Meningitis, Hirnabscess oder Sinusthrombose.

Die Diagnose stützt sich auf die objectiven Erscheinungen, namentlich auf die Verlegung der Nase durch eine vom Septum ausgehende mehr oder minder entzündliche Geschwulst, an der sich Fluctuation nachweisen lässt. Bei doppelseitigem Abscess mit Perforation des Knorpels gelingt es nicht selten, durch Compression des einen Tumors die auf der entgegengesetzten Seite befindliche Geschwulst zu vergrössern, bei Nachlass des Druckes wieder zu verkleinern. Ob endlich Knorpel und Knochen mitaffieirt sind, ob der Inhalt eitrig oder serös ist, lässt sich meist erst nach Eröffnung der Abscesse mittelst der Sonde constatiren.

Die Behandlung der Septumabscesse und idiopathischen Perichondritis kann nur eine operative sein. Wroblewski empfiehlt die locale Anästhesie mit 10% Cocaïn- und 50% Antipyrinlösung. Der Schnitt muss der ganzen Länge der Vorwölbung entlang von hinten nach vorne gehen und hat bei doppelseitiger Geschwulst ein doppelseitiger zu sein. Zeigt sich nach Abfluss des Eiters der Knorpel oder Knochen nekrotisch, so müssen die erkrankten Theile mit dem scharfen Löffel entfernt werden. War ein Trauma vorausgegangen, so achte man darauf, die fracturirten Knorpelenden zu reponiren (Fischenich). Schäffer empfiehlt, ein Stück Schleimhaut und Perichondrium zu entfernen, was jedoch erst dann angezeigt erscheint, wenn der Abscess sich nochmals füllt. Nach Abfluss des Eiters reinige man die Nase mit Borwasser und tamponire mit Jodoformgaze oder mit Wattetampons, die mit Jodol überzogen oder mit 1‰ Sublimatlösung imprägnirt sind, was so lange zu geschehen hat, bis die Wunde vernarbt ist.

Rhinitis exsudativa.

(Herpes, Eczem des Naseneinganges, Oedem, Rhinitis fibrinosa.)

Wenn auch die Nase seltener als die Mundrachenhöhle von Exsudationsprocessen (Blasen, Pusteln) heimgesucht wird, so bleibt dieselbe doch nicht völlig verschont. Ein Lieblingssitz derselben ist der Naseneingang, die äussere und innere Fläche der Nasenflügel, das Septum und der Nasenboden.

Bläschenerupti onen an dieser Stelle gehören theils dem Herpes, theils dem Eczem an. Der Herpes narium ist der häufige Begleiter acuter katarrhalischer sowie rheumatisch-febriler Zustände, wie sie bereits bei den Krankheiten der Mundhöhle geschildert wurden.

Als Eczem des Naseneinganges wird gewöhnlich eine Affection bezeichnet, die sehr verschiedenen Processen ihre Entstehung verdankt. Aeusserst häufig findet sich bei acuter und chronischer Rhinitis in Folge des reizenden Secretes und des häufigen Gebrauches des Taschentuches eine acute entzündliche Schwellung und Röthung des Naseneinganges, welche mit der Bildung von Bläschen — acutem Eczem — oder auch ohne dasselbe mit Excoriationen und nässenden Schrunden einhergeht. Verläuft diese Affection chronisch, dann sind die Nasenöffnungen, das Septum, der Nasenboden bis zu den vorderen Enden der unteren Muscheln theils mit dicken, gelben, eingetrockneten, die Nasenathmung mehr oder weniger behinderten Borken, theils mit Bläschen und Pusteln oder nässenden Excoriationen bedeckt: bei langer Dauer kriecht die Affection von der Nase weiter und erscheinen deshalb die Nasenflügel stark infiltrirt, bei Berührung schmerzhaft, die Oberlippe sowie die Haut des Nasenrückens und des Gesichtes geschwellt und zuweilen gleichfalls mit Bläschen oder Krusten besetzt. Nicht selten fehlen die Borken und man bemerkt nach Kiesselbach nur eine kleienförmige Abschuppung. Bei Kindern handelt es sich, wie Moldenhauer mit Recht bemerkt, in solchen Fällen fast immer um wirkliches Eczem, entweder in Folge einer Rhinitis oder auf der Basis der Scrophulose, von der sich meist noch andere Symptome wie Lymphadenitis, Conjunctivitis, Eczem der Ohrmuscheln oder des Kopfes und Gesichtes, vorfinden. Bei Erwachsenen sind die erwähnten Erscheinungen am Naseneingang fast immer auf eine circumscripte Phlegmone, eine Entzündung und Verschwärung der Talg- und Haarfollikel, eine Acne oder Sycosis vibrissarum oder auch auf Furunculose zurückzuführen. Sie beginnt in der Regel circumscript, mit Knoten- und Pustelbildung um den Haarschaft, der andere benachbarte Haarbälge nachfolgen: durch das Platzen der Pusteln entstehen Borken, unter welchen die Eiterbildung fortdauert und entzündliche Infiltration der Nasenspitze und Nasenflügel nach sich zieht. Unzweifelhaft gibt es aber auch Fälle, die mit Eczem beginnen und erst im weiteren Verlaufe zu Sycosis führen.

Nach unvollständiger Heilung der eben besprochenen Affectionen oder auch in Folge der ätzenden Wirkung des Secretes bei acuter oder chronischer Rhinitis, ferner in Folge mechanischer Läsionen, so besonders durch Bohren und Kratzen mit den Fingernägeln, ungestümes Schneuzen etc., entstehen bald in dem oberen Winkel, welchen der Nasenflügel mit dem Septum, oder in dem unteren, welchen er mit dem Nasenboden bildet, ferner auch an dem häutigen Septum kleine, strichartige Einrisse, Fissuren und Excoriationen, welche beim Reinigen der Nase bedeutend schmerzen, ja sogar bluten, und wegen der beständigen Insultirung nicht heilen. Das an und für sich ungefährliche Leiden kann jedoch, wie die Erfahrung zeigt, zu einem lebensgefährlichen werden, wenn nämlich die Schrunden den Mikroorganismen der Phlegmone, des septischen Giftes oder des Erysipels als Eingangspforten dienen. Der Arzt soll deshalb alle mit solchen Schrunden behafteten Kranken auf diese Eventualität aufmerksam machen und dieselben zur Heilung bringen.

Die Diagnose ist in der Regel leicht, doch sind Verwechslungen mit zerfallenden Neubildungen, Lupus, namentlich aber mit gummösen Infiltraten (siehe das Capitel „Syphilis“) möglich.

Die Behandlung des Eczems muss zuweilen eine allgemeine, stets aber eine locale sein. Acute und chronische Nasenkatarrhe müssen beseitigt, die Scrophulose bekämpft werden. Die locale Behandlung hat bei Eczem und Acne vor Allem die Entfernung der Borken zu erstreben; dies geschieht theils durch möglichst indifferente Nasenbäder, theils durch Einlage von Wattebäuschen, die mit Vaselin, Lanolin, Olivenöl oder Goldcream bestrichen werden; etwa noch vorhandene Pusteln sind zu öffnen, verklebte Haare möglichst kurz abzuschneiden und nur gelockerte zu epiliren. Dann wird mit Pinsel oder Wattetampon Ung. diachyli Hebrae oder Ung. hydr. praecip. albi oder eine Salbe aus Flor. Zinci, Magist. Bism. āā 1·0 : 10·0 Vaselin oder Hydrarg. sozojod 0·1 : 10·0 Vaselin applicirt. Schmiegelow empfiehlt das Einlegen von Wattetampons, die mit einer Sublimatlösung 1 : 1000 imprägnirt sind und die 2—3mal täglich während 2 Stunden in der Nase belassen werden.

Schmerzhafte Einrisse und Schrunden sowie blutende Rhagaden heilen am raschesten durch Cauterisation mit Lapis in Substanz oder Bestreichen mit weisser Präcipitat- oder Hebra'scher Salbe. Ausgebreitetere, in die Tiefe oder Fläche gehende Ulcerationen müssen stets den Verdacht auf Syphilis erregen und zur Verordnung von Jodpräparaten auffordern. Bei knolliger diffuser Infiltration des Naseneingangbodens empfiehlt Moldenhauer Scarificationen und Stichelungen, Zarniko gegen die durch Eczeme erzeugten Verdickungen die Massage, die jedoch monatelang consequent durchgeführt werden muss.

Oedematöse Exsudationen in der Nase sind theils die Begleiter phlegmonöser oder traumatischer Entzündungen, theils die Producte des Erysipels.

Stauungsödeme in der Nase gehören zu den grössten Seltenheiten; so beobachtete Fronstein einmal ein circumscriptes Oedem der mittleren Muschel neben Oedem der Hände, Füsse und des Gesichtes bei einer an Tricuspidal-Insufficienz leidenden Dame, das durch Digitalis wieder verschwand.

Fibrinös-croupöse Exsudate entstehen ausser bei der Diphtherie jedesmal nach Aetzungen mit Chromsäure, Trichloressigsäure oder dem Galvanokauter oder nach anderen chirurgischen Eingriffen in der Nase (secundärer artificieller Croup). Sie können sich unter Umständen organisiren und so zu Verwachsungen Anlass geben.

Echter, genuiner (primärer) Croup der Nase, Rhinitis crouposa fibrinosa oder, wie die Krankheit besser genannt wird, Rhinitis pseudomembranacea, gehört zu den relativ seltneren Affectionen und kommt sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen vor.

Die Affection beginnt unter dem Bilde eines mit Fiebererscheinungen verbundenen acuten Schnupfens, theils ohne, theils mit gleichzeitiger einfacher, nicht croupöser Pharyngitis. Es kommt rasch zur Verstopfung einer oder beider Nasen mit den derselben zukommenden Erscheinungen. Das abgesonderte schleimige, bald eitrig, selbst fötid werdende Secret veranlasst Röthung und Excoriationen am Naseneingang oder im Gesicht. Die mit dem Spiegel leicht sichtbaren, theils faserförmigen, theils das ganze Naseninnere überziehenden, bald schleierartigen, bald kartenblattdicken Croupmembranen sitzen ihrer Unterlage, der hochroth geschwellten Schleimhaut, immer so fest auf, dass sie beim Ausschneuzen nicht herausbefördert werden. Dagegen können sie mit der Sonde oder durch Einschieben von spitzen, fest gedrehten Wattetampons unter Blutung gelockert werden. Beim Fassen mit der Pincette reissen die Membranen leicht ab, auch regeneriren sie sich rasch wieder. Durch den Reiz des abfliessenden Secretes entstehen leicht Excoriationen am Naseneingang oder in der Nasolabialfalte oder der Oberlippe, die sich ebenfalls mit einem Croupmembran überziehen können (Licven). Allmälig werden die Membranen dünner, bis im Verlaufe von 8—24 Tagen der Uebergang in einfachen Katarrh und in Heilung erfolgt. In einem der Seifertschen Fälle dauerte die Affection 3 Wochen; auch bildete sich eine Verwachsung der unteren Muschel mit dem Septum.

Ueber die Ursache sind zur Zeit die Meinungen noch sehr getheilt. Maggiora und Gradenigo fanden in den Auflagerungen den Staphylococcus pyogenes aureus und halten demgemäss diesen für die Ursache; Licven züchtete einen eigenen Coccus, der mit dem Staphylococcus pyogenes zwar Aehnlichkeit hat, sich von diesem aber durch ausserordentlich schnelles Wachsthum und kurz dauernde Infectionsfähigkeit auszeichnet.

Eulenstein meint, die Rhinitis fibrinosa sei kein einheitlicher Begriff, sondern nur ein Krankheitsbild. In neuerer Zeit mehren sich die Stimmen, welche in der Rhinitis fibrinosa eine auf die Nase

beschränkte und deshalb meist gutartig verlaufende Diphtherie erblicken. Während eine Reihe von Autoren, wie B. Fränkel, v. Starck, Abel, Sedziak, Réthi etc., in den Membranen keine Diphtheriebacillen finden konnten, gelang anderen Autoren, wie z. B. Baginsky, Stamm, Concetti, Park, Abbot, Abel, Scheinmann, der Nachweis echter Diphtheriebacillen relativ häufig. Auch Felsenthal ist der Meinung, dass in der Mehrzahl der Fälle echte, wirkliche Diphtherie vorliegt; auch fand er in jenen Fällen, welche nicht auf den Rachen übergriffen, Pseudodiphtheriebacillen. Am eingehendsten haben sich in der letzten Zeit Gerber und Podack mit der Rhinitis fibrinosa oder, wie sie dieselbe nennen, mit der Rhinitis pseudomembranacea beschäftigt. Obgleich sie zugeben, dass diese Affection auch durch andere Mikroorganismen, wie z. B. den Fränkel'schen Diplococcus, erzeugt werden kann, sprechen sie doch die Meinung aus, dass die Rhinitis pseudomembranacea in vielen, vielleicht sogar in den meisten Fällen diphtheritischer Natur sei und dass man gut daran thue, jeden Fall, so lange seine nicht diphtheritische Natur bewiesen sei, als einen diphtheritischen zu behandeln. Weder der fast durchweg gutartige Charakter, noch der mehr subacute resp. chronische Verlauf, noch die angebliche Nichtinfectiosität könnten als entscheidende Argumente gegen das Vorkommen einer nicht diphtheritischen Rhinitis fibrinosa angeführt werden. Wie es mit der Nichtinfectiosität stehe, möge man aus einem von ihnen beobachteten Falle eines Mannes ersehen, der bei seiner Tochter 76 Tage nachher zu schwerer Rachendiphtherie führte. Hinsichtlich der häufig in dem Nasensecret aufzufindenden Pseudodiphtheriebacillen sprechen Gerber und Podack die Möglichkeit aus, dass sie aus echten Diphtheriebacillen hervorgehen und sich unter noch unbekannten Umständen wieder in letztere verwandeln könnten.

Die Diagnose kann, dem soeben Mitgetheilten entsprechend, nur durch die bacterielle Untersuchung begründet werden, wenn auch der klinische Nachweis der Pseudomembranen sehr leicht ist.

Die Behandlung besteht in den verdächtigen Fällen in strenger Isolirung, ferner in der fleissigen Reinigung der Nase mittelst Douche oder Spray mit antiseptischen Flüssigkeiten, eventuell in Insufflation von Jodoform, Jodol oder Borsäure, oder in Bepinselungen mit 5% Mentholöl. Die diphtheritische Form muss nach den im Capitel „Pharyngitis diphtheritica" angegebenen Principien behandelt werden.

Rhinitis ulcerosa.

Die Geschwüre der Nase haben eine sehr verschiedene Ursache und Bedeutung. Scheidet man die syphilitischen, tuberculösen, scrophulösen, lupösen, leprösen Geschwüre, deren Besprechung in eigenen Capiteln erfolgen wird, aus, so verbleiben die so häufig vorkommenden katarrhalischen und traumatischen Erosionen, die durch chemische

Stoffe erzeugten, das sogenannte Ulcus septum nasi perforans, und einige durch seltenere Ursachen, wie Caries der Nasenknochen, Abscesse, erzeugten Geschwüre

Die katarrhalisch-traumatischen Geschwüre gehören zu den häufigsten Begleitern acuter oder chronischer Nasenkatarrhe. Sie entstehen theils durch den Reiz des abgesonderten Secretes, theils durch mechanische Einwirkungen, wie Kratzen und Bohren in der Nase, wie sie besonders durch Versuche, die eingetrockneten und die Athmung behindernden Secrete zu entfernen, unternommen werden. Auch Fremdkörper, Rhinolithen, Fliegenlarven erzeugen bei längerer Anwesenheit Druckgeschwüre.

Am häufigsten sitzen die katarrhalisch-traumatischen Geschwüre am Naseneingang, speciell der Innenseite der Nasenflügel oder an dem unteren Theile der Scheidewand oder an dem Nasenboden. Sie sind durchweg oberflächlich, rundlich, länglich oder auch schrundenartig, oft mit eingetrocknetem Secret bedeckt und bluten bei der geringsten Berührung.

Bei der Behandlung muss zuerst das Grundleiden berücksichtigt, d. h. acute und chronische Katarrhe müssen behandelt, Polypen, Fremdkörper und Rhinolithen entfernt werden. Man verbiete strengstens das Bohren in der Nase, erweiche die Krusten mit Vaselin oder Mandelöl und applicire auf die Geschwüre Bor-, Wismuth- oder weisse Präcipitatsalbe mittelst eines weichen Haarpinsels oder durch Einführen kleiner antiseptischer, mit oben genannten Salben bestrichener Wattebäusche.

Unter den Chemikalien wirken in hohem Grade reizend auf die Nasenschleimhaut: Ammoniak-, Chlor-, Salzsäuredämpfe, Jod, Quecksilber, Arsenik (Schweinfurter Grün), Chromsäure und ihre Salze, Osmiumsäure, Digitalin. Die „professionelle Coryza", die Polyak auch aus Umgehen mit Bronzestaub entstehen lässt, führt offenbar dadurch, dass sie Jucken erzeugt und zum Kratzen Veranlassung gibt, oft zu Geschwürsprocessen an den Muscheln und zu Perforationen der Nasenscheidewand. Diese letzteren sind im Anfang sehr klein, sitzen meist 1—1½ cm über dem Nasenboden, verbreiten sich in der Regel mehr in die Tiefe als in die Fläche und hinterlassen rundliche, mit scharfen Rändern versehene Substanzverluste. Affectionen der Knochen, Einsinken der Nase sollen nach den meisten Beobachtern nicht vorkommen. Aehnliche Geschwüre wurden nach Foulerton auch bei Cementarbeitern beobachtet. Nach Lehmann, dessen Thierversuche mit den klinischen Beobachtungen am Menschen übereinstimmen, verfärbt sich bei der Einathmung von Salzsäuredämpfen die Nasenschleimhaut zuerst mehr blass-, dann dunkellividroth; in den folgenden Tagen entwickelt sich ein eitriger Nasenkatarrh, während gleichzeitig grössere und kleinere Partien des Septum bald einer trockenen Nekrose, bald einer feuchten Gangrän anheimfallen. Die trockene Nekrose ist häufiger, die Theile werden vollständig hart und lederartig und endlich durch demarkirende Entzündung abgestossen; gleichzeitig zeigen auch die vorderen Enden

der Muscheln starke Blutüberfüllung und schwärzliche Verfärbung; nach Ausheilung solch' hochgradiger gangränöser Zerstörungen kommt es zu narbigen Schrumpfungen und Verengerung des Naseneinganges. Die Wirkung der Ammoniakdämpfe ist eine weniger intensive; Lehmann konnte zwar gleichfalls katarrhalisch-eitrige Rhinitis mit Blutungen erzeugen, aber niemals Nekrose und Gangrän.

Die Behandlung muss hauptsächlich eine prophylaktische sein und in fleissiger Lüftung und Reinigung der Fabriksräume, Abkürzung der Arbeitszeit oder häufiger Ablösung der Arbeiter, Tragen eines Respirators oder Wattetampons in der Nase, mechanischer Entfernung der eingeathmeten Stoffe durch die Nasendouche, Vermeidung des Bohrens in der Nase bestehen.

Eine eigene, in ihrer Aetiologie noch nicht sicher erforschte Art von Geschwür ist das Ulcus septum nasi perforans.

Dasselbe hat nach den Ansichten aller Autoren nichts mit Syphilis oder einer anderen Dyskrasie zu thun. Nach Rossbach beginnt dasselbe mit einer leicht weisslichen Verfärbung der Septumschleimhaut und brüchigen Beschaffenheit des Epithels und der Mucosa. Im weiteren Verlaufe geht die Schleimhaut zu Grunde, indem sie molecular zerfällt; der Knorpel wird freigelegt und zerfällt ebenfalls, bis schliesslich Perforation eintritt. Wenn die Perforation eine gewisse Grösse erreicht hat, tritt Stillstand und Ueberhäutung der Ränder ein. Der Sitz des Geschwüres ist die Schleimhaut über der Cartilago quadrangularis, also die Stelle, wo auch meist die habituelle Blutung sitzt, und kann nach Hajek nach hinten bis zum knöchernen, nach vorne bis zum häutigen Septum reichen. Das Geschwür kann auf einer, häufiger der rechten, oder auf beiden Seiten zugleich auftreten oder auch nacheinander. Seine Form ist ganz rund, seltener oval, der Hauptdurchmesser von vorne nach hinten beträgt 1—2 cm.

Ueber die eigentliche Ursache des Geschwüres sind die Meinungen sehr getheilt; während die Einen Veränderungen der Gefässe theils trophoneurotischer, theils thrombotischer oder atheromatöser, theils embolischer Natur verantwortlich machen, glauben die Anderen, dass doch ein Trauma, und zwar Kratzen und Bohren mit den Fingernägeln, den ersten Anstoss zu den oben beschriebenen Veränderungen gibt. Verf. kam zu denselben Resultaten, wie Hajek. Im allerersten Anfang handelt es sich um eine circumscripte Entzündung der Septumschleimhaut, welche der Einathmung mechanisch oder chemisch reizenden Staubes ihre Entstehung verdankt und die mit Krustenbildung auf der entzündeten Stelle einhergeht. Die Krustenbildung am Septum führt einestheils zu Verengerung des Naseneinganges, anderntheils zu unangenehmen Sensationen, zu einem kitzelnden Gefühl, welche beiden Umstände den Besitzer der betreffenden Nase veranlassen, zu kratzen und die Nase durch Entfernung der Borke freizumachen. Mit der Borke wird aber auch ein Theil des anhaftenden Epithels entfernt; untersucht man jetzt die betreffende Stelle, so sieht man

eine weissliche Verfärbung und Auflockerung oder auch, wenn Gefässe mit verletzt werden, eine kleine blutende Fläche. Dadurch nun, dass in das gelockerte Epithel Staphylokokken und Streptokokken eindringen, erfolgt Schmelzung der Gewebe und schliessliche Perforation des Knorpels.

Weichselbaum will das Geschwür häufig bei Phthisikern gesehen haben, was Hajek bestätigt; Suchanek hält das Geschwür für ein traumatisches, ebenso Siebenmann. Zuckerkandl lässt es durch Xanthose entstehen.

Als Xanthose beschreibt Zuckerkandl eine gelbliche, gelbbraune oder rostfarbige Verfärbung der Schleimhaut des Septum cartilagineum, welche durch Pigmentablagerung in der Mucosa entsteht und zuweilen mit Atrophie verbunden ist.

Die Diagnose ist leicht, vorausgesetzt, dass Syphilis und Tuberculose sowie chemische Schädlichkeiten mit Sicherheit ausgeschlossen werden können. Während bei Nasensyphilis sehr häufig noch andere Zeichen florider oder abgelaufener Syphilis vorhanden sind, fehlen dieselben bei Ulcus perforans völlig; während syphilitische Geschwüre mit Vorliebe den Knochen ergreifen und unbehandelt immer weiter fortschreiten, ergreift der Ulcus perforans nur den Knorpel und heilt spontan; während endlich bei Syphilis oft noch andere Stellen der Nase afficirt und in der Umgebung der Perforation strahlige Narben vorhanden sind, beschränkt sich bei Ulcus perforans die Veränderung nur auf die Scheidewand. Von tuberculösen Geschwüren unterscheidet sich das Ulcus perforans dadurch, dass bei ersteren die Ulceration stets aus einer knolligen Infiltration oder Granulationsgeschwulst hervorgeht, dass die tuberculösen Geschwüre stets mit granulirenden Rändern besetzt sind und deshalb sehr oft die Perforationsstelle überwuchert und verdeckt ist, während das Ulcus perforans stets glatte Ränder ohne Granulationen aufweist und die Perforation offen zu Tage liegt; immerhin gibt es Fälle, bei denen ein sicherer Entscheid unmöglich ist.

Die Behandlung besteht, vorausgesetzt, dass die Kranken noch vor der Perforation in Behandlung kommen, in desinficirenden Nasendouchen, Bestreichen des Geschwüres mit Bor-, Wismuth- oder Quecksilbersalben und leichten Aetzungen des Geschwürsgrundes.

Zu den seltenen Geschwürsformen gehören endlich jene, welche durch Zerfall der Schleimhaut in Folge von Abscedirung oder Blutungen in und unter der Schleimhaut entstehen, und jene, welche Erkrankungen der Nebenhöhlen begleiten. Bei dieser letzteren befindet sich die von dem abfliessenden Eiter bespülte Schleimhaut, mit Vorliebe der um die Communicationsöffnungen herum liegende Theil, theils im Zustande der entzündlichen Hyperplasie, theils der eitrigen Einschmelzung; die Existenz solcher Defecte lässt sich meist nur durch

Sondenuntersuchung resp. durch Blossliegen oder Rauhigkeiten der Knochen constatiren. Endlich sei erwähnt, dass auch Brüche des Nasenbeines und Siebbeines zu stinkendem Ausfluss, Caries und Nekrose der Knochen und Zerstörungen der Schleimhaut Anlass geben können.

Die Diagnose dieser Geschwüre lässt sich bei sorgfältiger Untersuchung leicht stellen.

Die Behandlung richtet sich nach der Grundkrankheit und ist im Uebrigen dieselbe wie bei den anderen Geschwürsformen.

Rhinitis diphtheritica.

Die Diphtherie der Nase ist fast stets eine secundäre, d. h. vom Rachen fortgeleitete; ausnahmsweise wird bei Erwachsenen die Nase primär ergriffen, wenn z. B. Erosionen, Geschwüre oder frische Wunden vorhanden sind, wie z. B. in einem von Johnston mitgetheilten, eine Dame betreffenden Falle, welche nach der Operation eines Nasenpolypen an Diphtherie der Nase und des Nasenrachenraumes erkrankte, nachdem sie ihre wahrscheinlich an Diphtherie leidende Schneiderin besucht hatte. Bei Kindern hingegen erkrankt die Nase nicht selten primär; der sogenannte diphtheritische Schnupfen oder die im vorletzten Capitel besprochene Rhinitis fibrinosa können mehrere Tage unter dem Bilde eines gewöhnlichen Katarrhs verlaufen, bis dann plötzlich Rachen-Kehlkopfdiphtherie auftritt und so die Diagnose klargelegt wird. Die primäre Diphtherie der Kinder manifestirt sich ausser durch Störung des Allgemeinbefindens, Fieber, Mattigkeit, mehr oder weniger hochgradige Verlegung der Nase, durch Schwellung und Oedem der Nase, heftiges Schnarchen, später durch den Abgang von Pseudomembranen und stinkender Jauche, welche die Nasenlöcher und die Oberlippe excoriirt und zu Oedem der Haut, der Wangen, der Augenlieder und selbst der Conjunctiva Anlass gibt. Der locale Befund wurde bereits bei der Diphtherie des Rachens geschildert.

Bei Neugeborenen kommt nach Monti und Anderen in den ersten 6 Wochen nicht selten eine primäre Nasendiphtherie zur Beobachtung, welche von der genuinen Diphtherie völlig unabhängig ist, wahrscheinlich durch Erkrankungen der mütterlichen Genitalien hervorgerufen wird und mit Rhinitis fibrinosa nahe verwandt oder identisch sein dürfte. Die subjectiven und objectiven Erscheinungen sind den oben geschilderten völlig gleich; die Affection kann heilen, sich aber auch auf Lippen, Rachen, Kehlkopf fortsetzen oder durch Sepsis tödten. Die im Verlaufe des Scharlachs auftretende bösartige Nasenaffection hält Henoch, ebenso wie jene im Rachen, nicht für echte Diphtherie, sondern für eine nekrotisirende Entzündung.

Die Prognose der echten Diphtherie ist namentlich bei jüngeren Kindern und Säuglingen sehr schlecht, indem meist nur bei geringgradiger Exsudation Heilung beobachtet wird.

Die Behandlung ist dieselbe wie bei secundärer Nasendiphtherie (vergl. die Diphtherie des Rachens).

Rhinitis gangraenosa.

Gangrän des Naseninnern kommt äusserst selten zur Beobachtung, und wenn, fast nur in der circumscripten Form. Relativ am häufigsten gibt die Diphtherie, sowohl die genuine wie die den Scharlach begleitende, zu gangränösen Zerstörungen am Septum, den Muscheln oder am Naseneingange Anlass; auch gewisse Chemikalien, namentlich Salzsäuredämpfe, chromsaures Kali etc., können, wie bereits erwähnt, bei längerer Einwirkung zu trockenem und feuchtem Brand führen, ebenso Abscesse, diffuse Phlegmonen oder Ulcerationen, Fremdkörper oder Rhinolithen.

Die Erscheinungen der Nasengangrän bestehen meist in der Secretion eines jauchigen, serös blutigen, äusserst fötiden Ausflusses, welcher die Nasenlöcher und Oberlippe excoriirt und bei den diphtheritischen Formen zerfallene Pseudomembranen mit sich führt. Bei diesen ist die äussere Nase geschwellt, Wangen und Augenlider sind ödematös, in den schlimmsten Fällen wird auch die Conjunctiva und Cornea in Mitleidenschaft gezogen. Bald stellen sich die Erscheinungen der Sepsis ein, Petechien, profuses Nasenbluten, Lymphdrüsenschwellungen in den Kieferwinkeln, blutige Diarrhoen, Adynamie.

Bei der circumscripten Form fehlen die Allgemeinerscheinungen und hören nach Abstossung der gangränösen Partien der Fötor und die jauchige Secretion auf.

Die Prognose ist nur günstig bei localisirter Gangrän, sehr ungünstig bei der diffusen, namentlich der diphtheritischen, den Scharlach begleitenden Form.

Die Therapie muss vorzüglich eine locale sein und in sorgfältigster Ausspritzung der Nase mit den üblichen Desinficientien, Insufflationen von Jodoform, Borsäure etc., bestehen. Gegen die septischen Erscheinungen sind Chinin, Antifebrin, Roborantia zu versuchen.

Syphilis.

Wie alle Respirationsorgane, so wird auch die Nase mit Vorliebe von Syphilis befallen.

Primär erkrankt die Nase und der Naseneingang zuweilen durch den Transport des syphilitischen Giftes mittelst unreiner Finger oder durch Küsse, Berührungen oder schlecht gereinigte Instrumente, namentlich Ohrkatheter (Burow) Viel häufiger jedoch wird die Nase secundär ergriffen.

Die erste Aeusserung der constitutionellen Syphilis ist sehr oft der syphilitische Katarrh.

Nach Seifert unterscheidet sich derselbe von dem einfachen Schnupfen durch den weniger stürmischen Beginn, die geringere, aber viel länger dauernde Secretion und das Auftreten von erythematösen Flecken am Septum.

Bei Erwachsenen wird er meist wegen der geringen Beschwerden und Weite der Nase übersehen oder auf Rechnung einer Erkältung gesetzt. Bei Säuglingen jedoch sind die Erscheinungen viel prägnanter. Einige Tage oder Wochen nach der Geburt bemerken die Angehörigen eine Erschwerung der Nasenathmung; es tritt ein schnüffelndes, pfeifendes Geräusch auf oder Einsinken der Nasenflügel, reichliche Secretion und Borken- und Krustenbildung am Naseneingang. Zuweilen ist das Secret rein eitrig, blutig, übelriechend und sehr corrodirend. Einer Verwechslung mit gewöhnlichem Schnupfen oder mit acuter Nasenblennorrhoe entgeht man nur durch sorgfältiges Suchen nach anderweitigen Aeusserungen der Lues; abgesehen von dem kümmerlichen Aussehen solcher syphilitischer Kinder finden sich meist noch Exantheme, Pemphigus oder Psoriasis palmaris und plantaris, Rhagaden und Plaques der Mundhöhle, Condylome ad anum et scrotum. Nicht selten dürften sich, wie Verf. mit Gerber behaupten muss, unter dem Schleier der Coryza syphilitica bereits atrophirende und destruirende Processe tertiären Charakters verbergen.

Syphilitische Papeln und Condylome im Innern der Nase hat Verf. bisher noch nicht gesehen, dagegen kommen schuppende, nässende und ulcerirende Papeln in der Nasenflügelfurche und auf der inneren Fläche der Nasenflügel oder am Nasenboden nicht gar selten zur Beobachtung. Wenn auch oberflächliche Ulcerationen der Nasenschleimhaut in Folge des Zerfalles frühsyphilitischer Producte unstreitig vorkommen, so werden doch Zerstörungen der Knochen dabei nicht beobachtet, dagegen kann bei gleichzeitiger Einwirkung chemischer Substanzen (Coryza professionalis) der knorpelige Theil der Scheidenwand durchlöchert werden.

Unendlich viel häufiger geben die späteren Stadien sowohl der acquirirten wie hereditären Syphilis zu Affectionen der Nase Anlass.

Die gummöse Infiltration der Schleimhaut muss als die gewöhnliche Ursache der oft schenssliehen Verheerungen des Nasen-innern betrachtet werden. Zuweilen tritt die Syphilis schon nach wenigen Monaten ihres Bestehens in das gummöse Stadium (Syphilis maligna); am grössten ist nach Michelson die Gefahr im 1. bis 3. Jahre nach der Infection, und nach Gerber im 8. bis 14. Jahre.

Die subjectiven Beschwerden bestehen, da die Nasen-syphilis scheinbar harmlos und incognito unter dem Bilde eines Stockschnupfens beginnt, in Verstopfung der Nase, Störung des Geruches, vermehrter wässerig-schleimiger Secretion und nasalem Timbre der Stimme. Nach kürzerem oder längerem Bestande wird der Ausfluss aus der Nase eitrig, übelriechend, mit Blut vermischt, oft geléeartig oder käsig-krümelig; die Verstopfung wird eine vollständige, es treten Schmerzen in der Tiefe der Nase oder über dem Nasenrücken ein, welche in die Wangen, Zähne, Augen, Stirngegend ausstrahlen und

Fig. 29. Syphilitische Geschwüre an der rechten unteren und linken mittleren Muschel mit Perforation der im unteren Theile ulcerirten Scheidewand.

oft ausgesprochen neuralgischer Natur sind. Zuweilen enthält das äusserst fötide, den Introitus narium und die Haut der Oberlippe excoriirende Secret sandige Knochenbeimengungen oder es werden grössere Stücke nekrotischer Knochen sowie Krusten und Borken durch den Rachen oder die Nase ausgestossen. Auch Schwellung und Röthung der Weichtheile der Nase kommt vor.

Die objectiven Erscheinungen sind verschieden nach dem Sitze und dem Stadium, in welchem die Erkrankung zur Beobachtung gelangt. Im Stadium der Infiltration zeigen sich die ergriffenen Partien theils diffus, theils circumscript geschwellt und wenig oder gar nicht geröthet. Der Luftdurchzug durch die Nase ist behindert oder ganz aufgehoben. An der Nasenscheidewand erscheint die Schleimhaut uneben, höckerig, an den Muscheln mehr gleichmässig, oft bis zur Berührung des Septum, geschwellt. Nach längerem oder kürzerem Bestande geht das Stadium der Infiltration in das Stadium der Erweichung und Ulceration über. Die Unebenheiten und flachen Infiltrate wandeln sich vorerst in grauweisse, sulzige Flecken und scheinbare Auflagerungen um, nach deren Abstossung speckig belegte, ausgenagte, mit wallartigen Rändern umgebene, die ganze Schleimhaut

durchsetzende Geschwüre sichtbar werden. Wie Michelson hervorhebt, haben die syphilitischen Geschwüre meist eine langgestreckte, sagittalen Furchen und Mulden ähnliche Form, die er für geradezu pathognomonisch hält. Auf dem Grunde oder an den Rändern dieser Geschwüre finden sich Granulationen oder missfarbige sphacelöse Gewebstrümmer, in einem noch späteren Stadium ist der blossliegende Knorpel oder rauhe Knochen mit der Sonde zu fühlen oder zu sehen.

Das äusserst übelriechende Secret vertrocknet in der Nase zu langen, dicken, grünen, schmutzigbraunen Borken, welche nicht selten vollständige Abgüsse der Nasenhöhle oder eines Nasenganges vorstellen (Ozaena syphilitica). Der Geruch derselben wird meist von den Kranken selbst wahrgenommen, was bei der genuinen Ozaena nicht der Fall ist.

Wenn auch die Knorpel und Knochen der Nase in der Regel von der Schleimhaut aus — von aussen nach innen — blossgelegt werden,

Fig. 30. Ovale geheilte Perforation des deviirten Septum.

Fig. 31. Grosser, unregelmässiger Substanzverlust des Septum cartil., unten begrenzt von der Crista nasalis, oben von der Lamina perpendicularis, hinten vom Vomer. Aufnahme bei seitlicher Spiegelstellung.

so sind doch auch, wie die klinische Erfahrung und die anatomischen Untersuchungen von Sänger, Schuster und E. Fränkel beweisen, gummöse Perichondritis und gummöse suppurative Ostitis und Periostitis häufige Ursachen der von innen nach aussen fortschreitenden Zerstörung.

Unstreitig am häufigsten wird die Nasenscheidewand ergriffen. Mit besonderer Vorliebe localisirt sich die Syphilis auf dem vorderen knorpeligen Theile derselben. Hier entstehen nach vorausgegangener diffuser oder knolliger Infiltration und Ulceration Perforationen von sehr verschiedener Form und Grösse; in der Regel sind sie rund oder oval (Fig. 30), zuweilen finden sich mehrere durch gesunde Partien von einander getrennte Perforationen hinter- oder übereinander oder es geht das ganze Septum cartilagineum zu Grunde (Fig. 31). Die Ränder dieser Perforationen ulceriren oft noch lange und sind auch nach völliger Heilung constant mit eingetrocknetem Secrete bedeckt, das zu zeitweiliger Verstopfung, zu Blutungen und Excoriationen Anlass gibt.

Ziemlich häufig wird auch der hintere knöcherne Theil des Septum, der Vomer und die Lamina perpendicularis des

Siebbeines, ergriffen. Localisirt sich der Process an dem obersten vordersten Ende der Lamina perpendicularis oder dem unteren Ende des Nasenbeines und greift von da auf das knorpelige Septum oder das subcutane Bindegewebe der Nasenrückenhaut über, dann kann ohne vorhergegangene Verstopfung und eitrigen Ausfluss der Nasenrücken einsinken (Sattel- oder Hammelnase). Sie kommt dadurch zu Stande, dass das sich retrahirende Narbengewebe die Haut der Nase nach rückwärts resp. innen unter das Niveau der Nasenbeine zieht. Auch die anderen Formen von Missstaltung der äusseren Nase, die Stumpfnase, charakterisirt durch eine flache und breite Nasenwurzel mit mehr oder minder nach vorne und aufwärts stehenden Nasenlöchern, die seitlich eingedrückte Pincenez- oder Kneifernase — bei der die Nase seitlich an der Grenze zwischen dem knöchernen und knorpeligen Theile eine mehr oder weniger tiefe Stelle zeigt —, müssen auf Zerstörungen im Naseninnern zurückgeführt werden (Gerber). Defecte im Septum allein, mögen sie auch noch so gross sein, geben zu Formveränderungen der äusseren Nase keinen Anlass; dazu gehört eine Zerstörung an dem Nasenbeine oder der Lamina perpendicularis. Der Knocheneiter kann sich auch unter der Schleimhaut des Septum bis auf den Boden der Nasenhöhle herabsenken, beide Nasen obliteriren und zu Gesichtserysipel Anlass geben. Greift die Syphilis von der perpendiculären Platte des Siebbeines auf die horizontale über, dann liegt die Gefahr eitriger Meningitis, Sinusthrombose, Arrosion eines Gefässes mit tödtlicher äusserer oder innerlicher Blutung sehr nahe. Dasselbe ist der Fall, wenn das Keilbein ergriffen wird. Bei Ulcerationen der die knöcherne Scheidewand überziehenden Schleimhaut kommt es sehr bald zu Entblössung, Perforation und Ausstossung des Vomer.

Relativ selten localisirt sich die Syphilis an den Nasenbeinen. Der Nasenrücken wölbt sich, die äussere Haut wird kupfer- oder lividroth, es zeigt sich Fluctuation und schliesslich Ulceration; werden die Nasenbeine ausgestossen, so entsteht zwischen den Augenhöhlen eine grosse, unregelmässige oder ovale Oeffnung, durch welche, wie Verf. einmal sah, die scheusslich entstellte und des ganzen harten und weichen Gaumens beraubte Kranke die Zunge herausstrecken konnte. In einem anderen Falle wurden beide Stirnhöhlen, in einem dritten die Kieferhöhle blossgelegt.

Fast ebenso oft wie am Septum localisirt sich das gummöse Infiltrat an den Muscheln (vergl. Fig. 29 rechts an der unteren, links an der mittleren Muschel). Je nach dem Umfange desselben werden kleinere oder grössere Strecken der Schleimhaut ulcerirt, die Muscheln blossgelegt und theils in kleinen, spitzigen Partikeln, theils als grössere Lamellen oder auch ganz abgestossen. Die nekrotischen Muscheln ragen entweder als schwarzgraue Sequester frei in das Lumen der Nase herein oder sie sind an den Demarcationsrändern von zahlreichen papillären Granulationen und polypoiden Wucherungen umgeben.

Nicht selten beginnt die Affection am Boden der Nasenhöhle oder der Crista nasalis. Auch hier ist die erste objective Erscheinung Schwellung und Wulstung der Schleimhaut mit Verstopfung des unteren Nasenganges. Allmälig zerfällt die gewulstete Stelle, es entsteht ein Geschwür, welches sich bald rascher, bald langsamer nach vorne, nach hinten oder seitlich auf die untere Muschel oder den unteren Theil des Septum verbreitet und bei entsprechender Behandlung heilt oder in malignen Fällen trotz localer und allgemeiner Behandlung die Knochen des Nasenbodens — den Gaumenfortsatz des Oberkiefers und die horizontale Platte des Gaumenbeines — blosslegt. Das Ergriffensein des Nasenbodens, der zugleich das Dach der Mundhöhle bildet, äussert sich sehr häufig durch eine bald die Mittellinie, bald die Seitentheile des harten Gaumens betreffende Schwellung und Hervorwölbung, über welcher die Schleimhaut anfangs normal, später lividroth gefärbt ist. Die Raphe des harten Gaumens erscheint als eine erhabene, entzündete, cyanotische Leiste, auf der bei weiterem Fortschreiten der Affection sich längliche, spaltförmige oder rundliche Geschwüre bilden, welche zu Perforation der Schleimhaut und des Knochens führen. Die blossliegenden, rauhen, missfärbigen Knochen können sowohl von der Mundhöhle aus gesehen als auch von der Nase aus mittelst der Sonde gefühlt werden; zuweilen lässt sich durch Druck auf den harten Gaumen Crepitation der in ihrer Verbindung gelockerten und theilweise schon sequestrirten Knochen erzeugen. Nach des Verf. Erfahrung gehört die Localisation am Nasenboden zu den schwersten und langwierigsten Formen; die Abstossung der nekrotischen Knochen erfolgt bei der grossen Dicke der Crista nasalis, der Compactheit und der eigenthümlichen Form der Pars horizontalis des Gaumenbeines sowie des Proc. palatinus äusserst langsam. Wenn auch Perforationen des harten Gaumens bei Ergriffensein des Nasenbodens zur Regel gehören, so können dieselben doch in den seltensten Fällen trotz Exfoliation grosser Sequester, wie Verf. gesehen hat, ausbleiben.

In sehr schweren oder vernachlässigten Fällen können nicht nur sämmtliche Muscheln, die knöcherne und knorpelige Scheidewand mit Vomer und Crista nasalis, sondern auch beide Gaumenfortsätze des Oberkiefers, die Gaumenbeine oder das Keilbein nekrotisiren und ausgestossen werden.

Endlich localisirt sich das gummöse Infiltrat auch am Naseneingang, besonders auf den Nasenflügeln. Dieselben erscheinen mehr oder weniger verdickt, rigid, knotig, den Aditus verengernd, auf Druck etwas schmerzhaft, im späteren Verlaufe ulcerirt oder mit Schrunden und Fissuren bedeckt, an denen gelbes, borkiges Secret klebt. Nach Heilung der Geschwüre, eventuell Zerstörung der Knorpel und des vordersten häutigen Septumabschnittes, sinkt der Nasenflügel in Folge Narbenretraction ein und gibt dadurch oder durch Verwachsung mit den gegenüberliegenden Theilen zu Stenose des Naseneinganges und durch Herabhängen der Nasenspitze auf die Oberlippe zu Entstellung

Anlass. Wegen der grossen Aehnlichkeit mit Lupus exulcerans bezeichnet man diese Affection auch als Lupus syphiliticus.

Nach Otto Weber kommt an den Nasenflügelknorpeln zuweilen auch eine atrophisirende gummöse Knorpelentzündung vor, welche sich dadurch auszeichnet, dass die Haut über den Knorpeln sich ein wenig röthet, während die Knorpel selbst allmälig schwinden und zusammenfallen, so dass die einzelnen Theile nur noch durch eine eingezogene Hautfalte mit einander in Verbindung stehen.

Zu den grössten Seltenheiten gehören syphilitische Granulationsgeschwülste, harte, derbe Tumoren, wie solche Krecke in Nase und Rachen gesehen hat.

Der Verlauf der gummösen Formen der Syphilis ist ein äusserst langsamer. Auf die Schleimhaut beschränkt bleibende Geschwüre heilen unter geeigneter Behandlung oft ziemlich rasch, während die mit Entblössungen der Knochen einhergehenden Fälle oft Monate, ja 1—2 Jahre erfordern, da man nicht im Voraus bestimmen kann, ob der Knochen cariös oder nekrotisch und dann abgestossen wird oder ob derselbe — was Verf. mehrmals beobachtet hat — sich wieder überhäutet.

Die Diagnose der Primäraffecte sowie des syphilitischen Katarrhs, der Plaques und Papeln ist in der Regel leicht, vorausgesetzt, dass noch andere Erscheinungen der Lues, namentlich Hautsyphilide oder Plaques der Mundrachenhöhle, vorhanden sind; bei Neugeborenen kann oft nur die längere Beobachtung und wiederholte Untersuchung von Kind und Mutter die Diagnose fixiren.

Aeusserst schwierig, ja unmöglich ist die Diagnose der gummösen Rhinitis im Stadium der Infiltration, d. h. so lange noch keine Ulcerationen oder anderweitige Aeusserungen der Lues vorhanden sind. Sehr verdächtig sind die oben beschriebenen knotigen Unebenheiten des Septum, ferner hartnäckige Schnupfen, welche mit rheumatoiden Schmerzen der Schulter-, Brust- und Rückenmuskeln combinirt sind; man hüte sich deshalb, dieselben auf Erkältungen zurückzuführen. Da seit der Infection 10, selbst 20 Jahre verflossen sein können und auch die in Genital-Angelegenheiten aufrichtigen Kranken nicht mehr an einen Zusammenhang mit dem längstvergessenen und geheilten, oft sogar übersehenen Primäraffect denken, so erscheint namentlich bei verheirateten oder vor ihrer Ehe schon inficirt gewesenen Damen eine antisyphilitische Behandlung nicht nur gerechtfertigt, sondern geradezu geboten. Bei solchen Frauen fehlen, was Verf. besonders auffiel, sehr oft anderweitige Erscheinungen oder Ueberreste von Syphilis; sie können das volle Bild der Gesundheit darbieten, aber auch an Anämie und Neigung zu Abortus leiden, welch' letztere Erscheinung den denkenden Arzt auf die richtige Spur zu bringen vermag. Sehr schwierig ist ferner die Diagnose in allen jenen Fällen, in welchen die Syphilis die tiefsten, verborgensten und am schwierigsten zu untersuchenden Theile der Nase befällt, wie z. B. den hinteren Theil der Muscheln, das hintere Ende des Vomer, die Umgebung der Keilbeinhöhle, die äussere Nasenwand, das Nasendach. Da auch die nie zu

unterlassende Rhinoscopia posterior in solchen Fällen keine Auskunft geben kann, so beruht die Diagnose auf der Untersuchung mit der Sonde resp. auf dem Nachweis cariöser Knochen.

Sind Geschwüre vorhanden oder Affectionen der Knochen und Knorpel, so wird man bei Erwachsenen selten fehlgehen, wenn man dieselben für syphilitische erklärt. Allerdings ist Vorsicht nöthig, zumal wir im Capitel Rhinitis ulcerosa gesehen haben, dass Geschwüre in der Nase sehr häufig und durchaus nicht immer dyskrasischen Ursprunges sind.

Absolut sicher ist die Diagnose, wenn noch anderweitige syphilitische Erscheinungen, kupferfarbige Hautausschläge, Knochenauftreibungen, Muskelgummata, frische Geschwüre oder alte Narben in Mund, Raehen und Kehlkopf oder Hodensyphilis etc. vorhanden sind. Tiefe, speekig belegte Geschwüre am Naseneingang und den Nasenflügeln spreehen gegen Eczem und Sycosis; der Entscheid zwischen Tuberculose und Syphilis ist zuweilen äusserst schwer und muss dann der therapeutische Versuch oder die mikroskopische Untersuchung exstirpirter Granulationen und der Secrete die Diagnose feststellen.

Die Prognose ist, vorausgesetzt, dass die Krankheit richtig erkannt wird und die Kranken nicht erst bei weit vorgeschrittener Zerstörung in Behandlung kommen, eine günstige; freilich gelingt es nicht immer, Perforationen in die Mundhöhle, Entstellungen der äusseren Nase, Verlust von Nasenknochen, Stenosen oder Narbenbildung hintanzuhalten. Dass Affectionen der Lamina cribrosa, des Keilbeines, der Gesichtsknochen durch Meningitis, Sinusthrombose lebensgefährlich werden können, wurde bereits erwähnt. Aber auch nach völliger Heilung bleiben meist sehr unangenehme Folgezustände zurück. So vertrocknet einestheils nach Perforationen oder Verlust der Scheidewand das Secret zu dicken, schwer zu entfernenden Borken, anderntheils entwickelt sich das volle Bild der Rhinitis atrophica, welche der Umwandlung der früher ulcerirten Partien in Narbengewebe sowie der Schrumpfung der gummös infiltrirten Schleimhaut und nach Miehelson auch noch einer rareficirenden Ostitis ihre Entstehung verdankt.

Die Behandlung muss eine allgemeine und eine locale sein. Bei den frühsyphilitischen Formen greife man zum Quecksilber, bei den Spätformen zum Jodkali, welches als souveränes Mittel fast nie im Stiche lässt; die Allgemeinbehandlung muss um so energischer sein, je weniger eine Localbehandlung möglich ist; in hartnäckigen Fällen ist eine combinirte Inunctions- und innerliche Jodkalicur oder das Calomel, Dec. Zittmani angezeigt.

Die locale Behandlung des syphilitischen Katarrhs ist dieselbe wie bei acuter Nasenblennorrhoe. Bei den Spätformen ist die gründliche methodische, täglich 2—3malige Reinigung und Entfernung der Borken mittelst Spray oder noch besser mittelst der Nasendouche die erste Bedingung. Zur Douche verwendet man 2—4% Borsäurelösung, $^1/_2$‰ Sublimatlösung, Kali chloricum 1 Esslöffel in 1 Liter Wasser,

Kali hypermangan., Aluminium acetico-tartaricum (von einer 20% Lösung ½—1 Kaffeelöffel in 1 Liter); sehr festsitzende Borken müssen mit der Pincette entfernt werden. Nach der Nasendouche kauterisire man die Geschwüre mit Lapis in Substanz, Sublimat oder Chlorzink, insufflire Jodoform, Jodol oder Borsäure, oder lege Tampons mit Borwasser, Carbollösung, Jodglycerin, Europhensalbe oder Jodoformbougies ein. Gegen Infiltrate und Geschwüre der Nasenflügel empfiehlt sich das Auflegen von Empl. hydrargyri, Einpinseln von Jod und Jodoformcollodium. Manche empfehlen auch das Auskratzen der Ulcera und polypoiden Wucherungen mit dem scharfen Löffel; letztere sowie grössere knotige und raumbeengende Infiltrate am Septum entfernt Verf. mit der kalten oder heissen Schlinge; Abscesse sind baldigst zu öffnen. Bei Nekrose der Knochen ist die Entfernung locker sitzender Sequester die erste Bedingung zur Beseitigung des penetranten leimartigen Geruches; oft gelingt es, die ganze Muschel oder den Vomer als zusammenhängendes Stück zu entfernen, oft nur kleine, abgerundete oder spitzige, nadelförmige, poröse Theile; am schwersten zu entfernen sind die Knochen des Nasenbodens. Man benützt dazu starke Pincetten oder Löffelzangen oder das von Schäffer angegebene Instrument. Festsitzende Sequester lasse man bis zu ihrer Lockerung, die manchmal Monate in Anspruch nimmt, ruhig liegen; die zur schnelleren Abstossung neuerdings wieder von Bergeat empfohlenen Einspritzungen von verdünnter Salzsäure oder Chlorkalk nützen in der Regel wenig; auch vergesse man nicht, dass entblösste Knochen sich wieder überhäuten können. Die nach Heilung der schweren und ausgebreiteten Formen zurückbleibenden atrophischen, fötiden oder nichtfötiden Katarrhe müssen nach den früher angegebenen Regeln behandelt werden. Die Entstellungen der äusseren Nase sowie die Perforationen des harten Gaumens lassen sich zuweilen durch plastische Operationen oder künstliche Nasen aus Celluloid, Silber oder Kautschuk, durch Obturatoren und Gaumenplatten beseitigen.

Tuberculose.

Während früher die Tuberculose der Nase für eine äusserst seltene Erkrankung gehalten wurde, ist jetzt constatirt, dass dem nicht so ist, wenngleich dieselbe an Häufigkeit hinter der Syphilis noch weit zurückbleibt. Eine sehr sorgfältige Zusammenstellung der Literatur findet sich in den Arbeiten von Mertens, Hajek, Hahn, Michelson und O. Chiari.

Die Tuberculose der Nase kann ebenso wie jene der Mundrachenhöhle oder des Kehlkopfes primär auftreten, in der Regel erscheint sie jedoch secundär oder gleichzeitig mit Tuberculose anderer Organe. Verf. beobachtete einmal primäre Nasentuberculose bei einer Frau,

welche das durch das Sputum ihres tuberculösen Mannes verunreinigte Taschentuch gebraucht hatte. Hahn sah einmal die tuberculöse Wucherung auf dem Boden eines längere Monate bestehenden Eczems der Oberlippe und der Nase entstehen In den von Réthi und Neumayer mitgetheilten Fällen hatte sich die Tuberculose von dem Zahnfleisch aus in die Kieferhöhle und von da in die Nase verbreitet.

Die Tuberculose der Nase tritt meistens in zwei Formen auf, und zwar, was das Häufigere ist, in Form der tuberculösen Geschwulst (Tuberculom) und in der Form flacher, granulationsarmer Geschwüre.

Die geschwulstartige Form, das Tuberculom, wird theils als einzige und, wie es scheint, primäre Aeusserung der Tuberculose, theils als secundäre Erscheinung im Gefolge von Lupus der Haut oder Lungen- und Lymphdrüsentuberculose beobachtet. Der Lieblingssitz des Tuberculoms ist der vordere Theil der knorpeligen Scheidewand oder die Stelle, wo hänfig Excoriationen entstehen, die dann entweder durch Lungensputum der Patienten oder durch den mit Tuberkelbacillen verunreinigten kratzenden Fingernagel inficirt werden. Der Vorgang, wie ans einer solchen inficirten Excoriation ein Tuberculom entsteht, ist nach O. Chiari folgender: Zuerst entsteht wahrscheinlich ein kleines tnberculöses Geschwür, das meist übersehen wird, dann spriessen aus dem Boden und dem Rande des Geschwürs Granulationen, die znsammenfliessen und rauhe Höcker bilden, an welchen Schleim eintrocknet; erst durch die Behinderung der Nasenathmung und die bei der Entfernung der Krusten auftretende Blutung werden die Kranken veranlasst, Hilfe zu suchen. An anderen Stellen, wie an den Muscheln, dem knöchernen Septum sind primäre Tuberculome äusserst selten. Die entwickelten Tuberculome stellen meist aus mehreren Knoten und Knollen bestehende, an der Basis unter sich verbundene Geschwülste vor (Schäffer), von weicher Consistenz und röthlicher Farbe, welche mit Eiter und Krusten bedeckt sind und bei Berührung äusserst leicht bluten. Manchmal sieht man aber auch ganz isolirte Geschwülste von sehr harter Consistenz Localisirt sich das Tuberculom auf den Naseneingang, so erscheint derselbe durch knollige Infiltrate verengt, die Nasenflügel sind verdickt, hart und uneben und mit bräunlichen Krusten und Geschwüren bedeckt.

Bei der zweiten Form der Tuberculose bilden sich meistens secundär und in Begleitung hochgradiger Lungentuberculose an der Scheidewand, an den vorderen Enden der Muscheln oder am Naseneingang flache, granulationsarme Geschwüre, die sich rasch ausbreiten und am Boden oft mit miliaren Knötchen besetzt sind.

Die subjectiven Beschwerden sind im Anfang der Krankheit meist sehr gering und bestehen in den Erscheinungen eines Nasenkatarrhs. Erst später, wenn die Tuberkelgeschwülste wachsen, stellt sich Behinderung der nasalen Athmung ein oder die Kranken werden bei Ulceration durch übelriechenden eitrigen Nasenfluss oder Borkenbildnng sowie durch öfteres Nasenbluten aufmerksam. Schmerzen

fehlen in der Regel ganz, das Allgemeinbefinden leidet meist erst dann, wenn noch andere Organe, namentlich die Lunge, tuberculös erkranken. Wie die Tuberculose des Larynx, findet sich auch die der Nase öfters auf der der erkrankten Lunge entsprechenden Seite zuerst.

Der Verlauf ist meist ein sehr langsamer. In der Regel führen beide Formen zu Perforation der Scheidewand, wobei sich die Defecte meistens durch Granulationswucherungen wieder schliessen, bis auch diese endlich zerfallen. Dass die Nasentuberculose, wenn auch nur ausnahmsweise, durch Zerstörung der Knochen, zu Einsinken der Nase oder zu Verlust des Gaumenbeines führen kann, haben Hajek und Réthi beobachtet; Zerstörungen der Nasenflügel kommen jedoch ziemlich häufig vor.

Die Diagnose ist im Allgemeinen nicht leicht, da verschiedene Krankheitsprocesse mit Tuberculose verwechselt werden können. Am häufigsten geschieht dies mit der Syphilis; die tuberculösen Geschwülste können für Gummata oder auch für bösartige Neubildungen, kleinzellige Sarkome oder für Lupusknoten gehalten werden; bei Geschwürsbildung liegt eine Verwechslung mit den genannten Krankheiten noch viel näher, zumal bei jugendlichen Personen.

Die Diagnose stützt sich deshalb einerseits auf den Ausschluss der Syphilis, andererseits auf den klinischen Verlauf, das Auftreten von Tuberculose in anderen Organen, so namentlich in der Lunge, den Lymphdrüsen, Knochen, Mund-Rachenhöhle, dem Kehlkopf oder im Urogenitalapparat und ganz besonders auf den mikroskopischen Befund. Das Tuberculom besteht seiner Hauptmasse nach aus kleinen, runden Zellen, welche durch mehr oder weniger starkes Bindegewebe zusammengehalten werden. Zwischen diesen lymphoiden Zellen befinden sich epithelioide und Riesenzellen von verschiedener Anzahl und Vertheilung. Besonders auffallend ist nach den übereinstimmenden Berichten der meisten Autoren die geringe Zahl, ja das völlige Fehlen von Tuberkelbacillen in den Geschwülsten sowie auf der Oberfläche der Geschwüre. Oft findet man nach Hajek und Michelson keine oder nur vereinzelte Bacillen und diese erst nach wiederholten Untersuchungen oder in den tieferen Theilen der Geschwülste oder auf dem Grunde der Geschwüre. Auch Riesenzellen können völlig fehlen, besonders wenn die Krankheit ein mehr locales Leiden darstellt. Wenn auch im Allgemeinen die tuberculösen Geschwüre gegenüber den syphilitischen sich durch die Anwesenheit zahlreicher Granulationen auf dem Grunde und an den Rändern auszeichnen, so kommen doch auch Ausnahmen vor. Eine Unterscheidung von Lupus ist umsoweniger möglich, als das mikroskopische Bild genau dasselbe ist und Lupus nach den neueren Untersuchungen identisch ist mit Tuberculose. Ob das von Rosa Idelson und Baumgarten bei Lupus constatirte Fehlen centraler Käseherde, die bei Lupus grössere Anzahl der Riesenzellen und Blutgefässe sowie die Vernarbung wirklich sichere Anhaltspunkte zur Unterscheidung des Lupus von der Tuberculose abgeben, möchte Verf. bezweifeln. Immerhin muss man vom klinischen Standpunkte aus im Auge behalten, dass Lupus des Naseninnern meist erst

auftritt, wenn die Haut der Nase oder des Gesichtes in charakteristischer Weise bereits befallen ist. Das Rhinosclerom unterscheidet sich von der Tuberculose durch seine Knorpelhärte und die Mitbetheiligung des Nasenrachenraumes und des Rachens. Am leichtesten ist selbst bei genauer mikroskopischer Untersuchung eine Verwechslung mit weichen, gefässreichen Sarkomen möglich. Endlich können nach Weichselbaum auch Verwechslungen mit vergrösserten Schleimdrüsen oder stärkeren lymphoiden Wucherungen oder hämorrhagischen Erosionen stattfinden.

Die Prognose ist meist eine ungünstige: Heilung kann zwar eintreten, doch zeigt die Erfahrung, dass dieselbe meist nur eine zeitweise ist, indem Recidiven nicht ausbleiben. Eine Gefahr für das Leben tritt ein, wenn die Tuberculose auch andere lebenswichtige Organe befällt.

Die Behandlung muss in erster Linie eine chirurgische sein. Geschwüre müssen ausgekratzt, Tuberkelgeschwülste mit der kalten oder heissen Schlinge abgetragen oder mit dem Löffel entfernt und dann gründlich mit starker Milchsäurelösung geätzt oder mit dem Galvanokauter ausgebrannt werden. Bei sehr diffuser Erkrankung empfehlen Bruns und Riedel die Spaltung der Nase mit Entfernung der krankhaften Stelle sammt einem Theile der Scheidewand. In zweifelhaften Fällen ist ein Versuch mit Jodkali angezeigt.

Scrophulose, Lupus, Rotz, Rhinosclerom.

Ueber die Scrophulose der Nasenhöhle wissen wir zur Zeit fast noch weniger als über jene des Rachens.

Vor Allem fragt es sich, was man unter Scrophulose versteht. Je nachdem man den Begriff und die Grenzen der Scrophulose enger oder weiter zieht, wird man, wie Gottstein bemerkt, die Häufigkeit der scrophulösen Nasenerkrankungen höher oder niedriger schätzen. Thatsache ist, dass Scrophulöse besonders häufig von acuten und chronischen Nasenkatarrhen, besonders solchen mit eitriger Secretion, und Atrophie der Schleimhaut befallen werden; freilich behaupten Einige, das Bild der Scrophulose werde erst durch die Naseneiterung erzeugt. Das Vorkommen scrophulöser, mit Geschwüren einhergehender und zur Zerstörung der Nasenscheidewand und der Muscheln sowie zu Perforation des harten Gaumens führender Nasenerkrankungen wird von Henoch und Störk ausdrücklich erwähnt. Es scheint übrigens, dass die Zerstörung nicht ausschliesslich von der Schleimhaut ausgeht, sondern zuweilen durch primäre Erkrankungen des Knorpels und Knochens bedingt wird. Bei dem Mangel anatomischer Untersuchungen ist man zur Zeit nur auf die klinische Beobachtung angewiesen, die jedoch allein nicht massgebend sein kann. Was des Verf. Erfahrung anlangt, so sah

derselbe eine ziemliche Anzahl jüngerer und älterer Kinder mit abgelaufenen Zerstörungen an Septum und Muscheln ohne anderweitige Zeichen von Syphilis; die Mehrzahl zeigte in Folge vorausgegangener Lymphadenitis am Halse Narben; bei einem 12jährigen Jungen, dessen Septum bis auf ein schmales, doppelt perforirtes Stück zu Verlust gegangen war, fanden sich auch im Nasenrachenraume netzartige Narben sowie Narben der äusseren Haut und dicke, gewulstete Lippen. Auch Andere, wie z. B. B. Fränkel, sagen, dass, wenn derartige Defecte am Septum und den Muscheln auch nicht häufig seien, sie doch unzweifelhaft vorkämen und man namentlich bei Kindern kein Recht habe, lediglich aus dem Vorhandensein derselben auf Syphilis zu schliessen. Nichtsdestoweniger glaubt Verf., bei Beurtheilung solcher Fälle die äusserste Vorsicht empfehlen zu müssen. Bei der gewöhnlichen Unzuverlässigkeit und Fälschung anamnestischer Daten von Seite der Eltern dürfte der grössere Theil dieser Erkrankungen doch auf Syphilis, namentlich auf Lues hereditaria tarda, zurückzuführen sein. Ein anderer Theil scrophulöser Erkrankungen entpuppt sich bei genauerer Untersuchung als Lupus oder Tuberculose; nach Volkmann und Demme finden sich bei den schweren Formen der scrophulösen Ozaena Miliartuberkel.

Die Behandlung muss vorerst auf baldigste gründliche Beseitigung bestehender Nasenkatarrhe gerichtet sein; die genuine Ozaena wäre unendlich viel seltener, wenn der Stockschnupfen der Kinder nicht in so unverantwortlicher Weise vernachlässigt würde. Innerlich empfehlen sich Jod, Jodeisen, Eisen, China, ausserdem Landaufenthalt und namentlich Sool- oder bei älteren Kindern Meerbäder, bei Verdacht auf Syphilis Antiluctica.

Der Lupus befällt das Naseninnere in der Regel erst dann, wenn die äussere Haut schon ergriffen ist, zuweilen wird jedoch die Schleimhaut zuerst und isolirt befallen.

An der äusseren Nase localisirt sich der Lupus mit Vorliebe an den Nasenflügeln, um sich von da auf den Nasenrücken und die Nasenwurzel auszubreiten. Die Nasenflügel erscheinen starr, verdickt, mit dunkel- bis braunrothen, einzeln stehenden oder confluirenden Knötchen besetzt, welche theilweise ulceriren und dicke, gelbe Borken tragen. Nach kürzerem oder längerem Bestande werden die Nasenflügel zerstört, sie schrumpfen allmälig von den Rändern her zu einer dünnen, narbigen Masse oder gehen vollständig zu Verlust, wenn auch der Knorpel mitergriffen wird. Im Innern der Nase wird hauptsächlich das Septum cartilagineum befallen; es bilden sich auf demselben stecknadelkopfgrosse Knötchen oder grössere höckerige Geschwülste von weicher Consistenz, welche Tuberkelgeschwülsten oder sarkomatösen Neubildungen täuschend ähnlich sehen und die sich später in fötides Secret producirende Geschwüre umwandeln, in die Fläche und Tiefe weiterschreiten und Perforationen des Septum zur Folge haben. Zerstörungen der Nasenknochen sollen nach Kaposi bei Lupus nicht vorkommen. Bei der nichtulcerirenden Form tritt

Schrumpfung der Schleimhaut sowie der unterliegenden Knorpel und Knochen ein.

Die Diagnose ist zuweilen, namentlich im ulcerativen Stadium oder wenn keine frischen Knötchen vorhanden sind, recht schwierig und eine Verwechslung mit ulcerirenden Gummaknoten oder Tuberkelgeschwülsten leicht möglich. Doch lassen einestheils das jugendliche Alter der Kranken, ihr oft ausgesprochener scrophulöser Habitus, die langsame Ausbreitung der Krankheit, das Befallenwerden des knorpeligen Septum, die Mitbetheiligung der Knochen bei Syphilis oder das Fehlen anderweitiger syphilitischer Symptome, die Wirkungslosigkeit des Jodkali und anderer Specifica, anderntheils die Mitbetheiligung der äusseren Haut sowie die Intactheit der Lungen und die mikroskopische und bactericlle Untersuchung der Gewebstheile eine sichere Diagnose zu.

Die Prognose ist insoferne dubiös, als nach der erfolgten spontanen oder künstlichen Heilung grosse Neigung zu Recidiven besteht und auch andere Organe in Mitleidenschaft gezogen werden können.

Die Behandlung muss sich möglichst frühzeitige Zerstörung der ergriffenen Stellen bis weit in das gesunde Gewebe hinein mit Milchsäure, Curette, Chlorzink oder Galvanokauter, fleissige Reinigung der Nase sowie Verbesserung der Constitution durch Eisen, Arsenik oder Leberthran zur Aufgabe machen. Zuweilen erzielt man auch durch Auflegen von Quecksilberpflaster oder subcutane Injection von Tuberculin günstige Erfolge.

Der Rotz ist eine vom Thiere, speciell vom Pferde, auf den Menschen übertragene Krankheit, welche sich ausser in Mund und Rachen ganz besonders in der Nase localisirt.

Er befällt hauptsächlich Pferdewärter, Kutscher, Thierärzte, pathologische Anatomen, kurz Leute, die mit inficirten Thieren und Gegenständen zu thun haben, wobei kleine Verletzungen und Rhagaden der Haut und Schleimhaut als Eingangspforten dienen. Auf der entzündeten Schleimhaut der Nase entwickeln sich kleine gelbliche Knötchen, welche zerfallen, Geschwüre von geringerem oder grösserem Umfange zurücklassen und zu Usur der Knorpel und Knochen Anlass geben. Nach Bollinger tritt die Affection der Nase beim Menschen wie beim Pferde häufig erst in der zweiten oder dritten Woche am Schlusse der Erkrankung auf, auch kommt derselben durchaus nichts Pathognomonisches zu.

Die Erscheinungen bestehen im Anfang in der Absonderung eines dünnen, zähen Schleimes, wozu sich allmälig Anschwellung, Röthung und grosse Schmerzhaftigkeit der Nase und ihrer Umgebung gesellt; besonders die Nasenwurzel wird öfters dick, empfindlich, diffus erysipelatös geschwellt. Der häufig nur einseitige Nasenausfluss wird später dickflüssiger, mehr eitrig, braungelb, sanguinolent und übelriechend. Selten ist man im Stande, förmliche Knoten nachzuweisen, die am häufigsten an den Nasenflügeln vorkommen. Die schwereren Fälle führen zu Perforation des Septum, Caries und Nekrose

des Vomer, zu beträchtlicher Schwellung der Submaxillardrüsen, zu Pyämie und Tod.

Die Diagnose ist bei dem Mangel jeglicher ätiologischer Anhaltspunkte um so schwieriger, als derselbe auch mit syphilitischen und anderen Geschwüren die grösste Aehnlichkeit hat. Die Anamnese, die auf den Verkehr mit Pferden hinweist, der fieberhafte Beginn der Erkrankung, die im Verlaufe derselben fast nie fehlenden Gelenkschmerzen, das Auftreten von Rotzpusteln im Gesichte, die Wirkungslosigkeit des Jodkali, die Schüttelfröste und hauptsächlich die bacteriologische Untersuchung auf Rotzbacillen leiten in der Regel auf die richtige Spur.

Die Prognose des acuten Rotzes ist absolut ungünstig; günstiger gestaltet sie sich bei der chronischen Form, doch kann das ganze Leben lang Siechthum zurückbleiben.

Die Behandlung besteht in Cauterisation der erkrankten Schleimhaut mit Salpetersäure, Chlorzink, Carbolsäure, sowie in reinigenden Einspritzungen von Creosot 0·1 : 500 mehrmals im Tage. Selbstverständlich muss bei einer so fürchterlichen Krankheit, die auch von Mensch zu Mensch übertragen werden kann, die peinlichste Reinlichkeit sowie Vernichtung aller mit dem Secrete beschmutzter Wäsche platzgreifen.

Eine namentlich in Bessarabien, Galizien und der Walachei nicht seltene Affection ist das Rhinosclerom.

Während dasselbe von Hebra und Kaposi zu den Neubildungen, von Anderen zu den Producten der Syphilis gerechnet wird, wird es von Billroth, Geber und Mikulicz als ein äusserst schleichend verlaufender Entzündungsprocess angesehen, der nach kleinzelliger Infiltration der oberflächlichen und tiefen Schichten der Haut und Schleimhaut zu bindegewebiger Schrumpfung führt.

Die Aetiologie ist ganz dunkel; mehrmals gingen dem Ausbruch der Krankheit Verletzungen der äusseren Nase voraus; constitutionelle Erkrankungen, wie Syphilis, Scrophulose, Tuberculose, sollen keinen Einfluss auf die Entstehung haben, doch scheinen das häufigere Befallenwerden der ärmeren Volksclassen resp. die bei denselben oft herrschenden ungünstigen hygienischen Verhältnisse als prädisponirende Momente in Betracht zu kommen. Die Mehrzahl der neueren Forscher hält die von Frisch in den Rhinoscleromknoten gefundenen Kapselkokken für die Ursache der Krankheit.

Das Rhinosclerom — wegen der nahezu constanten Betheiligung des Rachens von Köbner auch Rhinopharyngosclerom genannt — beginnt theils auf der äusseren Haut, so namentlich an der Lippe oder den Nasenflügeln, theils auf der Schleimhaut der Scheidewand oder auch zuerst im Rachen, am weichen Gaumen und im Nasenrachenraum; im weiteren Verlauf schreitet es von den Lippen auf das Zahnfleisch, den harten Gaumen und die Wangen fort; das Naseninnere wird meist in ganzer Ausdehnung betroffen. Vom Rachen aus greift es auch auf den Kehlkopf und selbst die Trachea über.

Die Krankheit beginnt mit einer dunkeln Färbung und leichten Wulstung der betroffenen Haut- oder Schleimhautstellen; dieselben fühlen sich hart und derb an und lassen sich besser mit dem Finger als dem Auge abgrenzen; später bilden sich flache oder erhabene, scharf begrenzte oder diffuse Platten und Knoten, die sich äusserst hart, zuweilen knochenhart anfühlen und auf Druck zuweilen schmerzen. Ihre Farbe ist normal wie die der angrenzenden Haut oder Schleimhaut, oder hell- bis dunkelroth glänzend, wie eine hypertrophische Narbe. Am stärksten ergriffen wird stets der untere Nasengang, der meist völlig verlegt wird; zuweilen wachsen die Knoten zu den Nasenlöchern heraus. Die Schleimhaut ist mit dicken Borken und Krusten bedeckt, welche einen höchst unangenehmen und so eigenthümlichen Geruch verbreiten, dass Juffinger glaubt, aus dem letzteren allein schon die Diagnose stellen zu können. Die Nasenflügel oder das Septum mobile erscheinen unförmlich vergrössert und verdickt, starr und sehr derb. Kaposi sah das Rhinosclerom auf die Highmorshöhle übergreifen. Das Gaumensegel wird durch allmälige Schrumpfung der Knoten in die Höhe gezogen und narbig oder verwächst bei oberflächlichem Zerfall der Knoten mit der hinteren Rachenwand; schwinden die Knoten, so bleiben strahlige Narben zurück, welche den Verdacht der Syphilis wachrufen. Charakteristisch ist, dass die Knoten nicht zerfallen, sondern nur oberflächlich excoriiren, was nach Zarniko jedoch nur durch accidentielle Schädlichkeiten geschieht; nach Excision tritt schnell Recidive ein.

Die Diagnose ist um so schwieriger, als das Rhinosclerom die grösste Aehnlichkeit mit Syphilis, Tuberculose, Lupus oder Lepra besitzt, besonders wenn die Knoten excoriiren oder narbige Schrumpfung eintritt. Während aber nach Chiari und Roth die rhinosclerotischen Infiltrate äusserst hart und scharf begrenzt sind, zeigen die syphilitischen keinen so plötzlichen Uebergang, auch ist die nächste Umgebung der letzteren stets geröthet und entzündet, die der rhinosclerotischen nicht; während syphilitische Infiltrate vom Centrum aus zerfallen, tritt bei Rhinosclerom entweder gar kein oder nur ein oberflächlicher Zerfall ein; während die rhinosclerotischen Infiltrate monatelang stationär bleiben, verändern sich die syphilitischen schon früher, indem sie heilen oder zerfallen; während das Rhinosclerom auf Antiluetica nicht reagirt, werden die meisten syphilitischen Infiltrate durch dieselben beeinflusst. Die Knoten bei Lupus sind weicher, die durch ihren Zerfall gesetzten Substanzverluste tiefer. Lepröse Infiltrate exulceriren gleichfalls in ganzer Dicke und perforiren das Velum; auch fehlt niemals die Affection der äusseren Haut sowie die Anästhesie und Kachexie.

Die Prognose ist ungünstig, da Recidiven stets wiederkehren und die Affection durch Uebergreifen auf den Kehlkopf das Leben direct bedrohen kann.

Die Behandlung ist ziemlich aussichtslos, da eine Allgemeinbehandlung nichts nützt und durch die Localbehandlung zwar zeitweise Besserung, aber keine Heilung erzielt wird. Die Obstruction

der Nase erfordert Dilatation mittelst Bougies oder Laminaria, was namentlich Juffinger empfiehlt, oder Zerstörung der Knoten durch Aetzkali, 10% Pyrogallussäure, Chromsäure, scharfen Löffel oder Galvanokauter. Sehr guten Erfolg erzielte Doutrelepont in einem Falle durch zweimalige tägliche Einreibung einer 1% Sublimatlanolinsalbe; auch sind parenchymatöse Injectionen von Jodtinctur, Arsenik, Salicyl-, Carbolsäure, Pyrogallussäure, Auflegen eines Quecksilberpflasters empfohlen worden. Lubliner sah einmal eine beinahe vollständige Involution diffuser Rhinosclerom-Infiltrate nach dem Ueberstehen eines Typhus exanthematicus.

Mykosen und Parasiten.

Unter den mykotischen Affectionen der Nase ist der Soor relativ die häufigste; immerhin gehört das Vorkommen des Soorpilzes auf Schleimhäuten mit Flimmerepithel zu den Ausnahmen. Er findet sich fast nur in Gesellschaft des Mund- oder Rachensoors, vorwiegend bei Kindern oder geschwächten Erwachsenen, nach Thorner auch bei Influenza. Er erzeugt Reizung der Schleimhaut mit profuser Secretion und Verstopfung der Nase, Kopfschmerz, Blutung und Erosionen am Naseneingang.

Anderweitige Pilze hat man erst neuerdings in grosser Anzahl kennen gelernt; so kommen ausser verschiedenen Schimmelpilzen zahlreiche Arten von Spaltpilzen und Fäulnissbacterien in dem normalen, besonders aber dem fötiden Secret der verschiedenen Nasenerkrankungen vor; sogar Pneumoniokokken hat man darin gefunden. Rohrer fand bei chronischen Nasenrachenkatarrhen 75 Formen, 37 Kokken- und 38 Bacillenarten. Die nicht fötiden Secrete ergaben 19 Formen, die fötiden aber 56 Formen; bei den nicht fötiden Formen verhalten sich die Kokken zu den Bacillen wie 8 : 11, bei den fötiden Formen wie 30 : 26. Manche wollen, wie bereits erwähnt, die Mikroorganismen allein für den üblen Geruch so vieler Nasensecrete verantwortlich machen.

Virchow beschrieb einen Fall von Puccinia graminis in Verbindung mit Aspergillus olivascens; in dem schon citirten Falle von Schubert fand sich eine die Nase und den Nasenrachenraum ausfüllende, bröckig-schmierige, aus Aspergillus fumigatus bestehende Masse, welche einen intensiven Schimmelgeruch verbreitete und einen wässerig-scharfen Nasenausfluss zur Folge hatte. In einem zweiten Falle Schubert's bestand der graugrüne, breiartige Nasenbelag aus Mycelien eines Fadenpilzes und aus zahlreichen cylindrischen Gonidien.

Makroskopische Parasiten der Nase sind mehr als Fremdkörper zu betrachten, da es keine Thiere gibt, welche auf die menschliche

Nase als Brutstätte angewiesen wären. Derartige Parasiten gelangen meist während des Schlafes im Freien oder schwerer Trunkenheit in die Nase, namentlich wenn dieselbe fötides eitriges Secret enthält. Gar nicht selten sind Spulwürmer; ferner hat man Ohrwürmer, Tausendfüssler, Madenwürmer, Oestruslarven, Pentastoma taenioides, Fliegeneier, Oxyuren und Blutegel vorgefunden; die Affection kommt unendlich viel häufiger in den Tropen als bei uns vor; der indische „Peenash" beruht sehr oft auf der Einwanderung der Eier der Lucilia hominivora; bei uns soll hauptsächlich die Sarcophila Wohlfarti ihre Eier in die Nase legen (Zarniko).

Die Erscheinungen, welche solche Parasiten verursachen, sind bedingt durch die Art und Grösse. Das erste Symptom ist Kitzeln und Niesen, dann verstopft sich die betroffene Nasenhöhle; es stellen sich schleimige, blutige oder eitrige Secretion und Nasenbluten ein oder ödematöse Schwellung des Gesichtes und Fieber, hämmernde Schmerzen im Kopfe, Schwindel, Schlaflosigkeit, Gehirnreiz, Convulsionen und Coma. In anderen Fällen haben die Kranken das Gefühl eines sich in der Nase bewegenden Gegenstandes; unter der französischen Armee in Mexiko kamen zahlreiche Selbstmorde vor in Folge der fürchterlichen Schmerzen, welche Fliegenlarven in der Nase erzeugt hatten. Die Schleimhaut der Nase wird von der jungen Brut arrodirt und zerstört, auch dringt dieselbe in die Kieferhöhle, Stirnhöhle oder Orbita ein, alle Weichtheile bis auf den Knochen zerstörend.

Die Diagnose der Parasiten ist zuweilen, wenn die damit Behafteten selbst keine Anhaltspunkte geben können, eine recht schwierige; immerhin wird durch sorgfältige, öfters wiederholte Inspection das Uebel nicht lange verborgen bleiben.

Die Therapie hat sich die Entfernung der Schmarotzer zur Aufgabe zu stellen; jedenfalls ist der Versuch, dieselben mittelst der Nasendouche aus ihren Schlupfwinkeln herauszutreiben, der Extraction mit Instrumenten vorauszuschicken. Als Mittel, welche die Parasiten tödten, gelten Inhalationen von Aether, Alkohol, Benzin, Chloroform, Salmiak, Terpentin sowie Injectionsflüssigkeiten mit Alkohol, Alaun, Creosot, Carbol, Chloroform, Nelkenöl, Infuse von Tabak, Eichenrinde sowie Insufflationen von Jodoform und Carbol- oder Thymolpulver, auch Calomel und Sublimat. Mankiewicz empfiehlt Bepinselungen mit Bals. Peruv., Voltolini den constanten Strom, durch den die Parasiten betäubt werden sollen. In der Regel verschwinden nach der Entfernung der Parasiten alle Erscheinungen; etwa zurückbleibender Nasenfluss muss nach den früher angegebenen Regeln behandelt werden. Die Behandlung des Nasensoors ist dieselbe wie die des Mundes.

Blutungen.

Kein Organ zeigt so grosse Neigung zu Blutungen wie die Nasenhöhle. Die Ursache liegt theils in der exponirten Lage, theils in dem ausserordentlichen Gefässreichthum.

Unter den Ursachen sind Traumen, Fall, Wurf oder Stoss auf die Nase, Fracturen der Knochen und Knorpel, Einspiessen von Fremdkörpern, Kratzen und Bohren mit den Fingern, Jucken und Reiben der Nasenspitze, heftiges Schneuzen, Berührung mit der Sonde, Katheterismus der Tuba, operative Eingriffe wohl die häufigsten. Hieran schliessen sich die Blutungen im Verlaufe acuter und chronischer Katarrhe, Geschwüre, namentlich solcher, welche mit Zerstörung der Knochen einhergehen, blutreicher Neubildungen (Angiome), Fremdkörper und Parasiten. Blutungen durch Stauung und active Hyperämien entstehen bei heftigem Schneuzen, Pressen, Niesen, bei Keuchhusten, Lungen- und Herzkrankheiten, namentlich bei Aorteninsufficienz und Hypertrophie, bei Schrumpfniere, bei allgemeiner Plethora, nicht selten als Vorläufer der Menstruation, ferner bei manchen Leber- und Milzaffectionen, so besonders bei der Cirrhose sowie nicht selten bei Kindern am Ende des Schuljahres in Folge von geistiger Ueberanstrengung, Gemüthsbewegungen, in Folge geschlechtlicher Reizung, Ueberanstrengung der Augen und Behinderung des Kreislaufes. Auch die acuten Infectionskrankheiten, namentlich Scharlach, Masern, Influenza, Typhus, Weil'sche Krankheit, Febris recurrens und Diphtherie stellen ein ziemliches Contingent. Oefters sich wiederholendes Nasenbluten ist ganz gewöhnlich bei Anomalien der Blutmischung, Anämie, Chlorose, Gravidität, Hämophilie, Morb. macul., Leukämie, Scorbut; auch die Blutungen bei Atheromatose oder während der Pubertät und die hereditäre Belastung gehören hieher; die nächste Ursache liegt in der abnormen Brüchigkeit der Gefässwandungen. Relativ noch wenig bekannte, aber äusserst häufige Ursachen habitueller Epistaxis sind die Verletzung erweiterter kleiner Gefässe, stecknadelkopfgrosser Teleangektasien und borkenbedeckter Erosionen oder an Xanthose erkrankter Stellen am Septum; sie werden am häufigsten in der vordersten unteren Partie des Septum, 1—1½ cm über dem Nasenboden oder auf diesem, seltener auf der Mitte des Septum oder an den Muscheln angetroffen (sogenannte Prädilectionsstellen). Die Schleimhaut an diesen Stellen verhält sich entweder normal oder, was häufiger ist, sie ist von einer kleinen, sich immer wieder bildenden und verschwindenden Borke oder einem zusammenhängenden Blutcoagulum bedeckt; in wieder anderen Fällen erscheint die Schleimhaut aufgelockert, succulent, in eine weissliche, einer Narbe oder einer Pseudomembran ähnliche Fläche umgewandelt oder es besteht schon ein Ulcus perforans. Die Ursache dieser Blutungen liegt in der anatomischen Beschaffenheit des Septum, was freilich Zuckerkandl für unbegründet erklärt. Kiesselbach fand in der Schleimhaut des vorderen Theiles der Nasenscheidewand dem Schwellgewebe

der unteren Muscheln völlig gleichende Capillarektasien oder auch stark erweiterte, bis zur Basalmembran der Schleimhaut verlaufende Capillaren, ja sogar zuweilen förmliches Schwellgewebe. Auch das Vorkommen vicariirender Nasenblutungen ist sicher constatirt; sie ersetzen theils Blutungen aus dem After, wie bei Hämorrhois, theils die Menstruation; solche an Stelle der Menses auftretende, regelmässig alle 4—6 Wochen wiederkehrende, mit der Schwangerschaft verschwindende Nasenblutungen sind bei B. Fränkel mehrfach citirt. Sie sind offenbar fluxionärer resp. vasomotorischer Natur und durch die zur Zeit der Menses herrschende gesteigerte Reflexerregbarkeit hervorgerufen. Intermittirendes Nasenbluten kommt bei Wechselfieber vor.

Viel seltener als freie Blutungen sind solche in und unter die Schleimhaut. Sie stellen bald kleine, stecknadelkopf- bis bohnengrosse Ecchymosen, bald tumorartige Geschwülste, Hämatome, vor. Die letzteren entstehen theils spontan, theils durch Verletzungen, namentlich nach Fall, Stoss oder Schlag auf die Nase oder Fracturen des knöchernen oder knorpeligen Septum. Ihre Oberfläche ist glatt, weich, ihre Farbe tiefroth bis schwarz, die angrenzende Schleimhaut erscheint ecchymosirt; meist ist die Geschwulst doppelseitig und fluctuirt, auch kann sie so gross werden, dass sie zur Nasenöffnung heraustritt. Der Knorpel ist oft zerstört oder perforirt, die Communication der beiden Geschwülste lässt sich leicht nachweisen, indem sich bei Druck auf den einen Tumor der andere füllt. Hämatome können zwar spontan resorbirt werden, in der Regel aber entsteht durch Umwandlung des Inhaltes in Eiter ein Septumabscess, dessen Erscheinungen und Verlauf bereits besprochen wurden.

Bei freien Blutungen träufelt das Blut entweder allmälig und langsam oder schnell und stromweise aus einem oder beiden Nasenlöchern hervor; bei Blutungen in den hinteren Partien der Nase tritt es durch die Choanen und wird verschluckt, erbrochen oder durch den Mund entleert. Die Quantität des ergossenen Blutes ist äusserst variabel und schwankt von einigen Tropfen bis zu mehreren Pfunden; die Farbe ist meist lebhaft roth, bei Gerinnung und langsamer Entleerung braunroth-schwarz. Manchen Formen von Nasenbluten gehen Herzklopfen, Eingenommenheit und Röthe des Kopfes, dumpfer Druck, Pochen in der Stirne, Ohrensausen und Schläfrigkeit voraus; nachher fühlen sich die Kranken meist sehr erleichtert. Habituelle Epistaxis führt oft zu Anämie und Schwäche; sehr heftige acute Blutungen können Ohnmachten, Herzschwäche, ja selbst den Tod zur Folge haben; bei profuser Hämorrhagie während des Schlafes oder einer Ohnmacht ist die Gefahr der Aspiration eine sehr grosse. Ecchymosen verlaufen meist symptomlos, grössere Hämatome haben Verstopfung der Nase, Störungen des Geruches, zuweilen dumpfen Schmerz zur Folge.

Die Diagnose der freien Blutungen ist in der Regel leicht, zumal wenn das Blut aus den Nasenlöchern sich entleert oder die blutende Stelle gesehen werden kann, wobei man zuerst auf die erwähnten Prädilectionsstellen sein Augenmerk zu richten hat.

Schwieriger wird die Diagnose bei Blutungen durch die Choanen oder in Bezug auf den Entscheid, ob das ergossene Blut aus den Lungen, dem Magen oder Rachen stammt. Der Hämoptoë gehen gewöhnlich spannender, dumpfer Schmerz in der Brust oder Stechen, Husten und anderweitige Symptome der Phthise oder von Klappenfehlern voraus, der Hämatemesis Erscheinungen von Seite des Magens, Schmerz, Erbrechen, Uebligkeit, Aufstossen; Blutungen aus dem Rachen werden durch die Inspection, eventuell die Rhinoscopia posterior, erkannt, Hämatome und Ecchymosen durch die Rhinoscopia anterior.

Die Prognose richtet sich nach der Ursache und der Dauer resp. Schwere der Blutung. Sehr ungünstig ist dieselbe bei Schädelfracturen, hochgradiger linksseitiger Herzhypertrophie und bei hämorrhagischer Diathese; bei letzteren deshalb, weil sich diese Blutungen wiederholen und wir kein sicheres Heilmittel für das Grundübel besitzen. Dass profuse Blutungen mit Ohnmacht, Verschwinden des Pulses stets gefährlich sind, zumal wenn ärztliche Hilfe fehlt, ist selbstverständlich; ebenso, dass profuse oder recidivirende Blutungen im Verlaufe schwerer fieberhafter Krankheiten, des Typhus, der Diphtherie etc., oder mit linksseitiger Herzhypertrophie verbundener Atheromatose eine zum Mindesten zweifelhafte Prognose geben und oft schwere Anämie zurücklassen.

Therapie. Da manche Blutungen, so namentlich die der Plethorischen, Hämorrhoidarier, Herzkranken und Amenorrhoischen, einen wohlthätigen Einfluss auf das Allgemeinbefinden äussern, so erscheint eine Behandlung so lange unnöthig, als die Blutung keine excessive ist. Auch bei den übrigen Formen richte man sein Handeln nach der Intensität der Blutung Sehr schwierig ist oftmals die Auffindung der blutenden Stelle, was methodisch durch Aufpressen von Watte auf die verdächtigen Stellen zu geschehen hat. Am leichtesten gelingt es, der aus dem vorderen Theile des Septum stammenden Blutung durch Compression des entsprechenden Nasenflügels mit dem Finger oder durch Einführen eines Stückchens Watte, Feuerschwamm etc. Herr zu werden. Das so sehr beliebte Schnauben, Schnenzen und Vorwärtsneigen des Kopfes verlängert die Blutung und ist absolut zu verbieten. Bei mässigen Blutungen aus den tieferen Theilen der Nase empfiehlt sich die Nasendouche oder das Aufschnupfen adstringirender Wässer aus Alaun, verdünntem Essig, Liq. ferri sesquichl. 10 bis 20 Tropfen auf $^1/_4$ Liter Wasser. Wenn die blutende Stelle gesehen werden kann, dann applicire man auf dieselbe einen Tropfen reiner Eisenchloridlösung oder 10—20% Chromsäurelösung oder auch den Galvanokauter. Neuerdings wurde von Hedderich das Ferripyrin local in 18—20% Lösung und innerlich bei Erwachsenen je 0·5 pro die als nicht ätzendes Hämostaticum empfohlen.

Das sicherste Verfahren ist die Tamponade. In der Mehrzahl genügt die vordere und theilweise Tamponade; ein circa fingerlanges, 1—2 cm dickes, mit einem Faden umwickeltes Stück antiseptischer Watte oder ein Streifen hydrophilen Stoffes, Jodoformgaze, Dermatolgaze etc., wird mittelst einer Pincette oder der Gottstein'schen

Schraube eingeführt und auf die blutende Stelle mittelst Sonde fest angedrückt; steht die Blutung nicht, dann muss man einen zweiten, eventuell dritten Tampon bis zur völligen Ausfüllung der Nase folgen lassen (totale Tamponade); die zu den Nasenöffnungen heraushängenden Fäden werden entweder um das Ohr gewickelt oder mittelst Pflaster auf dem Nasenrücken befestigt. Noltenius empfiehlt als vorzügliches blutstillendes Mittel die Penghawar Jambi-Watte. Gelingt die Stillung der Blutung durch die vordere Tamponade nicht, dann schreite man zur hinteren Tamponade. Im Nothfalle genügt ein elastischer Katheter. Man zieht durch die Oeffnungen desselben einen dicken, gewichsten Faden, Catgut oder starke antiseptische Seide, schiebt den Katheter durch die Nase so weit vor, bis der Faden hinter dem Velum sichtbar wird; derselbe wird mit einer Pincette oder Zange gefasst, zur Mundhöhle herausgezogen und 10—20 cm vor seinem Ende mit einem trockenen Wattetampon von der Grösse einer Wallnuss versehen; durch Herausziehen des Katheters wird der Tampon, eventuell unter Zuhilfenahme des Zeigefingers, in den Nasenrachenraum befördert und in die Choane eingezogen. Der aus dem Munde heraushängende Faden dient zur Herausnahme des Tampons, der aus der Nase herausstehende wird in der oben angegebenen Weise befestigt. Leichter ist die Tamponade mittelst der Bellocque'schen Röhre, da die Feder mit dem an ihrem vorderen Ende befestigten Faden das Velum schneller umgeht; nur wäre zu wünschen, dass die im Handel vorkommenden Instrumente bedeutend graeiler seien. Die Befestigung und Einführung des Tampons geschieht in derselben Weise wie beim Katheter. Ein so vortreffliches Mittel zur Blutstillung aber auch immerhin die Tamponade ist, so kann dieselbe doch auch, wie im Capitel „Allgemeine Therapie" bereits ausgeführt wurde, durch Retention von Secret zu lebensgefährlichen Zufällen Anlass geben. Wenn irgendwie möglich, lasse man den Tampon nur 12 Stunden liegen und tamponire, wenn die Blutung noch nicht steht, lieber von Neuem. Bei Ohnmächtigen oder durch Blutverluste sehr Erschöpften bleibt freilich nichts übrig, als den Tampon länger, 24—36 Stunden, liegen zu lassen.

Unter den zahlreichen anderen für die Tamponade bestimmten Instrumenten sind zu erwähnen der Rhineurynter oder das Rhinobyon sowie der intranasale Tampon von Cooper Rose; alle bestehen aus einem dünnen Gummisack, der mit einer durch einen Hahn verschliessbaren Röhre in Verbindung steht, leer längs des Nasenbodens bis an die Choanen vorgeschoben und dann aufgeblasen oder mit Wasser gefüllt wird; die Sicherheit dieser Instrumente lässt jedoch viel zu wünschen übrig. Steht auch dann die Blutung nicht oder ist Gefahr im Verzuge, dann ist die Transfusion indicirt.

Hauptindication der Therapie ist es zweitens, das Grundübel zu beseitigen und die Wiederkehr der Blutung zu verhindern. Eine solche Radicalheilung ist fast stets möglich bei denjenigen Blutungen, welche pathologischen Veränderungen der Nasenschleimhaut ihre Entstehung verdanken, also bei ektatischen oder oberflächlich gelegenen

Gefässen, Katarrhen, Polypen, Fremdkörpern, Parasiten, Geschwüren, Excoriationen. Das beste Mittel zur Zerstörung ectatischer Venen, blutender Polypen und Angiome ist der Galvanokauter, der langsam und rothglühend auf die erweiterten Blutgefässe aufgesetzt wird. Oefters gelingt es auch, durch innere Medicamente, namentlich Eisen, Chinin, Landaufenthalt, das Blut zu verbessern und die Disposition zu Epistaxis zu mindern; als innerliche Styptica eignen sich besonders das Ergotin, auch subcutan, Liq. ferri sesquichl., Acid. sulfur., Plumb. acet. Plethorische und Hämorrhoidarier schicke man nach Karlsbad, Kissingen, Homburg, Marienbad, oder lasse sie zu Hause längere Zeit laxiren und Alcoholica auf's Strengste vermeiden; bei den letzteren empfehlen sich auch prophylaktische Blutentziehungen, namentlich Blutegel ad anum. Um der Menstruation ihren normalen Weg zu weisen, sind Scarificationen der Vaginalportion, warme Irrigationen, heisse Fussbäder, Pilulae aloeticae ferratae zu verordnen. Hämatome müssen an der tiefstgelegenen Stelle baldigst entleert, eventuell in ganzer Ausdehnung gespalten werden. Dass Herzkranke, Nephritiker, Leberkranke etc. Alles vermeiden müssen, was Congestionen und Blutungen erzeugt, ist selbstverständlich.

Fremdkörper und Concretionen. (Nasensteine.)

Fremdkörper in der Nase kommen fast nur bei Kindern, selten bei Erwachsenen und da meist bei Geisteskranken zur Beobachtung.

Zu den gewöhnlichen Dingen, welche sich Kinder beim Spielen in die Nase stecken, gehören Erbsen, Bohnen, Knöpfe, Kirschen- und Zwetschkenkerne, Glasperlen, Nägel, Steine, Holzstücke, kleine Schwämme, Papier- und andere Kugeln, Sohlenleder etc. Bei Erwachsenen bleiben manchmal nach Verletzungen Kugeln oder abgebrochene Messerklingen oder anderweitige Dinge stecken, wie bei einem von Voltolini beobachteten Kranken, der nach einem Falle eine grosse Anzahl zerbrochener Schilfrohre ein Vierteljahr lang in seiner Nase beherbergte. Endlich können auch Pinsel, Laminariastifte, Tampone aus Vergessenheit zurückbleiben oder Speisetheile durch den Brechact in die Nase gelangen.

Die Erscheinungen, welche Fremdkörper verursachen, sind bedingt durch ihre physikalischen Eigenschaften und den Zeitraum, während dessen sie in der Nase verbleiben. Bohnen, Erbsen quellen auf und treiben Wurzeln und Auswüchse. Spitzige Gegenstände verursachen bald nach ihrem Hineingerathen ausser Schmerz Blutungen, rundliche erzeugen Abscesse oder Schwellungen der Schleimhaut mit anfangs seröser, später eitriger Secretion, geringerer oder stärkerer

Unwegsamkeit der betroffenen Nasenhälfte. Je länger ein Fremdkörper, mag er noch so weich sein, in der Nase verbleibt, um so fötider wird die Secretion, um so heftiger der Kopfschmerz und der Druck im Gehirne und demgemäss um so deprimirter die Gemüthsstimmung; bei Kindern können, wie Wertheimber beobachtet hat, sogar eclamptische und epileptische Anfälle auftreten. Ulcerationen, Usur der Knochen, polypöse Wucherungen oder auch Atrophie der Schleimhaut sind die weiteren Folgen. Nicht selten schwillt auch die Haut der Nase und der Wangen an, durch das scharfe, fötid-sanguinolente Secret wird die Oberlippe erodirt oder es entsteht durch Verlegung des Thränennasenganges Thränenträufeln, Conjunctivitis etc.

Dieselben Erscheinungen machen auch Concretionen, die sogenannten Nasensteine oder Rhinolithen, zu deren Ablagerung die unregelmässige Form der Nasenhöhle besonders geeignet erscheint. Den häufigsten Anlass zur Bildung derselben geben Fremdkörper, Kirschen-, Traubenkerne etc., welche sich an ihrer Oberfläche mit Kalk incrustiren; manchmal wird der Kern einer solchen Concretion von eingetrocknetem Secrete oder einem Blutcoagulum gebildet. Da Verf. mehrmals Rhinolithen bei Nebenhöhleneiterungen traf, so dürfte der eingedickte Eiter den Anlass zur Kalkablagerung geben. Zuweilen findet sich nichts von einem Kerne, wie in einem von Schmiegelow mitgetheilten und auch symptomatisch wegen halbseitigen Schwitzens am Kopfe interessanten Falle. Heryng beobachtete einmal eine fast vollständige cementharte Verkittung der Nasenhöhle. Betz und Jurasz sahen Rhinolithiasis als Berufskrankheit bei Cementarbeitern.

Die Nasensteine bestehen der Hauptmasse nach aus 80% anorganischer Substanzen, besonders aus phosphorsaurem, kohlensaurem Kalk, kohlensaurer Magnesia, etwas Eisenoxyd und zu 20% aus organischen Stoffen, besonders aber aus Pilzwucherungen, namentlich Leptothrix, weshalb Czarda, Ruault, Moure und Gerber die Nasensteine direct als Bacterienproducte bezeichnen. Ihre Grösse ist sehr verschieden und schwankt zwischen dem Umfange einer Erbse und eines Pfirsichkernes; Verf. entfernte einmal einen Nasenstein, welcher die ganze rechte Nasenseite ausfüllte und so gross war, dass derselbe erst zertrümmert werden musste, damit er das Nasenloch passiren konnte. Die Oberfläche ist meist rauh, uneben, nicht selten dendritisch verzweigt und stachelig. Ein längere Zeit in der Nase befindliches Stück Papier hatte sich, wie Verf. beobachtete, durch Kalkniederschlag völlig in Glaspapier umgewandelt.

Nach B. Fränkel darf man die Steinbildung mit der Verkalkung der Schleimhaut nicht verwechseln; die letztere findet sich in der Nase alter Leute, zuweilen auch bei jüngeren Personen, in Folge der Diathesis ossificans; namentlich kann die Schleimhaut der Nebenhöhlen und die der Muscheln feinkörnig und in Plattenform verkalken und ein weisses Aussehen annehmen.

Die Diagnose der Fremdkörper und Concretionen ist bei Kindern oder da, wo die Anamnese fehlt, nur durch die objective

Untersuchung zu stellen. Fötider, auf eine Nasenhälfte beschränkter Ausfluss bei Kindern muss stets in erster Linie den Verdacht erwecken, dass derselbe durch einen Fremdkörper bedingt sei. Bei dem heftigen Widerstande der kleinen Patienten ist behufs genauer Untersuchung der ohnehin engen Nase die Narkose oft unentbehrlich: da die Inspection wegen der oft enormen Schwellung und reichlichen Secretion in der Regel keinen oder ungenügenden Aufschluss gibt, so beruht die Diagnose meist auf der Sondirung: aber auch diese kann irreführen, so z. B. zu einer Verwechslung eines Rhinolithen mit einem Sequester Anlass geben.

Die Entfernung der Fremdkörper oder Rhinolithen erheischt nicht nur Umsicht, sondern auch Geschicklichkeit. Frisch in die Nase gelangte rundliche Körper können unter Umständen durch Schneuzen, durch Niespulver oder die Douche in die freie Nasenhöhle herausbefördert werden; Fremdkörper, welche längere Zeit lagen und sich eingekeilt haben, müssen unter Leitung des Spiegels mit der Zange, Pincette oder anderen geeigneten Instrumenten extrahirt werden. Bei glatten Gegenständen, welche durch andere Instrumente sehr leicht noch tiefer in die Nase hineingetrieben werden, benützt man am besten eine an ihrem vorderen Ende löffel- oder ösenartig umgebogene Sonde, welche vorsichtig hinter den Fremdkörper gebracht wird. Bei Kindern, namentlich solchen, welche durch vorausgegangene Extractionsversuche ängstlich und scheu gemacht wurden, ist die Narkose meist unentbehrlich, bei Erwachsenen unnöthig oder durch Cocaïnisirung zu ersetzen. Concremente, welche wegen ihrer Grösse, Härte oder unregelmässigen Form nicht in toto extrahirt werden können, müssen mittelst Zangen oder lithotriptoartiger Instrumente erst verkleinert und stückweise entfernt werden. Dieselben ebenso wie Fremdkörper ohne Weiteres durch die Choanen in den Rachen zu stossen, ist roh und nur dann gestattet, wenn die Entfernung durch die vorderen Nasenöffnungen unmöglich ist; doch verbiete man während dieser Manipulation das Athmen oder führe den Finger in den Nasenrachenraum ein. Eine Nachbehandlung mit Ausspritzungen oder Insufflationen antiseptischer Stoffe ist nur dann nöthig, wenn durch die lange Anwesenheit der Fremdkörper Ulcerationen oder eitrige Katarrhe entstanden waren.

Neubildungen und Geschwülste.

Es ist sehr schwer, eine strenge Grenze zu ziehen zwischen Schleimhauthypertrophie und wirklicher Neubildung: man wird deshalb im Hinblicke auf die zahlreichen Uebergangsformen, die wir bereits bei der chronischen hypertrophischen Rhinitis kennen lernten, gut thun, nach dem Vorgange Hopmann's die letzteren, namentlich die cavernösen teleangektatischen Tumoren und warzigen Gebilde

der Muscheln als polypoide Geschwülste (Schleimhauthypertrophien), die wirklichen Neubildungen aber als Polypen zu bezeichnen.

Ihre Aetiologie ist ziemlich dunkel; dass Reizzustände der Schleimhaut, chronische Katarrhe eine gewisse, wenn auch nicht einzige Rolle spielen, ist umsoweniger zweifelhaft, als weiche Fibrome und Papillome in der einen, Schleimhauthypertrophien in der anderen Nase oder gleichzeitig neben einander ganz gewöhnlich vorkommen. Ebenso führen Fremdkörper und Rhinolithen durch chronische Reizung zu wirklichen Neubildungen, wofür nach Zuckerkandl auch der allmälige Uebergang derselben in normale Schleimhaut spricht. Bei Nebenhöhleneiterungen bilden sich theils durch den Reiz des abfliessenden Secretes, theils durch Fortleitung der Entzündung um die Ausführungsgänge und deren Nachbarschaft sowohl echte Schleimpolypen, als auch Papillome und Granulationswucherungen. Ob auch die Heredität eine Rolle spielt, ist noch unentschieden.

Das männliche Geschlecht ist ganz besonders bevorzugt, was mit der geringeren Schonung der Schleimhäute, also auch jener der Nase zusammenhängen mag. Auffallend bleibt nur, dass trotz der grossen Häufigkeit der Nasenkatarrhe im Kindesalter Neubildungen vor dem 15. Lebensjahre relativ sehr selten sind, eine Thatsache, die von den meisten Autoren und auch vom Verf constatirt ist, von Hopmann und Goldstein aber geleugnet wird. Der jüngste Patient, den Verf. operirte, war ein 10jähriger Knabe, dessen Vater ebenfalls mit Schleimpolypen behaftet war. Ueber die Aetiologie der bösartigen Neubildungen wissen wir ebensowenig wie über jene in anderen Körpertheilen.

Die häufigste Art der gutartigen Neubildungen sind die Schleimpolypen (Fig. 32).

Sie stellen weiche, ödematöse, gallertartig durchscheinende, bläulichweisse oder gelbliche, seltener röthliche oder intensiv rothe Geschwülste von Stecknadelkopfgrösse bis Daumenlänge vor. Ihre Form ist meist länglich-rund, birnförmig; die grösseren nehmen constant die Form des Raumes an, in welchem sie, sich accommodirend, weiterwachsen, und sind deshalb in der Regel platt, mehr lang als breit. Sind sie gestielt, dann hängen sie als längliche, sackartige, im Luftstrome bewegliche Gebilde in die Nasengänge herein oder füllen den Nasenrachenraum aus; bei sehr breitem Stiele oder diffuser Insertion bilden sie unregelmässige, wenig oder gar nicht bewegliche Geschwülste. Mit besonderer Vorliebe entspringen sie von den Kanten der mittleren Muschel, von der äusseren Wand der Nase, in dem Zwischenraum zwischen unterer und mittlerer Muschel, so namentlich von den Vorsprüngen und Leisten des Infundibulum und der Bursa ethmoidalis, sehr selten von der unteren Muschel, am seltensten vom Septum oder dem Boden der Nasenhöhle. Sie lieben die Gesellschaft; ein Exemplar gehört zu den Seltenheiten, meist sind mehrere vorhanden, oft steigt ihre Zahl auf 20, doch hat Verf. auch schon 30 bis 40, ja einmal bei einem Kranken 65 Stück aus beiden Nasenhöhlen entfernt; bald ist nur eine Nase befallen, was immer den

Verdacht auf Nebenhöhleneiterung hervorrufen muss, bald beide: in hochgradigen Fällen sind beide Nasen von vorne bis hinten förmlich damit ausgestopft. Wenn nur ein Polyp vorhanden ist, so zeichnet er sich in der Regel durch beträchtliche Grösse aus; auch scheinen nach Jurasz einseitige Polypen die Neigung zu haben, durch die Choanen hindurchzuwachsen. Die Schleimpolypen behalten die Elemente der Schleimhaut, aus welcher sie hervorgehen, bei; ihr Epithel besteht fast immer aus Flimmerzellen, auch hat man in ihnen Charcot-Leyden'sche Krystalle gefunden.

Nach Billroth überwiegt bald das Bindegewebe, bald das Drüsengewebe; in ersterem Falle stellen sie weiche Fibrome, in letzterem Adenome vor, deren neugebildete hypertrophische Drüsen durch ein weitmaschiges ödematöses Bindegewebe zusammengehalten werden. M. Mackenzie nennt die Schleimpolypen myxomatöse Geschwülste, Hopmann weiche Fibrome, bestehend aus einem weitmaschigen Netzwerk von alveolärem Bindegewebe, dessen Maschen zum Theil mit Zellen, zum Theil mit Albuminserum gefüllt sind und die manchmal serum- oder eiterhaltige Cysten, nach Michael sogar Luft enthalten. Zarniko nennt die Schleimpolypen ödematöse Fibrome und theilt diese noch weiter ein in Fibr. oedematodes simplex, Adenofibroma oedematodes und in Fibr. oedematodes cysticum. M. Schmidt nennt sie ödematöse Hypertrophien entzündlicher Natur.



Fig. 32. Schleimpolypen in beiden Nasen, rechts ein Stück, links drei.

Eine andere Form von Neubildungen sind die weichen Papillome (Fig. 33). Sie kommen ausschliesslich an der unteren oder mittleren Muschel vor als partielle oder diffuse, selten gestielte oder scharf von der gesunden Schleimhaut abgrenzbare breitbasige Geschwülste von papillärem Bau. Die bei der chronischen Rhinitis besprochenen und abgebildeten Hypertrophien der vorderen und hinteren unteren Muschelenden gehören grossentheils hieher. Die Papillen sind entweder dicht gedrängt oder locker stehend; in letzterem Falle sind die einzelnen mehr entwickelt und hängen beerengleich an kurzen, dicken Stielen zusammen (Himbeerpolypen nach Hopmann). Ihre Farbe variirt von hellrosa bis kirschroth, ihre Consistenz von der Weichheit der Schleimpolypen bis zur Derbheit eines Fibrosarkoms. Die meisten sind weich, beerenartig, seltener aus blattförmig angeordneten Papillen zusammengesetzt. Von Anderen, so besonders von Schäffer und Zuckerkandl, werden diese Papillome als teleangektatische Tumoren, von Steinbrügge als teleangektatische Fibrome beschrieben. Zarniko nennt sie Fibrome und theilt sie ein in Fibromata teleangiectodia oder cavernosa und in Fibr. adenomatodia: auch trennt er das harte Papillom Hopmann's oder die Hornwarzengeschwulst v. Büngen's von den oben beschriebenen papillären Fibromen. Am Septum, namentlich dem vorderen unteren Ende,

kommen Angiome, die man auch als erectile Geschwülste bezeichnet, nicht selten vor.

Den Papillomen am nächsten stehen die Granulationsgeschwülste, die besonders bei Nebenhöhleneiterungen im mittleren Nasengange, ferner an den Rändern und auf dem Grunde traumatischer, syphilitischer und tuberculöser Geschwüre ihren Sitz haben.

Cystengeschwülste haben eine sehr verschiedene Grösse; man unterscheidet echte Cysten, insoferne sie selbstständige, mit Flüssigkeit gefüllte und von einer äusseren Hülle umgebene Gebilde vorstellen, und unechte Cysten, die sich in jeder anderen Geschwulst entwickeln können. Die Cysten entstehen durch Verschluss des Drüsenausführungsganges mit Dilatation der Drüse; ihr Inhalt ist meist Schleim, käsiger Detritus, Leukocyten, Epithelien.

Geschwülste, deren Hauptmasse aus derbem Bindegewebe besteht, bezeichnet man als Fibrome. Häufiger sind sie in den hintersten Abschnitten der Nase und stellen dann die Nasenrachenpolypen in engerem Sinne vor. Wenn sie neben Bindegewebe elastische Fasern, Rundzellen und erweiterte Gefässe enthalten, können sie als Fibrosarkome oder bei Ueberwiegen der Gefässe als Angiome bezeichnet werden. Zarniko theilt diese Geschwülste ein in Choanenrandpolypen, in typische Nasenrachenpolypen und in nicht typische harte Fibrome. Sie entspringen fast ausschliesslich von der oberen hinteren Wand der Nase, von der Schleimhaut oder dem Periost des Vomer, der Umrandung der Choanen, der Pars perpendicularis des Gaumenbeines, den Halswirbeln, dem Keilbeinkörper oder dem inneren Flügel seines Proc. pterygoideus, der Keilbeinhöhle oder von der Aponeurose des Foram. lacer. anter. oder, was sehr selten ist und von W. Gleitsmann beobachtet wurde, von den Lippen des Tubenwulstes (siehe Fig. 34 und 35). Sie stellen derbe, kugelige oder flaschenförmige, meist breitgestielte, langsam wachsende, solitär auftretende Geschwülste vor, welche oft eine enorme Grösse erreichen, den ganzen Rachen ausfüllen und in die Nase hineinwuchern. Das bisher als grösstes bekannte und von Zaufal operirte Exemplar wog 112 Gramm und hatte eine Länge von 16 und eine Breite von 6 cm.

Fig. 33.
Papillom oder Himbeerpolyp der unteren Muschel.

Das Fibrosarkom des Nasenrachenraumes tritt mit Vorliebe im Alter des physiologischen Wachsthumes auf, es entsteht Ueberwachsthum und dadurch Geschwulst; auch gutartige Geschwülste, syphilitische Narben können sich in Sarkome umwandeln. Sie haben meist einen breiten, nicht beweglichen Stiel und wachsen theils in die Schädelhöhle hinein oder in die Nase, die Augenhöhle und den Oberkiefer, theils breiten sie sich nach unten gegen den Mundtheil des Rachens zu aus.

Als eine charakteristische und typische Geschwulst betrachtete man früher den sogenannten blutenden Polypen der Nasenscheidewand. Charakteristisch ist an ihm nur der Sitz im vordersten Theile des Septum, da, wo auch Erosionen, Xanthose und Ulcus

perforans vorkommen. Seine Structur ist sehr verschieden; in der Regel stellt er ein Fibrom vor, das äusserst reich an Gefässen ist, bald hat er mehr den Charakter eines Granuloms, bald eines teleangektatischen Lymphangioms (Schadewaldt, Alexander, Scheier, Heymann). Réthi, der sich gleichfalls gegen die Sonderstellung dieser Geschwulst wendet, rechnet sie zu den polypoiden Hypertrophien, wie sie auch an den Muscheln gefunden werden. Ihre Grösse schwankt von Linsen- bis Wallnussgrösse; sie sitzt häufiger breitgestielt der Schleimhaut auf wie ein Fungus, seltener ist sie dünngestielt. Das weibliche Geschlecht wird häufiger ergriffen als das männliche; auch scheint die linke Nasenseite bevorzugt.



Fig. 34.
Vom Vomer ausgehender fibröser Nasenrachenpolyp.



Fig. 35.
Vom Keilbein ausgehender fibröser Nasenrachenpolyp.

Zu den bösartigen, aus kleinen oder grossen Rund- oder Spindelzellen und wenig Bindegewebe bestehenden Neubildungen gehören die Sarkome. Sie sind von verschiedener Consistenz und sehr blutreich; manche Formen wachsen äusserst langsam, manche sehr schnell. Mit besonderer Vorliebe nehmen sie vom Septum ihren Ausgang; in anderen Fällen entspringen sie, wie die Schleimpolypen, in dem oberen Theile der Nase, erfüllen diese ganz, die Scheidewand verdrängend, und wachsen theils in die Kieferhöhle, theils in den Nasenrachenraum hinein. Sie kommen in jedem, namentlich im höheren Alter vor, doch hat Moure auch einen Fall bei einem $2^1/_2$jährigen Kinde beschrieben. Auch Melanosarkome sind von Lincoln, Heymann und Miehael beobachtet; sie stellen graue oder grauschwarze, von den Muscheln entspringende, aus grossen Rundzellen bestehende Geschwülste dar, die eine grosse Neigung zu Recidiven haben; man darf sie nicht verwechseln mit Drüsenpolypen, die durch ausgedehnte Hämorrhagien ebenfalls eine schwarze Farbe annehmen können (Miehael).

Carcinome gehören glücklicherweise zu den Seltenheiten; sie bestehen aus Pflasterepithel oder Cylinderepithel und stellen bald flache oder knotige Infiltrate, bald weiche, blumenkohlartige Gebilde (Papillarkrebse) dar, welche äusserst rasch wachsen, die ganze Nase und den Nasenrachenraum ausfüllen, in die Nebenhöhlen oder in die Orbita und Mundhöhle sowie in die Schädelhöhle hineinwachsen und selbst auf die äussere Haut übergreifen.

Die Möglichkeit, dass ursprünglich gutartige Neubildungen sich mit der Zeit in bösartige umwandeln, ist von Bayer mit Recht zugegeben worden; Verf. sah selbst zu wiederholten Malen Schleimpolypen in sarkomatöse, fast nur aus Zellen bestehende Geschwülste sich umwandeln.

Die bereits früher erwähnten Leisten und Spinen des Septum sind theils Ecchondrosen, theils Exostosen und Hyperostosen. Ausserdem kommen noch Knochenblasen, Echinococcus-Geschwülste, Enchondrome, Osteome, die beiden letzteren namentlich am Septum und den Muscheln und bei jugendlichen Personen, Myxome, Elfenbeinosteome, Hirnbrüche vor. Zu den merkwürdigsten Gebilden gehören jene Geschwülste, welche theilweise oder ganz aus Haaren bestehen oder Knorpel, Knochen, Fett und Bindegewebe, Drüsensubstanz enthalten; Zahnbildung in der Nase ist mehrfach, unter Anderen von Schäffer, Fletcher, Ingals und Anderen constatirt worden. Zum Schlusse soll erwähnt werden, dass von Suchanek bei Leukämie intranasale Lymphome beobachtet wurden.

Die Symptome der Neubildungen sind bedingt durch ihre Grösse und ihren Sitz. Kleinere Geschwülste, besonders Schleimpolypen am Nasendache und an der mittleren Muschel, können völlig symptomlos verlaufen oder erzeugen die Erscheinungen eines Nasenkatarrhs und werden oft zufällig entdeckt. Mit dem weiteren Wachsthum treten die bereits öfters geschilderten Erscheinungen nasaler Obstruction ein. Teleangektatische Geschwülste (Angiome), namentlich solche am Septum, ferner Papillome geben zu häufigen und profusen Blutungen Anlass. Durch die Ausfüllung der Nase mit sehr vielen oder sehr grossen Polypen werden nicht nur das Septum verdrängt und die Muscheln atrophisch, sondern auch die äussere Form der Nase verändert, der Nasenrücken erscheint breiter und platter, die Nasenbeine stehen in stumpfem Winkel zu einander. Zuweilen ist das Gefühl eines in der Nase sich bewegenden Fremdkörpers vorhanden, oft treten die Geschwülste zur vorderen Nasenöffnung heraus. Aeusserst häufig klagen die Kranken über beständigen Katarrh und schleimige Secretion mit Verlust des Geruches. Eitriger, übelriechender Ausfluss deutet auf eine Complication mit Nebenhöhleneiterung hin. Nasenrachenpolypen haben ausser Störung der Sprache Obstruction der Nase und Schluckbeschwerden oder das Gefühl eines Fremdkörpers im Rachen, Brechneigung, reichliche Secretion, dumpfen Druck im Kopfe und oft eine ganz auffallende Schläfrigkeit sowie Gehörstörungen zur Folge. Durch Druck auf den Thränennasengang entsteht Thränenträufeln. Bösartige Neubildungen machen oft lange Zeit dieselben Er-

scheinungen wie gutartige, im weiteren Verlaufe stellen sich jedoch blutig-eitrige, äusserst fötide Secretion, heftiges und häufiges Nasenbluten, Schmerzen in der Nase und unter den Augen, Trigeminusneuralgien, Exophthalmus, Röthung und Ulceration der Haut, Kachexie, Pyämie oder Gehirnerscheinungen ein. Constant schwellen die Lymphdrüsen unter dem oberen Ende des Kopfnickers an und bilden im weiteren Verlaufe faustgrosse, steinharte Tumoren, die wiederum Unbeweglichkeit des Kopfes, Schmerzen und Neuralgien im Gebiete des Plexus cervicalis erzeugen.

Besonders häufig sind bei allen Neubildungen Erscheinungen von Seite des Nervensystems, Kopfschmerz, Schwindel, Abnahme des Gedächtnisses, Unfähigkeit zu geistiger Arbeit sowie die später zu besprechenden Reflexneurosen.

Da das Nähere in dem Capitel „Reflexneurosen" besprochen werden wird, so kann an dieser Stelle nur das Asthma in seinen Beziehungen zu Nasenpolypen erörtert werden.

Vor allen Dingen ist zu constatiren, dass Asthma im Verhältniss zu der grossen Häufigkeit der Polypen nicht häufig auftritt, auch stimmen die meisten Beobachter darin überein, dass Asthma bei Polypen, welche symptomlos verlaufen oder die Nase nur theilweise verstopfen, häufiger ist als da, wo beide Nasenhöhlen völlig undurchgängig sind. Das Fehlen von Asthma bei völliger Verlegung der Nase erklärt sich einestheils aus der Gewöhnung an die ausschliessliche Mundathmung, der Herabsetzung der Reizempfänglichkeit der in beständigem Contacte mit den Neubildungen befindlichen Schleimhaut sowie aus der Unmöglichkeit des Hineingerathens von äusseren Reizen in die Nase und der durch die Compression des erectilen Muschelüberzuges erzeugten Unfähigkeit, anzuschwellen und sich auszudehnen.

Die Diagnose stützt sich auf die Inspection und Palpation. Während die erstere mehr im Allgemeinen über das Vorhandensein von Polypen Aufschluss gibt, belehrt uns die Sonde über Anheftungsweise, annähernde Grösse und beiläufige Zahl. Niemals versäume man, beide Nasenhöhlen zu untersuchen, selbst wenn die Kranken angeben, nur auf einer Seite verstopft zu sein. Sehr schwer, ja unmöglich ist die Diagnose der kleineren Geschwülste am Nasendach oder in der Tiefe des mittleren Nasenganges sowie der lateralen Wand der Nase, oder wenn Verbiegungen des Septum oder Spinen vorhanden sind Die Nasenrachenpolypen können nur durch die Rhinoscopia posterior und die Digitaluntersuchung ermittelt werden. Sarkome der Nasenscheidewand können mit tuberculösen, lupösen und syphilitischen Neubildungen um so eher verwechselt werden, als das mikroskopische Bild dieser Geschwülste mit jenem kleinzelliger Sarkome fast identisch ist. Man richte demnach seine Aufmerksamkeit auf die Gegenwart von Tuberkeln, Riesenzellen, Tuberkelbacillen und untersuche den ganzen Körper auf das Genaueste. Die histologische Diagnose der verschiedenen Geschwülste kann nur mit dem Mikroskope gestellt werden.

Die Prognose richtet sich nach dem Sitze und dem histologischen Bau. Dass die Prognose in Folge der Fortschritte der Rhinochirurgie gegen früher eine viel günstigere wurde, wird Niemand leugnen wollen. Wiederherstellung der Nasenathmung kann fast immer erzielt werden und damit auch die Beseitigung der durch sie bedingten Beschwerden; die Prognose wird nur einigermassen getrübt durch die ausgesprochene Tendenz der meisten Nasenpolypen zu Recidiven: dennoch wird sehr oft Radicalheilung erzielt; die Recidiven sind nicht zum geringsten Theile durch zu geringe Ausdauer der Patienten bedingt, theilweise auch durch zu wenig energische Behandlung des Stieles oder durch die Unmöglichkeit, in der Tiefe verborgenen Neubildungen beizukommen und endlich durch das gleichzeitige Bestehen einer Nebenhöhleneiterung. Selbst sarkomatöse Polypen können bei günstigem Sitze gründlich geheilt werden; dass bösartige Geschwülste, so besonders weiche Carcinome oder diffuse Sarkome, eine infauste Prognose geben, ist erklärlich.

Die Behandlung kann nur eine operative sein. Aetzungen mit Höllenstein oder Betupfen mit Chromsäure oder die Elektrolyse müssen als zwecklose, zeitraubende, ja sogar schädliche Spielereien bezeichnet werden.

Dass durch die früher und noch heute vielfach geübte Methode, das Ausreissen mit der Kornzange ohne Controle des Spiegels, nur ausnahmsweise Radicalheilung erzielt wird, ist einleuchtend; was soll es auch dem meist mit zahlreichen Polypen behafteten Kranken nützen, wenn der vorderste, gerade sichtbare Polyp theilweise oder auch ganz entfernt wird? Abgesehen von der Nutzlosigkeit dieses Verfahrens ist dasselbe, wie Voltolini es schon vor Jahren mit Recht nannte, ein sehr rohes und schmerzhaftes, indem Verletzungen der Muscheln, Ausreissen gesunder Schleimhauttheile ganz unvermeidlich sind.

Etwas Anderes ist die Operation mit passend gekrümmten schneidenden Zangen, wenn sie von kundiger Hand und unter Leitung des Spiegels vorgenommen wird; dass durch diese Methode Radicalheilung erzielt werden kann, wird Niemand in Abrede stellen.

Die schonendste Methode aber ist die Entfernung mit der kalten Schlinge, um deren Einführung sich besonders Zaufal verdient machte; die schon einmal mit der Kornzange Operirten können dieselbe nicht genug loben. Die Zahl der Polypenschnürer und Ecraseure ist eine sehr grosse. Ob der Handgriff ein viereckig abgebogenes Metallstück mit einem darauf verschiebbaren Querbalken oder, wie beim Tobold'schen Ecraseur, einen flachen Stab mit Schlitten vorstellt, ob die Biegung mit Handgriff oder in der Röhre liegt, ist höchst gleichgiltig; fast jeder Operateur hat sein eigenes Instrument und bezweifelt Verf. nicht im Geringsten, dass jedes geeignet ist. Verf. hat, um das Instrumentarium nicht unnöthigerweise zu vertheuern und um den Handgriff auch für Operationen im Kehlkopfe verwenden zu können, den Tobold'schen Ecraseur (Fig. 36) etwas modificirt und durch Verstärkung des Griffes, Versetzen des einen Ringes an das hintere Ende und durch Drehbarkeit desselben dem

Instrumente für Operationen in der Nase grössere Kraft und Handlichkeit verschafft. Die Röhren, durch welche guter Eisendraht oder Messingdraht gezogen wird, gehen von dem Handgriffe in stumpfem Winkel ab, haben eine Länge von circa 14 cm und beiläufig 1 mm vom vorderen Ende entfernt einen Querbalken, auf welchem die gefasste Geschwulst durchschnitten werden kann; die Schlinge wird um einen auf den Schlitten angebrachten Haken durch mehrmaliges Umwickeln oder durch Klemmschrauben befestigt.



Fig. 36. Schlingenschnürer für die Nase (kalte Schlinge).

Die Operation, zu der stets die Cocaïnisirung ausreicht, gestaltet sich folgendermassen: Nachdem mit dem in der linken Hand gefassten Spiegel der Naseneingang dilatirt und mittelst des Stirnbindenreflectors gut beleuchtet wurde, bringt man die mit der anderen Hand gefasste, der Grösse des zu entfernenden Polypen entsprechende Schlinge in verticaler Richtung in die Nase, schiebt sie unter den zuvorderst sitzenden Polypen, bringt sie möglichst hoch gegen die Ursprungsstelle desselben hinauf und schnürt zu. Der Polyp bleibt entweder in der Schlinge hängen oder er fällt aus der Nase heraus, bei sehr beträchtlicher Grösse muss er förmlich entbunden werden; die Blutung ist bei dünnem Stiele äusserst gering, bei breiter Anheftung manchmal beträchtlich, aber ungefährlich, der Schmerz gering oder mässig. Nach Stillung der Blutung und Entfernung der Coagula und des Schleims legt man die Schlinge an den zunächst folgenden Polypen in derselben Weise an und so fort, bis alle entfernt sind. Bei dünnem Stiele, geringer Blutung und wenigen Polypen ist die Operation in kürzester Zeit vollendet.

Ganz anders ist dies, wenn eine oder gar beide Nasenhöhlen vollständig impermeabel sind oder wenn man es mit breit aufsitzenden, flachen Neubildungen zu thun hat. In ersterem Falle muss das abträufelnde und sofort gerinnende Blut und der reichlich abgesonderte Schleim nach jedem Eingriff mit der Pincette oder Spitze entfernt werden, was nicht nur äusserst zeitraubend, sondern auch oft recht schwierig ist. In solchen Fällen braucht man bis zur Wiederherstellung des Luftdurchzuges stets wiederholte Sitzungen.

Neubildungen mit sehr dickem Stiele oder flache, breit aufsitzende Wucherungen setzen der kalten Schlinge energischen Widerstand entgegen, sie müssen deshalb mit der galvanokaustischen Schlinge entfernt werden; oft muss man abwechselnd mit beiden Schlingen arbeiten. Die grössten Schwierigkeiten bieten sich bei der Entfernung von Neubildungen in engen oder krummen Nasen sowie bei solchen in der Nähe der Choanen. Durch Uebung und Geschicklichkeit wird man unter Benützung der beschränktesten Raumverhältnisse mit der Zeit auch diese Hindernisse überwinden lernen.

Wie es zur Ausrottung eines Unkrautes nicht genügt, dasselbe über dem Boden abzuschneiden, ebenso darf man sich auch mit dem Abschneiden der Geschwülste nicht zufrieden geben. Jetzt erst beginnt der wichtigste Theil der Behandlung, die Zerstörung des Stieles und des Mutterbodens Je energischer und sorgfältiger dieselbe geschieht, um so günstiger sind die Aussichten auf Radicalheilung, je nachlässiger, um so sicherer sind Recidiven. Man hat oft seine liebe Noth, dem mit der Wiederwegsammachung der Nase völlig zufriedenen, nach Hause drängenden Patienten die Nothwendigkeit dieser Procedur begreiflich zu machen. Aetzungen mit Lapis in Substanz sind zu schwach; besser ist die Chromsäure oder Trichloressigsäure, am besten aber die Galvanokaustik; passend geformte Brenner werden an die Stielreste angedrückt oder in dieselben eingebohrt und möglichst tief zerstört. Die Cauterisation ist so gut wie nicht schmerzhaft, so lange man sich auf krankem Boden befindet, wird aber schmerzhafter, je mehr man sich dem gesunden Gewebe nähert; meist werden in die Augen, die Stirne sowie in die Zähne des Ober- und Unterkiefers ausstrahlende Schmerzen angegeben. Sehr empfehlenswerth ist auch die Abtragung der Geschwulstreste mittelst schneidender Zangen; leider kommt es dabei häufig zu beträchtlichen Blutungen.

Operirt man auf diese Weise, dann erzielt man selbst da noch Radicalheilung, wo es kaum möglich erschien. Nicht so günstig sind die Aussichten bei enger krummer Nase oder bei den sarkomatösen Polypen oder förmlicher polypöser Degeneration der mittleren Muschel. Wenn auch eine oft mehrere Monate, selbst Jahre anhaltende Heilung erzielt werden kann, so hat man doch neue Recidiven zu bekämpfen. Bei stets wiederkehrenden Polypen, die gewöhnlich einer Nebenhöhleneiterung ihr Entstehen und Recidiviren verdanken, muss selbstverständlich auch die betreffende Nebenhöhle behandelt werden. Bei aus-

gebreiteter polypöser Degeneration der mittleren Muschel ist, wenn die beschriebenen Methoden nicht zum Ziele führen und immer wieder Recidiven auftreten, die Entfernung der ganzen mittleren Muschel mit Zange oder Meissel, mit oder ohne Spaltung der äusseren Nase angezeigt.

In Bezug auf üble Zufälle, Blutungen etc., sowie auf die Nachbehandlung muss auf das im Capitel „Allgemeine Therapie" Gesagte verwiesen werden.

Zu den schwierigsten Operationen gehört unstreitig die Entfernung der Nasenrachenpolypen.

Sie kann von der Nase und vom Rachen aus bewerkstelligt werden. Wählt man den Weg durch die Nase, dann kommen zunächst die kalte und die Glühschlinge in Betracht. Die Schwierigkeit ist, die Schlinge bis an die Basis der Geschwulst zu bringen, was man entweder durch passende Drehung der Schlinge oder dadurch erreicht, dass man mit dem in den Nasenrachenraum eingeführten Zeigefinger die zu den Choanen hinaustretende Schlinge über die Geschwulst schiebt, was aber leichter gesagt als gethan ist. Zaufal construirte, um die Schlinge erst im Rachen entfalten zu können, einen eigenen Schlingenschnürer mit Federkraft. Bei der ausserordentlichen Derbheit und breiten Anheftung der Nasenrachenpolypen muss der Glühschlinge der Sicherheit wegen der Vorzug eingeräumt werden.

Nicht selten misslingen alle Versuche, die Geschwulst in die Schlinge zu fassen. Man verzichte in solchen Fällen auf weitere Experimente und rücke der Wurzel des Polypen direct auf den Leib, vorausgesetzt, dass dieselbe gesehen oder wenigstens mit der Sonde gefühlt werden kann; oft gelingt es, durch Einbohren spitziger oder messerförmiger Kauteren oder durch Elektrolyse die Basis der Geschwulst zu mortificiren und dieselbe zur Schrumpfung und zum Abfall zu bringen; dass dadurch eine eigene Nachbehandlung des Stieles überflüssig wird, ist ein weiterer Vortheil dieser vom Verf. schon längst geübten und beschriebenen Methode. Zuweilen gelingt es, die Geschwulst durch scharfe Haken aus dem Nasenrachenraum in die Nase zu befördern und von da aus zu entfernen. Auch das Einführen einer Schlinge mittelst der Bellocque'schen Röhre und Umlegen derselben mit dem Finger um die Geschwulst führt oft zum Ziele. Lässt auch dieses im Stiche, dann versuche man die Entfernung vom Rachen aus.

Das Abquetschen mit der schneidenden Choanenzange ist weder ein so gefährlicher noch roher Eingriff, wie das Ausreissen mit der gewöhnlichen Zange; die Schwierigkeit liegt nur darin, die Branchen des Instrumentes möglichst nahe an die Insertionsstelle zu bringen; die Cauterisation derselben mit Galvanokauter muss auch hier vorgenommen werden.

Das Anlegen der kalten und der Glühschlinge vom Rachen aus bietet nicht geringere Schwierigkeit als von der Nase aus. Wenn auch die Controle mit dem Spiegel erwünscht ist, so ist dieselbe doch nicht absolut nöthig, zumal Raumverhältnisse sehr oft zu Con-

cessionen nöthigen. Das progressive Zerstören durch Andrücken eines soliden Galvanokauters oder der Lincoln'schen gedeckten Glühscheibe ist zwar sehr zeitraubend, führt aber doch auch zum Ziele. Eine combinirte Methode empfiehlt Lange. Der linke Zeigefinger wird in den Nasenrachenraum eingeführt, während durch die Nase ein eigens construirter stumpfer Haken möglichst nahe an die Basis der Geschwulst gebracht und diese dann durch Zug mit dem Haken abgetrennt wird.

Mehr Berücksichtigung, als bisher geschehen, verdient bei sehr blutreichen Nasenrachengeschwülsten die Elektrolyse.

Wenn auch nicht zu leugnen ist, dass diese Methode eine ausserordentlich zeitraubende und langwierige ist und dass wenige Patienten Geld, Zeit und Geduld haben, in einer fremden Stadt 20—70 Sitzungen innerhalb mehrerer Monate oder noch längere Zeit (siehe die Mittheilungen von Michel und Kuttner) über sich ergehen zu lassen, so ist andererseits das Verfahren doch ein so schonendes, relativ schmerzloses und erfolgreiches, dass es in geeigneten Fällen als das empfehlenswertheste erscheint.

Sarkome und Carcinome können wenn auch nicht geheilt, so doch durch möglichst energische und häufige Eingriffe, Abtragen mit der Schlinge, multiple Galvanocauterisation, Auskratzen mit dem scharfen Löffel und darauffolgende Aetzung mit Chromsäure eine Zeit lang in ihrem Wachsthum aufgehalten werden. Von den juvenilen Sarkomen ist es ohnehin bekannt, dass sie sich spontan zurückbilden können, weshalb man warten oder, wenn nöthig, elektrolytisch oder galvanokaustisch operiren kann. Die Blutung ist bei dem grossen Gefässreichthum bösartiger Geschwülste meist eine so bedrohliche, dass man von weiteren Eingriffen absehen muss. Bei bösartigen Neubildungen, welche sehr grosse Strecken der Nase oder den Nasenrachenraum befallen haben, enthalte man sich jeglicher Eingriffe und trage Sorge für Beseitigung des üblen Geruchs durch desinficirende Einspritzungen, für Erhaltung der Kräfte; auch ist Arsen zu versuchen. Enchondrome können zuweilen mit der kalten Schlinge entfernt werden, sicherer ist jedenfalls die heisse. Weichere spongiöse Osteome oder Exostosen, Knochenblasen, können mit der Zange zerbrochen und stückweise entfernt werden, compacte erfordern die Ausmeisselung oder die Anwendung der Stichsäge, des Drillbohrers oder der elektrischen Trephine.

Die eingreifenden Operationsmethoden zur Entfernung der Neubildungen in der Nase und dem Nasenrachenraum, als da sind: Spaltung des harten und weichen Gaumens, Resection des Oberkiefers, Spaltung der Nase mit Beiseiteklappen der Nasenflügel, sind für maligne Geschwülste zu reserviren oder für solche gutartige, welche wegen ihrer ausserordentlichen Grösse oder hochgradiger Septumdeviation, Spinenbildung, narbiger Verengerung der Nasenlöcher oder aus anderen Gründen nach den oben beschriebenen Methoden nicht operirt werden können.

Nervenkrankheiten.

Entsprechend den beiden Hauptfunctionen der Nase, Vermittelung der Sensibilität und des Geruchs, unterscheiden wir Störungen im Bereiche des N. trigeminus und des N. olfactorius.

Die Störungen im Bereiche des N. trigeminus im engeren Sinne gehören zu den selteneren Affectionen.

Anästhesie der Nasenschleimhaut für sich allein ist äusserst selten. In der Regel sind centrale Erkrankungen, Lähmungen des Trigeminusstammes in Folge von Hirntumoren und Hirnsyphilis, schwere Hysterie, seltener Verletzungen der nasalen Trigeminusäste oder Druck durch Geschwülste, die Ursache. Die Unempfindlichkeit der Nasenschleimhaut manifestirt sich durch Mangel an Reflexen bei der Berührung, durch Ausbleiben des Niesens. Dass dabei auch scheinbar der Geruch leidet, hat seinen Grund darin, dass die Perception scharfer, stechender Riechstoffe, wie Salmiak, Essigsäure etc., keine Geruchs-, sondern eine Tastempfindung ist.

Hyperästhesie der Nasenschleimhaut hingegen ist sehr häufig. Sie äussert sich dadurch, dass die geringfügigsten Reize, welche die Schleimhaut der Nase, das Auge, selbst entfernt liegende Organe, wie die Haut, Sexualorgane oder den Mastdarm treffen, nicht nur kitzelnde und andere unangenehme Empfindungen erzeugen, sondern auch die heftigsten Erscheinungen, wie Niesanfälle, Kopfschmerz, Husten etc., zur Folge haben. Hieher gehört auch das kitzelnde und juckende Gefühl in der Nase bei Entozoen, namentlich Spulwürmern oder Bandwurm. Die Hyperästhesie der Nasenschleimhaut ist, wie im nächsten Capitel dargethan werden soll, die nothwendige Vorbedingung und Grundlage der sogenannten Reflexneurosen.

Parästhesie der Nasenschleimhaut ist im Verhältniss zu jener im Rachen eine relativ seltene Erscheinung. Sie äussert sich entweder als ein Gefühl von Kriebeln, Ameisenlaufen oder als Gefühl von Hitze oder Kälte spontan oder beim Durchtritt der Luft; auch Gefühle von Schwere oder Ziehen in der Nase mit Ausstrahlen in die Haut der Wange kommen vor. Die Schleimhaut kann völlig normal, aber auch verändert sein.

Neuralgie der Nasenäste des Trigeminus beobachtet man häufig während des Verlaufes eines acuten Schnupfens. Der dumpfe Stirn- oder Hinterhauptskopfschmerz, die bohrenden, pochenden und hämmernden, mit dem Pulse isochronen Schmerzen in der Tiefe des Auges und über den Augenbrauen bei acuter und chronischer Rhinitis, Nasenpolypen, adenoiden Wucherungen, welche, wie Ziem richtig bemerkt, wenigstens theilweise auf gestörten Abfluss der Lymphe und des venösen Blutes aus dem Gehirne zurückzuführen sind, tragen oft den typischen Charakter der Neuralgie. Bei Affectionen der Nebenhöhlen, namentlich der Stirnhöhle, ist Supraorbitalneuralgie eine sehr häufige, wenn auch nicht constante Erscheinung: blitzartig durch-

schiessende, elektrischen Strömen vergleichbare Schmerzen, welche in die Augenhöhle, die Zähne des Ober- und Unterkiefers, die Haut der Wangen, der Nasenwurzel und in die Mundschleimhaut ausstrahlen, beobachtet man bei Fremdkörpern, Nasensteinen, Parasiten, bösartigen Neubildungen, ferner Ulcerationen, namentlich syphilitischen, welche mit Caries und Nekrose der Knochen einhergehen, bei operativen, besonders galvanokaustischen Eingriffen, Abmeisseln von Septumdeviationen etc. Schmerzen in der Nase sind endlich auch Theilerscheinungen centraler oder peripherer Quintusneuralgien, Neurogliome des Ganglion Gasseri. Einen exquisiten Fall von Neuralgie beider Ethmoidales mit reflectorischen Krämpfen am weichen Gaumen hat Verf. beschrieben.

Die Behandlung richtet sich bei den bisher besprochenen Leiden nach der Ursache; bei nicht centraler Anästhesie versuche man den galvanischen Strom von der Nase aus; gegen Hyperästhesie und Neuralgie empfiehlt sich die Abhaltung aller Reize, die Behandlung etwaiger kranker Schleimhautstellen, die Extraction von Sequestern; innerlich Nervina, ausserdem Kaltwassereuren, Elektricität, Durchschneidung des Ethmoidalis von der Orbita aus, palliativ Narcotica.

Die häufigste den N. olfactorius treffende Affection ist die Anosmie, Geruchlosigkeit.

Sie ist entweder eine totale oder partielle, halbseitige oder doppelseitige.

Unter den centralen Ursachen sind zu erwähnen: angeborener Mangel der Olfactorii, Zerreissungen der Olfactorii und ihrer Endausbreitungen in Folge von Schussverletzungen oder Schlag auf den Kopf, Schädelfractur, Hirndruck (Quincke), Exsudate in der vorderen oder hinteren Schädelgrube, Abscesse und Gehirntumoren, namentlich Gliome, Syphilome des Vorderhirns und der Schädelbasis, Embolie der linken Art. cerebri media, Tabes, Atrophie der Olfactorii und ihrer centralen Ursprünge im höheren Alter. Langanhaltende Trigeminuslähmung führt in Folge mangelhafter Ernährung der Nasensehleimhaut zu Abschwächung des Geruchs; Facialislähmung hat gleichfalls Geruchsstörungen zur Folge durch Behinderung des Schnüffelns in Folge der Lähmung der Verengerer und Erweiterer der Nasenlöcher und dadurch, dass bei Lähmung des Orbic. oculi die Conjunctivalflüssigkeit über die Wange abläuft und die Nasenschleimhaut vertrocknet. Centralen Ursprungs ist offenbar die bei Hysterischen vorkommende Hemianosmie sowie die Abschwächung oder der Verlust des Geruchs bei klimakterischen Frauen, vielleicht auch die Anosmie nach Entfernung beider Eierstöcke, wie von Gottschalk beobachtet wurde.

Unter den peripheren Ursachen ist behinderte Einwirkung der Riechstoffe die häufigste; die riechenden Substanzen gelangen entweder überhaupt nicht in die Regio olfactoria, wie bei hochgradigen Verbiegungen und Auswüchsen des Septum, Occlusion der Nase, Verwachsungen der Choanen und des Rachens, Neubildungen, Fremdkörpern, oder sie können in Folge der acuten oder chronischen entzündlichen Schwellung oder Hypertrophie oder polypösen Degeneration der Schleim-

haut nicht auf die Endausbreitungen des Olfactorius einwirken. Die nach Abschwellung der Schleimhaut so häufig zurückbleibenden Geruchsstörungen verdanken einer Neuritis oder Perineuritis sowie der Atrophie der Endfasern des Olfactorius ihre Entstehung. Weitere Ursachen der Anosmie sind Zerstörung oder Compression der Nerven durch Caries und Tumoren des Siebbeins, abnorme Durchfeuchtung sowie zu grosse Trockenheit der Schneider'schen Membran, Atrophie der Schleimhaut, wie sie bei Ozaena regelmässig vorkommt, Mangel von Pigment in den Schultze'schen Riechzellen, allzu energischer Gebrauch der Nasendouche, namentlich von Alaun- und Zinklösungen oder Carbolsäure, Einathmung von Ammoniakdämpfen und Aether, Vergiftungen mit Nicotin und Quecksilber. Dass durch allzu lange und intensive Gerüche Geruchsverminderung durch Erschöpfung der Nervenfasern zu Stande kommt, hat Aronsohn nachgewiesen; daraus erklärt sich auch, dass Chirurgen mit der Zeit den Jodoformgeruch gar nicht mehr empfinden (M. Schmidt). Intermittirende Anosmie wurde von Raynaud beobachtet bei einer Dame, welche täglich Nachmittags 4 Uhr für 18 Stunden den Geruch verlor.

Die Prognose der Anosmie richtet sich nach der Ursache. Am günstigsten ist sie bei Hysterie oder bei acuten und chronischen Katarrhen, Nasenpolypen, Fremdkörpern etc.; Morell Mackenzie sah jedoch niemals den Geruch wiederkehren, wenn diese Affectionen länger als 2 Jahre gedauert hatten. Ganz ungünstig ist die Prognose bei Hirntumoren, Tumoren und Caries des Siebbeins, Schädelfractur, Rhinitis atrophica, etwas besser bei Syphilis.

Die Diagnose stützt sich auf die qualitative und quantitative Prüfung des Geruchssinnes, die bereits früher besprochen wurde. Auch lasse man aromatische Substanzen, wie z. B. Wein, kosten, um zu constatiren, ob die im hinteren Theile der Nase gelegenen Olfactoriusfasern noch erregbar sind.

Die Behandlung muss sich nach der Ursache richten; Anosmien durch Kopfverletzungen, Blutergüsse, Exsudate, Embolien bilden sich öfters mit der Zeit von selbst zurück. Katarrhe, Neubildungen müssen nach den angegebenen Methoden beseitigt werden. Bei den rein functionellen Anosmien ist ein Versuch mit dem constanten Strom angezeigt; nach Althaus ist zur Erregung der Olfactoriusfasern ein sehr starker Strom erforderlich, so dass heftige Schmerzen, Schwellungen der Schleimhaut unausbleiblich sind. Verf. hat jedoch schon mit sehr schwachen Strömen zuweilen sehr gute Resultate erzielt; man setzt den positiven Pol aussen auf die Nase, während man den negativen langsam der mittleren Muschel entlang führt. Luc bedient sich abwechselnd des constanten und des faradischen Stromes, jedesmal von 5 Minuten Dauer. Subcutane Injectionen von Strychnin, Bepinselungen der Nasenschleimhaut mit Strychnin 1·0 : 100·0 Ol. olivar. sowie Insufflationen von Strychnin 0·003—0·005 : 0·2 Amylum zweimal täglich sind zuweilen von Nutzen. Bei intermittirender

Anosmie empfehlen sich Chinin, Natr. salicyl., Tinct. Eucalypti glob., Arsen, Eisen; bei arthritischer Grundlage Ichthyol.

Die Steigerung des Geruchssinnes, Hyperosmie oder Hyperaesthesia olfactoria, ist zuweilen wie die Verschärfung des Geschmackes eine physiologische Erscheinung. Wilde, uncivilisirte Völker scheinen durchwegs einen ausserordentlich feinen Geruchssinn zu besitzen. Dass dies auf der dunkleren Hautfarbe dieser Völker resp. der stärkeren Pigmentirung der Riechschleimhaut beruht, ist sehr wahrscheinlich. Berühmt ist auch der Knabe James Mitchell, der mit Verlust aller anderen Sinne geboren, den Geruchssinn so ausgebildet hatte, dass er durch denselben wie ein Hund Personen und Sachen unterscheiden konnte. Als pathologische Erscheinung kommt Hyperosmie häufig bei Neurasthenischen, Hysterischen, Dyspeptischen, Anämischen und namentlich bei Schwangeren vor; sie riechen nicht nur die geringsten Quantitäten duftender Stoffe, die unter normalen Verhältnissen nicht percipirt werden können, ja sogar Dinge, die gewöhnlich für geruchlos gelten, z. B. Kirschen, sondern werden auch durch gewisse Gerüche von Kopfschmerz, Herzklopfen, Ueblichkeit und Brechneigung, Ohnmacht etc. befallen. Welche grosse Rolle die Hyperästhesie des Olfactorius bei der Entstehung des nervösen Schnupfens und des Asthma spielt, wurde bereits erwähnt.

Die Behandlung muss da, wo materielle Veränderungen vorliegen, eine chirurgische sein. Ausserdem empfehlen sich Einblasungen von narkotischen Pulvern — Herba Conii macul, Hyoscyami, Pulv. Belladonnae. Auch durch Bromkali innerlich und local, ferner durch Cocaïn und Menthol wird die Geruchsschärfe zeitweise herabgesetzt.

Relativ häufig ist auch die perverse Geruchsempfindung, Parosmie, Paraesthesia olfactoria, auch Kakosmia subjectiva genannt.

Die Ursachen sind so ziemlich dieselben wie bei Anosmie, also hauptsächlich acute und chronische Katarrhe, Polypen etc., Tumoren des Vorderhirns und der Schädelbasis, Gehirnsyphilis, apoplektische Insulte, Gehirnhyperämien, Atheromatose der Gehirngefässe, entzündliche Affectionen der Riechnerven, allgemeine Nervosität, Klimakterium, Hysterie und ganz besonders Influenza. Bei manchen Epileptischen geht dem Anfalle als Aura eine perverse Geruchsempfindung voraus; sehr häufig sind ferner Illusionen und Geruchshallucinationen bei Geisteskranken. Hieher gehören auch die Geruchsverirrungen der Hysterischen und Schwangeren, welche mit Vorliebe angebrannte Federn, Valeriana, Asa foetida etc. riechen. Bei der Parosmie werden entweder Gerüche wahrgenommen, die in der That nicht existiren, oder, was häufiger ist, existirende Gerüche erscheinen verändert, meist unangenehm, brandig, phosphorartig, schwefelig, faulig, gasartig, leichenhaft (Allotrioosmie). Nicht selten beobachtete Verf. Parosmie bei Hypochondern; so glaubte unter Anderen ein junger, geistig sonst gesunder Arbeiter aus dem Anus einen solchen Kothgeruch zu verbreiten, dass ihn seine Collegen mieden, während ein älterer nervöser Beamter nicht von dem

Gedanken loskommen konnte, dass er einen pestilenzialischen Geruch aus seiner Nase verbreite. Periodisch auftretende und einige Stunden anhaltende Parosmie mit Kothgeruch beobachtete Verf. bei einem 14jährigen, sonst völlig gesunden Knaben, dessen Vater eine Zeit lang dieselbe Erscheinung gehabt haben soll. Peyer beobachtete wiederholt Anomalien des Geruches bei Erkrankungen der männlichen Genitalien, speciell bei Pollutionen, Spermatorrhoe. Plötzlich auftretende üble Geruchsempfindungen sind ganz gewöhnlich bei Nebenhöhleneiterungen und dadurch erzeugt, dass dem Eiter durch Veränderung der Körperstellung Gelegenheit zum Abfluss geboten wird.

Bei Erkrankungen des Gehirns, namentlich Tumoren, alterniren nicht selten Parosmie mit Anosmie, was wohl mit Schwankungen des intracraniellen Blutdruckes zusammenhängen dürfte; auch ein häufiger Wechsel der Geruchsempfindungen ist dabei vorhanden. Reizungen des Olfactorius. Altersatrophie und Atrophie bei Tabes führen ebenfalls zu Parosmie.

Die Prognose der Parosmie ist am günstigsten bei materiellen Veränderungen in der Nase, zweifelhaft bei Hypochondern, Hysterischen, Schwangeren, ganz ungünstig bei Gehirntumoren und anderen intracraniellen Erkrankungen.

Die Behandlung hat zuerst die Aetiologie zu berücksichtigen. Insufflationen von Arg. nitr., Bepinselungen mit Jodlösung, Galvanokaustik, Operation von Neubildungen, Beseitigung der Septumdeviationen, Fremdkörper, Rhinolithen, Nebenhöhleneiterungen, Behandlung der Anämie, Epilepsie und Hysterie werden am ehesten zum Ziele führen. Bei Hypochondern versuche man ausser Regelung der Verdauung, des Stuhlganges durch Bewegung, Landaufenthalt und Bitterwässer, aromatische Einspritzungen und Schnupfpulver, Pulv. irid. flor., von Myrrha, Benzoe etc.. Ueberstreichen der Regio olfactoria mit dem Galvanokauter; doch wird man glänzende Erfolge damit kaum erzielen. Palliativ empfiehlt sich Cocaïn und Menthol.

Lähmung der Muskeln der Nasenflügel und in Folge dessen inspiratorisches Zusammenklappen derselben kommt vor bei Facialislähmung, ferner bei Coma, Sopor und in der Agone.

Bei Verengerungen der Nase oder Hindernissen im Nasenrachenraum kommt es in Folge von Erschlaffung der Nasenwände oder mangelhafter Uebung und Thätigkeit der Nasenflügelheber und -Erweiterer zu partiellem oder totalem Ansaugen des Nasenflügels während der Inspiration. Besonders störend wirkt dasselbe beim Bergsteigen oder während des Schlafes; Migräne, Aprosexie, nächtliche Asthmaanfälle sind die nicht seltenen Folgen dieses Zustandes. Denselben beseitigt man nach M. Schmidt am besten durch Einlegen passender, von Feldbausch construirter Instrumente, welche durch ihre Federkraft die Nasenflügel erweitern.

Reflexneurosen.

Schon lange wusste man, dass von verschiedenen Organen, so namentlich den weiblichen Genitalien aus, in anderen näher gelegenen oder entfernteren Körpertheilen durch Vermittelung des Gehirns und Rückenmarks Erscheinungen hervorgerufen werden können, welche man als reflectorische bezeichnet. Der neuesten Zeit blieb die Erkenntniss vorbehalten, dass unter den Organen, von welchen Reflexe ausgelöst werden, die Nase und der Nasenrachenraum eine äusserst wichtige Rolle spielen. Nachdem schon Voltolini, B. Fränkel, Hänisch und Andere auf den Zusammenhang zwischen Nasenpolypen und Asthma hingewiesen hatten, war es besonders Hack, welcher die Abhängigkeit zahlreicher anderer Erscheinungen von Nasenkrankheiten behauptete. Wenn auch einzelne von Hack's Ansichten sich bei näherer Prüfung als unrichtig erwiesen, so wurde doch die Mehrzahl derselben allseitig als richtig anerkannt.

Die nothwendigste Bedingung zur Auslösung von nasalen Reflexen ist die gesteigerte Erregbarkeit des Nervensystems. Diese Erregbarkeit kann eine allgemeine sein, d. h. das betreffende Individuum besitzt eine universelle neuropathische Disposition, es ist neurasthenisch oder hysterisch, oder die erhöhte Erregbarkeit beschränkt sich auf die Nerven der Nase und ihrer Adnexa: es besteht eine locale Hyperästhesie, eine nasale Neurasthenie. Beide Arten können angeboren sein oder erworben durch acute Exantheme, Keuchhusten, mangelhafte und unzweckmässige Ernährung, falsche Erziehung, Excesse in Baccho et Venere, Pollutionen, Spermatorrhoe, geistige Ueberanstrengung, psychische Momente, Krankheiten der Nase oder anderer Organe.

Zur Entstehung der Reflexe ist in zweiter Linie ein Reiz nothwendig, welcher die Nerven der Nase und ihrer Adnexa in Erregung versetzt und dann auf andere Nervenbahnen überspringt. Die Reize, welche die hyperästhetischen Nerven der Nase und ihrer Adnexa in Erregung versetzen, gelangen entweder von aussen in die Nase und den Nasenrachenraum oder sie werden in diesen Organen selbst erzeugt (periphere Reize).

Die von aussen in die Nase gelangenden Reize sind äusserst zahlreich. Es besteht in diesem Punkte eine ganz ausserordentliche Variabilität, eine individuelle Disposition und Idiosynkrasie. Während bei den Einen die die Reflexe erzeugenden Reize das Gebiet der Gefühlssphäre, speciell des Trigeminus, betreffen, gehören sie bei den Anderen in die Kategorie der Geruchsempfindungen resp. des Olfactorius, bei wieder Anderen in beide zugleich.

Die in der Nase selbst erzeugten Reize verdanken entweder vorübergehenden oder bleibenden pathologischen Veränderungen ihre Entstehung. Unter den vorübergehenden spielen active und passive Hyperämien, so namentlich abnorm starke Füllung des Schwellgewebes, die Hauptrolle. Unter den bleibenden Veränderungen sind zu nennen: Hypertrophien der Schleimhaut, einfache oder polypoide

Wucherungen der Muscheln, Verbiegungen und Auswüchse der Scheidewand, angeborene oder durch operative Eingriffe erzeugte Verwachsungen des Septum mit der Muschel oder der Muscheln unter sich, Neubildungen, besonders Schleimpolypen, chronische Nasenrachenkatarrhe, Erkrankungen der Bursa pharyngea, adenoide Wucherungen, Tonsillarhypertrophie, Nebenhöhleneiterungen.

Die Erregung der Nerven bei Anwesenheit der genannten vorübergehenden oder bleibenden Veränderungen geschieht auf mechanischem Wege, und zwar dadurch, dass Theile miteinander in Berührung treten, welche normalerweise unter sich keinen Contact haben. So tritt z. B. durch eine plötzliche starke Füllung des cavernösen Gewebes die untere Muschel mit dem Septum in Berührung und erregt die in den berührten Theilen verlaufenden Nervenfasern; noch leichter geschieht dies bei Verbiegungen oder spitzigen Auswüchsen des Septum, namentlich solchen, welche gegenüber der mittleren Muschel liegen, oder in sehr engen Nasen. Mechanisch erregend wirken ferner Schleimpolypen oder polypöse Hypertrophien der mittleren Muscheln, wenn sie mit der Scheidewand oder mit der äusseren Nasenwand oder der unteren Muschel in Contact gerathen. Dasselbe thun des Weiteren pendelnde Polypen, wenn sie ihre Lage wechseln oder wenn sie durch vermehrten Blutzufluss oder feuchte Witterung an Volumen zunehmen.

Ausser der zeitweisen Berührung benachbarter Schleimhautpartien kommt ferner in Betracht der directe Zug oder Druck, welchen die hypertrophirte Schleimhaut oder Neubildungen auf die in den veränderten Theilen verlaufenden Nerven ausüben, die Störung der Nasenathmung, die Behinderung der Circulation des Blutes und der Lymphe in der Nase und dem Gehirn und endlich Gefässaufregungen, welche namentlich bei Frauen vor oder während der Menses auftreten.

Die nasalen Reflexe werden jedoch nicht nur durch periphere Reize hervorgerufen, sondern auch durch centrale, d. h. durch solche, welche vom Gehirn oder Rückenmark ausgehen, die Nerven der Nase treffen und von diesen auf andere Nervenbahnen überspringen. Aus diesem Grunde kann die Schleimhaut der Nase vollkommen intact befunden werden.

Ueber den Ort, von welchem aus die Reflexe erregt werden, ist viel gestritten worden.

Von Hack wurde das Schwellgewebe, namentlich das der unteren Muscheln, als der alleinige Ort der Auslösung betrachtet; die Anslösung käme leichter zu Stande bei unbedeutenden und streng localisirten Processen als bei diffuser hyperplastischer Rhinitis, welch' letztere geradezu die Schwellung des cavernösen Gewebes verhindere: gelänge es, die Schwellkörper auszuschalten, dann würden auch die durch sie bedingten Erscheinungen aufhören. Andere, wie Baratoux und Heryng, verlegen die Reflexzone in die Nasenscheidewand, namentlich den hinteren Theil derselben, weil es ihnen gelang, durch Berührung dieser Stelle Husten, Niesen und Dyspnoe zu erzeugen.

Nach Sandmann sind die vorderen und hinteren unteren Muschelenden und die diesen gegenüberliegenden Theile der Scheidewand die Hauptauslösungsstellen für Reflexe; Aronsohn konnte durch galvanokaustische Behandlung eines von der mittleren Muschel ausgehenden derben Tumors Asthma erzeugen. Ganz sichergestellt durch B. Fränkel ist jetzt, dass von jedem Punkte der Nase ohne Vermittelung des cavernösen Gewebes Reflexe ausgelöst werden können. Dass aber das Schwellgewebe doch bei der Entstehung gewisser Reflexe, so namentlich des Asthma, eine Rolle spielt, wird später erörtert werden.

Bevor wir die einzelnen von der Nase erzeugten Reflexe näher besprechen, muss nochmals nachdrücklichst betont werden, dass die Schleimhaut der Nase normal sein, aber auch die verschiedensten Veränderungen aufweisen kann und dass alle die Nase treffenden Reize ohne gesteigerte allgemeine oder locale Hyperästhesie vollkommen wirkungslos bleiben.

Eine der häufigsten auf vasomotorischem Wege zu Stande gekommene Erscheinung ist die abnorme Füllung und Schwellbarkeit des erectilen Gewebes der unteren Muscheln.

Auf geringfügige und mannigfaltige Reize hin, Temperaturschwankungen, Veränderungen der Körperlage, namentlich Rückenlage in der Nacht, Genuss alkoholischer Getränke, Menstruation, psychische oder geschlechtliche Erregungen, erfolgt anfallweise, zuweilen blitzschnell, eine mehr oder weniger hochgradige, kürzere oder längere Zeit anhaltende oder wechselweise Verstopfung der einen oder anderen Nase oder beider zugleich, mit den bekannten schon öfters besprochenen Folgeerscheinungen. Nach dem Anfalle oder während der Untersuchung durch psychische Momente, Angst, Furcht vor Operation, verlieren sich diese Schwellungen meist ebenso schnell, wie sie gekommen waren. Dass die mit diesem Uebel Behafteten bei Tag und Nacht vielfach belästigt, ja, wie Verf. einmal bei einem Geistlichen gesehen, wegen des nasalen Timbres der Stimme in der Ausübung ihres Berufes im höchsten Grade behindert werden, ist leicht einzusehen. Im Allgemeinen ist das Uebel, so lange sich keine anderen Erscheinungen daran schliessen, ein leicht zu tragendes; es wird aber zu einem sehr verhängnissvollen, wenn die abnorme Schwellbarkeit des cavernösen Gewebes den Anstoss gibt zu der Auslösung sogenannter secundärer Reflexe, namentlich des Asthma. Dass das cavernöse Gewebe, besonders bei einfacher acuter und chronischer Rhinitis, Neigung zum Intumesciren zeigt, wurde bereits früher erwähnt.

Zu den vasomotorischen Reflexen gehört auch die Röthung der Nasenspitze, die ödematöse Schwellung der Augenlider und wahrscheinlich auch das vicariirende Nasenbluten.

Die sogenannte „rothe Nase“ besteht theils in einer plötzlich auftretenden und plötzlich verschwindenden, theils bleibenden erythematösen Röthung der Nasenspitze und Nasenflügel. Selbstverständlich kann nur in dem erstgenannten Falle von einer Neurose die Rede

sein, während den bleibenden Röthungen venöse Hyperämien zu Grunde liegen; doch darf man nicht vergessen, dass sehr häufig wiederkehrende flüchtige Gefässerweiterungen mit der Zeit zu dauernder Dilatation und Gewebsstörungen Anlass geben können.

Die von der Röthe ergriffene Partie ist in der Regel scharf abgegrenzt; die Nasenspitze ist bald nur leicht rosig angehaucht, bald kugelig aufgetrieben, glänzend wie erysipelatös und ebenso wie die Nasenflügel von zahlreichen, sich vielfach verästelnden Gefässen durchzogen. Bei sehr langer Dauer kommt es zu Verdickung der Cutis, zu schwammigen, warzigen, blaurothen Exerescenzen und zu Pustelbildung, kurz zu dem vollen Bilde der Acne rosacea. Ganz besonders häufig und entstellend ist die flüchtige Röthung bei jungen Mädchen. Unzweifelhaft spielen bei diesen sexuelle Vorgänge die Hauptrolle, da die Röthung am intensivsten und regelmässigsten zur Zeit der Menses auftritt. Ebenso können psychische und erotische Erregungen, Wärme und Kälte, geringe Erhöhung des Blutdruckes, wie sie nach dem Genusse sehr warmer Getränke — Kaffee, Thee, Suppe oder geringer Mengen Alcoholica — auftritt, die Röthung hervorrufen und unterhalten. Wie beim Erscheinen der Menses wird die Affection auch beim Verschwinden derselben im Klimakterium und während der Schwangerschaft beobachtet. Dass die rothe Nase auch bei chronischer Rhinitis resp. die durch dieselbe im Naseninnern erzeugte Stauung beobachtet wird, wurde ebenfalls schon erwähnt.

Während die flüchtige Röthung bei Vermeidung der genannten Schädlichkeiten nach längerem oder kürzerem Bestande sich von selbst verliert oder nur bei besonderen Anlässen erscheint, bleibt die mit sichtbaren Gefässerweiterungen verbundene Form stabil. Bei Männern gilt mit Recht der Missbrauch des Alkohols, namentlich des Weines und Branntweines, als Ursache. Auch bei Leuten, welche sich häufig und lange der Kälte aussetzen, Kutschern, Dienstmännern, Marktweibern etc., kommt die rothe Nase sehr häufig vor; freilich spielt bei diesen ausser der Kälte meistens auch der Alkohol eine Rolle.

Zu den vasomotorisch-secretorischen Neurosen gehört ferner auch der nervöse Sehnupfen, Coryza nervosa, Rhinitis vasomotoria, sympathetica. Eine Abart des letzteren ist das Heufieber und der Catarrhus autumnalis.

Die Rhinitis vasomotoria, wegen ihres periodischen Auftretens auch Rhinitis vasomotoria periodica genannt, hält Herzog für eine Affection des Sympathicus, da Reizung des Sympathicus vermehrten Blutzufluss zu dem cavernösen Gewebe und Hyperämie der Nasenschleimhaut zur Folge habe. Aschenbrandt hingegen hält den nervösen Sehnupfen für eine Affection des Trigeminus resp. des Ramus sphenopalatinus und stützt seine Ansicht auf die Thatsache, dass Reizung dieses Nerven Volumzunahme des cavernösen Gewebes der unteren Muschel, Gefässerweiterungen am Septum und vermehrte Secretion nach sich ziehe. Bei den vielfachen Anastomosen zwischen Trigeminus und Sympathicus ist es am wahrschein-

lichsten, dass sowohl Reizung des ersteren als auch Reizung des letzteren die oben citirten Erscheinungen hervorbringe.

Die Reize, welche den nervösen Schnupfen, nicht selten in Verbindung mit Asthma, hervorrufen, sind ausserordentlich zahlreich. Solche Reize sind z. B. Gerüche der verschiedensten Art, der Geruch von Blumen, Rosen, Veilchen, Reseden, Kamillen, Maiblumen, Pfirsich- und Hollunderblüthen — daher der Name Rosenschnupfen oder Rosenfieber —, ferner der Duft gewisser Speisen aromatischer Substanzen und ätherischer Oele, wie Benzoe, Cumarin, Ol. menth. pip., Perubalsam, Thymol, Moschus etc., ferner die Ausdünstungen mancher Thiere, wie der Katzen, Hunde, Affen, Papageien, Meerschweinchen, Kaninchen und Pferde —, daher der Name Stallfieber. Weitere Reize für die hyperästhetische Nase sind: die Einathmung kalter oder feuchter Luft sowie der heissen, verunreinigten, kohlensäureüberladenen Luft der Theater-, Ball-, Concert- und Restaurationssäle, das Betreten einer lohebedeckten Reitbahn, das Einathmen von Zimmer- und Strassenstaub oder von staubenden Substanzen, wie z. B. Mehl, Kalkstaub, Ipecacuanha, Lycopodium, Digitalis, Salicylsäure, Veratrin. Nicht selten ruft sogar der Wechsel der Körperstellung sowie jener des Zimmers oder des Wohnortes, das Uebernachten auf dem Lande, gleichgiltig zu welcher Jahreszeit, das Verweilen in einem Eisenbahncoupé, der Genuss von Alkohol oder sexuelle Erregung die heftigsten Schnupfen- und Asthma-Anfälle hervor. Bei manchen Personen stellt sich der nervöse Schnupfen jährlich zu derselben Zeit ein, namentlich bei trockenem Wetter und grosser Hitze, während er in feuchten, regnerischen Sommern ausbleibt oder nur andeutungsweise auftritt.

Der nervöse Schnupfen kann mit oder ohne Nieskrämpfe verlaufen, wie auch letztere selbstständig vorkommen. Das Niesen kann minuten-, ja stundenlang anhalten, um plötzlich aufzuhören und bei dem geringsten Reize, welcher die Nase trifft, wieder zu beginnen.

Die schon längst als Heufieber, Heuschnupfen, Heuasthma, Frühsommerkatarrh, Niesefieber, Junischnupfen bekannte Affection ist nach John Mackenzie ihrem Wesen nach ebenfalls ein nervöser Schnupfen, der dem Reize der eingeathmeten Blüthenpollen gewisser Pflanzen seine Entstehung verdankt.

Nach Blackley sind es in Europa besonders die Pollen blühender Gräser, des Roggens, des Hafers, der Gerste, zuweilen auch der Blüthenstaub der Rosen, in Amerika ausser den genannten auch jene der Ambrosia artemisiaefolia und des Wermuths, welche durch ihre mechanischen und chemischen Eigenschaften, hauptsächlich durch ihre zitternde Eigenbewegung, Ausdehnbarkeit und Aufquellungsfähigkeit bei Einwirkung von Feuchtigkeit die Schleimhaut der Nase reizen. Dass der Heuschnupfen in der That durch die erwähnten Pollen bedingt ist, beweist sein Vorkommen zur Zeit der Blüthe jener Pflanzen in Europa von Ende Mai bis Mitte Juli, in Amerika auch noch von August bis September, seine regelmässig jedes Jahr zur bestimmten Zeit erfolgende Wiederkehr, seine der Quantität der

in der Atmosphäre suspendirten Pollen entsprechende Zu- und Abnahme, sein häufiges und heftiges Auftreten auf dem Lande. Die Krankheit befällt mit Vorliebe Männer, ganz besonders gerne Engländer und Amerikaner, verschont aber auch nicht Angehörige anderer Nationen; am stärksten ergriffen werden die gebildeten Kreise, die Städtebewohner, während die Landbewohner und die der Einathmung der Pollen am meisten ausgesetzten Arbeiter auffallend selten erkranken.

Eine dem typischen Frühsommerkatarrh völlig gleiche, im Herbst auftretende und gleichfalls in das Capitel der Rhinitis vasomotoria gehörige Affection bezeichnet man als Catarrhus autumnalis.

Die Ansicht von Wyman, derselbe sei eine nur den Amerikanern eigenthümliche, zur Zeit der Blüthe der Ambrosia artemisiaefolia vorkommende Krankheit, ist wohl unhaltbar, da die Affection nach Hack auch in Deutschland vorkommt, wo die genannte Pflanze keine Rolle spielt.

Der nervöse Schnupfen sowohl wie das eigentliche Heufieber beginnt in der Regel plötzlich und unerwartet oder nach kurzen Prodromalerscheinungen mit einem heftigen, juckenden, kitzelnden Gefühle in der Nase, dem Nasenrachenraum und den Augenwinkeln, welchem intensive Niesanfälle mit profuser, dünner, wässeriger oder dicker, albuminöser Secretion, Thränenträufeln und Lichtscheu nachfolgen; der Geruch kann während der Anfälle erhalten bleiben oder herabgesetzt, ja ganz aufgehoben werden, ebenso kann die Athmung durch die Nase frei bleiben, aber auch durch Schwellung des cavernösen Gewebes ganz unmöglich werden; die Reizung der Conjunctiva steigert sich zuweilen zu förmlicher Chemosis, nicht selten tritt Flimmerscotom auf. Zuweilen ist auch Fieber und quälender Hustenreiz vorhanden. Die Anfälle, die beim gewöhnlichen nervösen Schnupfen sehr oft am Morgen beim Verlassen des Bettes oder am Abend auftreten, dauern manchmal nur einige Minuten, aber auch Stunden oder Tage, ja, wie bei dem eigentlichen Heufieber, Wochen, um erst mit der Beendigung der Grasblüthe aufzuhören und im nächsten Jahre wiederzukehren. Man bezeichnet diese Form des Heufiebers als katarrhalische. In schweren Fällen gesellt sich zu den geschilderten Erscheinungen Asthma, das ganz den Charakter des bronchialen trägt, ebenfalls Stunden, Tage und Wochen anhalten kann und sowohl bei Tag als bei Nacht zum Ausbruch kommt (katarrhalisch-asthmatische Form).

Eine der häufigsten und qualvollsten nasalen Reflexneurosen ist das Asthma.

Die Anfälle stellen sich in der Regel Nachts während des Schlafes oder zur Zeit der Menses oder nach psychischen und sexuellen Erregungen ein, um mehrere Stunden, Tage oder Wochen zu dauern und sich theils plötzlich, theils allmälig zu verlieren; manche Kranke werden jede Nacht, andere nur jede Woche oder einmal im Monat oder noch seltener von Anfällen heimgesucht und sind in der Zwischenzeit meist ganz frei, während bei Anderen auch bei Tage bronchitische

Erscheinungen und Dyspnoe fortbestehen. Vor oder während des Anfalles stellt sich öfters Kriebeln oder Ziehen in der Nase sowie profuser Nasenfluss mit heftigem Niesreiz und Thränenträufeln, allgemeine Abgespanntheit oder Aufgeregtheit ein; zuweilen folgt dem Anfall eine Eruption von Urticaria, Herpes oder anderen Efflorescenzen der Haut nach. Ebenso verschieden wie die Häufigkeit ist die Heftigkeit der Anfälle. Während bei den Einen der volle Symptomencomplex des Asthma sich entwickelt — hochgradigste in- und exspiratorische Dyspnoe, acute Lungenblähung, sibilirende Geräusche, Unregelmässigkeit der Herzthätigkeit, zähe, oft blutige Expectoration —, zeigen Andere nur geringe Dyspnoe, geringe oder gar keine Lungenblähung, keine oder nur unbedeutende sibilirende Geräusche. Wieder andere Kranke werden plötzlich von Bronchitis mit schnurrenden, pfeifenden, giemenden Rasselgeräuschen befallen. Dass diese Affection, das bronchitische Asthma, in der That zum Asthma gehört, beweist sein Vorkommen und Alterniren mit schweren Asthma-Attaken und sein oft plötzliches Verschwinden nach Darreichung eines Narcoticums oder nach Gebrauch einer Luftcur.

Für die Entstehung des nasalen Asthma müssen ausser den bei der Aetiologie des nervösen Schnupfens angegebenen, von aussen in die Nase gelangenden Reizen ganz besonders die innerhalb der Nase producirten Reize, speciell der Contact gegenüberliegender Schleimhautpartien, verantwortlich gemacht werden. Dementsprechend beobachtet man auch am häufigsten Asthma bei polypoiden Hypertrophien und Schleimpolypen der mittleren Muscheln. Ausserdem gibt es nach des Verf. Ansicht Fälle, bei denen das Asthma erst in secundärer Weise durch Vermittelung des Schwellgewebes zu Stande kommt. Erst dann, wenn dieses in horizontaler oder Seitenlage oder durch andere Einflüsse im Schlafe anschwillt, wird der Contact der unteren Muschel mit der Scheidewand oder einer Spina derselben hergestellt und das Asthma ausgelöst. Es ist aber der Contact des Schwellgewebes mit der Scheidewand nicht einmal nöthig; die durch Schwellung des erectilen Gewebes oder durch Hyperämie und vermehrte Nasenschleimsecretion sowie durch Ansaugen der Nasenflügel erzeugte Veränderung des Mechanismus und Chemismus der Athmung genügt bei Neuropathischen allein, um Asthma auszulösen. Substituirt der Schlafende instinctmässig bei plötzlicher Verschliessung der Nase sofort die Mundathmung, so wird er gezwungen, alle Nachtheile der Mundathmung, Einathmung einer kälteren, verunreinigten, wasserärmeren Luft, plötzlich über sich ergehen zu lassen; athmet er bei langsam sich entwickelnder Nasenschwellung unbewusst durch die verengte Nase weiter, so tritt Kohlensäureüberladung des Blutes ein. Wenn ungenügende Nasenathmung resp. ungenügende Zufuhr von Sauerstoff erfahrungsgemäss bei vielen Gesunden schreckhafte Träume, Alpdruck und Jactation erzeugt, so ist nicht zu verwundern, wenn dieselbe bei Neuropathischen zu Asthma und Epilepsie Anlass gibt. Auch Erlenmayer bringt die nächtlichen Anfälle mancher Epileptiker mit Anomalien der nasalen Respiration in Verbindung; überdies sind auch

bereits mehrere Heilungen von Epilepsie nach Behandlung der Nase constatirt.

Das nasale Asthma unterscheidet sich in nichts von dem von anderen Organen ausgelösten Asthma. Von den Nerven der Nase springt der Reiz auf die Vagi über und erzeugt dadurch Bronchialkrampf; der letztere genügt allein zur Erklärung des Asthma und seiner Erscheinungen. Dass aber das Asthma auch einseitig auftreten kann kann Verf. mit Sommerbrodt bestätigen. In den beiden vom Verf. beobachteten Fällen handelte es sich um einseitige Nasenerkrankung; auch trat das Asthma auf der der kranken Nase entspreehenden Lunge auf. Die während und nach dem Anfalle auftretenden bronchitischen Erscheinungen sind secundär und theils Folge des Druckes der sich contrahirenden Bronchialmuskeln auf die zwischen Längs- und Ringmuseulatur eingelagerten Drüsen, theils Folge der durch den Bronehialkrampf erzeugten Circulationsstörung. Die acute Blähung der Lunge ist hauptsächlich die Folge der erschwerten Exspiration, deren Kräfte schwächer sind als jene der Inspiration.

Die sogenannten Asthmakrystalle sind Zerfallsproducte von Eiweisskörpern, die Curschmann'schen Spiralen in die Form kleinster Bronchiolen gepresstes und durch den mühsam ein- und austretenden Luftstrom spiralig gewundenes Mucin und nicht die Ursachen, sondern nur die Produete des Asthma.

Ausser den bisher besprochenen Erscheinungen können auch andere, in theils näher, theils entfernter gelegenen Organen sich abspielende Symptome durch Affectionen der Nase hervorgerufen werden.

Sehr selten ist der einmal vom Verf. und von E. Fränkel beobachtete Speichelfluss. Häufiger sind Neuralgien eines oder mehrerer Aeste des Trigeminus, besonders des Supraorbitalis, ferner die verschiedenen Arten des Kopfschmerzes, die Migräne, der Hinterhaupt-, Stirn-, Scheitelkopfschmerz. Nach des Verf. Erfahrung kommen diese fast ausschliesslich im Gefolge diffuser Verdickungen der unteren und mittleren Muschel oder bei spitzigen, sich in die Muschelsehleimhaut einbohrenden Septumauswüchsen vor. Auch Schwindel, epileptische Anfälle, diese letzteren namentlich bei Kindern in Folge von Anwesenheit eines Fremdkörpers (Wertheimber) und Zwangsvorstellungen (Schech), können von der Nase und ihren Adnexen aus erregt werden.

Nicht selten ist der nasale Husten in Form von Krampfhusten.

Derselbe beginnt bald früh Morgens, bald während des Tages, bald in der Nacht plötzlieh unter lebhaftem Kitzelreiz, dauert bald nur einige Minuten, bald mehrere Stunden und eharakterisirt sich durch den Mangel jeglichen Auswurfs und völlige Intactheit des Kehlkopfes, der Bronchien und der Lunge. Der hochgradigste Fall, den Verf. gesehen, betraf einen herkulisch gebauten jungen Mann mit symptomlos verlaufenden Nasenpolypen, nach deren Entfernung die täglich Morgens zwischen 8—11 Uhr auftretenden enormen Hustenanfälle völlig verschwanden. Das der von der Nase ausgelöste Husten — der Trigeminushusten von Wille und Schadewaldt —

der constante Begleiter des Asthma sei und sich stets durch Berührung, Sondirung oder Elektrisiren der Nasenschleimhaut willkürlich erzeugen lasse, kann Verf. nicht bestätigen.

Das plötzliche Auftreten von bronchitischen Erscheinungen theils in Folge von Fluxion, theils von mässigem oder partiellem Bronchialkrampf, wurde bereits bei der Besprechung des Asthma erwähnt.

Zuweilen springt der Reiz von der Nase auf den Plexus cervicobrachialis über und erzeugt neuralgische Schmerzen in den Oberarmen, Stechen auf der Brust und zwischen den Schulterblättern. Auch Parästhesien des Rachens haben nicht selten ihren letzten Grund in Erkrankungen der Nase.

Noch eine grosse Anzahl anderer Erscheinungen hat man mit Nasenerkrankungen in Verbindnng stehen gesehen; so Blepharospasmus, Krämpfe im Bereiche des Facialis, klonische Krämpfe der Gaumensegelmusculatur, Keuchhusten, Morbus Basedowii, nervöses Herzklopfen, Stenocardie, Dyspepsie, Erbrechen, Enuresis noctura, Erblassen der äusseren Haut mit Frieren und Schüttelfrösten (Sommerbrodt, Scheinmann, Ziem). Die neueste Behauptung von Fliess, für das Entstehen von Magenneuralgie sei charakteristisch ein Punkt im vorderen Drittheil der linken mittleren Muschel und für Dysmennorrhoe ein Punkt an den unteren Muscheln und am Tuberculum septi beiderseits, bedarf noch sehr der weiteren Bestätigung.

In praktischer Hinsicht ist es unbedingt geboten, beim Auftreten der genannten Reflexerscheinungen, namentlich des Asthma, der anfallweise auftretenden Bronchitis, des Kopfschmerzes, Schwindels, Trigeminusneuralgien etc., die Nase auf das Sorgfältigste zu untersuchen oder an competenter Stelle untersuchen zu lassen, selbst dann, wenn keine Beschwerden von Seite der Nase geklagt werden oder die betreffenden Erscheinungen sich aus anderweitigen Organerkrankungen erklären liessen; es sei hier nur erinnert an einen von E. Fränkel mitgetheilten Fall von Asthma bei einer Dame, welche mit einem linksseitigen Klappenfehler behaftet war und durch Behandlung eines anfangs als nebensächlich betrachteten Nasenleidens radical von ihrem Asthma befreit wurde.

Ebenso muss aber auch vor übereilten Diagnosen und Speculationen dringend gewarnt werden. Die Lehre von den Reflexneurosen war eine Zeit lang leider in ein Stadium getreten, welches die Skepsis nicht nur berechtigt erscheinen liess, sondern geradezu herausforderte.

Die Diagnose stützt sich einestheils auf die subjectiven Beschwerden, anderntheils auf den objectiven Befund, namentlich auf die leichte Schwellbarkeit des cavernösen Gewebes, die Hyperästhesie der Schleimhaut bei Sondenberührung, chronische hyperplastische Rhinitis, polypoide Excrescenzen und Schleimpolypen, Deviationen und Auswüchse des Septum, Verwachsungen, chronischen Katarrh des Rachens, adenoide Wucherungen, Hyperplasien der Gaumenmandeln,

Erkrankungen der Bursa pharyngea, Nasenrachenpolypen. Bei nervösem Schnupfen entscheidet das plötzliche und regelmässige, nach Einwirkung der früher genannten Schädlichkeiten oder wie bei Heufieber das zur Zeit der Grasblüthe erfolgende Auftreten der Erscheinungen sowie die etwaige Anwesenheit materieller Veränderungen der Nase und anderweitiger nervöser Symptome. Sehr schwer wird der Nachweis des nasalen Ursprunges bei den in entfernteren Organen sich abspielenden Symptomen, wenn keine oder nur geringfügige materielle Erkrankungen der Nase sich vorfinden und auch andere Organe, welche die geklagten Erscheinungen hervorrufen könnten, normal befunden werden.

Der sicherste Beweis, dass die jeweilig geklagten nervösen Erscheinungen von der Nase ausgehen, wäre ihre experimentelle Erzeugung durch Sondenreiz. Die Erzeugung von Asthma, Neuralgie etc. oder des von Schadewaldt-Wille als sicheren Beweises für den nasalen Ursprung behaupteten Trigeminushustens gelingt recht selten, wie Verf. in Uebereinstimmung mit Heymann constatiren muss. Dagegen lassen sich sehr oft ganz besonders empfindliche Stellen der Nasenschleimhaut eruiren, deren Berührung bei dem Patienten Niesreiz, Thränenträufeln, Erbleichen, Pulsverlangsamung, Schwäche oder Ohnmacht zur Folge hat. Hat man durch sorgfältiges Abtasten mit der Sonde die Reizstelle oder die hyperästhetische Zone gefunden, dann mache man den Versuch, den ausbrechenden oder ausgebrochenen Anfall durch Cocaïnisiren dieser Stelle zu coupiren oder abzukürzen. Gelingt dies nach 5—10 Minuten, dann ist der Beweis für den nasalen Ursprung der Neurose geliefert. Der negative Ausfall des Experimentes kann jedoch nicht für das Gegentheil verwerthet werden, weil bei Anwesenheit mehrerer Reflexzonen die richtige Stelle nicht vom Cocaïn berührt worden sein konnte, oder wenn sie wirklich getroffen wurde, das angewandte Mittel zur Erzeugung von Areflexie zu schwach war, oder endlich, weil der pathologische Reflex nicht mehr gehemmt werden konnte. Auch die dem Ausbruche des Asthma oder anderer Reflexe vorausgehenden oder dieselben begleitenden nasalen Symptome sind nicht absolut beweisend; denn einerseits treten nasale Erscheinungen auch bei solchen Kranken auf, deren Asthma nicht von der Nase ausgeht, andererseits fehlen sie nicht selten bei solchen, deren Asthma unzweifelhaft nasalen Ursprunges ist.

Diese Unsicherheit in der Diagnose führt nothwendigerweise auch in der Praxis zu mannigfaltigen Zweifeln und Bedenken. Soll ich die Nase dieses oder jenes Kranken behandeln oder nicht? ist die Frage, welche sich der gewissenhafte Arzt immer wieder vorlegt. Da, wo materielle Veränderungen und Störungen der Nasenathmung vorhanden sind, ist die locale Behandlung nicht nur angezeigt, sondern geradezu geboten. Ganz besonders gilt dies für die Asthmatiker, welche meist keine Ahnung haben, dass sie nasenkrank seien und dass davon ihr Leiden herrühren könne. Wie oft dies der Fall ist, beweist eine vom Verf. auf Grund eigener Beobachtungen hergestellte Statistik, nach welcher sich nahezu 64% aller Asthmatiker als nasenkrank

erwiesen, welcher Procentsatz M. Schmidt noch viel zu klein erscheint. Eine locale Behandlung ist ferner auch angezeigt in jenen Fällen, bei denen sich keine oder nur unbedeutende materielle Veränderungen der Nase vorfinden und trotzdem sich die Erscheinungen durch Sondenberührung hervorrufen oder durch Cocaïn beeinflussen lassen.

Der Nutzen der localen Behandlung besteht in erster Linie in der Aufhebung des anormalen Contactes und Reizes gegenüberliegender Schleimhautpartien, in der Beseitigung des directen Druckes und Zuges auf die Nervenfasern der erkrankt gewesenen Partien, in der Wiederherstellung der nasalen Respiration und normaler Circulationsverhältnisse des Blutes und der Lymphe in der Nase und dem Gehirne.

Dass die locale Behandlung der centralen Reflexneurosen bei intacter Nasenschleimhaut auch als Gegenreiz, also als Revulsivum, nach Lichtwitz als Vesicans oder Derivans, wirkt, wie Mc. Bride annimmt, durch moleculäre Veränderung in einem gewissen Gebiet des Gehirns oder, wie Verf. glaubt, durch Beseitigung der Circulationsstörung, soll nicht geleugnet werden, ebensowenig wie die Thatsache, dass manche Asthmatiker sich erleichtert fühlen, wenn spontan oder künstlich Niesen sich einstellt. Deswegen aber das Asthma für eine pathologische Umwandlung des Niesactes zu erklären, die verschwinde, wenn es gelänge, den Trigeminus wieder zu seinen normalen Reflexen zu veranlassen, wie dies Wille und Schadewaldt gethan haben, erscheint mehr als gewagt. Dass, wie dieselben Autoren behaupten, es völlig gleichgiltig sei, ob die Nase materielle Veränderungen aufweise oder nicht, ist absolut unrichtig. Wäre diese Ansicht richtig, so müsste bei Anwesenheit von Hypertrophien oder Schleimpolypen die einfache Sondenberührung oder das Elektrisiren oder Cauterisiren der Polypen oder irgend eines anderen beliebigen Punktes der Nase behufs „Entladung der elektrisch gespannten Nerven“ schon genügen, das Asthma zu beseitigen; dass aber nur die gründliche Ausrottung der Polypen das Ausbleiben des Asthma zur Folge hat, das Wiederwachsen derselben von Neuem aber hervorruft, weiss Jeder, der mit Asthmatikern viel zu thun gehabt.

Es soll hier nicht verschwiegen werden, dass Reflexneurosen durch Behandlung der Nase erst erzeugt oder schon bestehende verschlimmert werden können. So sah Réthi mehrmals heftige Niesanfälle, Schwindel, Schwere im Kopfe, Erstickungsgefühl auftreten nach galvanokaustischer Behandlung resp. Narbenbildung an den Muscheln und am Septum.

Die Prognose der Reflexneurosen ist stets zweifelhaft zu stellen. Wenn auch eine nicht unbeträchtliche Anzahl derselben eine günstige Prognose zulässt, so muss doch nachdrücklichst betont werden, dass Schein- und Misserfolge sowie Recidiven durchaus nicht selten sind. Verf. muss dringend rathen, den meist schon vielfach behandelten und mit übertriebenen Hoffnungen erfüllten Kranken kurz und bündig zu erklären, dass man zwar eine Behandlung der

erkrankten Nase für angezeigt halte, aber durchaus nicht für den Erfolg garantiren könne.

Ganz besonders gilt dies für das Asthma, das auch ohne Behandlung oft lange Pausen macht. Die besten Erfolge, definitive Heilung, erzielt man in frischen Fällen; geringe Erfolge da, wo die Anfälle schon jahrelang bestanden und sich schon Emphysem und Herzdilatation entwickelt haben; ab und zu ist jedoch auch bei veralteten Fällen noch Besserung zu erzielen. Sehr gering oder völlig negativ sind ferner die Resultate der rein localen Behandlung in jenen Fällen, in welchen die Reflexe, so namentlich Kopfschmerz, die verschiedenen Neuralgien und ganz besonders das Asthma, auch noch von anderen Organen (Haut, Sexualorganen, Magendarmcanal) ausgelöst oder wenigstens von dort aus unterhalten werden, oder wenn die Anfälle auf die geringfügigste Veranlassung hin auftreten, wie z. B. beim Wechsel des Wohnortes, minimalen Temperaturdifferenzen, Eintritt der Menses, Gemüthsbewegungen. Asthmatiker werden häufig nur insoferne gebessert, als ihre Anfälle seltener und weniger heftig auftreten oder einen anderen Charakter annehmen.

Die Prognose des nervösen Schnupfens und des Heufiebers ist insoferne ungünstig, als die zu diesen Affectionen Disponirten meist von Neuem erkranken; günstig insoferne, als durch zweckmässige Behandlung der kranken Nase und des hyperästhetischen Nervensystems das Uebel definitiv geheilt werden kann. Eine günstige Prognose gestattet die abnorme Schwellbarkeit des cavernösen Gewebes, eine minder gute die rothe Nase und des Morbus Basedowii. Wenn auch bereits mehrere geheilte Fälle von Hopmann, Hack, B. Fränkel, Stokes und neuerdings von Musehold vorliegen, so darf man nicht vergessen, dass Semon einmal die Symptome dieser Krankheit einige Tage nach einer galvanokaustischen Operation in der Nase auftreten sah.

Die Heilung kommt selten plötzlich zu Stande; in der Regel bedarf es wiederholter Eingriffe und längerer sorgfältigster, namentlich auch allgemeiner Behandlung.

Die Behandlung der Reflexneurosen muss eine locale und allgemeine sein. Die allgemeine Behandlung bezweckt die Beseitigung der vorhandenen Nervenschwäche sowie aller jener Momente, welche sich im Einzelfalle als besonders wirksame Reize erwiesen haben (Scheinmann). Dazu dienen methodische Abhärtung, Seebäder, Kaltwassercuren, Aufenthalt im Hochgebirge, Fusstouren, Turnen, innerlich Arsen, Eisen, Bromkali (sehr zweckmässig als Bromwasser), Chinin, ferner Vermeidung geschlechtlicher Excesse, Behandlung von Spermatorrhoe, Impotenz etc. Die locale Behandlung hat da, wo materielle Veränderungen vorhanden sind, nach den in den betreffenden Capiteln niedergelegten Principien zu geschehen.

Bei periodischer Schwellung des cavernösen Gewebes empfiehlt sich das Ziehen von Längsfurchen, das submucöse Vorschieben eines galvanokaustischen Spitzbrenners bis auf die Knochen an verschiedenen Stellen der Muscheln, eventuell parenchymatöse Ein-

spritzungen von Jod, Ergotin oder Sclerotinsäure; Kafemann und Flatau empfehlen die Elektrolyse. Die Behandlung der rothen Nase ist im Allgemeinen eine undankbare. Die gewöhnlich verordneten medicamentösen Umschläge, Bepinselungen, Waschwasser und Salben nützen nur dem Apotheker. Ein Versuch mit Ergotin innerlich ist jedoch gerechtfertigt; Unna empfiehlt die äussere und innere Anwendung des Ichthyols und des sulfoichthyolsauren Ammoniums. (Ichthyoli 1·0—3·0, Lanolini 10·0 als Salbe; Ammon. sulfoichthyol. 5·0—10·0, Aqua destill. 20·0. D. S. 2mal täglich 15—20 Tropfen allmälig steigend innerlich.) Besondere Erfolge hat Verf. davon auch nicht gesehen. Am meisten zu empfehlen ist die methodische Stichelung und das Aufschlitzen der erweiterten Gefässe.

Die Behandlung des nervösen Schnupfens und des Heufiebers sowie des Catarrhus autumnalis muss bei Anwesenheit pathologischer Veränderungen eine locale sein, ausserdem auch noch eine medicamentöse. Fernbleiben von den veranlassenden Schädlichkeiten ist nöthig bei nervösem Schnupfen; bei Heufieber empfehlen sich Seereisen, Aufenthalt an der See, auf Inseln (Borkum, Helgoland) oder in einer Stadt oder in heufieberfreien Gegenden (Heufieberasyle in Amerika), Hüten des Zimmers zur Zeit der Grasblüthe, Verstopfen der Nasenlöcher mit Watte, Tragen eines engmaschigen Schleiers oder Respirators oder einer Brille mit breiten, die Augenhöhlen genau umschliessenden Rändern. Zur Abkürzung der Anfälle empfehlen sich Einathmungen von Amylnitrit 2—5 Tropfen, Kampher-, Chloroform mit Perubalsam-, Carbolsäure-, Menthol-, Salmiakdämpfen, Einträufelung von 5—10% Cocaïnlösung oder Insufflation von Cocaïn oder Morphiumpulver in die Nase, oder subcutan Morphium 0·002 bis 0·003.

Gegen nervösen Husten empfehlen sich Bromkali, Chloral, Cocaïn, Opium, Morphium; Beschorner rühmt Trochisci aus 0·01 Cocaïn und 0·005 Morphium.

Als Palliativa während der Asthma-Anfälle sind zu verordnen: Hautreize, Senfteige, heisse Umschläge auf Brust und Hals, heisse Fuss- und Handbäder; Atropin 0·001—0·002, Cocaïn 0·04, Morphium 0·02—0·03 pro dosi subcutan; Einathmungen von 2 bis 5 Tropfen Amylnitrit, 20% Mentholöl, Pyridin, Chloroform, Salpeterpapier, Strammonium- und Cannabis indica-Cigaretten; innerlich Chinin, Extr. Quebracho, Chloral oder Morphium mit Jodkali (Chlorali 5·0 oder Morph. mur. 0·1, Kali jodati 3·0, Aq. destill. 150·0, Succ. liq. 10·0, anfangs halbstündlich, dann einstündlich 1 Esslöffel), bei unregelmässiger Herzthätigkeit Digitalis. Auch die von Schäffer geübte Faradisation der Vagi unterhalb und einwärts der Kieferwinkel in ½—1stündiger Sitzung wirkt zuweilen überraschend. In der anfallfreien Zeit empfiehlt sich der längere Gebrauch der Tinct. Lobel. oder von Kali jodat. 2·0, Tinct. Lobel. infl. 30·0 3mal täglich 30—40 Tropfen zu nehmen (M. Schmidt). Auch Arsenik und Bromkali sind zu versuchen. Selbstverständlich müssen auch die neuropathische Anlage sowie allenfalls bestehende Constitutionsanomalien, ferner gastrische

und sexuelle Störungen mit den entsprechenden Mitteln bekämpft werden. Gegen inspiratorisches Ansaugen der Nasenflügel empfiehlt sich das Tragen des Feldbausch-Schmidt'schen Instrumentes während der Nacht. Von grösster Wichtigkeit ist die Wahl eines passenden Luftcurortes. Es ist oft recht schwer, den richtigen Ort zu treffen, zumal jeder Asthmatiker, wie M. Schmidt treffend sagt, sein Privatklima hat. Während ein Theil der Asthmatiker sich nur wohl fühlt am Meere, taugt für den anderen Theil nur das Höhen- resp. Gebirgsklima. So ist namentlich ein längerer Aufenthalt in St. Moritz, Pontresina, Silvaplana, Davos, Zermatt, Rigi Scheideck und Rigi Kaltbad, Seligsberg, Axenstein, Aussee, Ischl zu empfehlen; noch besser aber, wenn damit eine Kaltwassercur verbunden werden kann, wie z. B. in Schönegg am Vierwaldstättersee, Felsenegg und Schönfels am Zugersee. Auch Orte mit geringerer Bodenerhebung werden oft sehr gut ertragen, wie z. B. Badenweiler, Triberg, St. Blasien, Herrenalb, Falkenstein etc. Bei hochgradigem Emphysem ist auch die Behandlung mit comprimirter Luft oder der pneumatischen Kammer zu versuchen. Sehr empfindliche, namentlich gegen Wind und Feuchtigkeit empfindliche Kranke schicke man den Winter über an die Riviera und lasse sie erst dann in die Heimat zurückkehren, wenn sie noch einige Zeit in einer Uebergangsstation (Meran, Gries, Genfersee) zugebracht haben.

Die

Krankheiten der Nebenhöhlen.

Anatomisch-physiologische Vorbemerkungen.

Mit der Nasenhöhe stehen die Nebenhöhlen, auch Sinus, pneumatische Räume oder Anhänge genannt, in Verbindung.

Die grösste und klinisch wichtigste der Nebenhöhlen ist die paarige Kiefer- oder Highmorshöhle, der Sinus maxillaris.

Sie besitzt eine unregelmässige pyramidale Gestalt, ihre Spitze ist dem Jochfortsatze zugekehrt, ihre obere orbitale Wand wird durch die Augenhöhle und Seitenplatte des Oberkieferbeines gebildet, ihre vordere oder faciale Wand besitzt eine seichte Vertiefung, die Fossa canina, die bei der mongolischen Race fehlt, ihre hintere Wand ist gehöhlt, an der Oberfläche convex, ihre Basis oder innere Wand, welche sie von der Nasenhöhle scheidet, besteht aus Theilen des Oberkiefers, Gaumenbeines, der unteren Muschel und des Hakenfortsatzes des Siebbeines. Die Grösse der Kieferhöhle unterliegt, was praktisch von der grössten Bedeutung ist, ausserordentlichen Variationen. Bald reicht sie so weit herab wie die Nasenhöhle, bald steht ihre untere Begrenzung höher als diese, bald erstreckt sie sich weit in den Alveolarfortsatz herab. Die Kieferhöhle des Mannes unterscheidet sich nach Rüdinger und Reschreiter von der des Weibes durch ihre regelmässige Form, Grösse und Gestaltung der Vorderfläche, ganz besonders aber dadurch, dass sie über das Niveau der Nasenhöhle nach abwärts ragt. Beim Weibe steht der Sinus mit dem Niveau der Nasenhöhle in einer Ebene oder erreicht dasselbe gar nicht. Der Kubikinhalt der Kieferhöhle ist ausserordentlichen Schwankungen unterworfen und beträgt nach Catlin $2^1/_2$—20 Gramm, durchschnittlich 7 Gramm. Sie beherbergt verschieden grosse Buchten, von denen die Alveolarbuchten die wichtigsten sind und welche theils durch Faltungen der Bekleidungsmembran, theils durch Knochenkämme

mehr oder weniger von einander geschieden sein können. Die Scheidung kann eine so vollständige sein, dass gewissermassen zwei Kieferhöhlen nebeneinander liegen oder dass der untere Theil von dem oberen Theil der Höhle getrennt ist. Bei stark entwickelter Alveolarbucht finden sich gewöhnlich Prominenzen der Zahnalveolen. Die papierdünne, in den Sinus hineinragende Alveole besitzt häufig Lücken oder die Kuppel fehlt ganz und dann steckt die Wurzel des Zahnes frei in der Kieferhöhle. Die Bekleidungsmembran der Höhle ist von verschiedener Dicke und enthält acinöse und tubulöse Drüsen, die nach Paulsen zu den Eiweissdrüsen gehören, und dient theils als Schleimhaut, theils als Matrix einer Beinhaut für die Wandungen der Höhle.

Die Communicationsöffnung mit der Nase kann erst gesehen werden, wenn die mittlere Muschel abgetragen wird. Man erblickt dann an der äusseren Nasenwand einen von vorne oben nach hinten unten bogenförmig verlaufenden, circa $1^1/_2$—2 mm breiten Spalt, den Hiatus semilunaris, der unten von dem Processus uncinatus und oben von einer Hervorwölbung des Siebbeines der Bulla ethmoidalis begrenzt wird, deren Grösse und Ausdehnung sehr verschieden ist. Zuweilen ist die Bulba so beträchtlich, dass der Hiatus durch dieselbe förmlich überwölbt und die mittlere Muschel verdrängt wird. Blickt man in den Hiatus, so sieht man eine mehrere Millimeter tiefe Ausbuchtung, das Infundibulum, an dessen hinterem Ende sich eine Oeffnung, das Ostium maxillare, befindet, während am vordersten obersten Theile eine fast senkrecht aufsteigende zweite Oeffnung, das Ostium frontale, sichtbar wird. Von der Kieferhöhle aus betrachtet, befindet sich die Communicationsöffnung im obersten Theile der Höhle an der vorderen unteren Orbitalwand; sehr oft findet sich noch eine zweite Communicationsöffnung im hinteren Theile des unteren Nasenganges oder im mittleren Nasengange gegenüber der Mitte der mittleren Muschel; an diesen Stellen fehlt meist der Knochen völlig oder ist durch eine Membran ersetzt.

Der paarige Sinus frontalis, die Stirnhöhle, gleicht einer dreiseitigen Pyramide, deren Spitze in dem aufsteigenden Theile des Stirnbeines liegt und deren Basis von dem Uebergang der Schuppe in das Orbitaldach gebildet wird. Zwischen dem Sinus der rechten und linken Seite befindet sich meist eine verschieden dicke Scheidewand, doch kann dieselbe auch fehlen. Wie ihre Form, so ist auch ihre Grösse sehr variabel; bald überschreitet sie nur um ein Geringes die Augenbrauenbögen, bald erstreckt sie sich bis in die Jochfortsätze des Stirnbeines, bald reicht sie in sagittaler Richtung blos in den vordersten Abschnitt des Orbitaldaches hinein, dehnt sich aber auch über dem Orbitaldache in die Lamina cribrosa zu den Seiten der Crista galli tief nach hinten gegen das Keilbein zu aus oder steigt zwischen den Augenbrauenbögen noch ein Stück weit hinauf in das Stirnbein, zwischen die Lamellen desselben sich fortsetzend; bei vielen Menschen ist die Stirnhöhle in mehrere grössere oder kleinere Abtheilungen getheilt, bei Anderen ist sie sehr klein und kaum angedeutet,

bei Einigen fehlt sie ganz; sehr oft sind sie in einer Person ungleich entwickelt. Bei grossem Umfange der Höhle ist meist die orbitale Wand die dünnste, weshalb in solchen Fällen Eiteransammlungen leicht in die Orbita durchbrechen.

Die Stirnhöhle steht mit der Nase durch einen 10—12 mm langen knöchernen Gang, den Ductus nasofrontalis, in Verbindung, dessen Mündung, wie oben beschrieben, in dem vorderen oberen Ende des Infundibulum liegt. Nicht selten theilt sich der Ductus etwa 10 mm über dem höchsten Punkte des Infundibulum in zwei Gänge, wovon der eine mehr senkrecht aufsteigende in die am meisten nach unten gelegene Kammer der Stirnhöhle, der andere schief nach oben und hinten gehende in eine höher und weiter hinten und aussen gelegene Abtheilung mündet. Zuweilen findet sich, namentlich dann, wenn sich der Sinus sehr weit nach rückwärts zieht, noch eine zweite Communicationsöffnung vor dem vorderen Ende der obersten Muschel, und nach Zuckerkandl sogar noch eine dritte in einem Recessus zwischen mittlerer Muschel und Siebbeinlabyrinth. Der Ausführungsgang der Stirnhöhle ist am günstigsten situirt, auch findet, wie die Erfahrung lehrt, ein Verschluss desselben seltener statt als bei jenen der anderen Nebenhöhlen.

Sehr verborgen liegt der unpaarige Sinus sphenoidalis, die Keilbeinhöhle. Ihre vordere obere Wand und die seitlichen Wände sind dünn und compact, während auf die hintere und untere Wand eine Schichte spongiösen Knochengewebes folgt; zuweilen ist die Keilbeinhöhle von der Schädelhöhle ringsum durch äusserst dicke Knochenlamellen getrennt, wodurch das Uebergreifen einer Sinuserkrankung auf die Nachbarschaft wesentlich erschwert wird; zuweilen ist die Höhle excessiv gross, fast immer aber ist sie durch eine Scheidewand in zwei Hälften getheilt und sendet Buchten in die Pars basilaris ossis occipitis und in die grossen und kleinen Keilbeinflügel und flügelförmigen Fortsätze hinein. Nicht selten bildet die Keilbeinhöhle gewissermassen nur eine Fortsetzung der hinteren Siebbeinzellen und ist von dieser durch eine papierdünne Knochenlamelle getrennt. Von grosser klinischer Bedeutung ist die Dicke der Knochen zwischen der Keilbeinhöhle und dem Canalis opticus; sie schwankt zwischen Papierdünne und 7 mm, woraus sich erklärt, dass in ersterem Falle dem Sehnerven bei Krankheiten der Keilbeinhöhle grössere Gefahr droht als in letzterem. Endlich gibt es auch Fälle, bei welchen das Siebbeinlabyrinth sich so weit nach hinten ausdehnt, dass die vordere Wand des Keilbeinsinus hinter dem Sehnervencanale liegt, mithin der letztere überhaupt nicht mehr an die Keilbeinhöhle grenzt (Berger-Tyrmann).

Die verschieden grosse, rundliche oder schlitzförmige, meist doppelseitig, zuweilen nur einseitig vorhandene Communicationsöffnung mit der Nase liegt oberhalb des hinteren Endes der mittleren Muschel oder gerade unter dem Nasendache auf der vorderen Wand der Höhle, meist oberhalb der Mitte derselben, für den Secretabfluss fast ebenso ungünstig wie bei der Kieferhöhle.

Sehr zahlreich sind die pneumatischen Räume des Siebbeines, des Sinus ethmoidalis.

Sie liegen in den Seitentheilen des Siebbeines und bestehen aus Zellen von sehr verschiedener Grösse und Zahl, die sowohl unter sich als auch mit der Nasenhöhle communiciren. Man unterscheidet vordere, mittlere und hintere Siebbeinzellen; die lateral gelegenen sind oft so stark entwickelt, dass durch sie das Orbitaldach vorgewölbt wird. Die mittleren und hinteren Zellen münden in den oberen Nasengang oder stossen direct an die Keilbeinhöhle. die vorderen communicieren mit dem mittleren Nasengange wiederum durch Vermittelung des Hiatus semilunaris etwas hinter der Mündung des Sinus frontalis.

An der normalen Nase des lebenden Menschen sind die Ausführungsgänge der Nebenhöhlen kaum zu sehen; Jurasz gibt an, die Mündung der Stirnhöhle öfters gesehen zu haben, was dem Verf. und auch Hansberg bisher noch nicht gelang; einmal erblickte Verf. die accessorische Mündung des Sinus maxillaris bei einem jungen Mädchen, dessen rechte mittlere Muschel auffallend stark gegen die Scheidewand zu aufgerollt erschien.

An kranken Nasen hingegen, so namentlich bei atrophischer Rhinitis oder nach Verlust der unteren oder mittleren Muschel sowie des Septum, hat man öfters Gelegenheit, sowohl den Hiatus semilunaris und die accessorische Oeffnung für die Kieferhöhle, als auch die Mündung der Keilbeinhöhle zu sehen.

Die physiologische Bedeutung der Nebenhöhlen ist immer noch nicht aufgeklärt. Während die Einen glauben, dieselben seien nur dazu da, die Schwere des Schädels zu vermindern und dadurch die Beweglichkeit des Kopfes zu erleichtern, meinen die Anderen, sie seien dazu bestimmt, eine schleimige Flüssigkeit abzusondern und damit die Nase feucht zu erhalten oder endlich auch, um die inspirirte Luft zu erwärmen.

Braune und Clasen halten die erstere Ansicht für unwahrscheinlich, weil der Schädel, wenn die Nebenhöhlen statt mit Luft mit Knochenmasse gefüllt wären. doch nur um ein Geringes schwerer wäre, was kaum in Betracht käme. Gegen die letztere Ansicht spräche nicht nur die Beschaffenheit der Sinusschleimhaut, die sehr dünn, arm an Gefässen und zu einer regelmässigen Schleimproduction untauglich wäre, sondern auch die hohe Lage der Abflussöffnungen, aus welchen das Secret nur in ungewöhnlicher Körperstellung abfliessen könne. Was die Erwärmung der eingeathmeten Luft anlangt, so wissen wir, dass dieselbe in der Nase geschieht und dass die Nebenhöhlen dabei betheiligt sind. Die von Braune und Clasen aufgestellte Theorie, die Nebenhöhlen dienten zur Verschärfung des Geruches, ist sehr unwahrscheinlich, da, wie Zuckerkandl hervorhebt, im Bereiche der Riechspalte nur die Mündungen der hinteren Siebbeinzellen, der kleinsten und unbedeutendsten Räume, liegen. Richtig ist hingegen die Beobachtung der obengenannten Autoren, dass in den Nebenhöhlen

bei der Inspiration eine Luftverdünnung, bei der Exspiration eine Luftverdichtung zu Stande kommt. Zu ähnlichen Resultaten gelangte auch Paulsen. Er fand, dass unter gewöhnlichen Verhältnissen beim Durchstreichen eines continuirlichen Luftstromes der Luftwechsel in den Nebenhöhlen ein höchst unbedeutender ist, dass derselbe aber sofort ergiebiger wird, wenn der Luftstrom zeitweise gehemmt oder, wie unter normalen Verhältnissen, einmal nach innen und einmal nach aussen gerichtet ist.

Nach Kessel und M. J. Weber bilden die Nase, ihre Nebenhöhlen und das Mittelohr mit seinen anhängenden Zellen ein um das Vorder- und Mittelhirn herum liegendes System von Hohlräumen, welche Wasserdampf, Kohlensäure, Ammoniak und Wasser an dasselbe abgeben und deshalb als Respirationsorgane des Vorder- und Mittelhirns aufgefasst werden können. Merkel hält die Nebenhöhlen für Resonanzböden der Stimme, deren Töne dadurch voll, weich und elastisch würden, während Sandmann in denselben Schalldämpfer und rudimentäre Organe sieht, deren eigentliche Bestimmung, die Aufnahme von Riechwülsten, bei der Rückbildung des Riechorganes geschwunden sei.

Missbildungen, Formfehler und sonstige Anomalien.

Die Nebenhöhlen der Nase zeigen sehr verschiedene und sehr grosse Anomalien der Form und anderweitige Veränderungen.

Asymmetrische Entwicklung der Nebenhöhlen, selbst an einem und demselben Schädel, sind ganz gewöhnlich; abnorme Grösse resp. Erweiterung der Kieferhöhle ist nach Zuckerkandl bedingt durch sehr tiefe Aushöhlung der Alveolarfortsätze (Alveolarbucht) oder durch Excavation des Nasenbodens, wobei sich die Highmorshöhle zwischen die Platten des harten Gaumens erstreckt (Gaumenbucht), durch Ausbreitung der Höhle in den Stirnfortsatz des Oberkiefers, durch Buchten zwischen stark vortretenden Nervencanälen (Infraorbitalbucht), durch Ausweitung an der Verbindung des Oberkiefers mit dem Jochbein und endlich durch Einbezogenwerden eines Divertikels der Pars orbitalis ossis palati. Verkleinerung, Verkümmerung und Defect der Kieferhöhle treten auf: durch mangelhafte Resorption der Kieferspongiosa, durch Annäherung der äusseren Kieferwandung an die innere, durch mächtige Ausbauchung der äusseren Nasenwand, durch Verdickung der Kieferwände und endlich durch Retention von Zähnen im Alveolarfortsatze.

Die Diagnose der Verengerungen gründet sich auf den rhinoskopischen Befund resp. die Hervorwölbung der äusseren Nasenwand, auf die tiefe Einsenkung der Fossa canina und die Asymmetrie des Gesichtes. Die erwähnten Grössenanomalien sind praktisch deshalb von Wichtigkeit, weil dieselben auf die Ausbreitung von angesammelten

Flüssigkeiten, Ausdehnung und Eröffnung der Höhle Einfluss haben. So kann z. B. in einem engen Sinus die angesammelte Flüssigkeit sich nur wenig ausbreiten, auch wird bei Höhlen mit sehr verdickten Wandungen eine Ausdehnung sehr schwer oder gar nicht zu Stande kommen. Nicht selten wird die Kieferhöhle durch knöcherne Scheidewände in mehrere grössere oder kleinere Abtheilungen zerlegt, welche mit einander durch eine schmale Spalte communiciren, aber auch, wie W. Gruber beobachtete, vollständig von einander abgeschlossen sein können.

Dehiscenzen der Highmorshöhle treten in dreierlei Form auf. Am häufigsten bilden sie sich im Alter durch Schwund der Knochensubstanz aus, die Wandungen werden papierdünn, durchsichtig und stellenweise treten Lücken auf; in anderen Fällen entwickeln sich die Dehiscenzen am Grund von Gefässcanälen und endlich auch in Folge einer Bildungshemmung des Knochensystems.

Auch an der Stirnhöhle sind abnorme Erweiterungen und Verengerungen sowie Dehiscenzen und völliges Fehlen beobachtet. Lückenbildung der Stirnhöhlenwände ist bedingt durch Bildungsanomalien oder Atrophie oder Erkrankung der Stirnbeintafeln. Bei Mangel der Keilbeinhöhle findet sich an der vorderen Wand des Keilbeinkörpers statt des Processus sphenoideus ein Grübchen als Anfang der Höhlenbildung; in diesem Grübchen steckt ein flaschenförmiger Anhang der Nasenschleimhaut. Zuweilen wölbt eine hintere Siebbeinzelle die vordere Wand der Keilbeinhöhle unter Verlegung ihres Ausführungsganges nach hinten. Die Siebbeinzellen können zuweilen völlig fehlen, aber auch doppelt vorhanden sein; auch kommen Dehiscenzen der Lamina papyracea mit Eröffnung der Siebbeinzellen gegen die Augenhöhle vor.

Allgemeine Pathologie.

Zu den häufigsten Erkrankungen der Nebenhöhlen gehören die acuten und chronischen Entzündungen der Sinusmembran, welcher nicht nur die Rolle eines Periosts, sondern auch die einer Schleimhaut, allerdings einer Schleimhaut mit geringer Drüsenentwicklung, zukommt.

Bei der acuten katarrhalischen Entzündung der Nebenhöhlen (Sinuitis acuta catarrhalis) erscheint die Schleimhaut mehr oder weniger geschwellt, geröthet, zuweilen auch ecchymosirt; auch kommt es entweder zu einem freien, serösen oder zu einem eingeschlossenen Exsudat, wobei die Schleimhaut ödematös infiltrirt oder durch cystöse Einlagerungen tumorartig hervorgewölbt erscheint (Mukokele, Hydrops). Der Ausführungsgang kann frei bleiben, aber auch durch die genannten Veränderungen theilweise oder ganz verschlossen werden;

in ersterem Falle läuft das angesammelte Secret in die Nase ab, in letzterem Falle wird es in der Höhle angestaut und dieselbe erweitert.

Bei der chronischen eitrigen Entzündung, die meistens aus der acuten katarrhalischen hervorgeht, der Sinuitis pyorrhoica oder blennorrhoica, dem „Empyem", erscheint die Schleimhaut viel beträchtlicher geröthet, entzündet und geschwellt. Die Veränderungen sind um so hochgradiger, je länger eine solche Entzündung besteht; schliesslich kommt es zu Bildung von Granulationen oder grösseren und kleineren zottigen, warzigen Excrescenzen oder von Polypen und Cysten. Nach Zuckerkandl kommt es nach Aufhören der Eiterung zu fibröser, bindegewebiger Degeneration der Schleimhaut, mit Schwund zahlreicher Gefässe und Drüsen.

Relativ häufig finden sich bei den chronischen Eiterungen Veränderungen in den Knochen. Sie verdanken entweder der Eiterung selbst oder einer gleichzeitig bestehenden Dyskrasie, Syphilis, Tuberculose ihre Entstehung oder sie sind traumatischer Natur und entstanden durch Erschütterung, Fissur oder Fractur der Knochen oder durch Eröffnung der Höhlen mit nachfolgender Infection. Am häufigsten findet sich bei Erweiterung der Sinus zunehmende Verdünnung, flächenhafte Resorption und Schwund der Knochensubstanz, welche schliesslich nur noch die Dicke eines Kartenblattes hat und bei Druck das sogenannte Pergamentknittern zeigt.

Ebenso kommt es nicht selten zu Zerstörung der Schleimhaut, zu Caries und Nekrose des Knochens, zu Perforation der Sinuswände, zu Fistelbildung und Sequestrirung.

Die bei chronischen Nebenhöhleneiterungen sich findenden Ectasien der Höhle resp. Vorwölbungen verdanken in der Regel ihre Entstehung nicht der Retention von Eiter, sondern der Anwesenheit von Cysten, Schleimpolypen und anderen sehr oft bösartigen Neubildungen. Dass bei schon vorhandenem Knochenschwund oder Osteoporose oder Caries in Folge völligen Verschlusses des Ausführungsganges durch Secretstauung eine sehr beträchtliche Ausdehnung der Sinuswände zu Stande kommen kann, ist sicher.

In allen Nebenhöhlen kommen ferner auch Geschwülste und Neubildungen vor, die bei den einzelnen Höhlen näher besprochen werden. Ebenso sind die Nebenhöhlen zuweilen der Sitz von Rhinosclerom- und Rotzknoten sowie von Parasiten, namentlich Spulwürmern und Oestruslarven. Tuberculose ist nach Weichselbaum selbst bei ausgesprochener Tuberculose der Nasenschleimhaut äusserst selten; relativ am häufigsten wird die Kieferhöhle ergriffen, in der Neumann von Tuberkeln durchsetzte Granulationen fand. Nach Virchow wird endlich noch eine kalkige Degeneration der Schleimhaut beobachtet, welche meist auf die Nasenhöhle übergeht.

Allgemeine Aetiologie und Symptomatologie.

Aetiologie.

Unter den Ursachen acuter und chronischer Nebenhöhlenentzündungen nehmen acute infectiöse Katarrhe der Nasenschleimhaut die erste Stelle ein. Besonders gilt dies von jenen Katarrhen, welche die Influenza, die Masern, den Keuchhusten, den Scharlach, den Typhus, die Pneumonie, die Diphtherie, das Erysipel oder den Rotz begleiten; doch kann auch der gewöhnliche Schnupfen oder der Jodschnupfen oder die durch operative Eingriffe erzeugte Entzündung durch die Ausführungsgänge in die Nebenhöhlen sich fortsetzen. Die Infection der Nebenhöhlen kann aber auch unabhängig von jener der Nasenschleimhaut und selbstständig erfolgen, wie Zarniko meint, vielleicht als directe Folge der im Blute kreisenden Bacterien. Bei Traumen, Fremdkörpern findet ebenfalls meistens eine Infection mit eitererregenden Mikroorganismen statt. Nicht selten erkranken ferner mehrere benachbarte Sinus, wie z. B. die Kieferhöhle, die Siebbeinhöhlen, durch Herabfliessen von infectiösem Secret aus der Stirnhöhle. Durch dyskrasische Processe, syphilitische oder tuberculöse Geschwüre der Nasenschleimhaut, durch syphilitische und tuberculöse Knochenhaut- und Knochenerkrankungen, durch Parasiten und Rhinolithen werden ebenfalls die Nebenhöhlen in Mitleidenschaft gezogen. Von principieller Bedeutung ist die Frage, ob durch Verschluss der Ausführungsgänge in Folge katarrhalischer Schwellung oder durch Verlegung derselben durch Polypen oder andere Geschwülste Nebenhöhleneiterungen entstehen können. Während man früher diese Frage in positivem Sinne beantwortete, neigt sich die Mehrzahl der neueren Autoren, darunter auch der Verf, zu der Ansicht, dass dies nicht der Fall sei, wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, dass es durch die Luftverdünnung zu Hyperämie der Schleimhaut und zu Ausschwitzung einer geringen Menge wässeriger Flüssigkeit kommt (Hartmann, Zuckerkandl). Die bei Nebenhöhlen so häufig sich vorfindenden Hypertrophien, Granulationswucherungen und Polypen sind fast immer die Folgen, nicht die Ursachen der Eiterung. Dass aber bei der Anwesenheit von Hypertrophien und Schleimpolypen das Secret sich zersetzen und durch forcirtes Schneuzen in die Nebenhöhlen eingetrieben und entzündungserregend wirken kann, ist nicht zu bezweifeln.

Symptomatologie.

Die Erscheinungen, welche Nebenhöhleneiterungen zur Folge haben, sind zwar im Einzelnen je nach dem Sitze der Erkrankung etwas verschieden, zeigen aber doch wieder so viel Gemeinschaftliches, dass eine zusammenfassende Besprechung angezeigt erscheint.

Unter den subjectiven Beschwerden, die ausserordentlich gering sind, ja zuweilen ganz fehlen können, sind schmerzhafte

Empfindungen und gewisse nervöse Störungen am häufigsten. Namentlich sind es die verschiedenen Formen des Kopfschmerzes, welche den Verdacht auf Sinuseiterungen hervorrufen müssen. Bald wird ein dumpfer Druck im ganzen Kopfe geklagt, bald ein Hämmern und Pochen zwischen den Augen, an der Nasenwurzel oder über den Augen, bald auf dem Scheitel, bald wieder mehr im Hinterhaupt und in den Schläfen. Kopfdruck und Benommenheit sowie Schwindelgefühle und Schmerzen treten theils in Anfällen, theils continuirlich auf. Aeusserst häufig finden sich ausgesprochene Neuralgien im Bereiche des ersten, zweiten und dritten Astes des Trigeminus. Gesteigert wird der Schmerz meistens durch körperliche oder geistige Arbeit, durch Congestion nach dem Kopfe, durch Sichbücken, Husten oder Pressen sowie durch den Genuss geistiger Getränke, durch das Rauchen oder den Aufenthalt in heisser Luft. Unerträglich wird der Schmerz bei Verlegung des Ausführungsganges in Folge behinderten Secretabflusses, während nach Entleerung der Höhle meist sofortige Erleichterung sich einstellt.

Aeusserst häufig wird das Auge in Mitleidenschaft gezogen, und zwar entweder dadurch, dass entzündliche Processe weiterkriechen, oder dass Eiter verschleppt, oder dass der Inhalt der Orbita gedrückt und verdrängt wird. Deshalb kommt es zu Entzündungen der Bindehaut, zu Infiltraten und Geschwüren der Cornea, zu Iritis, Iridocyclitis, Chorioiditis, Veränderungen an der Papilla optica, Phlegmone der Augenlider und der Orbita, Ciliarneuralgie, Flimmerscotom, Glaukom, Asthenopie und Einschränkung des Gesichtsfeldes. (Ziem).

Die übrigen Beschwerden sind mehr localer Natur und durch die Veränderungen in der Nase bedingt. Hieher gehören die Klagen über Verstopfung der Nase und ihre Folgen, über die Störungen des Geruchs, die sich theils als Abschwächung des Geruchs, theils als unangenehme Geruchsempfindungen (Kakosmia subjectiva) äussern. Dass bei der Anwesenheit von Nasenpolypen und Hypertrophien auch Asthma und andere Reflexneurosen auftreten können, lehrt die tägliche Erfahrung.

Unter den objectiven Erscheinungen ist allen entzündlichen Nebenhöhlenerkrankungen gemeinsam der Ausfluss von schleimigem oder eitrigem Secret aus der Nase.

Derselbe ist entsprechend der weitaus grösseren Häufigkeit einseitiger Erkrankung meist einseitig; doch kann unter Umständen der Secretausfluss trotz Einseitigkeit der Erkrankung doppelseitig auftreten, was natürlich stets der Fall ist, wenn die Nebenhöhlen beider Kopfhälften ergriffen sind. Neben der Einseitigkeit der Secretion ist hauptsächlich ihre Periodicität zu bemerken; bei der ungünstigen Lage mancher Ausführungsgänge, so namentlich jener der Kieferhöhle und der Keilbeinhöhle, kann das Secret nur abfliessen, wenn die Höhle grösstentheils oder ganz gefüllt ist, oder wenn dem Secret durch Veränderung der Kopfstellung Gelegenheit zum Abfluss gegeben wird. Deshalb fliesst der Eiter meistens in der Nacht ab, wenn sich der Kranke auf die entgegengesetzte Kopfseite legt oder wenn er aus

der horizontalen in die verticale Stellung übergeht. Ausserdem kann aber der Eiterabfluss noch behindert werden durch Veränderungen der Ausführungsgänge, Schwellung, ventilartige Wulstung der Schleimhaut, Hypertrophien, Granulationen und Polypen in der Umgebung der Orificien.

Die Stelle, wo der abfliessende flüssige oder zu Krusten eingetrocknete Eiter sichtbar wird, ist von grösster diagnostischer Bedeutung und ist verschieden nach dem Sitze der Eiterung. Bei der gemeinschaftlichen Mündung der Kieferhöhle, Stirnhöhle und vorderen Siebbeinzellen muss derselbe bei Erkrankung der genannten Sinus natürlich im Hiatus zuerst zum Vorschein kommen; von da fliesst er auf das vordere mittlere Muschelende, die laterale Nasenwand, die untere Muschel und den Nasenboden. Aus der Keilbeinhöhle und den hinteren Siebbeinzellen stammender Eiter fliesst entweder nach vorne in die Rima olfactoria und auf die Scheidewand oder nach hinten in den Nasenrachenraum, was übrigens auch bei Eiterungen der Kiefer- und Stirnhöhle der Fall ist, wenn die mittlere Muschel abnorm gebildet oder in ihrem vorderen Theile hypertrophisch ist, oder wenn der Kranke die Rückenlage annimmt. Sehr oft ist das ganze Naseninnere mit Eiter oder Krusten und Borken bedeckt, so dass es längerer Beobachtung über die Herkunft des Eiters bedarf.

Der aus den Nebenhöhlen stammende Eiter ist meistens dickflüssig, weiss, rahmartig oder weiss-gelblich, grün und bei Beimischung von Blut schmutzig-bräunlich. Sehr häufig formt er sich zu Krusten oder zu einer käsigen, krümeligen Masse, die zu Rhinolithenbildung Anlass geben kann, oder er ist mehr schleimartig, fadenziehend. Hinsichtlich des Geruches unterscheidet er sich, wie bereits erwähnt, vollständig von dem bei Ozaena vorkommenden Secret; bald ist er geruchlos, bald riecht er süsslich fade, bald ist er fötid und riecht nach Mistjauche oder nach Häringslake (Bayer).

Constant finden sich ferner bei allen Nebenhöhleneiterungen gewisse Consecutivzustände an der Nasenschleimhaut, am häufigsten an den Mündungen der Sinus im mittleren Nasengang. Theils durch die Benetzung mit dem abfliessenden Eiter, theils in Folge weiterkriechender Entzündung kommt es bald früher, bald später zu Röthung und Schwellung der Schleimhaut, zu circumscripter oder diffuser Verdickung der vorderen Enden der mittleren Muschel oder der Umgebung des Hiatus, zu leistenartiger Vorwölbung der Schleimhaut der äusseren Nasenwand — Kaufmann's lateralen Schleimhautwulst —, zu Granulationswucherungen und zur Bildung echter Schleimpolypen. Dass die letzteren jedoch, wie Grünwald behauptet, für Nebenhöhleneiterungen charakteristisch seien, ist unrichtig, da Polypen an beiden mittleren Muscheln oft genug auch ohne Sinuserkrankung beobachtet werden (M. Schmidt); dass einseitige und trotz Operation recidivirende Polypen den Verdacht auf Nebenhöhleneiterungen erwecken müssen, ist hingegen richtig. Auch diffuse Schwellung der unteren Muscheln, Hypertrophien der Septumschleimhaut, letztere namentlich bei Eite-

rungen der Keilbein- und hinteren Siebbeinhöhlen, papilläre Hypertrophien der hinteren unteren Muschelenden können ebenfalls dem Reize des abfliessenden Eiters ihre Entstehung verdanken.

Es kann ferner keinem Zweifel unterliegen, dass Eiterungen der Nebenhöhlen auch wirkliche Atrophie der Schleimhaut oder atrophieähnliche Veränderungen zur Folge haben können. Warum bei einzelnen Kranken die Schleimhaut hypertrophisch, bei anderen atrophisch wird, wissen wir nicht. Die Atrophie betrifft theils die untere, theils die mittlere Muschel, am häufigsten aber befällt sie den Nasenrachenraum; freilich ist dabei nicht immer die Schleimhaut degenerirt, sondern es handelt sich nur um die Erscheinungen der bereits früher besprochenen Pharyngitis sicca

Die Folgen einer Nebenhöhleneiterung machen sich aber noch weiter bemerkbar. So kommt es sehr häufig zu Eczem des Nasenein gangs. zu entzündlicher Röthung und Schwellung der Haut des Nasenrückens und dessen Nachbarschaft, zu flüchtigem Oedem oder Erysipel des Gesichts.

Wie bereits in der Allgemeinen Pathologie erwähnt wurde, kommt es ferner nicht selten zu Caries und Nekrose der Knochen. Dieselbe betrifft entweder die Wandungen der erkrankten Höhle selbst oder die den Ausführungsgängen benachbarten Knochen.

Durch Weiterverbreitung des Eiters kommt es nicht selten zu Entzündungen oder Vereiterungen benachbarter oder auch entfernterer Organe. So hat man beobachtet Tonsillitis und Peritonsillitis, Abscesse zwischen den Schultern und an den Beinen, ferner Lungenabscess (Jeanty), eitrige Pericarditis (Chattelier, Luc), Meningitis. Verf. beobachtete ferner einmal bei einem Kranken gleichzeitig mit Peritonsillitis eine schmerzhafte Affection des Kniegelenks, bei einem anderen Kranken eine mit der Heilung eines Kieferhöhlenempyems sich verlierende acute Nephritis. Auch Pyämie und Septikämie können von Nebenhöhleneiterungen ihren Ausgang nehmen. Nicht selten entstehen ferner durch Verschlucken des Eiters Appetitlosigkeit, Magenkatarrhe sowie Abmagerung, Anämie und kachektisches Aussehen sowie psychische Depression.

Allgemeine Diagnose.

Bei der häufigen Unbestimmtheit und Vieldeutigkeit der subjectiven Erscheinungen, welche Nebenhöhleneiterungen zur Folge haben, muss sich die Diagnose hauptsächlich auf die Ergebnisse der objectiven Untersuchung stützen.

Schon sehr früh versuchten W. Zenker und Czernicki die Ergebnisse der Auscultation und Percussion zu verwerthen. Im Allgemeinen müssen auch die von Lingg wieder aufgenommenen Versuche als gescheitert betrachtet werden, wenn dieselben auch aus-

nahmsweise brauchbare Resultate ergaben. So constatirte W. Zenker bei einem Epileptiker mit kugeliger Hervortreibung des Stirnbeines in Folge von Syphilis einen ausgesprochenen tiefen Hohlgefässton; das Gefühl des Widerstandes war geringer als an den übrigen Stellen des Schädels, auch zeigte sich der Schall bei Verschluss der Nase und des Mundes tiefer, was bewies, dass die Luft der Stirnhöhle mit jener der Nase und des Rachens communicirte. Das Auftreten gurrender und zischender Geräusche im Momente tiefster Respiration, das einmal von Czernicki und zweimal von Walter Berger bei Kranken mit Stirnhöhlenkatarrh wahrgenommen wurde, ist eine ebenso grosse Seltenheit, wie die Anwesenheit eines Succussionsgeräusches beim Schütteln des Kopfes resp. der mit Luft und Flüssigkeit gefüllten Nebenhöhlen.

Brauchbarer scheint die Auscultation der Stirnhöhle nach Okukeff zu sein. Ausgeführt wird sie derart, dass man das für den Kranken bestimmte, mit einem glattrandigen Ansatz aus Hartgummi versehene Ende eines gewöhnlichen Otoskops sanft gegen den inneren oberen Augenwinkel drückt und so den Ton einer stark schwingenden, mittelhohen, auf den Scheitel des Patienten gesetzten Stimmgabel auscultirt. Durch Vergleich mit dem Tone der anderen Seite kann auf eine Erkrankung der Stirnhöhle geschlossen werden; werthlos ist diese Methode bei doppelseitiger Stirnhöhleneiterung und bei Mangel der Stirnhöhle (E. Richter).

Eine andere Untersuchungsmethode ist die schon von Voltolini vorgeschlagene und neuerdings von Vohsen und Anderen sehr verbesserte Durchleuchtung.

Man benützt dazu eine an einem passenden Handgriffe befestigte und durch Accumulatoren gespeiste kleine Glühlampe, welche bei der Untersuchung der Kieferhöhle bei gänzlich verdunkeltem Zimmer in den Mund genommen, bei Untersuchung der Stirnhöhle in den oberen inneren Orbitalrand eingedrückt wird. Die Methode beruht darauf, dass die Lichtstrahlen die Wände der gesunden Nebenhöhlen durchbrechen und dieselben wie deren Nachbarschaft transparent resp röthlich glühend erscheinen lassen. Sind die Nebenhöhlen aber mit Eiter oder undurchsichtigen Tumoren erfüllt, dann bleibt die betreffende Seite dunkel.

So werthvoll aber auch immerhin diese Methode ist, so kann sie doch nicht als absolut sicher bezeichnet werden, zumal trotz Anwesenheit von Eiter die betreffende Stelle hell und bei Freisein dunkel erscheinen kann, was einestheils in der sehr geringen Menge von Eiter, anderntheils in abnormer Dicke oder sonstigen Anomalien der Knochenwände seinen Grund hat. Davidsohn legt deshalb mehr Gewicht auf die Durchleuchtung des Bulbus resp. der Pupille, welche bei Eiteransammlung in der Kieferhöhle dunkel bleibt, während sie normalerweise roth erleuchtet erscheint. Burger hält aber auch diese Methode nicht für unfehlbar, da einestheils bei vielen normalen Personen die Pupille überhaupt nicht erleuchtet werden kann und anderntheils die Pupille erleuchtet erscheint, wenn wenig Eiter vorhanden ist. Da Burger jedesmal bei der Durchleuchtung eine subjective

Lichtempfindung constatirt haben will, so hält er das Fehlen eines subjectiven Lichteindruckes bei der Durchleuchtung für ein bedeutsames Symptom der Kieferhöhlenciterung, vorausgesetzt, dass nicht auf einem oder auf beiden Augen Amaurose besteht.

Wenn, wie so oft, Granulationswucherungen oder Polypen oder Schleimhauthypertrophien vorhanden sind, welche die Inspection der tiefer gelegenen Theile, namentlich des mittleren Nasengangs erschweren oder unmöglich machen, so müssen dieselben in erster Linie entfernt werden. Es gelingt dann sehr oft, zu constatiren, dass der Eiter aus dem Hiatus abfliesst. Manchmal kann aber trotz vorliegender Erkrankung keine Eitersecretion nachgewiesen werden. In solchen Fällen hat man versucht, durch Veränderung der Körperstellung den Eiter zum Abfluss zu bringen und dadurch die Diagnose genauer zu fixiren. Wenn es auch im Allgemeinen richtig ist, dass man, wie B. Fränkel zuerst constatirte, den in der Kieferhöhle angesammelten Eiter durch Vornüberneigen des Kopfes oder durch Drehung desselben auf die andere Seite zum Ausfliessen bringen kann, so ist dieses Verhalten doch nicht für Kieferhöhlenempyem allein charakteristisch, weil durch derartige Manipulationen der Eiterausfluss auch aus den anderen Höhlen ermöglicht wird. Auch die Austreibung des Eiters mittelst der Politzer'schen Luftdouche (Hartmann) oder die Verstärkung desselben resp. Verflüssigung durch innerliche Gaben von Jodkali (Ziem) lassen nicht selten im Stiche.

Von hoher diagnostischer Bedeutung aber ist die Sondirung der Nebenhöhlen resp. das Erscheinen von Eiter oder der Nachweis von Caries bei Einführung der Sonde in die Ausführungsgänge.

Wenn auch im Allgemeinen bei günstigen anatomischen Verhältnissen jede Nebenhöhle sondirt werden kann, so bleibt doch eine nicht kleine Anzahl von Fällen übrig, bei denen die Sondirung äusserst schwierig, ja unmöglich ist. Die Sondirung der Kieferhöhle gelingt nach Hansberg in ungefähr zwei Drittel der Fälle, und zwar am besten dann, wenn man die circa 15 cm lange, $^1/_2$ bis 1 mm breite, vorne im rechten Winkel abgebogene, mit dem Knopf nach unten gerichtete Sonde in die Tiefe des mittleren Nasenganges einführt und dann beim Zurückgehen gegen die äussere Nasenwand dreht, wo sie, im Falle des Gelingens der Procedur, in die Oeffnung der Kieferhöhle hineingleitet. Am leichtesten gelingt die Sondirung aber durch eine accessorische Oeffnung.

Die Sondirung der Stirnhöhle geschieht in der Weise, dass die ebenfalls im rechten Winkel 2—3 cm lang abgebogene Sonde zwischen dem vorderen Ende der mittleren Muschel und der äusseren Nasenwand gerade in die Höhe geschoben wird. Gelingt es auf diese Weise nicht, so krümme man die Sonde seitlich; auch ist es gut, den Sondengriff zu senken und so der Sondenspitze mehr die Richtung nach vorne und oben zu geben. Das Haupthinderniss ist meist eine stark entwickelte Bulla ethmoidalis oder eine noch höher gelegene Siebbeinzelle, oder die verschiedene Grösse und Form des Ostium

frontale und der oft mehr bogenförmige Verlauf des Ductus nasofrontalis. Die Ansichten über die Häufigkeit des Gelingens der Sondirung der Stirnhöhle sind sehr verschieden; Cholewa mag sehr vom Glücke begünstigt gewesen sein, dass er in 60% der Fälle die Sondirung für möglich hält; Hartmann und Hansberg halten sie für ungefähr in der Hälfte der Fälle für möglich, während andere, wie Jurasz, Katzenstein, welchen sich auch der Verf. anschliessen muss, noch einen viel geringeren Procentsatz angeben. Um die Sondirung der Stirnhöhle überhaupt zu ermöglichen, ist nicht selten die Amputation des vorderen Endes der mittleren Muschel nöthig, ein Eingriff, der jedoch nur in dringenden Fällen gestattet ist.

Fig. 37. Canüle zum Ausspritzen der Kiefer- und Stirnbeinhöhle vom Hiatus aus.

Die Sondirung der Keilbeinhöhle geschieht in der Weise, dass eine gerade Sonde durch die Rima olfactoria nach hinten und oben in einer Richtung vorgeschoben wird, so dass die mittlere Muschel etwa in ihrer Mitte gekreuzt wird. Sehr leicht ist die Sondirung bei völliger Geradestellung des Septum und weiter Rima olfactoria; am besten aber dann, wenn die Mündung der Höhle gesehen werden kann. Sehr schwer, ja unmöglich, ist die Sondirung in enger und krummer Nase, weshalb in solchen Fällen neuerdings die Amputation der mittleren Muschel vorgeschlagen wird. Bresgen sucht mittelst gebogener Sonden entweder vom oberen Nasengang nach hinten oben oder hinter der mittleren Muschel hinaufzugelangen. Nach Grünwald beträgt bei weiblichen Erwachsenen der durchschnittliche Abstand der Keilbeinhöhle vom Naseneingang 7·5 cm, bei männlichen 8·2 cm.

Bei der Kleinheit der Ausführungsgänge des Siebbeinzellen ist es kaum möglich, eine Sonde in dieselben einzuführen, höchstens gelingt dies bei den vorderen Siebbeinzellen, deren Ausführungsgang neben jenem der Stirnhöhle liegt. Man begnügt sich deshalb, die laterale und mediale Seite der mittleren Muschel abzutasten, um allenfallsige offene Hohlräume oder Caries constatiren zu können.

Gibt auch die Sondirung kein sicheres Resultat, dann versuche man die Ausspülung oder die Drainirung der Nebenhöhlen von den natürlichen Oeffnungen aus. Man benützt dazu eine 1—1½ mm dicke, 10—15 cm lange, hinten trichterförmig endigende und stumpfwinkelig abgebogene Röhre, welche mittelst eines Gummischlauches mit einem Ballon oder einer Spritze in Verbindung steht, aus der die zu verwendende Flüssigkeit — 1% warme Koch-

salzlösung — ausgetrieben wird. Das vordere Ende der Canüle muss der auszuspritzenden Höhle entsprechend ebenso gebogen werden, wie dies bei der Sondirung angegeben wurde (siehe Fig 37).

Gelingt die Drainirung von den Ausführungsgängen nicht, dann bleibt als letztes und zugleich sicherstes diagnostisches Hilfsmittel nur noch die Probepunction resp. Ausspülung von einer künstlich geschaffenen Oeffnung aus übrig. Das Nähere wird in dem therapeutischen Theile der einzelnen Sinusaffectionen ausgeführt werden.

Ist schon die Diagnose der einfachen halbseitigen Eiterungen zuweilen eine sehr schwierige, so gestaltet sich die Diagnose der combinirten Eiterungen noch viel schwieriger.

Am häufigsten erkranken Stirn- und Kieferhöhle zusammen, oder auch Stirnhöhle und Siebbeinhöhlen, oder Kiefer- und Siebbeinhöhlen. Eiterungen im Keilbein sind nicht selten mit Eiterung der hinteren Siebbeinzellen combinirt; auch erkranken nicht selten beide Stirn- oder Kieferhöhlen oder beide Hälften der Keilbeinhöhle In solchen Fällen kann nur häufige, genaueste Untersuchung und allmäliges schrittweises Vorgehen zum Ziele führen. Der Gang der Untersuchung hat sich folgendermassen zu gestalten: Ergeben Anamnese und objective Untersuchung, dass eine Nebenhöhleneiterung vorliegt, so sind in erster Linie allenfalls im mittleren Nasengange vorhandene Hypertrophien, Granulationen und Polypen zu entfernen und die Nase vom Eiter zu reinigen. Da die Kieferhöhle am häufigsten erkrankt, so versuche man die Sondirung und Ausspülung von dem Hiatus aus, und wenn dies nicht gelingt, von einer accessorischen Oeffnung aus; lässt auch diese im Stich, dann eröffne man nach den im nächsten Capitel anzugebenden Methoden die Kieferhöhle und lasse die Probeausspülung nachfolgen. Erscheint Eiter, dann ist die Kieferhöhle erkrankt, erscheint aber kein Eiter, dann muss derselbe entweder aus den Siebbeinzellen oder aus der Stirnhöhle herstammen. Sodann sondire man, eventuell nach Abtragung des vorderen mittleren Muschelendes, den Ausführungsgang der Stirnhöhle und lasse die Ausspülung nachfolgen; erscheint die Spritzflüssigkeit getrübt, dann liegt eine Eiterung der Stirnhöhle vor, wenn nicht, dann kann der Eiter nur aus den Siebbeinzellen oder der Keilbeinhöhle stammen. Jetzt schreite man zur Sondirung und Ausspülung der Keilbeinhöhle, wobei die Entfernung eines Stückes der mittleren Muschel nöthig werden kann. Kommt Eiter zum Vorschein, dann ist der Beweis der Erkrankung der Keilbeinhöhle erbracht, kommt kein Eiter, dann sondire und palpire man zuerst die vorderen und dann die hinteren Siebbeinzellen, deren Erkrankung oft nur eine ganz circumscripte ist.

So leicht auch, nach der gegebenen theoretischen Schilderung, die Diagnose der combinirten Empyeme erscheinen mag, so schwierig gestaltet sie sich praktisch in engen oder durch Deviationen und Auswüchse des Septum oder abnorme Bildung der Muscheln veränderten Nasen. Dazu gesellen sich noch äusserst häufig die Anwesenheit circumscripter oder diffuser Schleimhauthypertrophien nnd Polypen und die unsagbar schwierige Auffindbarkeit der Ausführungsgänge.

Die Krankheiten der Kieferhöhle.

Unter allen Nebenhöhlen erkrankt die Kieferhöhle am häufigsten.

Von den meisten Autoren wurde bisher das Vorkommen freier, nicht eitriger Flüssigkeit in der Kieferhöhle geleugnet. Abgesehen von einem schon von Verneuil mitgetheilten Falle beweisen die neueren Mittheilungen von Noltenius, dass es in der That eine Sinuitis serosa antri Highmori gibt, wobei das Exsudat meist von ganz klarer oder schwach bernsteingelber Farbe ist. Hieher gehört offenbar auch ein von Krieg an sich selbst beobachteter Fall, in dessen Verlaufe sich dreimal plötzlich eine grosse Menge eines bernstein- bis orangegelben, geruchlosen, visciden Secretes von honigartiger Consistenz entleerte.

Die Beschwerden der Kranken sind zuweilen jenen bei Empyem sehr ähnlich, zuweilen sehr unbestimmt und bestehen in Kopf- und Wangenschmerz, Nasenanschwellung ohne jede Erweiterung der Höhle.

Die Diagnose kann nur mittelst der Probepunction gestellt werden. Die Therapie besteht einzig und allein in der Entfernung des Exsudates ohne nachfolgende Ausspülungen.

Verschieden von diesen freien Flüssigkeitsergüssen ist die cystöse Degeneration der Schleimhaut, die man fälschlicher Weise auch als Mukokele oder Hydrops antri Highmori bezeichnet hat und bei welcher es in hochgradigen Fällen zu Erweiterung der Höhle und Schwund der Knochensubstanz kommt.

Die unzweifelhaft häufigste und praktisch wichtigste Erkrankung ist die chronische eitrige Entzündung, die Sinuitis pyorrhoica oder blennorrhoica, kurz auch Empyem der Kieferhöhle genannt.

In ätiologischer Beziehung kommen alle bereits früher besprochenen durch Infectionskrankheiten hervorgerufenen Katarrhe der Nase in Betracht (nasale Empyeme). Ausserdem erkrankt die Kieferhöhle äusserst häufig in Folge krankhafter Zustände der Zähne des Oberkiefers und deren Alveolen (dentale Empyeme). Da die Grösse der Höhle sehr verschieden ist, so können sowohl Erkrankungen der Eck- als auch sämmtlicher Backzähne und deren Alveolen zu Kieferhöhleneiterungen führen. Am häufigsten geschieht dies durch Erkrankungen des ersten bis dritten Molaris, deren Alveolen oft in die Kieferhöhle hineinragen und deren trennende Knochenbrücke relativ am dünnsten, ja sogar oft defect ist, oder völlig fehlt. Unter den speciellen Erkrankungen sind zu nennen: Periostitis oder Cysten der Wurzeln, Einstossen von Zähnen in die Höhle, Fracturen der Alveolen. Wie auch Walb hervorhebt, tragen ferner zu weit getriebene Conservirung der Zähne, schlechte Plombirung, Stehenlassen von Wurzelresten unter dem künstlichen Gebisse besonders häufig die

Schuld. Der feinere Vorgang beruht in den meisten Fällen auf Infection mit entzündungserregenden Mikroorganismen. Nach Schütz soll die Caries der Zähne zuerst subperiostale Abscesse erzeugen, welche dann in die Höhle durchbrechen; nach Killian könnte es sich aber auch um eine directe Fortleitung der Entzündung durch die Markräume des Alveolarfortsatzes auf die Schleimhaut der Höhle handeln. Im Uebrigen hat Hajek Recht, wenn er sagt, dass hier noch eine bedeutende Lücke vorhanden sei, welche nur durch genaue pathologisch-anatomische Untersuchungen ausgefüllt werden könne. Immerhin bleibt auffallend, dass die meisten Kieferhöhlenempyeme mit Caries der Zähne combinirt sind; der Entscheid aber, ob die Caries schon vor dem Empyem existirte oder ob sie erst demselben nachfolgte, ist meistens nicht zu erbringen.

In dritter Linie können ferner Traumen, Fracturen des Oberkiefers oder Verletzungen, wie bei der Durchschneidung des N. infraorb., Cauterisationen der mittleren Muscheln oder Tamponade der Nase mit Liquor ferri-Watte, Fremdkörper und Rhinolithen, Pilzwucherungen und Neubildungen Kieferhöhleneiterungen zur Folge haben.

Die subjectiven Erscheinungen sind sehr verschieden und sind bald sehr geringfügig, bald sehr stürmisch. Am häufigsten wird über Kopfschmerz geklagt, dessen Sitz bald in das Gebiet des N. infraorbitalis, in die Gegend der Wange oder des Jochbogens, bald in das Gebiet des N. supraorbitalis in die Gegend oberhalb des Auges, der Stirne oder in die Tiefe des Auges verlegt wird. Ausserdem bestehen nicht selten Schwindel, Unfähigkeit zu körperlicher und geistiger Arbeit, Verstopfung der Nase, üble Geruchsempfindungen und anhaltende Schlafsucht. Wenn der Eiter nach hinten abfliesst, können die Erscheinungen der Pharyngitis sicca oder einer acuten Angina sowie Hustenreiz und Magenbeschwerden vorhanden sein.

Unter den objectiven Erscheinungen ist der Abfluss von Eiter die wichtigste. Am häufigsten erscheint derselbe zwischen mittlerer Muschel und äusserer Nasenwand und träufelt von da auf die untere Muschel und den Nasenboden. Bei beträchtlicher Hypertrophie oder Auftreibung und Missbildung des vorderen Endes der mittleren Muschel oder dann, wenn durch eine Spina oder Deviation die mittlere Muschel stark nach aussen gedrückt wird, fliesst der Eiter nach hinten in den Nasenrachenraum, wo er sich auf der Hinterwand, den Tuben oder in den Rosenmüller'schen Gruben in Form einer Borke niederschlägt. Nach Burger kann sogar der Eiter in die entgegengesetzte Nasenseite fliessen und so zu diagnostischen Irrthümern Anlass geben.

Neben der Einseitigkeit des Eiterabflusses kommt ferner noch seine Periodicität, seine Abhängigkeit von der Körperlage in Betracht. Nicht selten ist der Abfluss des Eiters von einem pulsirenden Lichtreflex begleitet, einer Erscheinung, deren auch von Schöller und Walb gedacht wird. Wie bei Mittelohreiterungen resp. Perforationen des Trommelfelles die an einer Stelle wiederkehrende Pulsation die oft nicht sichtbare Oeffnung andeutet, so ist auch die active Hyperämie der entzündeten Nasenschleimhaut im Stande, in Flüssigkeiten

Pulsationen hervorzurufen, welche sich durch Reflexe des Lichtes kundthun. Reinigt man mit antiseptischer Watte sorgfältig die Schleimhaut, dann entsteht an denjenigen Punkten ein pulsirender Lichtkegel, wo zuerst wieder Flüssigkeit auf der Oberfläche erscheint. Oft hat es den Anschein, als ob nach aussen von der mittleren Muschel noch eine zweite Muschel vorhanden wäre oder, wie Hartmann sich ausdrückt, als ob die nasale Wand der Kieferhöhle im Bereiche des mittleren Nasenganges vorgewölbt wäre, was in der That auch häufig der Fall ist. Kaufmann fasst die erwähnten Veränderungen unter dem Namen „lateraler Schleimhautwulst" zusammen und hält denselben für ein sicheres Zeichen einer entweder noch bestehenden oder bereits geschwundenen Kieferhöhleneiterung; nach seiner Ansicht ist die Wulstbildung nicht nur verursacht durch den Reiz des abfliessenden Eiters, sondern auch durch Circulations- und Ernährungsstörungen des dem Eiterherde naheliegenden Schleimhautüberzuges, welcher theils durch zahlreiche Lückenbildung in der Zwischenwand, theils durch zahlreiche Gefässanastomosen direct mit der Kieferhöhlenschleimhaut in Verbindung steht. Nach des Verf. Beobachtung kann der laterale Schleimhautwulst vollständig fehlen; nicht selten sind die Hypertrophien und Granulationswucherungen so mächtig, dass der Eiter erst dann zum Vorschein kommt, wenn man mit der Sonde die einzelnen Wucherungen oder Polypen auseinanderdrängt. Nicht selten ist auch die untere Muschel geschwellt, hypertrophisch oder mit Granulomen besetzt; auch lässt sich mittelst der Sonde die Entblössung und Rauhheit der äusseren Nasenwand, speciell Caries der den Hiatus semilunaris bildenden Knochen und deren Nachbarschaft nachweisen. Dass unter Umständen aber auch Atrophie der Schleimhaut vorhanden sein kann, wurde im allgemeinen Theil bereits erwähnt.

Ueber den bacteriologischen Befund des Kieferhöhleneiters liegen bisher nur wenige Mittheilungen vor. Werner und Jurasz fanden manchmal geradezu Reineulturen von Streptokokken; besonders zeigte sich ein Streptococcus conglomeratus sehr virulent, indem er bei einer Kranken die Quelle mehrfacher schwerer Gesichtserysipele wurde. Weniger häufig fanden sich Staphylokokken; auch wurde mehrmals bei sehr übelriechender Eiterung ein facultativ anaërob waehsender, gasbildender Baeillus gezüchtet, eine Abart des Bacillus coli. Herzfeld und Herrmann fanden in 10 Fällen von Kieferhöhleneiterung 5mal Streptocoecus pyogenes aureus, 3mal Staphylococcus pyogenes albus, 8mal Streptokokken, 1mal Friedländer's Bacillus, ferner 1mal ein typhusartiges Bacterium, 3mal Bacillus capsulatus mesothermus, 3mal ein coliartiges Bacterium, 2mal proteusartige Bacterien, 1mal gelbe Sarcine und 1mal einen dicken, kleine, plumpe Stäbchen bildenden Bacillus.

Der Verlauf und die Dauer der sich selbst überlassenen Kieferhöhlenempyeme ist meist ein sehr langer und kann bis zu 20 Jahren und noch mehr betragen; Besserungen und Verschlimmerungen wechseln mit einander ab, erstere kommen namentlich im Sommer oder nach dem Gebrauche eines Seebades vor, letztere besonders nach acuten

Nasenkatarrhen oder anderen Schädlichkeiten. Die Beschwerden können während der ganzen Dauer der Affection dieselben bleiben, wie eingangs geschildert wurde; es können aber auch, wie früher schon erwähnt, gefährliche, ja selbst das Leben bedrohende Complicationen auftreten. Auf die Mitbetheiligung der Augen, speciell die häufige Einengung des Gesichtsfeldes, Abnahme der Sehschärfe, Iritis, Iridocyclitis, haben besonders Ziem und Andere hingewiesen, auch können Auftreibungen der Fossa canina, Exophthalmus, Schwellungen der Wange und Oberlippe, Erysipel sowie Perforation des Eiters durch die faciale, orbitale oder orale Wand der Höhle sich einstellen.

Man findet zuweilen noch die Angabe, dass das Empyem der Kieferhöhle mit Auftreibung und Verdünnung der Knochenwände einhergehe In Bezug auf das primäre Empyem kann diese Behauptung im Allgemeinen nicht aufrecht erhalten werden, obwohl Scheff, G. Killian und Burger eine Ausweitung des Antrum resp. eine Hervorwölbung der nasalen Wand annehmen; dagegen gibt es secundäre Schleim- und Eiteransammlungen der Kieferhöhle, die durch Cysten, Sarkome oder andere Tumoren oder Krankheiten der Knochen, wie tuberculöse, syphilitische oder Phosphornekrose, hervorgerufen sind und bei denen Erweiterung und papierartige Verdünnung der Sinuswände besteht. Diese Erweiterung betrifft bald die faciale und orbitale Wand der Höhle, bald die nasale, auch kann der harte Gaumen vorgewölbt und perforirt werden.

Die Diagnose der idiopathischen Kieferhöhleneiterung ist bei Anwesenheit der oben aufgezählten objectiven Veränderungen nicht schwer; die Diagnose stösst aber dann auf grosse Schwierigkeiten, wenn diese Veränderungen fehlen oder nur unvollkommen entwickelt sind. Dazu kommt noch, dass nicht selten die subjectiven Erscheinungen mehr auf eine Erkrankung der Stirnhöhle hindeuten. Zuweilen gibt die Anamnese einen Fingerzeig, besonders wenn Erkrankungen der Zähne, Schwellungen der Wange, Epulis oder Zahnfisteln vorausgegangen waren. Das Nähere ist in dem Capitel Allgemeine Diagnose nachzusehen.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig, doch darf man nie vergessen, dass Höhleneiterungen stets viel länger dauern als offene, und dass manche Kieferhöhleneiterungen absolut nicht zur Heilung gebracht werden können. Dass secundäre, durch maligne Neubildungen bedingte Empyeme eine schlechte Prognose geben, ist natürlich. Jurasz meint, dass der Streptokokkeneiter die schlechteste, Eiterung in Folge von anderen Eitererregern dagegen eine günstigere Prognose geben, was von Klemperer geleugnet wird, da die Intensität eines eitrigen Processes nicht sowohl von der Art des Erregers als von seiner Virulenz abhänge.

Die Therapie muss in erster Linie in Entfernung der den Secretabfluss hindernden Granulationen, Hypertrophien oder Schleimpolypen bestehen. In frischen Fällen genügt die Ausspülung der Höhle von ihrer im Hiatus gelegenen oder einer accessorischen Oeffnung aus. Die dabei verwendete Canüle ist in Fig. 37 abgebildet. Die Zahl der

zur Ausspülung empfohlenen Mittel ist eine ungeheure, weshalb es genügen mag, nur die hauptsächlichsten anzuführen; dazu gehört sterilisirtes 25—27° C. warmes Wasser, warme 1% Kochsalz- oder Sodalösung, 1—3% Boraxlösung, 0·1% Kali hypermanganicum, 1—3% Carbol-, Lysol-, Creolin-, Borsäurelösung oder Sublimat 1 : 5000. Auch die Rotterinpastillen sowie Wasserstoffsuperoxyd leisten gute Dienste. Bei schon länger bestehenden Eiterungen ist die Ausspülung vom Hiatus aus nicht zu empfehlen, da der käsig eingedickte, gewöhnlich am Boden der Höhle liegende Eiter nicht gründlich entfernt wird. Dass bei vielen Fällen eine Besserung, bei manchen eine völlige Heilung erzielt werden kann, soll nicht geleugnet werden. Bei der Schwierigkeit und dem zweifelhaften Erfolge der Ausspülung von den natürlichen Oeffnungen aus muss der Ausspülung durch eine künstlich angelegte Oeffnung unbedingt der Vorzug eingeräumt werden. Die zur Ausspülung bestimmte Canüle ist in Fig. 38 abgebildet.



Fig. 38. Canüle zum Ausspülen der Kieferhöhle von der Alveola oder Fossa canina aus.

Die sowohl zur Probepunction als auch zur permanenten Ausspülung bestimmte Eröffnung kann an verschiedenen Stellen vorgenommen werden.

Die Wahl der Operationsstelle hängt ab von den die Eiterung veranlasst habenden oder zur Zeit noch unterhaltenden Ursachen. Da fast die Hälfte aller Kieferhöhlenempyeme durch Krankheiten der Zähne und ihrer Alveolen veranlasst und unterhalten wird, so geschieht die Eröffnung am zweckmässigsten von den Alveolen aus. Besteht eine Fistel, dann kann dieselbe erweitert werden; sind noch schadhafte oder schlecht plombirte, verdächtige Zähne oder Wurzelreste vorhanden, dann müssen dieselben extrahirt werden; sodann wird durch die Alveole des entfernten Zahnes das Stilet von Siebenmann oder ein Troicart oder ein Bohrer eingeführt und die Höhle eröffnet. Verf bedient sich am liebsten des von Hajek in zwei verschiedenen Grössen angegebenen Troicarts oder des Hartmann'schen Instrumentes, das ebenso wie das Hajek'sche der Sicherheit wegen mit einer Ringmarke versehen ist (Fig. 39).

Dass man in den Sinus eingedrungen ist, beweist die freie Beweglichkeit des Instrumentes. Will man keinen gesunden Zahn opfern und doch von der Alveole aus eröffnen, so geschieht dies nach Ziem am besten mittelst der amerikanischen Bohrmaschine, wie sie die Zahnärzte gebrauchen, und zwar in dem schmalen Raume zwischen zwei Zähnen. Die Oeffnung braucht in beiden Fällen nur so gross zu sein, dass die oben erwähnte dünne Canüle eingeführt werden kann;

abschliessende Vorrichtungen, wie Stifte oder Canülen, sind dabei unnöthig, da sich die Wundränder derart aufeinander legen, dass weder Eiter herausfliessen, noch Speisetheile in die Höhle hineingerathen können.

Die Ausspülung muss anfangs täglich, bei starker Eiterung zweimal täglich vorgenommen werden. Die Dauer der Behandlung ist sehr verschieden; im Allgemeinen kann man annehmen, dass die Heilung um so eher eintritt, je frischer die Affection ist, und um so später, je länger die Eiterung schon bestanden hat. Dass die Affection heilt, kündigt sich durch die Veränderung des Secretes an; dasselbe verliert zuerst seinen rein citrigen Charakter und wird mehr schleimigeitrig und cohärent münzenförmig Aber auch die Quantität des Secretes vermindert sich allmälig, um endlich ganz, manchmal erst nach einem halben oder ganzen Jahre, ja sogar noch später, zu sistiren. Man hat vorgeschlagen, bei zögernder Heilung schon nach 4 bis 6 Wochen die Höhle breit zu öffnen. Verf. ist mit Zarniko der

Fig. 39. Instrument von Hartmann zur Eröffnung der Kieferhöhle von der Alveole aus.

Ansicht, dass man individualisiren und so lange bei der einfachen Ausspülung bleiben soll, als durch dieselbe Besserung erzielt wird.

Unter Umständen kann es angezeigt sein, die Oeffnung in der Alveole im Verlaufe der Behandlung zu erweitern oder gleich anfangs grösser, 4—6 mm breit, anzulegen, um die von Friedländer und Krause zuerst empfohlene Trockenbehandlung einzuleiten. Sie besteht darin, dass in die nur einmal ausgespülte und durch Lufteintreiben wieder sorgfältig getrocknete Höhle mittelst des Kabierskeschen Pulverbläsers in reichlicher Menge Jodoform, Jodol, Dermatol oder Aristolpulver eingeblasen und diese Procedur alle zwei Tage wiederholt wird. Da sich die Röhren leicht verstopfen und bei der Tendenz der Fistel zum Zuwachsen je länger um so schwerer einzuführen sind und dadurch eine Selbstbehandlung so gut wie unmöglich wird, empfiehlt Grünwald die Application von Jodoformäther mittelst eines kleinen Sprayapparates resp. eines mit demselben in Verbindung stehenden mit 8 bis 10 kleinen seitlichen Löchern versehenen Paukenröhrchens. Recht gute Erfolge sieht man, wie Verf. mit Chiari bestätigen kann, ferner auch von der Tamponade der Höhle mit Jodoformgaze nach vorheriger Pulvereinblasung; dieselbe wird ein- bis zweimal wöchentlich vorgenommen, freilich wird die selbe nicht immer vertragen und muss dann wegen Kopfschmerz und anderen Reizerscheinungen wieder aufgegeben werden.

Ausser von dem Alveolarfortsatz aus kann die Kieferhöhle auch von der Fossa canina aus eröffnet werden, und zwar entweder wieder

durch Anlegen eines engen Canals oder mittelst breiter Eröffnung. Diese letztere Methode, von Küster, Grünwald, Jansen und Anderen empfohlen, ist indicirt, wenn durch die Ausspülungen oder die Trockenbehandlung oder Tamponade keine Heilung erzielt wird, wenn also hochgradige Veränderungen der Schleimhaut, Caries oder Polypen vorhanden sind.

Die Operation wird am besten in der Chloroformnarkose vorgenommen. Nachdem die Oberlippe stark emporgezogen, wird die sich bildende Schleimhautfalte bis auf's Periost durchschnitten und dieses mit dem Raspatorium abgehoben. Dann wird — wenn man nach der Methode von Grünwald operirt — ein nahezu viereckiges, 6 qmm Stück Knochen herausgemeisselt; nachdem die Höhle inspicirt und palpirt worden, wird die mit Granulationen oder Polypen besetzte oder auch zuweilen schon ulcerirte Schleimhaut mit gebogenen scharfen Löffeln herausgekratzt und allenfallsige cariöse Stellen entfernt. Darauf wird die Höhle mit Jodoformgaze tamponirt und die Heilung unter öfterem Wechsel (alle 3—4 Tage) des Jodoformtampons abgewartet. Küster legt eine etwas grössere Oeffnung an und ersetzt den Tampon durch ein Drainrohr. Die grösste Oeffnung legt Jansen an, indem er die ganze vordere Wand der Höhle bis zum Foram. infraorb. wegmeisselt; er legt 8—14 Tage nach der Operation einen aus vulcanisirtem Kautschuk verfertigten Obturator ein, der mittelst einer Klammer an einem Zahne befestigt wird. Die Heilung beansprucht in schweren Fällen mehrere Monate, ja selbst 1—2 Jahre.

Gegen die Eröffnung der Kieferhöhle vom Munde, sowohl zu diagnostischen als therapeutischen Zwecken, hat sich seit einigen Jahren eine lebhafte und zum Theil etwas unnöthige Agitation erhoben. Man warf nämlich dieser Methode vor, dass der durch die nicht verschlossene Oeffnung abfliessende Eiter Ekel errege und den Patienten den Appetit verderbe, dass durch das Hineingerathen von Speisetheilen oder infectiösen Mikroorganismen in die Kieferhöhle die Heilung verhindert werde und dass das Tragen einer Verschlussvorrichtung in der Oeffnung lästig sei und das Kauen erschwere.

So richtig auch die genannten Einwürfe beim Anlegen einer grossen und weiten Oeffnung sind, so unberechtigt erscheinen sie, wenn die Communicationsöffnung klein angelegt wird, da, wie bereits erwähnt wurde, durch eine kleine Oeffnung weder spontan Eiter abfliessen noch Genossenes eindringen kann.

Immerhin verdient der Vorschlag von Mikulicz, die Kieferhöhle von der äusseren Nasenwand aus durch Einbohren eines schneidenden Stilets (siehe Fig. 40) unterhalb des vorderen Endes der unteren Muschel zu eröffnen, Beachtung. Schäffer hatte schon früher bei den mit Schwund oder Usur der Knochen verbundenen Fällen mit seiner Löffelsonde diese Methode geübt. Krause verwendet dazu theils den Troicart, theils einen mit sehr harter Stahlspitze versehenen Katheter à double courant (siehe Fig. 41), Moritz Schmidt eine starke Injectionsnadel, Tornwaldt einen kleinen

Trepan, der mittelst einer Kurbel gedreht wird. Wenn auch die hier geschaffene Oeffnung nicht wie jene von den Alveolen oder der Fossa canina aus angelegte den tiefsten Punkt der Höhle trifft, so liegt sie demselben doch ziemlich nahe. Die Einwände Störk's und G. Killian's, dass man dabei die dickste Wandung der Höhle durchbrechen müsse, was sehr schwierig sei, und dass oft eine eigene Lamelle oberhalb der Alveolen liege, welche den oberen Theil der Kieferhöhle vollständig von dem unteren abschliesse, dass die Kieferhöhle nicht selten vom unteren Nasengang gar nicht zu erreichen und dass das Einführen einer Canüle zum Zwecke der Selbstausspülung sehr schwierig sei, sind vollständig berechtigt. Die von Zuckerkandl vorgeschlagene Eröffnung der äusseren Nasenwand hinter und

Fig. 40. Troicart von Mikulicz zur Eröffnung der Kieferhöhle von der Nase aus.



Fig. 41. Troicart und Canüle von Krause zur Eröffnung der Kieferhöhle von der Nase aus.

unter dem Infundibulum, da, wo der Sinus von der Nasenhöhle nur durch eine Membran oder ganz dünne Knochenlamelle getrennt ist, hat den Nachtheil, dass die angelegte Oeffnung sich sehr hoch über dem Boden der Kieferhöhle befindet, wodurch der Abfluss des Secretes erschwert wird. Im Uebrigen darf man nicht vergessen, dass die Einen mehr Vorliebe für die Eröffnung von den Alveolen aus, die Anderen mehr für die Operation von der Nase aus haben. Für auswärtige Kranke, welche nicht lange in ärztlicher Behandlung bleiben können, ist die Eröffnung von den Alveolen aus vorzuziehen, da die Selbstausspülung leichter gelingt.

Eine sehr seltene Erkrankung scheint nach Weichselbaum die Phlegmone der Highmorshöhle zu sein.

Sie charakterisirt sich als Entzündung der Auskleidungsmembran mit Einlagerung disseminirter oder confluirender und in Zerfall übergehender fibrinöser Plaques in die Membran selbst. Am häufigsten

und intensivsten scheint die Kieferhöhle befallen zu werden, doch erkranken auch die anderen Nebenhöhlen; die Nase ist entweder nicht betheiligt oder zeigt nur geringfügige Veränderungen.

Sowohl bei primärem als secundärem Auftreten der Affection, namentlich bei phlegmonösen Processen der Zunge und des Rachens oder bei Croup des Larynx und Pharynx, sind die Erscheinungen äusserst stürmisch und bestehen ausser in Fieber und Schmerzen in der Oberkiefer- und Stirnhöhlengegend in Störungen der Gehirnthätigkeit, die schon nach 2—4 Tagen zum Tode führen können. Als Complicationen der primären Form fand Weichselbaum Milzschwellung, Schwellung und Trübung der Leber und Nieren mit theilweiser fettiger Degeneration, Ecchymosen der Pleura und des Pericards.

Das Gesichtserysipel führt gleichfalls zuweilen zu phlegmonöser Entzündung der Sinusmembran; dieselbe unterscheidet sich jedoch von der obengenannten Form durch den Mangel fibrinöser Einlagerungen. In umgekehrter Weise führt auch die Sinusphlegmone zu Gesichtserysipel, was namentlich bei den den Abdominaltyphus begleitenden Erysipelen der Fall sein soll.

Diphtherie des Sinus maxillaris soll nach Zuckerkandl ohne Membranbildung verlaufen, da die sogenannte Schleimhaut des Sinus vermöge ihres anatomischen Baues unfähig ist, eine Pseudomembran zu bilden; es findet sich nur Ecchymosirung und Oedem.

Tuberculose der Kieferhöhle ist meist von der Nase oder von der Mundhöhle fortgeleitet; Fälle letzterer Art wurden von Réthi und Neumayer veröffentlicht.

Auch Pilze und Parasiten sowie Fremdkörper können in die Kieferhöhle eindringen. So fand man Oestruslarven, Fliegeneier, Soor und Schimmelpilze; Zarniko beobachtete bei einer Frau grosse Massen von Aspergillus fumigatus, die er durch Ausspülungen vom mittleren Nasengange aus entfernte. Fremdkörper, die nach Ziem am besten mit einem gebogenen, in die Höhle eingeführten Draht entfernt werden, verursachen nur dann stärkere Reaction, wenn die Höhle besonders intolerant ist oder wenn sie schon vorher erkrankt war.

Die Kieferhöhle ist ferner ziemlich häufig der Sitz von Neubildungen. Heymann constatirte, dass jeder neunte bis zehnte Mensch eine Geschwulst in seiner Kieferhöhle trägt.

Unter den gutartigen Neubildungen sind zu nennen: Zahn- oder Kiefercysten, Osteome, Osteophyten, Bildung von Knochenblättchen am Periost, Schleimpolypen, die von Zuckerkandl in gestielte, brückenartig zwischen den Wänden ausgespannte Geschwülste und in flache, breitbasige Schleimhauttumoren eingetheilt werden. Heymann, der 14mal Polypen gestielt auf der Schleimhaut sitzen sah, bezeichnet eine Art als faltenartige und eine andere Art als kiemenförmige

Polypen. Die Cysten gehen aus verschlossenen Drüsenausführungsgängen hervor und sind hirsekorn- bis haselnussgross. Heymann fand niemals eine einzelne Cyste, sondern stets mehrere, bis zu 11 an der Zahl.

Unter den bösartigen Neubildungen sind Sarkome, Medullar- und Epithelialcarcinome, wie solche von Onodi, Dreyfuss, Reinhard und Anderen beobachtet wurden, die häufigsten. Sie entstehen entweder primär in der Höhle oder wachsen aus der Nachbarschaft, so namentlich aus der Nase oder vom Oberkiefer in die Höhle erst hinein. Dass sich aber auch gutartige Geschwülste der Kieferhöhle in bösartige umwandeln können, ist von E. Fink constatirt.

Die Erscheinungen der Neubildungen sind, so lange dieselben die Höhle nicht ausdehnen oder durchbrechen, dunkel oder jenen bei Eiterungen gleich, zumal wenn noch Exsudation von schleimiger oder schleimig-eitriger Flüssigkeit stattgefunden hat. Ausdehnung oder Hervorwölbung der Sinuswände spricht stets für Tumorbildung, ebenso die Anwesenheit von Geschwülsten in der Gegend des Hiatus; sicher wird die Diagnose durch die Probepunction, wobei nach Entleerung allenfallsiger Flüssigkeit die Sonde sich nicht frei bewegen lässt, sondern auf Widerstand stösst. Bei der Durchleuchtung wird ferner die erkrankte Seite dunkel bleiben, wenn der Tumor ein solider ist, während Cysten das Licht durchlassen. Cysten können spontan bersten; nach Wernher verschwindet zuweilen die Ausdehnung der Sinuswände nach Abfluss einer albuminösen Flüssigkeit, auch nehmen die erweichten Knochen wieder Kalksalze auf.

Die Behandlung kann nur eine operative sein, wobei die Höhle breit eröffnet werden muss.

Die Krankheiten der Stirnhöhle.

Sie nehmen in Bezug auf Häufigkeit die zweite Stelle ein und sind nahezu dieselben wie jene der Kieferhöhle.

Die acute katarrhalische Entzündung der Stirnhöhle — Sinuitis frontalis catarrhalis — ist die Ursache der heftigen Stirnkopfschmerzen, welche theils dem Ausbruche einer gewöhnlichen Coryza oder dem Influenza-, Masern- und Jodschnupfen vorausgeht, theils denselben begleitet oder ihm nachfolgt. Bei manchen Personen wird jedesmal derselbe Sinus ergriffen. Der Schmerz, dessen Sitz die Kranken in die Gegend der Glabella oder in die Tiefe des Auges oder in die Gegend des Augenbrauenbogens verlegen, ist selten continuirlich, häufiger intermittirend von neuralgischem Charakter, klopfend, reissend oder bohrend. Zuweilen besteht Druckempfindlichkeit im oberen inneren Augenwinkel, ja sogar Oedem des oberen Augenlides. Trotz der Häufigkeit dieses Symptoms vergesse man

nicht, dass dasselbe auch durch Ulcerationen und Granulationen der Nasenschleimhaut bedingt, also reflectorischer Natur sein kann.

Die objective Untersuchung ergibt meistens nur die Erscheinungen eines acuten Nasenkatarrhs.

Die Behandlung besteht in vorsichtiger Anwendung der Nasendouche mit warmer 1% Kochsalz- oder Sodalösung oder, wenn die Douche nicht ertragen wird, in Inhalationen heisser Wasserdämpfe, warmen oder kalten Umschlägen auf die Stirngegend, Einreibung narkotischer Salben oder Chloroformöl. Nach Zarniko sollen sich manchmal durch die Coeaïnisirung des Naseninnern die Beschwerden verringern. Sehr guten Erfolg sah Verf. stets von der Politzer'schen Luftdouche in Verbindung mit Antipyrin, Salipyrin, Phenacetin, Migränin.

Wie bei der Kieferhöhle, so kommt auch in der Stirnhöhle eine Ansammlung seröser Flüssigkeit — Sinuitis serosa oder Mukokele (Hydrops) und von Eiter — Sinuitis blennorrhoica sive pyorrhoica, Empyem — vor. Uebergangsformen, d. h. Ergüsse von schleimiger, schleimig-eitriger, eitrig-hämorrhagischer Flüssigkeit sind ausserordentlich häufig.

In der Aetiologie der chronisch-entzündlichen Stirnhöhlenerkrankungen spielen nach Kuhnt die individuelle Disposition, die Grösse und Form des Sinus, die Configuration des Ductus nasofrontalis sowie Verbiegungen und Auswüchse des Septum eine grosse Rolle; ebenso scheinen ungleichmässige Lebensweise, Narbenbildung im mittleren Nasengang von wesentlichem Einfluss zu sein. Die speciellen Ursachen sind dieselben, die bereits im Capitel „Allgemeine Aetiologie" erwähnt wurden.

Bei der Sinuitis serosa, Mukokele, Hydrops, findet sich die Schleimhaut anfangs injicirt, ecchymosirt, später bis zu gänzlicher Ausfüllung der Höhle aufgequollen, ödematös und von gelblichem Serum durchsetzt; auch freie Flüssigkeit von dünner, fadenziehender, honigartiger oder noch dickerer Consistenz, von trüber oder bernsteingelber oder chocoladeartiger Farbe, nicht übelriechend und frei von Mikroorganismen, ist in verschiedener Menge vorhanden. Die Affection entwickelt sich in der Regel äusserst langsam und nicht selten ohne besondere Beschwerden, doch kann Druck im Kopfe sowie Supraorbitalneuralgie den Beginn der Erkrankung anzeigen. Wird der Ausführungsgang verlegt, was bei der Enge und Länge des Stirnnasencanals viel leichter möglich ist als bei den anderen Nebenhöhlen, so bildet sich allmälig am inneren Augenwinkel eine weiche, fluctuirende Geschwulst, meist in der Nähe der Nasenwurzel, etwas oberhalb des Thränensackes. Durch den wachsenden Druck der Flüssigkeit wird die Knochennaht zwischen Thränenbein und Orbita auseinandergedrängt, so dass die ödematöse Sinusmembran in die Nasenhöhle gelangt und dort als ein bisweilen auf den Nasenboden herabhängender Tumor gesehen werden kann. Natürlich ist in solchen Fällen die betreffende Nasen-

höhle mehr oder weniger verstopft und treten Erscheinungen wie bei Neubildungen der Nase auf Exophthalmus mit Verdrängung des Auges nach vorne, aussen und unten, sowie Hervorwölbung der Stirngegend gehören zu den weiteren Erscheinungen. Die vordere Wand der Stirnhöhle wird verdünnt, bei Druck nachgiebig, zuweilen wie der Deckel einer blechernen Dose, oder fluctuirend; die Geschwulst zeigt sich in Form und Grösse sehr veränderlich, was in der zeitweisen Entleerung des Sinusinhaltes seinen Grund hat; manchmal entleert sich plötzlich mit momentaner Erleichterung für den Kranken eine grosse Menge wässerig-trüber, dünner, milchähnlicher Flüssigkeit durch die Nase, wie die von H. Fischer und Paget mitgetheilten Fälle beweisen. Schwere Gehirnsymptome kommen nur ausnahmsweise vor, meist dann, wenn der Sinusinhalt eitrig geworden ist; im Uebrigen hat der Stirnhöhlen-Hydrops keine oder nur eine sehr geringe Neigung zum Durchbruch nach aussen und verläuft meist ohne Ostitis oder Periostitis der Sinuswandungen. Immerhin ist er eine ernste Erkrankung; doch ist die Prognose insoferne günstig, als letaler Ausgang äusserst selten ist und nach Beseitigung der Flüssigkeit die Störungen sich meist völlig zurückbilden.

Dieselben Erscheinungen machen auch Blutergüsse, die nach Steiner zu den allergrössten Seltenheiten gehören und durch heftigen Stoss auf die Augenlidgegend erzeugt werden können.

Die Behandlung ist dieselbe wie die der chronischen Eiterung.

Bei der eitrigen Entzündung — Sinuitis pyorrhoica, Empyem — sind die Veränderungen um so hochgradiger, je länger die Affection dauert; die Schleimhaut ist mehr oder weniger geschwellt, verdickt, gewulstet, die Zahl der Gefässe ist vermehrt, ihr Lumen erweitert, ihr Verlauf geschlängelt. In sehr veralteten Fällen ist die Schleimhaut zottig, uneben und mit zahlreichen grösseren und kleineren, weicheren und härteren Wucherungen oder mit wirklichen Schleimpolypen besetzt, nicht selten finden sich ulceröse Zerstörung und Verfärbung der Schleimhaut, Caries und Nekrose der Knochen mit Perforation der Wandung und Fistelbildung. Die Erkrankung der Knochen ist entweder Folge der Erkrankung der Schleimhaut oder bedingt durch eine Dyskrasie oder durch ein Trauma. Das Secret ist fast niemals rein eitrig, meist ist es schleimig-eitrig, dünn oder dick zu Klumpen geballt, seltener gallertig oder kaulquappenartig, von grüner, gelber, röthlicher oder chocoladebrauner Farbe, oft sehr übelriechend, ja jauchig und ausserordentlich reich an Mikroorganismen, namentlich an Streptokokken, Pneumoniokokken und anderen theilweise indifferenten Kokken (Kuhnt) Der Ausführungsgang kann offen, theilweise oder ganz verlegt sein, doch ist letzteres nicht nöthig, um Perforation und andere schwere Erscheinungen zu erzeugen Deshalb erscheint auch die Eintheilung in offene und geschlossene Empyeme nicht durchführbar, weil es, wie Verf. mit E Richter behaupten muss, rein offene und rein geschlossene Empyeme überhaupt nicht gibt: wenn

es auch plötzlich durch Schwellung des Ausführungsganges zu temporärem Verschluss, also zu geschlossenem Empyem kommt, so verwandelt sich das letztere doch sofort wieder in ein offenes, wenn der Eiter wieder abfliessen kann. Mit mehr Recht könnte man von nichtperforirenden und perforirenden Stirnhöhleneiterungen sprechen; die ersteren hat man auch als latente, die letzteren als manifeste Empyeme bezeichnet.

Die Erscheinungen, welche chronische Stirnhöhleneiterungen zur Folge haben, können sehr geringfügig, aber auch äusserst heftig sein. Unter den subjectiven Beschwerden nimmt der Kopfschmerz unstreitig die erste Stelle ein. Derselbe tritt in der Mehrzahl der Fälle in der Form der typischen Supraorbitalneuralgie, und zwar mit einer Heftigkeit und Regelmässigkeit auf, dass die Kranken hiedurch allein schon gezwungen werden, ärztliche Hilfe zu suchen. In anderen Fällen tritt der Schmerz mehr continuirlich, aber weniger heftig auf, oder er wird als dumpfer Druck über dem Auge und der Glabella, oder als Benommenheit des ganzen Kopfes oder der Schläfengegend und des Hinterkopfes bezeichnet. Eine Steigerung erfährt der Schmerz meistens bei Vorwärtsbeugung und Congestionirung des Kopfes, beim Husten, Pressen, Niesen, bei Verlegung des Ausführungsganges, bei geistiger und körperlicher Anstrengung, bei Genuss von Alkohol und Tabak. Nach Kuhnt trägt auch die durch die Schleimhautschwellung gesetzte Zerrung und Dehnung der Fasern, der chemische Reiz des Eiters, die Empfindlichkeit der Knochenwände und vielleicht auch eine gewisse Hyperämie der Meningen die Schuld an dem Auftreten des Schmerzes. Schmerzhafte Empfindungen können aber auch vollständig fehlen, wie Williams, Engelmann, Hajek, M. Schmidt und Andere beobachtet haben.

Sehr häufig sind ferner Schwindelanfälle, Gedächtnissschwäche, Unfähigkeit zu geistiger und körperlicher Arbeit, geringe Resistenz gegen Alkohol und Tabak (Grünwald), Appetitlosigkeit, Schlaflosigkeit, allgemeine Nervosität, Mattigkeit, Trübsinn, Anämie und Abmagerung.

So verdächtig aber auch die genannten Beschwerden sind, charakteristisch sind sie nicht, weshalb den objectiven Erscheinungen ein viel höherer Werth zukommt. Dazu gehört vor allen Dingen die beim Beklopfen mit dem Finger auftretende Empfindlichkeit und Schmerzhaftigkeit der vorderen und unteren Wand der Stirnhöhle resp. der Gegend zwischen innerem oberen Augenwinkel und Foram. supraorbitale. Nebstdem lassen sich häufig an dieser Stelle bei der Palpation Veränderungen am Knochen und den ihn überziehenden Weichtheilen constatiren, als da sind: Verdickung des Periosts und des submucösen Zellgewebes, Infiltration der Cutis, circumscripte Vorwölbung der unteren Wand (Kuhnt, Jansen, E. Richter). Kuhnt erwähnt ferner eine gewisse Hyperästhesie der Haut innerhalb des druckempfindlichen Knochenbezirkes und eine intensive Röthung und das längere Rothbleiben der gedrückten und geklopften Stellen der vorderen Sinuswand. Die Vorwölbung der inneren

oberen Orbitalwand ist in Folge der Verdünnung des Knochens meist von geringer Resistenz, elastisch und eindrückbar oder sogar schon fluctuirend; doch kann dieselbe ausnahmsweise, wie in einem von Herzog Carl mitgetheilten Falle, eine derartige Härte besitzen, dass eine Exostose der Orbita vorgetäuscht wird. Bei Kindern liegt die hervorgewölbte Stelle wegen der nur in senkrechter Richtung stattfindenden Entwicklung der Stirnhöhle senkrecht an den seitlichen Partien der Nasenwurzel. Bereitet sich die Perforation vor, so stellen sich meistens phlegmonöse und ödematöse Schwellung des oberen Augenlides, Ptosis, subperiostale Abscessbildung, entzündliche Schwellung des orbitalen Gewebes, Exophthalmus und Dislocation des Bulbus ein. Die Folgen davon sind Doppeltsehen, Einengung des Gesichtsfeldes, Herabsetzung des centralen Sehens, musculäre Asthenopie, Accommodationsstörungen, Schwächung des M. rectus internus, ferner entzündliche Veränderungen an Bindehaut, Hornhaut und Netzhaut, als da sind: Katarrhe, Herpes, Infiltrate und Vereiterungen der Cornea, Cyclitis, Iritis, Chorioiditis, Hyperämie, Schlängelung und Erweiterung der Venen in der Papille des N. opticus.

Sehr wichtig ist ferner der Befund in der Nasenhöhle. Meist bestehen übelriechender, einseitiger Nasenausfluss, Verstopfung der Nase und Geruchsstörungen. Der Eiter quillt aus dem Hiatus hervor, dessen Umgebung meist entzündlich geschwellt, hypertrophisch mit Granulationen oder Schleimpolypen besetzt ist. Die Menge des Eiters kann durch die Sondirung verstärkt und derselbe durch die Ausspülung zu Tage gefördert werden; nicht selten lassen sich im Ductus nasofrontalis cariöse Stellen nachweisen. Bei der Durchleuchtung bleibt in vorgeschrittenen Fällen der erkrankte Sinus dunkel, während im Anfangsstadium die Resultate negativ oder zweifelhaft ausfallen.

Der Verlauf und Ausgang der Stirnhöhleneiterung ist sehr verschieden, stets aber ein chronischer; in einem vom Verf. beobachteten Falle bestand die Affection sicher 40—50 Jahre. Im Anfange können die Erscheinungen sehr mässig sein, im weiteren Verlaufe kommt es aber stets zu Veränderungen am Knochen, zu Verdünnung, Schwund der Knochensubstanz mit Erweiterung der Höhle oder zu Caries und Nekrose. Eine sehr beträchtliche Steigerung der subjectiven Beschwerden findet statt bei Secretstauung oder Verschluss des Ausführungsganges, ein Nachlass nach Abfluss grösserer Eitermengen, mag dieselbe spontan oder nach Sondirung und Ausspülung zu Stande kommen. Das Gehirn zeigt bei Ektasie der Höhle sehr oft eine auffallende Toleranz gegenüber dem langsam wachsenden Drucke. Nicht selten kommt es aber auch zu Reiz- und Druckerscheinungen, zu Hyperämie der Meningen, Meningitis, halbseitiger Lähmung, Sinusthrombose und Abscessbildung. Der Tod erfolgt am häufigsten durch Perforation der hinteren Wand der Höhle; merkwürdigerweise fand sich dabei der Ausführungsgang häufiger wegsam als unwegsam (Kuhnt). Die durch spontanen Durchbruch der unteren Wand entstandenen Fisteln heilen selten ohne Kunsthilfe. Von Mason Warren wurde ein Fall beschrieben, bei

dem es zur Bildung eines Lufttumors kam; auch Verf. sah einen ähnlichen Fall bei einem Arbeiter, dem durch eine Hacke die Stirnhöhle eröffnet worden war und der durch Pressen und Schneuzen Eiter und Luft unter die Stirnhaut eindringen lassen konnte. Nicht selten kommt es zu partiellem, ja sogar zu allgemeinem Emphysem der Haut, wie schon von Desprès beobachtet wurde.

Die Diagnose ist im „latenten" Anfangsstadium und bei dem Mangel oder geringer Entwicklung der objectiven Erscheinungen sehr schwer und sind Verwechslungen mit Kieferhöhlen- oder Siebbeinempyem, namentlich wenn dasselbe mit Supraorbitalneuralgie einhergeht, sehr leicht möglich. Immerhin wird es möglich sein, gestützt auf die Resultate der Palpation, des Befundes in der Nase, der Sondirung und Probeausspülung im Vereine mit dem Ergebnisse der Durchleuchtung und durch Verwerthung der Anamnese die richtige Diagnose zu stellen. In jenen Fällen, bei denen bereits Symptome am Auge, Exophthalmus, Lidabscess oder gar Fistel vorhanden sind, ist die Diagnose ohnehin leicht.

Die Prognose ist stets eine ernste, da sich plötzlich schwere Gehirnsymptome oder Verlust des Auges einstellen können. Dass aber auch Gehirnabscesse lange Zeit latent verlaufen und plötzlich durchbrechend das letale Ende hervorrufen können, hat Verf. selbst erlebt. Immerhin ist es möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass acute Empyeme spontan heilen.

Die Behandlung richtet sich nach dem Stadium, in dem sich die Affection befindet. In ganz frischen Fällen kann sie eine zuwartende sein, namentlich wenn keine bedenklichen Erscheinungen vorhanden sind; Engelmann warnt vor dem Sondiren, um nicht zu reizen und um keine Infectionsstoffe in die Höhle zu bringen. Verf. kann die Luftdouche bestens empfehlen. Auch durch ein passendes diätetisches Verhalten, Meiden von Alkohol und Tabak, Eisumschläge, Bettruhe, gelinde Abführmittel oder durch eine energische, jeden zweiten bis dritten Tag vorzunehmende Schwitzcur, Jaborandithee in Verbindung mit Phenacetin, Antipyrin, Salipyrin, ferner durch locale Behandlung des acuten Schnupfens mittelst Borsäurespray und Lapislösung gelingt es nicht selten, Heilung herbeizuführen (E Richter und Habermann). Nach Hajek genügt zuweilen die Säuberung des Ausführungsganges von Polypen und Granulationen allein, um Heilung zu erzielen. Gelingt sie nicht, dann schreite man zur Ausspülung der Höhle von der natürlichen Oeffnung aus, die meistens erst dann gelingt, wenn in der Tiefe des Hiatus verborgene Hypertrophien oder Polypen entfernt sind und das vorderste Ende der mittleren Muschel weggenommen wurde. Am besten eignet sich warme 3% Borlösung, die man später nach Hajek durch 5 bis 10% Lapislösung ersetzt.

In sehr veralteten Fällen mag man immerhin eine Zeit lang die Ausspülung von der Nase oder die Application von Hexaäthylviolett mit der Sonde versuchen; nach Verf. Erfahrung erzielt man damit zwar Besserung, aber keine Heilung. Deshalb ist die Eröffnung der Stirnhöhle von aussen als die einzige absolut sichere Methode zu

empfehlen. Als Indication derselben betrachtet Verf. nicht mehr wie früher das Auftreten von Gehirnerscheinungen oder von Symptomen am Auge oder Fistelbildung, sondern jeden Fall, bei dem heftige Supraorbitalneuralgie das alleinige subjective Symptom bildet. Auch die überwiegende Mehrzahl der neueren Autoren, vor Allen auch Kuhnt, verwirft die Behandlung von der Nase aus und empfiehlt die Eröffnung von aussen.

Die Methoden sind im Principe alle gleich, sie unterscheiden sich nur in Bezug auf die Schnittführung und auf die Grösse der Oeffnung. Die Einen, wie Grünwald, legen den Schnitt in die Corrugatorfalte, die Anderen über, unter oder in den Augenbrauenbogen (Krecke), welch' letzteres Verf. bestens empfehlen kann.

Die Operation gestaltet sich nach Krecke folgendermassen: Nachdem die Augenbrauen rasirt sind, wird ein Schnitt genau am Margo supraorbitalis von der Nasenwurzel bis etwa zum äusseren Drittel der Orbita geführt. Will man noch den N. supraorbitalis nach Thiersch extrahiren, so kann dies gleichfalls von diesem Schnitte aus geschehen. Der Schnitt wird dann bis auf den Knochen vertieft und das Periost nach oben und unten mit dem Raspatorium abgehebelt. Die Blutung ist dabei ziemlich stark, steht aber leicht bei längerer Compression. Bemerkt sei noch, dass man an der druckempfindlichen Stelle am inneren oberen Orbitalrand meist Verdickung des Periosts und des submucösen Gewebes, Infiltration der Haut oder Hervorwölbung und Verdünnung des Knochens, zuweilen mit Verfärbung (Jansen), vorfindet. Nachdem nun der Knochen freigelegt ist, setzt man einen nicht zu kleinen Hohlmeissel am Supraorbitalrand ein und meisselt mit kräftigen Hammerschlägen bis auf die Schleimhaut durch. Sobald die Sinusschleimhaut, die meist einer bläulich schimmernden, sulzigen Blase ähnlich sieht, freiliegt, wird eine Sonde in den Sinus eingeführt, um die Ausdehnung desselben zu bemessen. Je nach der Grösse des Sinus wird die Oeffnung in der vorderen Wand nach allen Seiten erweitert, eventuell wird auch noch ein Stück der unteren Wand weggenommen, so dass man nach allen Richtungen hin den Sinus übersehen kann. Sodann wird mit dem scharfen Löffel die ganze Schleimhaut entfernt und der Ausführungsgang nach der Nase hin erweitert und ebenfalls ausgekratzt Die Wunde wird mit Jodoformgaze tamponirt und verbunden Der erste Tampon wird nach 5—6 Tagen entfernt und durch einen neuen ersetzt. In der zweiten Woche macht sich bereits Granulationsbildung bemerkbar, die immer stärker wird, so dass die Menge der einzuführenden Jodoformgaze immer kleiner wird. Durch Cauterisation mit Arg. nitr. wird die Vernarbung unterstützt und nach 2—3 Monaten ist die Wunde geheilt. Wie Verf. mit Krecke bestätigen kann, ist die durch die Narbe erzeugte Entstellung eine äusserst geringe, zumal wenn die etwas eingezogene Narbe genau in den wieder mit Haaren besetzten Augenbrauenbogen fällt.

Jansen entfernt nicht die vordere, sondern die untere von dem Orbitaldach gebildete Stirnhöhlenwand ziemlich tief bis in die Orbita hinein. Engelmann empfiehlt die Methode von Killian, wobei

ebenfalls breit eröffnet, das Nasenbein vom Stirnbein gelöst und in Verbindung mit Periost und Haut nach aussen geklappt und eine breite Verbindung zwischen Stirnhöhle und Nase angelegt wird.

Zu erwähnen ist noch, dass manche Autoren, wie z. B. Habermann und auch theilweise Kuhnt, nach Eröffnung der Höhle die Schleimhaut nur theilweise entfernen und methodische Ausspritzungen und Pulverinsufflationen vornehmen, bis die Schleimhaut zur Norm zurückgekehrt ist Sicherer scheint jedenfalls die Entfernung der ganzen Sinusmembran.

Zum Schlusse muss noch der Eröffnung der Stirnhöhle von der Nase aus gedacht werden. Schäffer und Winckler schlugen vor, den Stirnhöhlenboden von der Nase aus durch eine kräftige Sonde zwischen mittlerer Muschel und Scheidewand einzustossen und dann die Höhle methodisch auszuspülen. Diese Methode hat jedoch bei fast allen Autoren als viel zu gefährlich keinen Anklang gefunden.

Die Stirnhöhle ist ferner auch der Sitz von Neubildungen. Ziemlich häufig sind Schleimpolypen, Cysten, ganz besonders aber Osteome, die nach Arnold, Banga, Bornhaupt und Anderen von der Innenfläche der Stirnhöhle ihren Ausgang nehmen und theils aus compacter, theils spongiöser Knochenmasse bestehen, theils nach aussen wachsen, theils in das Schädelinnere vordringen. Ihr Verlauf und Wachsthum ist in der Regel sehr chronisch und kann sich auf Jahrzehnte erstrecken. Sie entstehen meist zur Pubertätszeit, wahrscheinlich aus Wachsthumsanomalien der Stirnhöhle. Sie können, wie in einem von Poppert mitgetheilten Falle, so gross werden, dass der Bulbus nach aussen und unten verdrängt wird. Von Sarkomen und Ecchondromen unterscheiden sie sich durch das langsame Wachsthum und ihre grosse Härte. Von Osteomen der Siebbeinzellen unterscheiden sie sich dadurch, dass sich bei ersteren die Geschwulst am inneren Augenwinkel in der Orbita selbst entwickelt und der Bulbus gerade nach aussen verdrängt wird.

Die von Dolbeau und Tillmanns beschriebenen todten Osteome haben daher ihren Namen, weil sie nicht von Weichtheilen bedeckt sind und keinen Stiel haben, sondern als abgestossene Sequester frei in den Nebenhöhlen liegen.

Zu den Seltenheiten gehören Teratome, Cholesteatome und Carcinome; so beobachtete Salzer einen eigrossen Tumor der Stirnhöhle, der aus Fettgewebe, glatten Muskelfasern, kleinen Knöchelchen und Haare enthaltenden Cysten bestand; Weinlechner entfernte mittelst Trepanation ein grosses blätteriges Cholesteatom, das durch Eindickung des Eiters eines 12 Jahre bestehenden, durch Fall auf die Stirngegend verursachten Empyems entstanden war.

Die Symptome der Stirnhöhlengeschwülste sind bedingt durch die Grösse, den Sitz und das Wachsthum der Geschwülste und mit den bei der Mukokele und dem Empyem beschriebenen grösstentheils identisch.

Die Behandlung kann nur eine operative sein.

Die Krankheiten der Siebbeinhöhlen.

Die Aetiologie der Erkrankungen der Siebbeinzellen, unter welchen wieder die chronische Eiterung die häufigste ist, ist dieselbe, wie sie bereits in dem Capitel „Allgemeine Aetiologie" angegeben wurde.

Die Siebbeinhöhlen erkranken theils primär und allein, theils secundär und in Verbindung mit anderen benachbarten Höhlen, so besonders mit der Kiefer- und Stirnhöhle. In sämmtlichen von Jansen operirten Fällen von Stirnhöhlenempyem war auch das Siebbein mit ergriffen.

Die Schleim- und Eiteransammlung in den Siebbeinzellen kann eine geschlossene und eine offene sein. In ersterem Falle sind eine oder mehrere Siebbeinzellen mit freier oder in Cysten eingeschlossener schleimiger, heller und dicker oder trüber Flüssigkeit gefüllt. Die mittlere Muschel kann in Folge dessen vergrössert, namentlich in ihrem vorderen Ende verdickt, sie kann aber auch völlig normal erscheinen. Nach Berger und Tyrmann kommt es dabei nicht selten zu Atrophie der Scheidewände nebeneinanderliegender Siebbeinzellen oder zu Verschmelzung mehrerer Höhlen in eine, zur Bildung glatter, einkammeriger Cysten, zu Verschmelzung der Siebbeinzellen mit der Stirnhöhle oder der Orbita.

Geschlossene Empyeme finden sich nicht selten in den als Knochenblasen oder Knochencysten beschriebenen Geschwülsten Am häufigsten sitzen sie am vorderen Ende der mittleren Muschel, wo sie Verstopfung der Nase und, je nach der Grösse, Verbreiterung des Nasenrückens zur Folge haben. Sind mehrere derartige Hohlräume vorhanden, dann kommt es neben beträchtlicher Auftreibung des Nasenrückens zu Compression des Thränennasenganges und zu Geschwulstbildung im inneren Augenwinkel resp. zu Hervorwölbung der Orbita und mehr oder weniger hochgradiger Verdrängung des Bulbus nach aussen und oben. Geschlossene Empyeme können aber auch völlig latent verlaufen und zufällig eröffnet werden, wie dies nicht selten bei der Entfernung von Schleimpolypen geschieht.

Die Behandlung kann nur eine operative sein und muss in Eröffnung der Schleim- und Eiterherde mit dem Troicart oder dem galvanokaustischen Brenner oder dem Meissel oder in der Abtragung der ganzen Geschwulst mit der kalten oder heissen Schlinge bestehen.

Die Lehre von den offenen Siebbeineiterungen kann zur Zeit noch nicht als abgeschlossen betrachtet werden. Es gibt dabei so viele strittige Punkte und so wenige pathologisch-anatomische Befunde, dass eine weitere Bereicherung unseres Wissens dringend angezeigt erscheint.

Vor allen Dingen erhebt sich die Frage, ob es eine selbstständige nekrotisirende Ethmoiditis, die einer schleichenden Entzündung der Sinusmembran mit Periostitis und Nekrose ihre Ent-

stehung verdankt und die Woakes zuerst beschrieben, wirklich gibt. Verf. muss diese Frage im Princip bejahen, denn so gut es eine zu Nekrose führende Kiefer- und Stirnhöhleneiterung gibt, die einer katarrhalischen Entzündung ihre Entstehung verdankt, ebensogut kann derselbe Process sich auch in dem so exponirt liegenden Siebbein abspielen. Dass Dyskrasien, namentlich Syphilis und Tuberculose, mit besonderer Vorliebe die Muscheln ergreifen, ist ohnehin zur Genüge bekannt. Eine andere Frage ist die nach den Beziehungen der Polypen zu der Erkrankung des Siebbeins. Woakes und Grünwald halten die Polypen für die Folgen der Eiterung. Hajek ist geneigt, weder die Polypenbildung als eine directe Folge der Ethmoiditis, noch umgekehrt die Polypen als directe Ursache der Ethmoiditis anzusehen; beide Dinge gingen eben häufig nebeneinander her, weil sie das gemeinschaftliche Resultat der chronisch-katarrhalischen Entzündung seien Polypen an der mittleren Muschel aber als pathognomonisch für Eiterungen resp. Caries im Siebbein oder in anderen Nebenhöhlen zu betrachten, ist unstatthaft, zumal dieselben auch ohne jede Eiterung und ohne jede Erkrankung der Knochen vorkommen.

Die subjectiven Erscheinungen sind im Allgemeinen jenen bei Kiefer- und Stirnhöhleneiterungen ausserordentlich ähnlich. Besonders heftig ist der Kopfschmerz, der von den meisten Kranken in die Gegend der Nasenwurzel und den unteren inneren Theil der Orbita oder in die obere Wangengegend verlegt wird. Sehr häufig klagen ferner die Kranken über ziehende und bohrende Schmerzen, über ein Nagen und Bohren, als ob ein Thier in der Nase sässe. Dabei sind häufig absolute Unfähigkeit zu geistiger oder körperlicher Arbeit, Schwindel, melancholische Gemüthsstimmung und schweres Krankheitsgefühl vorhanden. Die localen Symptome, Behinderung der Nasenathmung, Geruchsstörungen, Eiterabfluss, sind dieselben wie bei Erkrankungen anderer Höhlen.

Die objective Untersuchung ergibt nicht selten, nach Schäffer sogar ungewöhnlich häufig, erysipelatöse Anschwellungen der Nase, Wangen und der Infraorbitalgegend. Druck auf die Nasenwurzel und auf die Thränenbeine wird, wie Verf. mit Grünwald bestätigen kann, sehr schmerzhaft empfunden, ebenso auch Druck auf die Gegend der Stirnhöhle. Bei Erweiterung der Höhlen ist Verbreiterung des Nasenrückens und Geschwulstbildung im inneren Augenwinkel mit Verdrängung des Bulbus und Doppeltsehen vorhanden. Ist die Geschwulst am inneren Augenwinkel weich und fluctuirend, dann bereitet sich der Eiter zur Perforation vor, wobei es zu Oedem und Abscessbildung am unteren Augenlid oder zu Orbitalphlegmone kommen kann. Von grösster Wichtigkeit ist der rhinoskopische Befund: die Anwesenheit kleinerer und grösserer Polypen oder Granulationswucherungen oder Hypertrophien an der mittleren Muschel, ferner das Abfliessen von Eiter, dessen Menge bei Druck auf die mittlere Muschel oder auf die Polypen sich sichtlich vermehrt. Der Ort, wo der Eiter hervorquillt, ist verschieden nach dem Sitze der Erkrankung. Bei Affection der vorderen Siebbeinzellen erscheint der Eiter gewöhnlich

im mittleren Nasengang resp. im Hiatus, entsprechend der Lage des natürlichen Ausführungsganges; nicht selten erscheint er aber auch wie bei dem Ergriffensein der hinteren Siebbeinzellen in der Rima olfactoria oder im hintersten Theil der Nase und im Nasenrachenraum. Ganz besonderer Werth wird von Grünwald und Anderen auf die Constatirung von Caries gelegt, wobei die Sondenspitze rechtwinkelig abzubiegen und die ganze mittlere Muschel nach den verschiedensten Richtungen hin methodisch abzutasten ist.

Der Verlauf der Siebbeineiterungen ist meist ein sehr chronischer. Schwere Complicationen können, wie erwähnt, bei Durchbruch in die Orbita erfolgen; letaler Ausgang ist selten und erfolgt meist nur bei Caries und Durchbruch der Lamina horizontalis, durch eitrige Meningitis oder Hirnabscess.

Die Diagnose kann bei dem Vorhandensein der obenerwähnten objectiven Veränderungen sehr leicht, bei Fehlen oder geringer Entwicklung derselben aber äusserst schwierig sein. Nicht selten ist die Diagnose nur nach Ausschluss anderer Nebenhöhleneiterungen möglich, wie im Capitel „Allgemeine Diagnose" bei Besprechung der Diagnose combinirter Empyeme ausgeführt wurde. Warnen möchte Verf. mit Hajek vor der allzu einseitigen Verwerthung der „Caries". Abgesehen davon, dass selbst bei der schonendsten Entfernung der Nasenpolypen mit kalter oder heisser Schlinge ein Stück Muschelschleimhaut mit abgerissen, der Knochen also blossgelegt und bei der Sondenuntersuchung als „rauh" und cariös befunden wird, kann auch ohne diese Verletzung die Sonde leicht in die Tiefe dringen und den Knochen berühren. Auch Jansen sagt, dass durch die zahlreichen Kanten und Unebenheiten, die dünnen und leicht zerbrechlichen Knochensepta unschwer das Gefühl von rauhem und entblösstem Knochen künstlich hervorgebracht werden könne und dass die zahlreichen auf Sondenuntersuchung fundirten Diagnosen von Caries der Nebenhöhlen mit ihren verblüffenden Resultaten von Heilungen mit einiger Vorsicht aufzunehmen seien. Aber auch abgesehen von möglichen Täuschungen ist durch Anatomen und Kliniker die relative Seltenheit von Caries bei Nasenpolypen constatirt worden.

Die Behandlung muss in erster Linie in der Entfernung von Hypertrophien, Granulationen oder Polypen mit der Schlinge oder Curette bestehen. Sind diese entfernt oder keine vorhanden, dann kratze man die cariösen Stellen mit dem scharfen Löffel aus oder entferne sie mit der Knochenzange. Nach Reinigung mit Borwasser wird Jodoform oder Jodolpulver insufflirt und, wenn nöthig, mit Jodoformgaze tamponirt. Grünwald bringt zur Stillung der zuweilen sehr heftigen Blutung frisches Wasserstoffsuperoxyd mittelst Watte in die ausgekratzten Höhlen. Auch Aetzungen mit Chromsäure, Carbolsäure, Lapis in Substanz oder Betupfungen mit an eine Sonde ungeschmolzenem Hexaäthylviolett (Bresgen) werden zur Heilung resp. Verminderung der Eiterung empfohlen. Bei Geschwulstbildung im inneren Augenwinkel kann man nach Schäffer versuchen, mit der Löffelsonde nach aussen rückwärts und oben in die äussere Nasen-

wandung an der Ansatzstelle der mittleren Muschel einzugehen und durch Eröffnung der orbitalen Siebbeinzellen dem Eiter Abfluss zu verschaffen; Bresgen eröffnet mit dem Meissel die Bulla ethmoidalis. Gelingt dies nicht oder bereitet sich die Geschwulst zum Durchbruche vor, so muss von aussen operirt werden. Grünwald empfiehlt einen bogenförmigen Schnitt, der unmittelbar unter der Augenbraue derselben parallel von der Hälfte derselben beginnend, bis zur Nasenwurzel, wo er umbiegend bis etwa zur Hälfte des Nasenbeins heruntergeführt wird und am inneren Augenwinkel endigt. Der N. supraorbitalis wird geschont, eventuell nach Durchtrennung der das Foramen bedeckenden Knochenbrücke bei Seite geschoben. Mit dem Elevatorium wird der ganze Lappen sammt Periost nach unten abgehebelt, wodurch die innere Orbitalwand mit der Lamina papyracea freigelegt wird. Dieselbe wird mit dem Meissel durchbrochen, ebenso das Thränenbein, durch das man nach innen hinten und unten in das Siebbein gelangt. Einen wesentlichen Vortheil hat diese Methode bei gleichzeitiger Erkrankung der Stirnhöhle, deren untere Wand bequem von hier eröffnet werden kann.

Von Neubildungen des Siebbeins, die theils in demselben entstehen, theils von der Nachbarschaft hineinwachsen, hat man beobachtet: Schleimpolypen, Fibrome, Osteome, Elfenbeinexostosen; von bösartigen Neubildungen: Sarkome, Lymphosarkome und Carcinome.

Die Erscheinungen bestehen, wenn die Geschwülste die Höhle durchbrechen, in Verlegung der Nase, Dacryocystoblennorrhoe oder Thränenträufeln in Folge von Compression des Thränennasenganges, Verbreiterung des Nasenrückens, Hervorwölbung der inneren Orbitalwand, Verdrängung des Bulbus mit beschränkter oder völlig aufgehobener Beweglichkeit des Augapfels und Verminderung der Sehschärfe oder Amaurose.

Die Prognose der gutartigen Geschwülste ist insoferne günstig, als sie operativ entfernt werden können; absolut ungünstig sind die malignen Neubildungen, die durch Eindringen in die Orbita, Kieferhöhle und in das Gehirn sowie durch Metastasen letal enden.

Die Krankheiten der Keilbeinhöhle.

Wie an den anderen Nebenhöhlen, so sind auch bei der Keilbeinhöhle die häufigsten Erkrankungen die acute und chronische Entzündung der Sinusmembran.

Die Aetiologie ist dieselbe wie bei den Krankheiten der anderen Höhlen, namentlich spielen Katarrhe der Nase und des Nasenrachenraumes unstreitig die erste Rolle; auch ist die Keilbeinhöhle

bei acuten Phlegmonen des pharyngealen und retropharyngealen Bindegewebes häufig mitbetheiligt. Doppelseitige Erkrankungen sind häufiger als einseitige.

Die acute katarrhalische Entzündung der Sinusmembran ist nach Schäffer eine ziemlich häufige Erkrankung, welche von viel bestimmteren subjectiven Symptomen begleitet ist, als die chronische. Im Anschlusse an einen Schnupfen klagen die Kranken über starken Kopfschmerz, den sie in die Mitte des Kopfes, in die Tiefe des Schädels oder auch in den Hinterkopf verlegen, öfters auch über Schwindel und Druck auf die Augen. Die genannten Erscheinungen sind bedingt durch die Entzündung der Schleimhaut und die Vermehrung und Retention von Secret, namentlich wenn der Ausführungsgang, der sehr ungünstig liegt, auch noch sehr klein ist.

Objectiv erscheint die zwischen mittlerer Muschel und Septum liegende Schleimhaut hochroth verfärbt, nach vorne gedrängt und mit wenig weissgelbem, eitrigem Schleim bedeckt.

Die Behandlung besteht in der Sondirung der Höhle nach vorheriger Cocaïnisirung, wobei sich ein dicker Klumpen blutigen Eiters entleert und die Kranken sich sogleich subjectiv wohler befinden. Bei sehr engem oder nicht auffindbarem Ausführungsgange wird die vordere Wand der Höhle durchstossen, eventuell die Oeffnung noch nach unten erweitert und vergrössert. Schäffer gibt zur Verflüssigung des Secretes 3mal täglich einen Löffel 5% Jodkalilösung und macht die Politzer'sche Luftdouche. Daraufhin wird die Nase resp. die Keilbeinhöhle mit Sublimat 1 : 10.000 ausgespritzt und Jodoformpulver eingeblasen, was natürlich längere Zeit fortgesetzt werden muss.

Die chronische Keilbeinhöhleneiterung geht meistens aus der acuten hervor oder verdankt der Infection aus anderen Höhlen, so namentlich der Stirnhöhle oder einer Bursitis, oder einem eitrigen Nasenrachenkatarrh ihre Entstehung. Nach Verf. Erfahrung spielen auch dyskrasische Processe, namentlich die Syphilis, Scrophulose und Tuberculose, sowie Infectionskrankheiten, Masern, Scharlach, Keuchhusten, Typhus, Erysipel etc., eine Hauptrolle.

Die subjectiven Erscheinungen können sehr geringe, aber auch sehr ausgesprochene sein. Besonders häufig wird wieder über Kopfschmerz, dumpfen Druck, Benommenheit, Gedächtnissschwäche, Schwindel, Unfähigkeit zu geistiger Arbeit, manchmal auch über Schmerzen im Nacken und Supraorbitalneuralgie geklagt. Auch Sehstörungen, theils functioneller, theils anatomischer Natur können vorhanden sein. Die meisten Kranken klagen ferner über Verschleimung oder noch häufiger über Trockenheit im Rachen, über Würgen und Schluckbeschwerden, über Schleim- und Krustenbildung in der Nase mit Verstopfung.

Die objective Untersuchung ergibt das Vorhandensein von Eiter, der meist aus der Rima olfactoria dem Septum entlang hervorquillt oder sich in Form dünner Krusten theils auf dem Septum,

theils am Rachendache und im Nasenrachenraume niederschlägt, wodurch das Bild der Pharyngitis sicca entsteht. Polypen und Granulationen sind viel seltener als bei anderen Nebenhöhleneiterungen und scheint es fast, als ob der Schleimhaut der Keilbeinhöhle und ihrer Umgebung die Fähigkeit, solche zu bilden, abgehe. Relativ oft begegnet man hingegen Atrophie der Schleimhaut im hintersten Theile der Nase oder auch mässiger sammtartiger Schwellung der Septumschleimhaut; wiederholt sah Verf. auch circumscripte Schleimhauthypertrophien am Septum gegenüber der mittleren Muschel. Bei der Sondirung, die oft mit gebogenen Sonden vorgenommen werden muss, gelingt es in der Mehrzahl der Fälle nicht, Caries nachzuweisen; wenn sie vorhanden ist, betrifft sie meist die vordere Wand oder den hintersten Theil des Vomer, seltener das Innere der Höhle.

Die Diagnose stützt sich auf die objectiven Symptome sowie auf das Erscheinen von Eiter bei der Ausspülung der Höhle. Einer Verwechslung mit Empyem der hinteren Siebbeinzellen kann nur durch längere Beobachtung und häufige Untersuchung vorgebeugt werden.

Der Verlauf ist meist ein sehr chronischer, sich über viele Jahre erstreckender, zumal die Krankheit sehr häufig schon in frühester Jugend erworben wird.

Die Prognose ist im Allgemeinen günstig. Lebensgefährliche Erscheinungen sieht man nur bei beträchtlicher Erweiterung der Höhle oder bei ausgebreiteter Caries. So kann es bei der Nähe des Canalis opticus durch Druck auf die Sehnerven zu einseitiger oder doppelseitiger temporaler Hemianopsie oder völliger Amaurose kommen. Auch können sich nach Berger und Tyrmann Phlegmone und Emphysem der Orbita, Retropharyngealabscess, Sinusthrombose, Meningitis oder tödtliche Blutung einstellen oder es kann ein Theil des Keilbeins als Sequester abgestossen werden. Aber auch ohne Erkrankung des Knochens kann es ebenso wie bei Eiterungen des Siebbeins oder der Stirnhöhle zu Meningitis kommen (Weichselbaum, Weigert, Zaufal). Ob die Entzündungserreger von den Nebenhöhlen aus, wie Weigert meint, längs der Scheiden der Olfactoriusfasern oder auf dem Wege des Blut- und Lymphstromes oder durch die Saftcanäle der Knochen in die Schädelhöhle eindringen, ist noch unentschieden und bedarf weiterer Untersuchungen.

Die Behandlung besteht in methodischen Ausspülungen der Höhle mit desinficirenden Substanzen, in der Application von Hexaäthylviolett, Chromsäure oder Lapis mittelst der Sonde oder in Einblasungen von Jodoform, Jodol, Dermatol mit dem Kabierske'schen Pulverbläser. Behufs besseren Zuganges zur Höhle muss öfters das hinterste Stück der mittleren Muschel entfernt werden, was aber meist starke Blutung zur Folge hat. Von bestem Erfolge ist die Erweiterung des Ausführungsganges resp. die künstliche Eröffnung der Höhle an ihrer vorderen Wand. Man kann dieselbe mit der Schäffer'schen Löffelsonde, einer Curette, einem scharfen Löffel vornehmen und sind die Instrumente genau in derselben Richtung vorzuschieben, wie bei

der Sondirung angegeben wurde. Die Erweiterung des Ausführungsganges resp. die Eröffnung der Höhle muss stets in der Richtung nach unten geschehen, wobei die dünnen, mit der Schleimhaut noch in Verbindung stehenden Knochenplättchen mit der Knochenzange zu entfernen sind. Die breite Eröffnung mittelst Meissel und mit Herausnahme eines dreieckigen Knochenstückes ist angezeigt, wenn die angelegte Oeffnung zu klein war oder wenn das Innere der Höhle cariös erkrankt oder mit Polypen und Granulationen erfüllt ist. Nachher empfiehlt sich die Tamponade mit Jodoformgaze oder die Trockenbehandlung. Bei dyskrasischer Ursache muss gleichzeitig eine innere Behandlung stattfinden, so bei Syphilis mit Jodkali und Quecksilber, bei Scrophulose mit Jodeisen oder Jodeisenleberthran, bei Anämie mit Eisen oder Arsenik und Aufenthalt in frischer Luft oder in einem Mineralbad.

Neubildungen der Keilbeinhöhle entstehen theils primär wie Schleimpolypen, Cysten, Granulationen, Osteome, theils wachsen sie von der Nachbarschaft, vom Nasenrachenraum, der Kiefer- oder Siebbeinhöhle in dieselbe hinein. Zweimal sah Verf. Zerstörung des Keilbeinkörpers in Folge von malignen Geschwülsten der Schädelbasis. Die Erscheinungen bestehen in Kopfschmerz, Trigeminusneuralgie, epileptischen Anfällen, Druck auf den Opticus, Amaurose, Exophthalmus; bei malignen Tumoren kommt es in der Regel zu Metastasen.

Zu den grössten Seltenheiten gehören Fremdkörper und Blutungen; so entfernte Betz einmal einen Strohhalm, und sah Jackson Clarke bei einem Knaben ein grosses Blutgerinnsel, das aus der linken Carotis stammte und sich aus dieser mittelst einer Oeffnung in die Keilbeinhöhle erstreckte.

Literaturverzeichniss.

Alexander. Beitrag zur Anatomie des blutenden Septumpolypen. Arch. f. Lar. I. 3.
Arnold. Zwei Osteome der Stirnhöhle. Virchow's Arch. LVII.
Aschenbrandt Th. Ueber den Einfluss der Nerven auf die Secretion der Nasenschleimhaut. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 3. 1885.
— Die Bedeutuug der Nase für die Athmung. Würzburg 1886.
Babes. Ueber den die Gingivitis und Hämorrhagieu verursachenden Bacillus bei Scorbut. D. med. Woch. Nr. 43. 1893.
Bamberger. Die Krankheiten des chylopoetischen Systems. Erlangen 1864.
Baratoux. Reflexneurosen in Folge von Nasenkraukheiten. Internat. Centralbl. f. Laryng. etc. II S. 424.
Baumm Zur Aetiologie nud Prophylaxis der Bednar'schen Aphthen. Berl. klin. Woch. Nr. 34. 1891.
Bayer L. Ueber Knochencysten der Nasenhöhle. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. II. S. 237.
— Beitrag zum Studium und zur Behandlung des Empyem der Highmorshöhle. D. med. Woch. Nr. 10. 1889.
Berg John. Beitrag zur Kenntniss der Krankheiten der Nebenhöhlen der Nase und zur Lehre vom Ausfliessen der Cerebrospinalflüssigkeit durch die Nase. Intern. Centralbl. VII. S. 358 u. ff.
Berger Walter. Referat in Schmidt's Jahresber. Bd. 162. S. 284.
Berger u. Tyrman. Die Krankheiten der Keilbeinhöhle und des Siebbeinlabyrinthes und ihre Beziehungen zu den Erkrankungen des Sehorgans. Wiesbaden 1886.
Berger. La chirurgie du Sinus sphenoidal. Thèse. Paris 1890.
Bernhardt. Ueber idiopathischen Zungenkrampf. Centralbl. f. Nervenheilk. Nr. 11. 1886.
Beschorner. Ueber Heufieber und dessen Behandlung. Jahresber. d. Gesellsch. f. Natur- u Heilkunde. Dresden 1886.
— Tonsillotomie und Blutungen. Debatte. Jahresber. d. Gesellsch. f. Natur- u. Heilkunde. Dresden 1883—1884.
Betz. Rhinolithiasis als Gewerbekrankheit. Verh. der Vers. d. Naturf. Nürnberg 1893.
— Strohhalm in der Keilbeinhöhle. Ber. d. 1. Vers. südd. Lar. 1894.
Bezold. Zur operativen Behandlung der adenoiden Vegetationen des Nasenrachenraumes. Aerztl. Intell.-Blatt. Nr. 14. 1881.
Beregszászy. Entzündung der beiden Wharton'schen Gänge. Intern. klin. Rundschau 1888. S. 705.
Billroth. Ueber den Bau der Schleimpolypen. Berlin 1855.

Biondi. Die pathogenen Mikroorganismen des Speichels. Bresl. ärztl. Zeitschr. Nr. 18. 1887.
Blackley. Hayfever, its causes, treatment and effectiv prevention. 1873.
Bloch E Untersuchungen zur Physiologie der Nasenathmung. Zeitschr. f. Ohrenheilk. Bd. 18. 1888.
— Die Pathologie und Therapie der Mundathmung. Wiesbaden 1889.
Bockhart. Zur Aetiologie und Behandlung der ulcerösen Mercurialstomatitis. Monatshft. f prakt. Dermat. Nr. 8. 1885.
Böcker. Narbige Verwachsung des einen Nasenloches. D. med. Woch Nr. 46. 1884.
Bohn H Die Mundkrankheiten. Gerhardt's Handb. d. Kinderkrankh. IV. 2. 1880.
Bokai. Neuere Mittheilungen über Retropharyngealabscess und retroph. Lymphdrüsenentzündungen. Jahrb. f. Kinderheilk. XVII.
Bollinger O. Ziemssen's Handb. d. spec. Pathol. u. Ther. III.
Bornhaupt. Arch. f. klin. Chirurg. XXVI S. 589.
Bournonville. Ein Fall von Coryza caseosa. Centralbl. f. Chirurg. Nr. 16. 1885.
Braune u. Clasen. Die Nebenhöhlen der menschlichen Nase in ihrer Bedeutung für den Mechanismus des Riechens. Zeitschr. f. Anat. u. Entwickl. II. 1 und 2. 1876.
Bresgen M. Der chronische Nasen- und Rachenkatarrh. 2. Aufl. Wien 1883.
— Grundzüge einer Pathologie und Therapie der Nasen-, Mundrachen- und Kehlkopfkrankheiten. Wien und Leipzig 1884.
— Zur Behandlung der Eiterung der Nebenhöhlen der Nase, insbesondere der Oberkieferhöhle und deren Probeeröffnung. Therap. Monatshft. März 1888 u. D. med. Woch. Nr. 4. 1889.
— Wann treten nach Operationen in der Nase und im Nasenrachenraum leicht Entzündungen des Ohres oder benachbarter Theile auf? Wien. med. Presse Nr. 45—47. 1892.
— Beiträge zur Ozaenafrage. Münch. med. Woch. Nr. 10 und 11. 1894.
— Die Eiterungen der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Münch. med. Woch. Nr. 31 u. 32. 1894.
Bride Mc. Internat. Centralbl. f. Laryng etc. IV. S. 85.
Brosin. Ueber die schwarze Haarzunge. Dermatologische Studien. Hft. VIII. 1888.
Bryson Delavan. Arch. of. Laryngol. III. 8. 1882.
Bumm E. Ueber Parotitis nach Ovariotomie. Münch. med. Woch. Nr. 10. 1887.
Burckhardt. Ueber die Eröffnung der retropharyngealen Abscesse. Centralbl. f. Chir. Nr. 4. 1888.
Burger. Das Empyem der Kieferhöhle. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 111.
Burow. Uebertragung der Syphilis durch den Tubenkatheter. Monatsschr. f. Ohrenh. etc Nr. 5. 1885.
Buss. Ueber die Beziehungen zwischen Angina und acutem Gelenkrheumatismus. Arch. f. klin. Med. Bd. 54. Hft. 1.
Butlin H. Krankheiten der Zunge. Deutsch bearbeitet und herausgegeben von Jul. Beregszászy. Wien 1887.
Cahn. Ueber Gaumengeschwüre bei Typhus abdominalis. Berl. klin. Woch. Nr. 14. 1886.
Caspary. Ueber flüchtige gutartige Plaques der Zungenschleimhaut. Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. VII.
Chiari. Ueber retropharyngeale Strumen. Monatsschr. f. Ohrenh etc. Nr. 11. 1881.
— Ueber die Erkrankungen der sogenannten Bursa pharyngea. Wien med. Woch. Nr. 40. 1891.
— Ueber die Localisation der Angina phlegmonosa. Wien. med. Woch. Nr. 43. 1889.
— Ueber die Erfolge der Behandlung des Empyema antri Highmori. Prag. med. Woch. Nr. 27—29. 1892.
— Ueber Lymphosarkome des Rachens. Wien. klin. Woch. 1894.
— Ueber Tuberculose der Nasenschleimhaut. Arch. f. Lar. I. 2.
Chiari u. Roth. Das Rhinosclerom der Schleimhaut. Zeitschr. f. Heilkunde. VI. 4 u. 5.
Cholewa. Hypertrophien der hinteren Enden der unteren Muschel der Nase. Zeitschr. f. Ohrenh. XIX. 1888.
— Ueber Resection des Septum narium. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 9. 1891.

— Die Sondirung der Stirnhöhle. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 8. 1892.
Ciaglinski u. Hewelke. Contribution à l'étiologie de la soidisant langue noire. Revue de laryng. Avril 1894.
Coneato-Bufalini. L'eterizzazione nelle angine. Rivista clin. di Bologna III.
Cozzolino. Coryza caseosa. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. I. 1.
Cuttler. Intern. Centralbl. Nr. 4. 1889.
Czaikowski Intern. Centralbl. f. Laryng. V. Febr. 1889.
Czernicki. Referat in Schmidt's Jahrb. Bd. 162. S. 284.
Daae. Ein Apparat zur Behandlung der Ozaena durch Massage. Arch. f. Laryng. II. 2.
Damaschino. Muguet pharyngien. Revue médicale Nr. 48. 1882.
Davidsohn. Die elektrische Durchleuchtung der Gesichtsknochen, ein sicheres Hilfsmittel für die Diagnose des Empyema antri Highmori mit Berücksichtigung der Form des harten Gaumens. Berl. klin. Woch. 1892.
Decker u. Seifert. Münch. med Woch. Nr. 4. 1888.
Deichmüller. Luftgeschwulst der Wange. Berl. klin. Woch. Nr. 54. 1890.
Demme. Ueber Ozaena. D. med. Woch. Nr. 46. 1891.
Desprès. Gazette des Hop. 1872.
Dessois De la langue noire. Gaz. des hôpit. Nr. 28. 1879.
Dogiel. Ueber die Drüsen der Regio olfactoria. Arch. f. mikroskop. Anat. XXIV. 1. 1885.
Dohrn. Münch. med. Woch. Nr. 25. 1891.
Doutrelepont. Zur Therapie des Rhinoseleroms. D. med Woch. Nr. 5. 1887.
Eberth. Zur Kenntniss der mykotischen Processe. Arch. f. klin. Med. XXVIII.
Ehrendorffer. Geheiltes plexiformes Sarkom der hinteren Pharynxwand. Arch. f. klin. Chirurg. XXVI
Engelmann. Der Stirnhöhlenkatarrh. Arch. f. Laryng. I. 3.
Epstein. Ueber Epithelperlen in der Mundhöhle neugeborener Kinder. Zeitschr. f. Heilk. I. 1880.
Erb. Bemerkungen über die Plaquesnarben der Mundhöhle und ihre Ursachen. Münch med. Woch. Nr. 42. 1892.
Erlenmayer. Die Principien der Epilepsiebehandlung. 1886.
— Zungenkrampf. Centralbl. f. Nervenkr. IX. 5. 1886.
Escherich. Diphtherie, Croup, Serumtherapie. Wien 1895.
Esmarch. Ueber die Aetiologie und Diagnose der bösartigen Geschwülste, besonders der Zunge und der Lippen. Arch. f. klin. Chir. Bd. XXXIX. 2.
Fehleisen. Ligatur der A. lingualis wegen angeborener Makroglossie. Berl. klin. Woch. Nr. 50. 1887.
Felix, v. Zwei Sarkome der hinteren Pharynxwand. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 8. 1894.
Fink. Ueber maligne Transformation gutartiger Geschwülste in der Highmorshöhle. Arch. f. Laryng. I. 2.
Fischenich. Ueber das Hämatom und die primäre Perichondritis der Nasenscheidewand. Arch. f. Laryng. II. 1.
Fischer H. Wässerige Ausscheidungen aus einer Nasenöffnung. D. Zeitschr. f. Chirurg. XII. 4 u. 5.
— Ueber das Vorkommen von Sarcine in Mund und Lungen. Arch. f. klin. Med. XXXVI.
Fischer L. Syphilitische Nekrose des Atlas, Heilung. D. Zeitschr. f. Chirurg. XXII. 3.
Fischl. Zur Kenntniss der Nierenaffection bei Diphtherie. Zeitschr. f. klin. Med. VII.
Flatau. Chronisch recidivirender Herpes der Mundhöhle. D. med. Woch. Nr. 22. 1891.
Fliess. Neue Beiträge zur Klinik und Therapie der nasalen Reflexneurosen. 1893.
— Magenschmerz und Dysmenorrhoe in neuem Zusammenhang. Wien. klin. Rundschau. 1895.
Fränkel B. Allgemeine Diagnostik und Therapie der Krankheiten der Nase, des Nasenrachenraumes, des Rachens und Kehlkopfes. Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. IV. 1.

Fränkel B. Die Krankheiten der Nase. Ibidem.
— Schlundkopf. Eulenburg's Realencyklop. XII. 1888.
— Ueber die Miliartuberculose des Pharynx. Berl. klin. Woch. Nr 46 u. 47. 1876.
— Gutartige Mykosis des Pharynx. Berl. klin. Woch. 1873.
— Gefrierdurchschnitte zur Anatomie der Nasenhöhle. Berlin 1891.
— Ueber adenoide Vegetationen. D. med. Woch. Nr. 41. 1884.
— Ueber das Empyem der Oberkieferhöhle. Berl klin. Woch. Nr. 16. 1887.
— Ueber Angina lacunaris. Berl. klin. Woch Nr. 17 u. 18. 1886.
Fränkel Eugen. Ueber Abdominaltyphus. D. med. Woch. Nr. 6. 1887.
— Ueber einen Fall von Mykosis tonsillaris et linguae benigna. Zeitschr. f klin. Med. IV.
— Zur Diagnostik und Therapie gewisser Erkrankungen der mittleren und unteren Nasenmuscheln. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr 242. 1884.
— Ueber die sogenannte Stomatitis aphthosa, besonders in anatomischer und ätiologischer Beziehung. Virch. Arch. Bd. 113. Hft. 3.
— Ueber Bednar'sche Aphthen. Centralbl. f. klin. Med. Nr. 29. 1891.
Freudenberg. Ueber Soor beim gesunden Erwachsenen. Centralbl. f. klin. Med. Nr. 48. 1886.
Friedländer Alfred. Zur Therapie des Empyema antri Highmori. Berl. klin. Woch. Nr. 37. 1889.
Friedreich. Der acute Milztumor und seine Beziehungen zu acuten Infectionskrankheiten. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 75. 1874.
— Beiträge zur Kenntniss der Sputa. Virch. Arch. XXX.
Frisch. Zur Aetiologie des Rhinoscleroms Wien. med. Woch. Nr. 32. 1882.
Fronstein. Ein Fall von circumscriptem Oedem der Nasenschleimhaut. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. II. S. 420.
Frühwald. Ueber Stomatitis ulcerosa. Jahrb. f. Kinderheilk. XXIX. 2. 1889.
Ganghofner. Behandlung der Dipbtherie. Handh. d. spec. Ther. I. Bd.
Gautier. De la desquamation de la langue. Génève 1882.
Geber. Ueber das Wesen des Rhinoscleroms. Arch. f. Dermat. u. Syph. IV.
Gerber. Zur Kenntniss der Nasensteine. D. med. Woch. Nr 51. 1892.
— Spätformen der hereditären Syphilis in den oberen Luftwegen. Wien 1894.
Gerher u. Podack. Ueher die Beziehungen der sogenannten primären Rhinitis fibrinosa und des sogenannten Pseudodiphtheriehacillus zum Klebs-Löffler'schen Diphtheriebacillus. Arch. f. klin. Med. LIV.
Gerhardt. Zur Naturgeschichte der acuten Infectionskrankheiten. D. Arch. f. klin. Med. XIV.
— Ueher Diphtherie. Verhandl. d. II. med. Congr. zu Wieshaden 1883.
— Ueber Rothlauf des Rachens. Charité-Annalen XII.
Glasmacher. Knochenhlasenhildung in der Nase. Berl. klin. Woch. Nr. 36. 1884.
Gleitsmann. Ein Fall von primärer Tuberculose der Mundhöhle. Intern. Centralbl. 1889. S. 165.
Goldstein. Ueber Nasenpolypen bei Individuen unter 16 Jahren. Dissert. 1894.
Gottstein. Nasenkrankheiten. Eulenburg's Realencyklop. IX.
— Ueber die verschiedenen Formen der Rhinitis und deren Behandlung vermittelst der Tamponade. Berl. klin. Woch. Nr. 4. 1884.
— Zur Operation der adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum Ibid. Nr. 2. 1886.
Grönhech. Ueber das Verhältniss zwischen Enuresis nocturna und adenoiden Vegetationen. Arch. f. Laryng. II. 2.
Gruber W. Ueber ahnorm lange Proc. styloideus des Schläfenbeins. Virch. Arch. L.
— Ueber einen Fall von Theilung des Sinus maxillaris etc. Virch. Arch. 113. 3.
Gruhn. Ueher Dacryocystohlennorrhoe bei Erkrankungen der Nase. Münch. med. Woch. Nr. 27. 1888.
Grünwald. Die Lehre von den Naseneiterungen. 1893.
Güterhock. Ueber Hemiglossitis. D. Zeitschr. f. Chirurg. XXII u. XXIII.
Guye. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 10. 1887 u. D. med. Woch Nr. 40. 1888.
Hack. Ueber neuralgische Begleiterscheinungen bei Pharynxkrankheiten. D. med. Woch. Nr. 42. 1883.
— Reflexneurosen und Nasenleiden. Berl. klin. Woch. Nr 25. 1882.
— Ueber eine operative Radicalhehandlung bestimmter Formen von Migräne, Asthma, Heufieber, sowie zahlreicher verwandter Erscbeinungen. Wiesbaden 1884.

— Ueber Catarrhus autumnalis und Heufieber. D. med. Woch. Nr. 9. 1886.
Hacker. Actinomykose der Zunge. Anzeiger d. Gesellsch. d. Aerzte Nr. 27. 1885.
Hahn Fr. Ueber Tuberculose der Nasenschleimhaut. D. med. Woch. Nr. 23. 1890.
Hajek. Die Bacterien bei der acuten und chronischen Coryza sowie bei Ozaena und deren Beziehungen zu den genannten Krankheiten. Berl. klin. Woch. Nr. 33. 1888.
— Pharyngitis fibrinosa. Intern klin. Rundschau Nr. 41, 43. 1891.
— Die Tuberculose der Nasenschleimhaut. Intern. klin. Rundschau Nr. 1—5. 1889.
— Das perforirende Geschwür der Nasenscheidewand. Virch. Arch. Bd. 120. Hft. 3.
— Laryngo-rhinologische Mittheilungen. Intern. klin. Rundschau. 1892.
Halbeis. Die adenoiden Vegetationen des Nasenrachenraumes. München 1893.
Hallopeau. Herpes labialis, Gangrène etc. Revue méd. Nr. 8. 1882.
Hanau. Ueber die Entstehung der eitrigen Entzündungen der Ohrspeicheldrüse. Beitr. z. path. Anat. etc. von Ziegler und Nauwerk. IV. 5. 1889.
Hansberg. Die Sondirung der Nebenhöhlen der Nase. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 1 u. f. 1890.
Hartmann A. Ueber die Operation der adenoiden Wucherungen und hypertrophischen Pharynxtonsillen. D. med. Woch. Nr. 35. 1885.
— Ueber Croup der Nasenschleimhaut (Rhinitis fibrinosa). D. med. Woch. Nr. 29. 1887.
— Ueber das Empyem der Stirnhöhlen. Arch. f. klin. Med. XX.
— Supraorbitalneuralgie, hervorgerufen durch Empyem der Nebenhöhlen der Nase in Folge von Behinderung des Secretabflusses aus dem mittleren Nasengang. Berl. klin. Woch. Nr. 48. 1882.
— Abscessbildung in der Orbita durch acuten Schnupfen, mit Bemerkungen über die Behandlung fötider Blennorrhoe der Nase. Berl. klin. Woch. Nr. 21. 1884.
— Partielle Resection der Nasenscheidewand bei hochgradiger Verkrümmung. D. med. Woch. Nr. 51. 1882.
— Deviationen und Cristae des Septum narium. Intern. Centralbl. VII. S. 170.
Hedderich. Ein neues Hämostaticum Ferripyrin. Münch. med. Woch. Nr. 1. 1895.
Hedinger. Die Galvanokaustik seit Middeldorpf. 1878.
— Die adenoiden Vegetationen. Württemb. Corresp.-Blatt Nr. 34. 1885.
Helbing. Zur Behandlung der Pharyngitis phlegmonosa. Münch. med. Woch. Nr. 41. 1889.
Heller. Der Nasenrachenraum in der Pathologie. Arch. f. klin. Med. Bd. 55.
Heller A. Beitrag zur Lehre vom Soor. Arch. f. klin. Med. Bd. 55.
Henoch Fall von acuter Anschwellung des Bodens der Mundhöhle. Charité-Annal. VI.
— Vorlesungen über Kinderkrankheiten. II. Aufl. 1883.
— Mittheilungen aus den Diphtheritis-Epidemien der Jahre 1882 und 1883. Charité-Annalen X.
Heryng Theodor. De la pharyngite chronique en général et de la pharyngite latérale en particulier. Revue mens. de laryng 1882.
— Ueber Pharynxmykosis leptothritica. Zeitschr. f. klin. Med. VII.
— Des névroses réflexes determinées par les affections nasales. Annales des malad. de l'oreille etc. Février 1886.
— Die elektrische Durchleuchtung der Highmorshöhle bei Empyem. Berl. klin. Woch Nr. 36, 37. 1889.
— Ueber benigne Pharynxgeschwüre. Intern. klin. Rundschau Nr. 41, 42. 1890.
Herzfeld u. Herrmann. Bacteriologische Befunde in zehn Fällen von Kieferhöhleneiterung. Arch. f. Laryng. III. 1 u. 2.
Herzog J. Der acute und chronische Nasenkatarrh mit besonderer Berücksichtigung des nervösen Schnupfens. 2. Aufl. Graz 1886.
— Ueber Herpes des Rachens. Pester med.-chir. Presse Nr. 18, 19. 1880.
Herzog Carl in Baiern. Beitrag zur Casuistik der Orbitaltumoren. Annalen des städt. Krankenhauses zu München. 1886.
Heubner. Die experimentelle Diphtherie. Leipzig 1883.
— Ueber Scharlachdiphtherie. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 322.
Heymann. Ueber pathologische Zustände, die von der Nase ihre Entstehung finden können. D. Med. Zeitung Nr. 66. 1886.

Heymann. Ein Fall von Lordose der Halswirbelsäule. Berl. klin. Woch. Nr. 52. 1877 u. Nr. 47. 1890
— Ueber gutartige Geschwülste der Highmorshöhle. Virch. Arch. Bd. 129.
Homolle. Des scrofulides graves primitives de la gorge. Paris 1876.
Hopmann. Zur Nomenclatur der Nasenschleimhautgeschwülste. Wien. med. Presse Nr. 39. 1883.
— Ueber congenitale Verengerungen und Verschluss der Choanen. Arch. f. klin. Chir. XXXVII. 2.
— Ueber Nasenpolypen. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 6 u. 8. 1885 u. Nr. 6 bis 9. 1887.
— Gaumenhalter mit elastischem Zug. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 5. 1890.
— Ueber Messungen des Tiefendurchmessers der Nasenscheidewand bezw. des Nasenrachenraumes; ein Beitrag zur ätiologischen Beurtheilung der Ozaena. Arch. f. Laryng. I. 1.
Hoppe. Rachenkatarrh mit stinkendem Geruch. Memorabil. I. Nr. 6. 1881.
Hutchinson u. Hadden. Xerostomie. Referat in Fortschr. d. Med. Nr. 11. 1889.
Jacobi Die Therapie der Diphtherie. Intern. klin. Rundschau Nr. 34—37. 1888.
Jacobson. Algosis faucium leptothricia. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 317.
Jansen Zur Eröffnung der Nebenhöhlen der Nase bei chronischer Eiterung. Arch. f. Laryng. I 2.
Jeanty. De l'empyeme latente de l'antre Highmori. Bordeaux 1891.
Joseph. Beitrag zur Therapie der Leukoplakie. D. med. Woch. Nr. 43. 1885.
Johnston. Arch. of Laryng. III 9.
Ipscher. Noch ein Fall von Sialodochitis fibrinosa. Berl. klin. Woch. Nr 36. 1877.
Isambert. Conférences cliniques sur les maladies du larynx. Paris, Masson 1877.
Israel. Klinische Beiträge zur Kenntniss der Actinomykose des Menschen. 1885.
Juffinger. Das Sclerom der Schleimhaut der Nase, des Rachens und der Luftröhre. Wien 1892.
Jurasz. Casuistische Beiträge zur Lehre von den Anomalien der Gaumentonsillen. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 12. 1885.
— Ueber die Sensibilitätsneurosen des Rachens und des Kehlkopfes. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 195. 1881.
— Ueber die Behandlung hochgradiger Verkrümmungen der Nasenscheidewand. Berl. klin. Woch. Nr 4. 1882.
— Seröse Perichondritis der Nasenscheidewand. D. med. Woch. Nr. 50. 1884.
— Ueber die Sondirung der Stirnbeinhöhle. Berl. klin Woch Nr. 3. 1887.
— Die Krankheiten der oberen Luftwege. I. II. Heidelberg 1891.
Justi. Ueber adenoide Neubildungen im Nasenrachenraum. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 125.
Kafemann. Der Katarrh des Recessus pharyngeus medius, seine Bedeutung und vereinfachte chirurgische Behandlung. 1889.
— Ueber elektrolytische Operationen in den oberen Luftwegen. 1889.
— Schuluntersuchungen der kindlichen Nase und des Nasenrachenraumes. Königsberg 1890.
— Nasenobturator und Naseninhalator. Arch. f. Laryng. II. 3.
— Ueber die Beziehungen zwischen Nasen- und Rachenleiden zum Stottern etc. 1891.
Kaposi. Pathologie und Therapie der Hautkrankheiten. 1883.
— Glossodynia exfoliativa. Wien. med. Presse. Nr. 12—18. 1885.
Kapper. Ein Fall von acuter Actinomykose. Wien. med. Presse. Nr. 3. 1887.
Kaufmann. Die Struma retrooesophagea. D. Zeitschr. f. Chirurg. XVIII. 3 u. 4.
— Ueber eine typische Form von Schleimhautgeschwulst (lateraler Schleimhautwulst). Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 1—8. 1890.
Kayser R. Die Bedeutung der Nase und der ersten Athmungswege für die Respiration Arch f. Physiol. Bd. XLI.
— Ueber Nasen- und Mundathmung. Pflüger's Arch. Bd. 47. Hft. 11 u. 12. 1890.
— Rhinologische Mittheilungen. D. med. Woch. Nr. 26. 1891.
Keimer Ein Fall von Angioma varicosum des Gaumensegels, der linken Mandelgegend und des vorderen Gaumenbogens, geheilt durch Elektropunctur. D. med. Woch. Nr. 33. 1887.
Kiesselbach. Eczema introitus narium. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 2. 1885.

Killian G. Meine Erfahrungen über die Kieferhöhleneiterung. Münch. med. Woch. Nr. 4 u. f. 1892.
Kipp. Zwei Fälle von gänzlichem Verlust des Gehörs auf einem Ohre in Folge von Mumps. Zeitschr. f. Ohrenh. XIV.
Klingel. Ueber Rhinitis caseosa. Arch. f. Laryng. III. 1 u. 2.
König. Lehrbuch der speciellen Chirurgie. 1885.
König Emil. Ueber Empyem und Hydrops der Stirnhöhle. Dissertation. Bern 1882.
Körner. Untersuchungen über Wachsthumsstörung und Missgestaltung des Oberkiefers und des Nasengerüstes in Folge von Behinderung der Nasenathmung. F. C. W. Vogel. 1891.
Kohts. Die Krankheiten des Rachens. Gerhardt's Handb. d. Kinderkrankh. IV. 2. 1880.
Krause. Berl. klin. Woch. Nr. 15. 1887.
Krebs. Ueber Pharyngitis sicca oder atrophica. Monatsschr. f. Ohrenh. 1895.
Krecke. Beitrag zur Pathologie und Therapie des chronischen Stirnhöhlenempyems. Münch. med Woch. Nr. 51. 1893.
— Eine besondere Form von syphilitischer Granulationsgeschwulst im Rachen. Münch. med. Woch. Nr. 47. 1894.
Kretschmann. Ein Instrument zur Behandlung gewisser Formen hypertrophischer Tonsillen. Münch. med. Woch. Nr. 9. 1895.
Krieg. Resection der Cartilago quadrangularis septi narium zur Heilung der Skoliosis septi. Med. Corresp.-Blatt d. Württemb. ärztl Landesver. Nr. 26, 27. 1886 und Berl. klin. Woch. Nr. 31. 1889.
— Ueber Empyem des Antrum Highmori. Württ. Corr.-Blatt Nr 34, 35. 1888.
Küster. Ueber die Grundsätze der Behandlung von Eiterungen in starrwandigen Höhlen. D. med. Woch. Nr. 10. 1889.
Kuhnt. Ueber die entzündlichen Erkrankungen der Stirnhöhle und ihre Folgezustände. 1895.
Kussmaul. Berl. klin. Woch. Nr. 13. 1879.
Kuttner. Die Elektrolyse und ihre Wirkungsweise etc. Berl. klin. Woch. Nr. 45. 1889.
— Die sogenannte idiopathische acute Perichondritis der Nasenscheidewand. Arch. f. Laryng. II. 1.
Landgraf. Ueber primäre infectiöse Phlegmone des Pharynx. Berl. klin. Woch. Nr. 6. 1888.
— Ueber Rachen- und Kehlkopferkrankungen bei Abdominaltyphus. Charité-Annalen XIV.
Lange V. Die adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum nebst einer neuen Operationsmethode. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr 2. 1880 und Nr. 2. 1882.
— Zur Frage nach den adenoiden Vegetationen im Nasenrachenraum. D. med. Woch. Nr. 51. 1883.
— Aus meinem Instrumentarium. Monatsschr. f Ohrenh. Nr. 11. 1885.
— Ueber Aluminium acetico-tartaric. etc. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 10. 1885.
— Zur Operation der Choanalpolypen. D. med. Woch. Nr. 11. 1887.
Lannois u. Lemoine. Des manifestations méningitiques et cerébrales des oreillons. Arch. de Neurol. XI. 31. 1886.
Lédiard. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. III. 8. S 287.
Lefferts. Chronic Nasal Catarrh The med. News. 1884.
Lehmann. Experimentelle Studien über den Einfluss technisch und hygienisch wichtiger Gase und Dämpfe auf den Organismus. München 1886.
Leyden. Ueber die Herzaffectionen bei Diphtherie. Zeitschr. f. klin. Medic. IV.
Lichtwitz. Zum Studium der Nasen- und Rachenreflexneurosen. Prager med. Woch. Nr. 6. 1889.
Lieven. Zur Aetiologie der Rhinitis fibrinosa. Münch. med. Woch. Nr. 48. 1891.
— Beitrag zur Behandlung der flächenhaften syphilitischen Verwachsungen des weichen Gaumens mit der hinteren Rachenwand. Münch. med. Woch. Nr. 21. 1895.
Lingg. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. V. 11. 1889.
Löffler. Verhandl. d. Congr. f innere Med zu Wiesbaden 1883 und 1884.
— Zur Therapie der Diphtherie. Intern. klin. Rundschau Nr. 12 u. f. 1891.

Löffler. Welche Maassregeln erscheinen gegen die Verbreitung der Diphtherie geboten? Berl. klin. Woch. Nr. 40. 1890.
Löwenberg. Les tumeurs adenoides du pharynx nasal, leur influence sur l'audition, la respiration et la phonation, leur traitement. Paris 1879.
— Natur und Behandlung der Ozaena. D. med. Woch. Nr. 1 u. 2. 1885.
Lublinski. Ueber syphilitische Pharynxstricturen. Berl. klin. Woch. Nr. 24. 1883.
Lücke. Praktische Bedeutung des abnorm langen und verbogenen Proc. styloid. des Schläfenbeines. Virch. Arch LI
Lühe. Eine Parotitis-Epidemie. Berl. klin. Woch. Nr 40. 1879.
Luschka. Ueber Papillargeschwülste des Schlundkopfes. Virch. Arch. L.
Mackenzie John. A contribution of the study of Coryza vasomotoria periodica or socalled Hay fever New-York. Med. Record. 19. Juli 1884.
Mackenzie Morell. Die Krankheiten des Halses und der Nase. Deutsch von Felix Semon. 2 Bde. 1880 und 1884.
Maggiora u. Gradenigo. Centralbl. f. Bacteriol. VIII. 21.
Magnussen L. Beitrag zur Diagnostik und Casuistik der Actinomykose. Kiel 1885.
Manchot. Münch. med. Woch. Nr. 50. 1893.
Mertens P. Ueber Tuberculose der Nasenschleimhaut. Dissertation. 1889.
Metzner. Ein Fall von mykotischer Mandelentzündung mit tödtlichem Ausgang. Berl. klin. Woch. Nr. 29. 1889.
Meyer Wilh. Ueber adenoide Vegetationen in der Rachenhöhle. Arch. f. Ohrenh. 1873 u. 1874.
Michael. Doppelmeissel zur Behandlung adenoider Vegetationen des Nasenrachenraumes. Berl. klin. Woch. Nr. 5. 1885.
— Adenoide Vegetationen des Nasenrachenraumes. Wien. Klinik. 1885.
— Ueber Melanosarkome der Nase und lufthaltige Polypen. Intern. Centralbl. VII. S. 179.
Michel C. Die Krankheiten der Nasenhöhle und des Nasenrachenraumes. 1876.
— Zur Behandlung der Krankheiten der Mundrachenhöhle und des Kehlkopfes. 1880.
— Ueber elektrolytische Behandlung der fibrösen und gefässreichen Nasenrachenpolypen. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 5. 1887.
Michelson. Ueber einige seltenere Zungenkrankheiten. Berl. klin. Woch. Nr. 46. 1890.
— Ueber Tuberculose der Nasen- und Mundschleimhaut. Zeitschr. f. klin. Med. Bd. XVII. Supplement.
— Ueber Nasensyphilis. Volkm. Samml. klin. Vortr. Nr. 326.
Mikulicz. Ueber das Rhinosclerom. Arch. f. klin. Chirurg. XX.
— Zur operativen Behandlung des Empyems der Highmorshöhle. Zeitschr. f. Heilk. VII. 4. 1886.
Moldenhauer. Das sogenannte Ekzem des Naseneinganges. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 5. 1885.
— Die Krankheiten der Nasenhöhlen, ihrer Nebenhöhlen und des Nasenrachenraumes. 1886.
Monti. Ueber Croup und Diphtherie im Kindesalter. 2. Aufl. 1884.
— Zur Aetiologie und Pathogenese der Stomatitis aphthosa. Intern. klin. Rundschau Nr. 43. 1890.
Moure. Manuel pratique des maladies des fosses nasales et de la cavité nasopharyngienne. Paris 1886.
Müller. Ein Fall von Lepra. Arch. f. klin. Med. XXXIV.
Nedopil. Ueber Psoriasis der Zungen- und Mundschleimhaut. Arch. f. klin. Chirurg. XX.
— Ueber tuberculöse Erkrankungen der Zunge. Wien. Klinik Nr. 9. 1881.
Neumann. Ueber die Entstehung der Ranula aus den Bochdalek'schen Drüsenschläuchen der Zungenwurzel. Arch. f. klin. Chirurg. XXXIII. 3.
Neumayer. Ein Fall von Mund-, Kieferhöhlen- und Nasentuberculose. Arch. f. Laryng. II. 2.
Noltenius. 37 Fälle von seröser Erkrankung der Oberkieferhöhle. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 4. 1895.
Ostmann. Neue Beiträge zur Untersuchung über Balgdrüsen der Zungenwurzel. Virch. Arch. Bd. 92. S. 119.

Otto. Casuistischer Beitrag zur Erweiterung der Stirnhöhle durch Eitcransammlung, zugleich ein Beitrag zur centralen Galvanisation bei centraler Lähmung. Arch. f. klin. Med. XI.

Partsch. Einige neue Fälle von Actinomykose des Menschen. D. Zeitschr. f. Chirurg. XXIII. 5 u. 6.

Paulsen E. Experimentelle Untersuchungen über die Strömungen der Luft in der Nasenhöhle. Sitz.-Ber. d. Wien. Akad. Bd. 85. III. 1882.

— Zur acuten Entzündung des Nasenrachenraumes. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 7. 1887.

— Ueber die Drüsen der Nasenschleimhaut, besonders die Bowman'schen Drüsen. Arch. f. mikr. Anat. XXVI.

— Ueber die Schleimhaut, besonders die Drüsen der Oberkieferhöhle. Arch. f. mikr. Anat. XXXII.

— Ueber einen kapselbildenden Coccus bei Ozaena.

Pauly. Berl. klin. Woch. Nr. 22. 1877.

Penzoldt. Allgem. med. Central-Ztg. Nr. 78. 1878, und Corresp.-Blatt d. allgem. ärztl. Ver. v. Thüringen Nr. 9. 1878.

Petersen. Ueber die subperichondrale Resection der knorpeligen Nasenscheidewand. Berl. klin. Woch. Nr. 22. 1885.

Pitha. Angina nosocomialis phagedanica. Prag. Vierteljahrschr. II. 1857.

Polyak. Ueber eine noch nicht beschriebene Form der Coryza professionalis. Berl. klin. Woch. Nr. 1. 1893.

Poppert. Zur Casuistik der Stirnhöhlenosteome. Münch. med. Woch. Nr. 3. 1892.

Preuschen, v. Ueber Entzündung der Ohrspeicheldrüse nach Ovariotomie. D. med. Woch. Nr. 51. 1885.

Quincke. Ueber acutes umschriebenes Hautödem. Monatshft. f. prakt. Dermat. 1882.

Ranke H. Zur Aetiologie und pathologischen Anatomie des nomatösen Brandes. Jahrb. f. Kinderheilk. XXVII. 3. 1888.

Raynaud. Gazette hebdom. 2. Avril 1869.

Recklinghausen. Ueber die Ranula, die Cyste der Bartholinischen Drüse und die Flimmercyste der Leber. Virch. Arch. LXXXIV. 3.

Réthi. Resection des Proc. styloid. wegen Schlingbeschwerden. Intern. klin. Rundschau Nr. 24. 1888.

— Neurosen, entstanden durch Behandlung des Naseninnern. Intern. klin. Rundschau Nr. 51. 1889.

— Zur Frage und Heilbarkeit der Ozaena. Arch. f. Laryng. II. 2.

— Motilitätsneurosen des weichen Gaumens. Wien 1893.

— Die polypoide Rhinitis. Wien 1894.

Reutter. Beitrag zur Untersuchung des Geruchsinnes. Zeitschr. f. klin. Med. XXII. 1 u. 2.

Richter Ernst. Die nicht perforirende eitrige Entzündung der Stirnhöhle und ihre operative Behandlung. Dissertation. Leipzig 1895.

Ricd. Jenaische Zeitschr. f. Med. I. 1864.

Rohrer. Zur Morphologie der Bacterien des Ohres und Nasenrachenraumes. 1889.

Rosenbach. Behandlung der Gangrän und Phlegmonen in der Umgebung der Mundhöhle. Handb. d. spec. Ther. Abth. VI.

Roser. Zwei Fälle von acuter Actinomykose. D. med. Woch. Nr. 22. 1886.

— Die Ludwig'sche Angina. D. med. Woch. Nr. 11. 1883.

Rossbach. Ueber ein merkwürdiges vasomotorisches Verhalten der Halsschleimhäute. Berl. klin. Woch. Nr. 36. 1882.

— Ueber ulcus rotundum septi nasi cartilaginosi. Corresp.-Blatt d. Allgem. ärztl. Ver. v. Thüringen 1889. Hft. 2.

Roth Fr. Ueber die Incubation und Uebertragbarkeit der Parotitis epidemica. Münch. med. Woch. Nr. 20. 1886.

Roth W. Die chronische Rachenentzündung. Wien 1883.

— Ueber haarförmige Bildungen an der Zunge. Wien. med. Presse Nr. 26 u. 27. 1887.

Rückert. Der Pharynx als Sprach- und Schluckapparat. München 1882.

Rüdinger. Beitrag zur Morphologie des weichen Gaumens und des Verdauungsapparates. Stuttgart 1879.
Rühle. Ueber Pharynxkrankheiten. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 6.
Rüttermann. Parotitis nach Ovariotomie. Dissertation. Berlin 1893.
Saalfeld. Ueber die sogenannte Pharyngitis granulosa. Virch. Arch. LXXXII.
Samter. Zur acuten infectiösen Phlegmone des Pharynx. Berl. klin. Woch. Nr. 18. 1894.
Sänger M. Ueber die mechanische Disposition zu Ozaena. Ther. Monatshft. 6. October 1894.
Sänger u. Schuster. Beiträge zur Pathologie und Therapie der Nasensyphilis. Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. 1877 u. 1878.
Salzer. Zur Casuistik der Geschwülste am Kopfe. Arch. f. klin. Chirurg. XXXIII.
Schadewaldt. Die Trigeminusneurosen. D. med. Woch. Nr. 37, 38. 1885.
Schäfer. Ein Fall von ulceröser Entzündung im Bereiche der rechten Siebbeinhälfte mit letalem Ausgang. Prag. med. Woch. Nr. 20. 1883.
Schäffer M. Chirurgische Erfahrungen in der Rhinologie und Laryngologie. Wiesbaden 1885.
— Asthma und seine Behandlung. D. med. Woch. Nr. 32, 33. 1879.
— Nasenleiden und Reflexneurosen. D. med. Woch. Nr. 23. 24. 1884.
— Aluminium acetico-tartaricum. D. med. Woch. Nr. 20. 1885.
— Zur Diagnose und Therapie der Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase mit Ausnahme des Sinus maxillaris. D. med. Woch. Nr. 41. 1890.
— Ueber acute und chronische Erkrankungen der Keilbeinhöhlen. D. med. Woch. Nr. 47. 1892.
Schaus. Ueber Schiefstand der Nasenscheidewand. Arch. f. klin. Chirurg. XXXV. 1.
Schech Ph. Ueber Leukoplakia oris. Aerzt. Intell.-Bl. Nr. 40, 41. 1885.
— Die schwarze Zunge. Münch. med. Woch. Nr. 13. 1887.
— Die Galvanokaustik in der Laryngochirurgie. Aerztl. Intell.-Bl. Nr. 43, 44. 1877.
— Ueber Stenosirungen des Pharynx in Folge von Syphilis. Arch. f. klin. Med. XVII.
— Klonische Krämpfe des weichen Gaumens mit objectivem Ohrgeräusch in Folge nasaler Trigeminusneuralgie. Münch. med. Woch. Nr. 22. 1886.
— Die sogenannten Reflexneurosen und ihre Beziehungen zu den Krankheiten der Nase. Aerztl. Intell.-Bl. Nr. 30. 1884.
— Ueber Asthma. Münch. med. Woch. Nr. 40, 41. 1887.
— Die Erkrankungen der Nebenhöhlen der Nase. 1. Aufl. München 1883.
— Diagnose und Therapie der Erkrankungen der Nebenhöhlen. Referat f. den X. intern. med. Congress. Intern. Centralbl. VII. S. 172.
— Zur Diagnose und Therapie der chronischen Stirnhöhleneiterungen. Arch. f. Laryng. III. 1.
Scheier. Ueber Zungensarkom. Berl. klin. Woch. Nr. 24. 1892.
— Beitrag zu den blutenden Polypen der Nasenscheidewand. Arch. f. Laryng. I. 3.
Scheinmann J. Zur Diagnose und Therapie der nasalen Reflexneurosen. Berl. klin. Woch. Nr. 14. 1889.
Schindler. Fall von Rundzellensarkom im Munde bei einem Kinde mit Erfolg operirt. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 4. 1885.
Schmidt Moriz. Ueber Pharyngitis lateralis. Arch. f. klin. Med. XXVI.
— Ueber die Behandlung von parenchymatösen Kröpfen. D. med. Woch. Nr. 8. 1884.
— Zur Diagnose und Behandlung der Erkrankungen des Antrum Highmori. Berl. klin. Woch. Nr. 50. 1888.
— Ueber die Schlitzung der Mandeln. Therap. Monatshft. Nr. 10. 1889.
— Ueber das Ansaugen der Nasenflügel. D. med. Woch. Nr. 4. 1892.
— Die Krankheiten der oberen Luftwege. Berlin 1894.
Schmiegelow. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. II. S. 46.
Schmitt Adolf. Alveolarsarkom des weichen Gaumens. Münch. med. Woch. 1894.
Schrötter L. Ueber membranförmige Narben im oberen Pharynxraume. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 8. 1882.
— Ueber angeborenen knöchernen Verschluss der Choanen. Monatsschr. f. Ohrenh. etc. Nr. 4. 1885.

— Beitrag zur Behandlung der Larynxstenosen. Wien 1876.
Schubert P. Zur Casuistik der Aspergillusmykosen. Arch. f. klin. Med. XXXVI.
— Ueber einen neuen Fall von Wucherung eines Fadenpilzes in der Nase. Bericht d. X. Vers. südd. u. schweiz. Ohrenärzte. 1889.
Schuchhardt K. Beiträge zur Entstehung der Carcinome aus chronisch-entzündlichen Zuständen der Schleimhäute und Hautdecken. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 257.
— Ueber das Wesen der Ozaena. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 340.
Schuchhardt. Ein behaarter Rachenpolyp. Centralbl. f. Chir. Nr. 41. 1884.
Schumacher. Ueber localisirte Hydrargyrose und ihre laryngoskopische Diagnose. Verhandl. d. Congr. f. inn. Med. zu Wiesbaden 1886.
Schwabach. Arch. f. mikr. Anat. XXIX. S. 61, und D. med. Woch. Nr. 26. 1887.
Schwimmer. Die idiopathischen Schleimhautplaques der Mundhöhle. Vierteljahrsschr. f. Derm. u. Syph. IV.
— Beitrag zur Glossopathologie. Wien. med. Woch. Nr. 8. 1886.
Seifert O. Klonische Krämpfe des weichen Gaumens mit objectivem Ohrgeräusch in Folge von chronischer Rhinitis. Intern. klin. Rundschau Nr. 29. 1887.
— Ueber Influenza. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 240.
— Ueber Croup der Nasenscheimhaut. Münch. med. Woch. Nr. 38. 1887.
— Ueber Xerostomie. Wien. klin. Woch. Nr. 46. 1889.
— Ueber Rhinitis atrophicans. Intern. Centralbl. f. Laryng. VII. S. 169.
— Behandlung der Erkrankungen der Mundhöhle. Handb. d. spec. Ther. IV. Bd.
— Die Pathologie der Zungentonsille. Arch. f. Laryng. I. 1.
— Ueber Syphilis der oberen Luftwege. D. med. Woch. Nr. 42—45. 1893.
Seifert u. Kohn. Atlas der Histopathologie der Nase, der Mundrachenhöhle und des Kehlkopfes. Wiesbaden 1895.
Seitz F. Diphtherie und Croup. II. Aufl. Berlin 1879.
Seitz J. Nierenentzündung bei Stomatitis aphthosa. Corresp.-Blatt Schweizer Aerzte Nr. 22. 1887.
Sell. Fälle von Lingua nigra. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. II. S. 112.
Semon F. Die Krankheiten des Halses und der Nase v. M. Mackenzie. 1880. 1884.
— The throat departement of St. Thomas Hospital in 1882.
— Elektrische Erleuchtung verschiedener Höhlen des menschlichen Körpers etc. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. I. S. 341, 342.
Senator. Ueber acute infectiöse Phlegmone des Rachens. Berl. klin. Woch. Nr. 5. 1888.
— Ueber lebende Fliegenlarven in Magen und Mundhöhle. Berl. klin. Woch. Nr. 7. 1890.
Sendtner. Zur Aetiologie der Angina follicularis. Münch. med. Woch. Nr. 26. 1891.
Sidlo. Blasen- und Emphysembildung am weichen Gaumen. Wien. med. Presse Nr. 23. 1877.
Siebenmann. Ein Ausguss vom pneumatischen Höhlensystem der Nase. Wiesbaden 1891.
— Ueber die Verhornung des Epithels im Gebiete des Waldeyer'schen adenoiden Schlundringes und über die sogenannte Pharyngomycosis leptothricia. Arch. f. Laryng. II. 3.
Siegel. Ueber Glossitis und Mundseuche. Berl. klin. Woch. Nr. 48. 1893.
— Die Mundseuche des Menschen (Stomatitis epidemica). D. med. Woch. Nr. 49. 1891.
Simon E. Schmidt's Jahrb. Bd. 107. S. 161.
Sokolowski u. Dwochowski. Ein Beitrag zur Pathologie der entzündlichen Tonsillarprocesse. Arch. f. klin. Med. Bd. 49. Hft. 6.
Soltmann. Jahrb. f. Kinderheilk. XII.
Sommerbrodt J. Ueber im Pharynx localisirte Hydrargyrose. Berl. klin. Woch. Nr. 47. 1886.
— Ueber eine Papillargeschwulst im Pharynx. Virch. Arch. LI.
— Ueber Nasenreflexneurosen. Berl. klin. Woch. Nr. 11. 1885.
Sonnenburg. Arch. f. klin. Chir. XXIX. Hft. 3.
Spiess. Zur Behandlung der Verbiegungen der Nasenscheidewand. Arch. f. Laryng. I. Bd. 3.

Steinbrügge. Zeitschr. f. Ohrenh. VIII.
Steiner. Ueber die Entwicklung der Stirnhöhlen und deren krankhafte Erweiterung durch Ansammlung von Flüssigkeit. Arch. f. klin. Chirurg. XIII. 1.
Stöhr Ph. Ueber Mandeln und Balgdrüsen. Virch. Arch. Bd. 97. Hft. 2.
Störk. Klinik der Krankheiten des Kehlkopfes, der Nase und des Rachens. 1880.
— Drei Fälle von Haematoma retropharyngeale. Wien. med. Woch. Nr. 46. 1878.
— Ueber die Localbehandlung des Empyems der Highmorshöhle. Wien. med. Woch. Nr. 43. 1886.
— Die Erkrankungen der Nase, des Rachens und des Kehlkopfes. Wien 1895.
Strassmann. Ueber Tuberculose der Tonsillen. Virch. Arch. LXXXXVI.
Strübing. Ueber acutes angioneurotisches Oedem. Zeitschr. f. klin. Med. IX.
— Zur Therapie der Diphtherie. D. med. Woch. Nr. 48. 1891.
Strümpell. Lehrb. d. spec. Path. u. Ther. II. Aufl. 1885.
Stubenrauch, v. Tuberculöse Parotitis. Arch. f. klin. Chir. Bd. 47.
Suchanek. Ueber ulcus septum nar. perforans. Corresp.-Blatt. f. Schweizer Aerzte. 1893.
Swain. Die Balgdrüsen am Zungengrunde und deren Hypertrophie. Arch. f. klin. Med. XXXIX. 5. u. 6.

Taylor. Lancet. II. 1876, p. 685.
Thiery. Beobachtungen an einem Zungenlosen. Arch. f. klin. Chirurg. XXXII.
Thorner. Soor des Rachens und der Nasenhöhle bei einem Erwachsenen als Begleiterscheinung der Influenza. New-Yorker med. Monatsschr. Febr. 1892.
Tillmanns. Ueber todte Osteome der Nasen- und Stirnhöhle. Arch. f. klin. Chirurg. XXXII. 3.
Tornwaldt. Ueber die Bedeutung der Bursa pharyngea. Wiesbaden 1885.
— Ueber die explorative Eröffnung der Kieferhöhle. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. Jänner 1889. S. 382.
Touton. Casuistisches zum Lichen ruber planus der Haut und Schleimhaut. Berl. klin. Woch. Nr. 23. 1886.
Trautmann. Anatomische, pathologische und klinische Studien über Hyperplasie der Rachentonsille. Berlin 1886.

Unna. Ueber die normale Zungenoberfläche und den normalen Zungenbelag. Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. VIII.
— Ueber kreisförmige Exfoliation der Hohlhand und der Zunge. Vierteljahrsschr. f. Dermat. u. Syph. VIII.
Unruh. Ein Beitrag zur Pathologie der Diphtherie. Jahrb. f. Kinderheilk. XVII.

Vierordt O. Behandlung des Scharlach. Handb. d. spec. Ther. I. Bd.
Vogel A. Krankheiten der Lippen und der Mundhöhle. Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. VII. 1.
Vohsen. Die Durchleuchtung der Oberkieferhöhle und Stirnhöhle und deren Erkrankungen. Berl. klin. Woch. Nr. 46. 1890.
Volkmann. Einige Fälle von Cheilitis glandularis. Virch. Arch. L.
— Ueber den Charakter und die Bedeutung der fungösen Gelenkentzündungen. Volkmann's Samml. klin. Vortr. Nr. 168 u. 169. S. 31.
Voltolini. Die Anwendung der Galvanokaustik im Innern des Kehlkopfes und Schlundkopfes etc. II. Aufl. 1872.
— Die Pharyngoskopie und Rinoskopie. II. Aufl. 1879.
— Ueber elektrolytische Operation mit Demonstration von Instrumenten. Monatsschrift. f. Ohrenh. etc. Nr. 10. 1886.
— Die Krankheiten der Nase und des Nasenrachenraumes nebst einer Abhandlung über Elektrolyse. Breslau 1888.

Wagner E. Krankheiten des weichen Gaumens. Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. VII. 1.
— Die Erkrankungen des weichen Gaumens im Abdominaltyphus. Arch. f. klin. Med. XXXVII.
Wagner R. Erkrankungen des Gehirns nach einfachen Nasenoperationen. Münch. med. Woch. Nr. 51. 1891.
Walb H. Erfahrungen auf dem Gebiete der Nasen- und Rachenkrankheiten. Bonn 1888.

Waldeyer-Bickel. Der lymphatische Apparat des Pharynx. D. med. Woch. Nr. 20. 1884.
Weber Otto. Pitha's u. Billroth's Handb. d. allgem. u. spec. Chirurg. III. 1.
Weichselbaum. Die phlegmonöse Entzündung der Nebenhöhlen der Nase. Wien. med. Jahrb. 1881.
— Tuberculose der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Allgem. Wien. med. Zeitung. Nr. 27, 28. 1881.
Weinlechner. Abnorm langer Proc. styloid. als Ursache von Schlingbeschwerden. Wien. med. Woch. Nr. 5. 1882.
Wendt E. Die Krankheiten der Nasenrachenhöhle und des Rachens. Ziemssen's Handb. d. spec. Path. u. Ther. VII. 1.
Werner, Jurasz, Klemperer. Ber. d. II. Vers. südd. Laryng. 1895.
Wernher. Ueber die Auftreibung des Sinus maxillaris durch Flüssigkeiten, besonders durch Schleimcysten. Arch. f. klin. Chirurg. XIX. 4.
Wertheimber. Die Schlunddiphtherie. München 1871.
— Heilung von Dysphagia hysterica durch Eis. Arch. f. klin. Med. Bd. 43. S. 124.
— Ueber den submaxillaren Mumps. Münch. med. Woch. Nr. 35. 1893.
— Ueber die erythematöse Zungenrandentzündung der Säuglinge. Münch. med. Woch. 1894.
Wertheimer. Intern. Centralbl. f. Laryng. etc. III. S. 44.
Wille. Der Trigeminushusten. D. med. Woch. Nr. 16, 17. 1885.
Winckler. Ueber das Empyem des Sinus frontalis. Münch. med. Woch. Nr. 47, 48. 1892.
— Ueber den Gebrauch von Dilatationssonden in der Rhinochirurgie. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 6. 1893.
Winternitz. Hydrotherapie. Ziemssen's Handb. d. allgem. Ther. II. 3.
Wroblewski. Ueber die sogenannten acuten Abscesse der Nasenscheidewand. Arch. f. Laryng. II. 3.
Wyman. Autumnal catarrh. New-York 1872.
Zarniko. Aspergillusmykose der Kieferhöhle. D. med. Woch. Nr. 44. 1891.
— Die Krankheiten der Nase, ihrer Nebenhöhlen und des Nasenrachenraumes. Berlin 1894.
Zaufal. Ueber die Untersuchung des Nasenrachenraumes von der Nase aus, insbesondere mit trichterförmigen Spiegeln. Arch. f. Ohrenh. XII.
— Die normalen Bewegungen der Rachenmündung der Eustachischen Röhre. Arch. f. Ohrenh. IX, X.
— Die Plica salpingopharyngea. Arch. f. Ohrenh. XV.
— Ueber die allgemeine Verwendbarkeit der kalten Drahtschlinge zur Operation der Nasenpolypen. Prag 1878.
— Manuelle Extraction eines ungewöhnlich grossen fibrösen Nasenrachenpolypen. Prag. med. Woch. Nr. 11. 1893.
Zeissl. Lehrbuch der Syphilis. 4. Aufl. 1882.
— Eine noch nicht beschriebene Geschwulst der Sublingualdrüse. Wien. med. Jahrb. 1881.
Zenker W. Eine Mittheilung über die Percussion der Stirnhöhlen. Allg. Zeitschr. f. Psychiatrie. XXVII.
Ziem. Ueber Asymmetrie des Schädels bei Nasenkrankheiten. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 2—5. 1883.
— Ueber partielle und totale Verlegung der Nase. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 1—4. 1879.
— Ueber Nasenblennorrhoe bei Neugeborenen. Allgem. med. Centralztg. Nr. 101. 1885.
— Ueber Blennorrhoe der Nase und ihrer Nebenhöhlen. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 4. 1880.
— Delirium und vorübergehendes Irresein nach Operationen in der Nase. Monatsschrift f. Ohrenh. Nr. 9. 1885.
— Ueber das zweckmässige Verfahren zur Eröffnung der Kieferhöhle. Therap. Monatshefte Nr. 4 u. 5. 1888.

Ziem. Ueber metastatische Erkrankungen bei Nasenleiden. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 11. 1889.
— Ueber Verkrümmungen der Wirbelsäule bei obstruirenden Nasenleiden. Monatsschrift. f. Ohrenh. etc. Nr. 5. 1890.
— Ueber den Nachweis der Naseneiterung im Allgemeinen etc. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 7. 1890.
— In Sachen der Durchleuchtung der Kieferhöhle. Berl. klin. Woch. Nr. 24. 1891.
— Nochmals die Durchleuchtung der Kieferhöhle. Berl. klin. Woch. Nr. 48. 1891.
— Beziehungen zwischen Augen- und Nasenkrankheiten. Monatsschr. f. Ohrenh. Nr. 9. 1893.
— Intraoculare Erkrankungen bei Nasenleiden. Berl. klin. Woch. Nr. 38. 1889.
Ziemssen, v. Ueber diphtheritische Lähmungen und deren Behandlung. Klin. Vortr. IV. Nervensystem. 1887.
Zuckerkandl E. Normale und pathologische Anatomie der Nasenhöhle und ihrer pneumatischen Anhänge. Wien 1882.
Zuckerkandl Otto. Zur Frage der Blutung nach Tonsillotomie. Intern. klin. Rundschau Nr. 35. 1887.
Zwaardemaker. Athembeschlag als diagnostisches Mittel der Nasenstenose. Intern. Centralbl. VI. S. 337.
— Prüfung des Geruchsinnes. Fortschr. d. Med. Nr. 21. VI. 1888.

Sachregister.

Acne vibrissarum 300.
Accumulatoren 118.
Actinomykosis 62.
Adenoides Gewebe 98. — Wucherungen 151.
Ageusia 71.
Algosis faucium 216.
Allotriogeusia 71.
Allotrioosmie 347.
Alpdrücken 257.
Anästhesie der Mundhöhle 69; des Rachens 230; der Nase 344; dolorosa 230; — gustatoria 71.
Anatomie der Mundhöhle 1; des Rachens 97; der Nase 243; der Speicheldrüsen 77; der Nebenhöhlen 363.
Angina arthritica 127; catarrhalis acuta 126; couenneuse 175; diphtheritica 181; erysipelatosa 166; follicularis 129; herpetica 175; cachectica 180; lacunaris 129; Ludovici 89; nosocomialis phagedaenica 204; pultacée 180; scorbutica 180; syphilitica 205; tonsillaris 129; toxica 127; typhosa 180; ulcerosa 179; vasomotoria 234.
Angioneurosen 72, 234. 351, 352, 357.
Anomalien der Mundhöhle 8; des Rachens 119; der Nase 269; der Nebenhöhlen 367.
Anosmie 345.
Ansaugen der Nasenflügel 348.
Aphthen 30; Bednar'sche 40; des Rachens 179.
Aprosexie 111, 253.
Aptyalismus 81.
Aspergillus in Rachen und Nase 218. 324; in der Kieferhöhle 386.
Asthma 162, 338, 354, 361, 371.
Augenaffectionen bei Krankheiten der Nase 261. 292. 354, 371, 381, 388, 391, 395, 396, 400.
Athembeschwerden 20, 172, 189. 195, 220, 228; nasale 255, 257.

Baelz'sche Krankheit 23.
Ballonspray 114, 262.
Basedow'sche Krankheit 357.
Batterien galvanokaustische 116.
Bauernwetzel 83.
Bepinselungen der Mundhöhle 8; des Rachens 114; der Nase 264.
Blennorrhoea des Mundes 13; acute der Nase 281; Störk'sche 291; der Nebenhöhlen 369, 378, 389, 395, 399.
Blutungen der Mundhöhle 63; des Rachens 218; der Nase 267. 326; nach Tonsillotomie 164; des Sinus frontalis 389; der Keilbeinhöhle 401.
Bougies medicamentöse 265.
Bronchitis asthmatica 355, 357.
Bursa pharyngea siehe Recessus pharyngeus medius.
Bursitis 136.

Catarrhus autumnalis 354.
Cauterisation der Mundhöhle 8; des Rachens 115; der Nase 265, 288.
Cheilitis glandularis 23.
Choanen-Verschluss 120; — Zange 159.
Chromsäure 8. 115, 265, 288.
Cocaïn 8, 114, 266.
Concremente der Speicheldrüsen 93; der Mandeln 222; der Nase 331.
Coryza acute 278; caseosa 291; vasomotoria sive sympathetica 352; professionelle 279, 304; syphilitica 309.
Coryzarien 264.
Croup des Rachens 178; der Nase 302.
Cynanche cellularis maligna 89; contagiosa 181.
Cysticercus der Zunge 63.

Defecte siehe Perforationen.
Dentitionsgeschwür 39.
Diphtherie der Mundhöhle 44; des Rachens 181; der Nase 187, 307; der

Nebenhöhlen 386; des Kehlkopfes, Trachea und Bronchien 188; der Haut 190; der Sexualorgane 190; der Wundränder 194; croupöse 184; gangränöse 191; septische 190, 192; scarlatinöse 183, 203; Nachkrankheiten und Complicationen 193.
Drainirung der Nebenhöhlen 376.
Durchleuchtung 374.
Dysphagia hysterica 235.

Echinococcus 63, 337.
Ecraseur für die Nase 340.
Einreibungen medicamentöse 8, 112.
Eczem der Lippen 29; des Naseneinganges 300.
Elektricität 8, 102, 239, 265.
Elektrolyse 118, 227, 278, 343.
Emphysem des Rachens 227.
Empyem der Kieferhöhle 378; Stirnhöhle 389; Keilbeinhöhle 399; Siebbeinzellen 395; Diagnose combinirter Empyeme 377.
Enuresis nocturna 152, 258.
Ephidrosis parotidea 87.
Epilepsie bei Nasenkrankheiten 356.
Epithelialabschilferungen der Zunge 41.
Eröffnung der Kieferhöhle 382.
Stirnhöhle 392.
Siebbeinhöhlen 395.
Keilbeinhöhle 400.
Erosionen hämorrhagische 31.
Erysipel der Mundhöhle 29; des Rachens 166; der Nase 298; der Kieferhöhle 386.
Erythema multiforme des Rachens 177.
Excoriationen, oberflächliche, der Zunge 41; des Naseneinganges 301.
Exfoliation kreisfleckige 41.

Fissuren im Mundwinkel 49; am Nasen-eingang 301.
Fliegenlarven in der Nase 325.
Follicularverschwärungen des Gaumens 40; der Tonsillen 129.
Formfehler der Mundhöhle 8; des Rachens 119; der Nase 269; der Nebenhöhlen 367.
Fremdkörper der Speicheldrüsen 93; des Rachens 220; der Nase 330; der Nebenhöhlen 336, 401.
Fröschleingeschwulst 68.
Frühsommerkatarrh siehe Heufieber.

Galvanokaustik, Instrumentarium 115, 116; im Rachen 149, 164; in der Nase 265, 288, 341.
Gangrän der Mundhöhle 45; des Rachens 204; der Nase 308.
Gaumenhaken 105.
Gaumenmandel siehe Tonsilla palatina.
Gaumenspalte 9, 119.
Geschwülste der Mundhöhle 65; des Rachens 224; der Nase 332; der Speicheldrüsen 92; der Nebenhöhlen 369, 386, 394, 398, 401.
Geschwüre der Mundhöhle 33; des Rachens 179, 180, 206, 207; der Nase 303, 305, 310, 317.
Geruchlosigkeit siehe Anosmie.
Gingivitis 12.
Globus hystericus 27, 231.
Glossitis dissecata 23; papulosa acuta 30; suppurativa 20; syphilitica indurativa 23; superficialis Moellers 43.
Glossodynia 69.
Granula des Rachens 137, 149.
Granulationsgeschwulst, syphilitische, des Rachens 208; der Nase 314.
Guineawurm 63.
Gumma der Mundhöhle 50; des Rachens 206; der Nase 310.
Gurgelwasser 113.

Haematoma retropharyngeale 219; der Nase 298, 327.
Halsumschläge 112.
Hasenscharte 8.
Hemiglossitis herpetica 28.
Herpes labialis 28; pharyngis 175; narium 300.
Herzaffectionen bei Diphtherie 193, 194.
Herzklopfen reflectorisches 357.
Heufieber 353.
Highmorshöhle siehe Kieferhöhle.
Hydrargyrose 34.
Hydrops der Kieferhöhle 378; Stirnhöhle 388.
Hygiene der Haut 131.
Hyperaesthesia gustatoria 71; olfactoria 347; der Mundhöhle 69; des Rachens 231; der Nase 344.
Hyperkeratosis lacunaris 217.
Hyperosmie 347.
Hypertrophie der Gaumenmandeln 161; Rachenmandel 151; Lippen 9; Nasenknochen und Knorpel 285; Muscheln 284; Parotis 92; Seitenstränge 139; Uvula 146, 150; Zunge 22; Zungenbalgdrüsen 26.

Ichthyosis oris 15.
Inhalationsapparate 114, 262.
Inspection der Mundhöhle 5; des Rachens 102; der Nase 251; des Nasenrachenraumes 103.
Insufflationen 115, 264, 383.
Irrigator für die Nase 262.

Kakosmia objectiva 290; subjectiva 347, 371.
Keilbeinhöhle 365; Krankheiten der 398.
Keratosis oris 15.
Keuchhustengeschwür 39.
Kieferhöhle 363; Krankheiten der 378.
Kieferklemme 10, 73.
Kneifernase 270, 312.
Knochenblasen der Nase 274, 395.
Knochenerkrankungen der Nase 270, 285, 290, 298, 310, 318, 369, 373.
Knoten, syphilitische, siehe Gumma.
Kopfschmerz 258, 275, 287, 291, 331, 336, 356, 371 u. f.
Krämpfe der Kaumuskeln 73; Lippen 73; Rachenmuskeln 235; Zunge 73.

Lacunen, Katarrh der 129, 140.
Lähmung der Kaumuskeln 74; Lippen 74; Zunge 75; diphtheritische 195; der Rachenmuskeln 237; Nasenflügel 348.
Landkartenzunge 41.
Lepra der Mundhöhle 57; des Rachens 214.
Leptothrix bucealis 3, 62, 216.
Leukoplakia oris 15.
Liehen ruber planus oris 17.
Luft eingeathmeter Beschaffenheit 249.
Lupus der Mundhöhle 56; des Rachens 214; der Nase 320; syphiliticus 314.

Makroglossie 9, 22.
Mandel siehe Tonsilla.
Mandelsteine 222.
Massage 113, 265, 297.
Maul- und Klauenseuche 57, 215.
Mikrocoeccus diphtheriae 182.
Migräne 258, 356, 370.
Mikrostomie 9.
Miliaria des Rachens 175.
Missbildungen der Mundhöhle 8; des Rachens 119; der Nase 269; der Nebenhöhlen 367.
Mukokele 368, 378, 388.
Mumps 82; submaxillarer 88.
Mundathmung, Folgen der 255.
Mundentzündung siehe Stomatitis.
Mundfäule 37.
Mundseuche des Menschen 57.
Mykosen der Mundhöhle 58; des Rachens 215; der Nase 324; der Kieferhöhle 386.
Mykosis tonsillaris benigna 216.
Myocarditis bei Diphtherie 194.
Myxadenitis labialis 23.

Nachbehandlung 267.
Narkose bei Nasenoperationen 266.
Nase angeborene Enge 273. — Weite 273; Bad 261; Blennorrhoe 281; Blutungen 326; vicariirende 327; Bürste von Hartmann 296; Diphtherie 187, 307; Katarrh purulenter 281; — Douche 261; Husten 356; Schleimpolypen 333; Sonde 254; Spiegel 251, 252; Steine 331; Syphilis 309.
Nasenrachenkatarrh acuter 128; chronischer 135; phlegmonöser 168.
Nasenrachenpolypen 335.
Nebenhöhlen der Nase, Anatomie 363; Physiologie 366; Pathologie, allgemeine, der Nebenhöhlen 368; Aetiologie und Symptomatologie allgemeine 370; Diagnose allgemeine 373.
Nervenkrankheiten der Mundhöhle 69; des Rachens 230; der Nase 344.
Neubildungen der Mundhöhle 65; des Rachens 224; der Nase 332; Speicheldrüsen 92; Nebenhöhlen 386, 394, 398, 401.
Neuralgie der Mundhöhle 69; des Rachens 231; der Nase 344.
Neurasthenia nasalis 349.
Neurose secretorische 234; vasomotorische des Rachens 234; der Nase 351, 352.
Nierenaffection bei Diphtherie 193.
Nigrities linguae 24.
Niesanfälle 286, 353, 354.
Noma 45.

Oedem, acutes, der Lippen 72; des Rachens 179; der Nase 301.
Oesophagismus 235.
Ohraffectionen 111, 145, 153, 160, 260, 269.
Oidium albicans 58.
Olfactometer 255.
Operationslehre, allgemeine, der Nase 266.
Orchitis parotidea 84.
Osteome der Nase 337; todte 394.
Ozaena genuine 291; syphilitische 311.
Ozaenacoccus 295.

Palpation der Mundhöhle 6; des Rachens 108; der Nase mit Sonde 254.
Papeln siehe Plaques.
Papilla foliata 2.
Papillitis 12.
Paraesthesia oris 70; gustatoria 71; olfactoria 347; pharyngis 231.
Parasiten der Zunge 63; Nase 324; der Nebenhöhlen 386.
Parosmie 347.
Parotitis epidemica 82; suppurativa 86.
Pavor nocturnus 162, 257.
Pecnash 325.
Pemphigus der Mundhöhle 29; des Rachens 176.

Perforationen des harten Gaumens 51; weichen Gaumens 119, 207; des Septum 270, 298, 304, 305, 311.
Perichondritis, primäre, der Nasenscheidewand 299.
Periglossitis sublingualis 21.
Periparotitis 83.
Peritonsillitis 168.
Pharyngitis acuta catarrhalis 126; atrophica 141, 151; chronica 134; diphtheritica 181; exsudativa 175; fibrinosa 178; foetida 142; gangraenosa 204; granulosa 137; lateralis 139; phlegmonosa 165; acute infectiöse 170; sicca 141, 151; scrophulosa 212; typhosa 180.
Pharyngocele 126.
Pharyngomykosis benigna sive leptothricia 216.
Pharyngoskopie siehe Rhinoskopie.
Pharynxhydrargyrose 34.
Phlegmone der Mundhöhle 19; des Rachens 165; der Nase 298; der Kieferhöhle 385.
Plaques, gutartige, der Zunge 41; pterygoidiennes 40; syphilitische der Mundhöhle 49; des Rachens 205; der Nase 309.
Plaquesnarben 15.
Polypen der Nase 333; blutende der Nasenscheidewand 335.
Probeausspülung der Nebenhöhlen 376.
Probepunction 377, 382, 383, 384.
Processus styloideus, abnorme Länge 119.
Prolapsus linguae 22.
Psoriasis oris 15.
Ptyalismus 78, 356.
Punaisie 292.

Rachenkatarrh siehe Pharyngitis.
Rachenhusten 144.
Rachenmandel s. Tonsilla pharyngea.
Ranula 68.
Raucherplaques 15.
Räume pneumatische 363.
Recessus pharyngeus medius 98; Katarrh des 128, 136.
Reflexneurosen 111, 258, 286, 338, 349, 371.
Retropharyngeal-Abscess 171; Hämatom 219; Struma 228.
Rhagaden 49, 301.
Rhineurynter 329.
Rhinitis catarrhalis acuta 278; chronica atrophica 290; atrophica foetida 291; hypertrophica 283; crouposa fibrinosa 302; diphtheritica 307; exsudativa 300; gangraenosa 308; gonorrhoica 281; phlegmonosa 298; ulcerosa 303; vasomotoria 352.
Rhinobyon 329.
Rhinolalia aperta 259; clausa 259.
Rhinolithen 331.
Rhinosclerom 215, 322.
Rhinoscopia anter. 251; poster. 103.
Rhinoskopisches Bild 106, 252.
Riechorgan 249.
Ringmesser von Gottstein 158; Hartmann 158; V. Lange 158; W. Mayer 156; Löwenberg 157; Schütz 157.
Rosenfieber 353.
Rothe Nase 286, 351.
Rothlauf des Rachens 166.
Rotz der Mundhöhle 58; des Rachens 215; der Nase 321; der Nebenhöhlen 369.

Salivation 78, 356.
Sarcine 62, 218.
Sattelnase 270, 312.
Scarificationen 103.
Schleimhautpapel siehe Plaques.
Schlingbeschwerden 7, 20, 66, 166, 172, 175, 184, 208, 211, 220, 226, 235, 237.
Schlingenschnürer für die Nase 340.
Schnarchen 257.
Schnupfen nervöser 352.
Schnupfpulver siehe Coryzarien.
Schwämmchen 58.
Schwellgewebe der Nase 247; abnorme Reizbarkeit 284, 351.
Schwellungskatarrh 283, 351.
Schwindel 356, 371.
Scorbut der Mundhöhle 35; des Rachens 180.
Scrophulose des Rachens 212; der Nase 319.
Seitenstrangentzündung 130, 149.
Septum-Abscess 298; Defecte 270, 286, 304, 305, 311; Polyp blutender 335; Verbiegungen und Auswüchse 270.
Sialodochitis 87.
Siebbeinhöhlen 366; Krankheiten der 395.
Sinuitis catarrhalis 368; serosa 378; pyorrhoica 369.
Sinuserkrankungen s. Nebenhöhlen.
Sondirung der Nebenhöhlen 375.
Soor des Mundes 58; des Rachens 215; der Nase 324.
Spatel 102.
Speicheldrüsen, Anatomie 77.
Speichelfluss 78, 356.
Speichelsteine 93.
Speichelverminderung 81.
Spinen des Septum 274.

Sprachorgan, Nase als 250.
Sprachstörungen 7, 75, 110. 162, 167, 226, 259.
Spray 114, 148, 262.
Spritzen für die Nase 262.
Stallfieber 353.
Staphylhämatom 219.
Stenosen siehe Verengerungen.
Stimmstörungen 26, 144, 167, 195, 220, 223.
Stirnhöhle 364; Krankheiten der 387.
Stomacace 37.
Stomatitis aphthosa 30; gonorrhoica 13; catarrhalis 11; diphtheritica 44; exsudativa 27; gangraenosa 45; mercurialis 33; parenchymatosa und phlegmonosa 19; scorbutica 35; sicca 13; ulcerosa 33; uraemica 11.
Stomatomykosis sarcinica 62.
Strahlenpilz 62.
Stricturen siehe Verengerungen.
Struma retropharyngea 228.
Stumpfnase 293, 312.
Sublingualis, Erkrankungen 88.
Submaxillaris, Erkrankungen 88.
Supraorbitalneuralgie 260, 279, 371, 379. 387, 390.
Sykosis des Naseneinganges 300.
Symptomatologie, allgemeine, der Krankheiten der Mundhöhle 6; des Rachens 109; der Nase 255; der Nebenhöhleneiterungen 370.
Synechien der Nase 274.
Syphilis der Mundhöhle 49; des Rachens 205; der Nase 309.

Tamponade der Nase nach Gottstein 295; hintere und vordere 267, 328, 329.
Therapie, allgemeine, der Krankheiten der Mundhöhle 8; des Rachens 111; der Nase 261.
Thränennasengangentzündung 201, 292, 388, 396.
Tonsilla palatina 99; Hypertrophie der 161; pharyngea 98; Hypertrophie der 151; Abscess der 167.
Tonsillotomie 163.
Trichine 63.
Trichloressigsäure 115, 265.
Trichter von Zaufal 108. 253.
Trigeminus-Husten 144. 356; Neuralgie 260, 336, 371, 379, 387, 390.
Trismus 73.
Trockenbehandlung der Nebenhöhlen 383.
Tuberculose der Mundhöhle 53; des Rachens 210; der Nase 316; Nebenhöhlen 369, 386.
Tylosis oris 15.

Ulcus septum nasi perforans 305.
Universalhandgriff für galvanokaustische Operationen von Schech 116.
Untersuchungsmethode der Mundhöhle 5; des Rachens 102; der Nase 250.
Urämie bei Diphtherie 193.
Urticaria in Mund und Rachen 29.
Uvula 99; Formfehler 120; Hypertrophie 146, 150.
Uvulotomie 150.

Varicen der Zunge 64.
Variola der Mundhöhle 29; des Rachens 177.
Vegetationen siehe Wucherungen.
Verbiegungen des Septum 270.
Verengerungen der Mundhöhle 9; des Rachens 119, 123, 207; der Nase 274.
Verkalkung der Nasenschleimhaut 331; der Nebenhöhlen 369.
Verwachsungen der Mundhöhle 9; des Rachens 119, 120, 122; der Nase 270, 274; der Tuben 122; der Choanen 120, 207, 270.
Vibrations-Massage 113, 151, 265.
Volubilitas linguae 5.

Wasserkrebs 45.
Wolfsrachen 119.
Wucherungen adenoide 151; polypoide der Muscheln 284.
Wundbehandlung in der Nase 267.

Xerostomie 13, 81.

Zäpfchen siehe Uvula.
Zahnbildung in der Nase 337.
Zahnfleisch-Entzündung 12; Tuberculose 54; Neubildungen 65.
Ziegenpeter 82.
Zufälle, üble, bei Nasenoperationen 268.
Zunge 1; Belag 2; Carcinom 66; Entzündungen 12. 20; schwarze Haarzunge 24; Sarkom 67; Syphilom 50; Tuberculose 54.
Zungenbändchen zu kurzes und zu langes 9.
Zungenpapillen 1; Atrophie 27; Hypertrophie 24, 26.
Zungenrandentzündung erythematöse 12.
Zungentonsille 2; Hypertrophie der 26; Atrophie 27.
Zungensteine 65.